

抗結核劑

衛署藥製字第013650號
Code No.10205

“溫士頓”

愛娜癆錠

"Winston"

Inavita Tablets

現今醫藥發達之際，結核病患者仍須長期且有耐心的治療，本劑即是考慮病患長期用藥過程中，會導致維他命 B₆ 缺乏症而製造，以求達到使患者於醫療過程能免除缺乏維他命 B₆ 的餘慮，且可預防或減輕治療期內服用藥物所引起的副作用，確保療效，以期縮短結核患者治療時間，使早日康復。

【成份】 Each tablet contains :

Isoniazid 100 mg
Pyridoxine HCl 10 mg
賦形劑：Tartrazine、Calcium Phosphate Dibasic、Magnesium Stearate、Cellulose Microcrystalline、Carmellose Sodium。

【作用及特性】

1. 本劑為抗結核之第一線藥劑(First-line drug)。
2. 本劑是結核病預防治療(Preventive therapy)的唯一藥劑。
3. 本劑是效力強的抗結核藥劑，常與PAS或Streptomycin合併使用。
4. 本劑參加Vitamine B₆，故患者長期服用時可預防因缺乏Vitamine B₆所引起的副作用。
5. 本劑作用於生長中之結核桿菌，產生強烈的抑菌作用。
6. 本劑可與結核菌維持生命必須之部份金屬元素相結合產生殺菌作用。
7. 本劑可干擾結核桿菌核甘酸及脂質合成，且可抑制其細胞壁中脂肪成份之合成。
8. 本劑口服吸收甚佳，且分佈甚廣，可達體內各組織。

【適應症】

抗肺結核、喉頭結核、腸結核、膀胱結核、皮膚結核、結核性髓膜炎、結核性膿胸、腎臟結核。

【用法用量】

通常成人一日三次，一次一錠，視症狀與年齡酌量增減之。
本藥須由醫師處方使用。

【包裝儲存】

6 ~ 1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。
25℃以下密閉阻光容器中儲存。
1510-01

Made in Taiwan



溫士頓醫藥股份有限公司

台南市永康區鹽洲里仁愛街117號