

尺寸：9.8x15cm

顏色：PANTONE Red 032 CV

PANTONE Process Black CV



衛署藥製字第014184號
Code No.20103

“溫士頓”

去氫羥化腎上腺皮質素 錠

"Winston"

Prednisolone Tablets

Prednisolone是一種合成之腎上腺皮質素，它的抗炎作用比Cortisone強3~4倍，且所用劑量比Cortisone小。

Prednisolone對於體內電解質的平衡損害較Cortisone小，對於水和鈉所引起的滯留和鉀的損失等的副作用亦微小，可說是一種安全度極高的製劑。

Prednisolone是種強力抗炎劑，對於一般的風濕性關節炎、過敏性疾病、支氣管氣喘、蕁麻疹等有極佳的治療效果。

【成分】每錠含有：

Prednisolone.....5mg

賦形劑：Lactose、Potato Starch、Calcium Phosphate Dibasic、Tartaric acid、Carmellose Sodium、Magnesium Stearate、Primojel。

【適應症】

急性風濕熱、風濕性肌炎、風濕性關節炎、骨關節炎、支氣管氣喘、過敏性鼻炎、藥物過敏、枯草熱、蕁麻疹、散播性紅斑狼瘡、過敏性皮膚炎、關節囊炎、肌炎。

【用法用量】

初劑量：成人1日4~6錠，分四次服用。

維持劑量：成人通常1日1~4錠分四次服用。或依症狀之減輕而逐漸減少劑量，至每日1/2~1錠時停止服用。本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 1.若是屬於急慢性感染症時，請併用適當的化學療法劑或抗生素藥品，治療感染性疾病更具療效。
- 2.服用本劑時請補充體內蛋白質，以免發生蛋白質缺乏。
- 3.對於有精神病因素者請多加注意。

4.因其副作用會引起浮腫、血壓上升，是以腎臟病患者及高血壓患者請注意。

5.糖尿病患者使用時有增加Insulin藥量的必要。

6.對於消化管障害如胃潰瘍等患者務請特別注意。

【禁忌】

精神病、消化管潰瘍、抗生物質不能奏效而須要手術之感染性疾病。心臟血管障害、腎機能不全、糖尿病、閉塞性靜脈炎、骨粗鬆病結核瘰癧性疾。

【包裝儲存】

1000錠以下塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。25℃以下緊密容器儲存。

1510-01



溫士頓醫藥股份有限公司

台南市永康區鹽洲里仁愛街117號

Made in Taiwan