

Paradoks nieobecności

Arkadiusz Dąbal

2026-05-17

Spis treści

1	Preliminaria	4
1.1	Podstawowe pojęcia i oznaczenia	4
1.2	Preferencje jednostkowe	4
1.3	Profile preferencji	5
1.4	Model wyborczy	5
1.5	Operacje na elektoracie	6
1.6	Kryteria wyborcze	7
2	Paradoks nieobecności	9
2.1	Twierdzenie Moulina	11
2.2	Inne twierdzenia	13
3	Silny paradoks nieobecności	18
	Spis symboli i oznaczeń	23

Wstep

Cel i zakres pracy

Rozdział 1

Preliminaria

1.1 Podstawowe pojęcia i oznaczenia

W niniejszej pracy wprowadzamy podstawowe oznaczenia oraz pojęcia z zakresu teorii wyboru, które będą wykorzystywane w dalszej części pracy. Formalizacja ta umożliwia precyzyjne sformułowanie oraz analizę paradoksu nieobecności.

Niech K oznacza zbiór kandydatów, przy czym $\#K = m$, natomiast W oznacza zbiór wyborców, gdzie $\#W = n$.

Definicja 1.1.1 (Elektorat). *Zbiorem wszystkich elektoratów nazywamy zbiór*

$$\mathcal{E}(W) := \mathcal{P}(W) \setminus \{\emptyset\}.$$

Elementy zbioru $\mathcal{E}(W)$ interpretujemy jako niepuste podzbiory zbioru W , czyli możliwe grupy wyborców uczestniczących w głosowaniu.

1.2 Preferencje jednostkowe

Definicja 1.2.1 (Relacja preferencji). *Relacją preferencji na zbiorze K nazywamy zupełny i przechodni porządek liniowy określony na K .*

Relacja preferencji opisuje indywidualne upodobania wyborcy względem kandydatów. Zupełność oznacza, że każda para kandydatów jest porównywalna, natomiast przechodniość zapewnia spójność preferencji.

Definicja 1.2.2 (Relacja preferencji wyborcy). *Dla każdego wyborcy $w \in W$ jego relację preferencji oznaczamy przez $\overset{w}{>}$. Zapis*

$$a \overset{w}{>} b$$

oznacza, że wyborca w preferuje kandydata a względem kandydata b .

Definicja 1.2.3 (Przestrzeń relacji preferencji). *Przestrzenią relacji preferencji na zbiorze K nazywamy zbiór wszystkich relacji preferencji na K , oznaczany przez*

$$\mathcal{R}.$$

Dla każdego wyborcy $w \in W$ jego relacja preferencji należy do przestrzeni $\mathcal{R}$, tj.

$$\overset{w}{>} \in \mathcal{R}.$$

Dla zwięzłości zapisu pomijamy indeks wyborcy, gdy nie prowadzi to do niejednoznaczności. Wówczas ciąg symboli

$$abcd$$

oznacza relację preferencji postaci

$$a \overset{w}{>} b \overset{w}{>} c \overset{w}{>} d.$$

Równoważnie można ją przedstawić w postaci pionowej:

w
a
b
c
d

Definicja 1.2.4 (Słaba preferencja). *Niech $\overset{w}{>}$ będzie relacją preferencji wyborcy $w \in W$. Relacją słabej preferencji związaną z $\overset{w}{>}$ nazywamy relację $\overset{w}{\geq}$ określoną wzorem*

$$a \overset{w}{\geq} b \iff a \overset{w}{>} b \text{ lub } a = b.$$

W dalszej części pracy rozważamy ustalony elektorat $V \in \mathcal{E}(W)$.

1.3 Profile preferencji

Definicja 1.3.1 (Profil preferencji). *Profilem preferencji na zbiorze wyborców W nazywamy funkcję*

$$R : W \rightarrow \mathcal{R},$$

która każdemu wyborcy $w \in W$ przyporządkowuje jego relację preferencji $R(w)$.

Zbiór wszystkich profili preferencji określonych na zbiorze W oznaczamy przez

$$\mathcal{R}^W.$$

W dalszej części pracy, dla przejrzystości zapisu, będziemy czasem posługiwać się przedstawieniem zagregowanym profilu preferencji. W takim ujęciu profil opisuje liczebność grup wyborców posiadających daną relację preferencji.

1	2
A	D
B	C
C	B
D	A

W powyższym przykładzie pierwszy blok oznacza jednego wyborcę o preferencjach $A \succ B \succ C \succ D$, natomiast drugi blok oznacza dwóch wyborców o preferencjach $D \succ C \succ B \succ A$.

1.4 Model wyborczy

Definicja 1.4.1 (Model wyborczy). *Modelem wyborczym nazywamy parę uporządkowaną*

$$\Sigma = (V, R|_V),$$

gdzie $V \in \mathcal{E}(W)$ jest elektoratem, natomiast $R \in \mathcal{R}^W$ jest profilem preferencji na zbiorze wszystkich wyborców.

Ograniczenie $R|_V$ oznacza zawężenie profilu preferencji do wyborców należących do elektoratu V .

Zakładamy, że:

- ten sam profil preferencji prowadzi do tego samego wyniku wyborów,
- każdy dopuszczalny profil preferencji wyznacza pewien wynik wyborów.

Definicja 1.4.2 (Metoda wyborcza). *Metodą wyborczą nazywamy funkcję*

$$M : \mathcal{R}^V \rightarrow \mathcal{P}(K),$$

która każdemu profilowi preferencji przyporządkowuje zbiór zwycięzców.

Definicja 1.4.3 (Metoda rozstrzygająca). *Metodę wyborczą M nazywamy rozstrzygającą, jeżeli dla każdego profilu preferencji wskazuje dokładnie jednego zwycięzcę, tj.*

$$M : \mathcal{R}^V \rightarrow K.$$

Definicja 1.4.4 (Metoda efektywna). *Metodę wyborczą nazywamy efektywną, jeżeli dla każdego dopuszczalnego profilu preferencji wyłania co najmniej jednego zwycięzcę.*

1.5 Operacje na elektoracie

W dalszej części pracy analizujemy wpływ udziału wyborców w głosowaniu na wynik wyborów. W tym celu wprowadzamy operacje modyfikacji elektoratu oraz odpowiadających im profili preferencji.

Niech $V \in \mathcal{E}(W)$ oraz $R \in \mathcal{R}^V$. Zakładamy, że każdemu wyborcy $w \in W$ przypisana jest relacja preferencji $\overset{w}{>} \in \mathcal{R}$.

Dla $w \in V$ definiujemy usunięcie wyborcy:

$$R - w := R \setminus \{(w, \overset{w}{>})\} \in \mathcal{R}^{V \setminus \{w\}}.$$

Dla $w \in W \setminus V$ definiujemy dodanie wyborcy:

$$R + w := R \cup \{(w, \overset{w}{>})\} \in \mathcal{R}^{V \cup \{w\}}.$$

Dla $k \in \mathbb{N}_+$ zapisujemy skrótowo:

$$R + k \cdot w, \quad R - k \cdot w,$$

gdzie oznacza to odpowiednio dodanie lub usunięcie k wyborców o relacji preferencji $\overset{w}{>}$.

Wprowadzone operacje pozwalają analizować zależność wyniku wyborów od składu elektoratu.

1.6 Kryteria wyborcze

Definicja 1.6.1 (Kandydat Condorceta). *Niech $R \in \mathcal{R}^V$ będzie profilem preferencji. Kandydata $a \in K$ nazywamy kandydatem Condorceta (zwycięzcą Condorceta), jeżeli w bezpośrednim porównaniu większościowym wygrywa z każdym innym kandydatem, tj.*

$$\forall b \in K, b \neq a \quad \#\{w \in V : a \overset{w}{>} b\} > \#\{w \in V : b \overset{w}{>} a\}.$$

Definicja 1.6.2 (Kryterium Condorceta). *Metoda wyborcza M spełnia kryterium Condorceta wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego profilu preferencji R , jeśli istnieje kandydat Condorceta $a \in K$, to jest on jedynym zwycięzcą wyłonionym przez metodę M , tj.*

$$M(R) = \{a\}.$$

Definicja 1.6.3 (Przeegrany Condorceta). *Niech $R \in \mathcal{R}^V$. Kandydata $a \in K$ nazywamy przegranym Condorceta, jeżeli przegrywa z każdym innym kandydatem w porównaniach parami, tj.*

$$\forall b \in K, b \neq a \quad \#\{w \in V : b \overset{w}{>} a\} > \#\{w \in V : a \overset{w}{>} b\}.$$

Kandydat będący przegranym Condorceta nie wygrywa żadnego porównania większościowego i stanowi naturalne przeciwieństwo zwycięzcy Condorceta.

Definicja 1.6.4 (Kryterium obecności). *Metoda wyborcza M spełnia kryterium obecności, jeżeli każdy wyborca słabo preferuje udział w głosowaniu względem jego braku, tj.*

$$M(R) \overset{v}{\geq} M(R - v),$$

dla każdego profilu preferencji $R \in \mathcal{R}^V$, każdego elektoratu $V \in \mathcal{E}(W)$ oraz każdego wyborcy $v \in V$.

Definicja 1.6.5 (Margines większości). *Dla profilu preferencji R funkcję marginesu większości nazywamy funkcję*

$$g_R : K \times K \rightarrow \mathbb{Z},$$

daną wzorem

$$g_R(a, b) = \#\{w \in V : a \overset{w}{>} b\} - \#\{w \in V : b \overset{w}{>} a\}.$$

Funkcja g_R mierzy przewagę jednego kandydata nad drugim w głosowaniach parami.

Definicja 1.6.6 (Zwycięzca Maximina). *Kandydata $a \in K$ nazywamy zwycięzcą metody Maximina, jeżeli maksymalizuje wartość*

$$\min_{x \in K \setminus \{a\}} g_R(a, x).$$

Profil preferencji R indukuje ważony turniej skierowany T_R , którego wierzchołkami są kandydaci, a waga krawędzi (x, y) wynosi $g_R(x, y)$.

Definicja 1.6.7 (Ranking Kemeny'ego). *Rankingiem Kemeny'ego nazywamy relację preferencji $> \in \mathcal{R}$, która maksymalizuje zgodność z preferencjami wyborców, tj. maksymalizuje wartość*

$$\sum_{w \in V} \left| > \cap \overset{w}{>} \right|.$$

Definicja 1.6.8 (Zwycięzca Kemeny'ego). *Kandydata $a \in K$ nazywamy zwycięzcą Kemeny'ego wtedy i tylko wtedy, gdy zajmuje pierwsze miejsce w pewnym rankingu Kemeny'ego.*

Mówimy, że metoda wyborcza spełnia kryterium Maximina (odpowiednio kryterium Kemeny'ego), jeżeli dla każdego profilu preferencji wybiera zwycięzcę Maximina (odpowiednio zwycięzcę Kemeny'ego). Jeżeli w danym profilu istnieje wielu takich kandydatów, metoda musi rozstrzygnąć remis i wskazać dokładnie jednego zwycięzcę.

Ponieważ zwycięzca Condorceta, o ile istnieje, jest jednocześnie jedynym zwycięzcą Maximina oraz jedynym zwycięzcą Kemeny'ego dla danego profilu preferencji, każda metoda spełniająca odpowiednie kryterium stanowi rozszerzenie kryterium Condorceta.

Możemy teraz przejść do udowodnienia prostszej wersji twierdzenia Moulina dla bardziej ograniczonych klas metod wyborczych.

W tym celu najpierw przedstawimy użyteczny lemat, który pozwala rozszerzyć dowody niemożliwości dla czterech alternatyw na przypadki, gdy liczba alternatyw jest większa niż cztery. Jego dowód stanowi również pierwszą wskazówkę, w jaki sposób zgodność z kryterium Condorceta oraz warunek uczestnictwa wzajemnie na siebie oddziałują.

Rozdział 2

Paradoks nieobecności

Paradoks nieobecności (ang. no-show paradox) jest jednym z najbardziej zaskakujących zjawisk w teorii wyboru. Polega on na tym, że dla pewnych metod wyborczych udział wyborcy w głosowaniu może prowadzić do wyniku mniej dla niego korzystnego niż jego rezygnacja z udziału.

Zjawisko to stoi w sprzeczności z naturalnym oczekiwaniem, że udział w głosowaniu nie powinien pogarszać sytuacji wyborcy.

Przykład 2.0.1 (Paradoks nieobecności dla procedury głosowań parami). *Rozważmy procedurę głosowań parami ze statusem quo równym kandydatowi D. Agenda głosowań ma postać:*

B vs D , następnie zwycięzca vs A , następnie zwycięzca vs C .

Niech profil preferencji będzie dany tabelą:

10	10	10
A	B	D
B	D	C
D	C	A
C	A	B

- W pierwszym głosowaniu porównywani są kandydaci B oraz D . Kandydat B wygrywa stosunkiem głosów 20 : 10.
- Następnie kandydat B zostaje porównany z kandydatem A . W tym głosowaniu zwycięża A stosunkiem głosów 20 : 10.
- W ostatnim etapie kandydat A zostaje zestawiony z kandydatem C . Kandydat C wygrywa większością 20 : 10, a zatem końcowym zwycięzcą procedury zostaje C .
- Każdy z trzech typów wyborców preferuje jednak kandydata D względem zwycięzcy C .
- Oznacza to, że wszyscy wyborcy woleliby utrzymanie statusu quo od wyniku uzyskanego przy pełnej frekwencji.
- W konsekwencji udział wszystkich wyborców w procedurze prowadzi do rezultatu gorszego od statusu quo, co stanowi przykład paradoksu nieobecności.

Metoda ta oczywiście nie jest neutralna, gdyż kolejność głosowania pomiędzy kolejnymi kandydatami ma ogromne znaczenie. Możemy zaproponować następującą definicję.

Definicja 2.0.1 (Paradoks nieobecności). *Mówimy, że metoda wyborcza M jest podatna na paradoks nieobecności, jeżeli istnieje profil preferencji $R \in \mathcal{R}^V$ oraz wyborca $v \in V$, dla których zachodzi*

$$M(R - v) \overset{v}{>} M(R).$$

Oznacza to, że wyborca v ściśle preferuje wynik wyborów uzyskany po jego nieobecności względem wyniku, który powstaje, gdy bierze udział w głosowaniu.

Poniższy przykład ilustruje występowanie paradoksu nieobecności dla metody Hare'a (IRV).

Przykład 2.0.2 (Paradoks nieobecności dla metody Copelanda). *Rozważmy profil preferencji:*

1	1	1	1
A	B	D	C
C	A	A	D
D	C	C	B
B	D	B	A

*Założmy dodatkowo, że w przypadku remisu metoda wybiera kandydata C .
Rozważmy teraz dodanie wyborcy o preferencjach*

$$C \succ A \succ B \succ D.$$

Otrzymujemy profil:

1	1	1	1	1
A	B	D	C	C
C	A	A	D	A
D	C	C	B	B
B	D	B	A	D

- Przy początkowym profilu kandydaci A oraz C uzyskują taki sam wynik Copelanda.
- Zgodnie z przyjętą regułą rozstrzygania remisów zwycięzcą zostaje C .
- Po dołączeniu nowego wyborcy jedynym zwycięzcą metody Copelanda zostaje kandydat A .
- Nowy wyborca posiada preferencje

$$C \succ A,$$

a więc bardziej preferuje wynik uzyskany przy swojej nieobecności.

- Oznacza to, że udział w głosowaniu pogarsza wynik z punktu widzenia tego wyborcy.

W konsekwencji metoda Copelanda jest podatna na paradoks nieobecności.

Możemy zaproponować następujące kryterium

Definicja 2.0.2 (Metoda odporna na nieobecność). *Metodę wyborczą M nazywamy odporną na nieobecność, jeżeli dla każdego profilu preferencji $R \in \mathcal{R}^V$ oraz każdego wyborcy $w \in V$ zachodzi*

$$M(R) \overset{w}{\geq} M(R - w).$$

Paradoks nieobecności pozostaje w ścisłym związku z kryterium Condorceta, co wyraża poniższe twierdzenie.

2.1 Twierdzenie Moulina

Twierdzenie 2.1.1 (Moulin). *Jeżeli liczba kandydatów spełnia $\#K \geq 4$, to każda metoda wyborcza spełniająca kryterium Condorceta jest podatna na paradoks nieobecności.*

Dowód. TODO □

Twierdzenie to pokazuje fundamentalne napięcie pomiędzy naturalnymi własnościami metod wyborczych: zgodność z kryterium Condorceta implikuje możliwość wystąpienia paradoksu nieobecności.

Warto zauważyć, że implikacja odwrotna nie zachodzi. Istnieją metody wyborcze, które nie spełniają kryterium Condorceta, a mimo to są podatne na paradoks nieobecności (np. metoda Hare'a). Z drugiej strony istnieją metody odporne na ten paradoks, takie jak dyktatura czy metoda punktów Bordy.

Dyktatura jest metodą odporną na nieobecność. Niech M będzie metodą dyktatorską z dyktatorem $d \in W$.

Z definicji metody dyktatorskiej wynik wyborów jest zawsze równy najbardziej preferowanemu kandydatowi dyktatora. Oznacza to, że dla każdego profilu preferencji R

$$M(R) = \max_{d} K.$$

Rozważmy dowolnego wyborcę $v \in W$.

- Jeżeli $v = d$, to po usunięciu dyktatora wynik wyborów albo pozostaje taki sam, albo zmienia się na mniej preferowany z punktu widzenia dyktatora. W szczególności

$$M(R) \geq M(R - d).$$

- Jeżeli $v \neq d$, to usunięcie wyborcy v nie wpływa na wynik wyborów, ponieważ wynik zależy wyłącznie od preferencji dyktatora. Zatem

$$M(R) \stackrel{v}{=} M(R - v).$$

W obu przypadkach wyborca nie uzyskuje lepszego wyniku poprzez rezygnację z udziału w głosowaniu.

W konsekwencji metoda dyktatorska jest odporna na paradoks nieobecności. □

Metoda punktów Bordy jest odporna na paradoks nieobecności. Niech R będzie profilem preferencji oraz $w \in W$ dowolnym wyborcą.

Bez straty ogólności załóżmy, że preferencje wyborcy w mają postać

$$k_1 \stackrel{w}{>} k_2 \stackrel{w}{>} \dots \stackrel{w}{>} k_m.$$

W metodzie Bordy kandydat znajdujący się na i -tej pozycji otrzymuje $m - i$ punktów. Niech

$$s_i$$

oznacza liczbę punktów uzyskaną przez kandydata k_i w profilu R .

Po usunięciu wyborcy w kandydat k_i traci dokładnie $m - i$ punktów, a więc jego nowy wynik wynosi

$$s_i - (m - i).$$

Zauważmy, że kandydaci wyżej oceniani przez wyborcę w tracą więcej punktów niż kandydaci oceniani niżej.

W szczególności, jeżeli

$$i < j,$$

to

$$(m - i) > (m - j).$$

Oznacza to, że usunięcie wyborcy w działa relatywnie bardziej na korzyść kandydatów mniej preferowanych przez w .

W konsekwencji wynik wyborów po usunięciu wyborcy w nie może być przez niego ściśle preferowany względem wyniku przy jego udziale, tj.

$$M(R - w) \stackrel{w}{\leq} M(R).$$

Zatem metoda punktów Bordy spełnia kryterium obecności. □

Przykład 2.1.1 (Metoda Hare'a a paradoks nieobecności). *Rozważmy metodę Hare'a (IRV) oraz profil preferencji przedstawiony w tabeli:*

10	5	4	6
A	B	B	C
B	C	C	D
C	A	D	A
D	D	A	B

Dla powyższego profilu metoda Hare'a wskazuje jako zwycięzcę kandydata A . Rozważmy teraz sytuację, w której grupa 4 wyborców o preferencjach

$$B \succ C \succ D \succ A$$

rezygnuje z udziału w głosowaniu. Otrzymujemy wówczas zmodyfikowany profil:

10	5	6
A	B	C
B	C	D
C	A	A
D	D	B

W tym przypadku zwycięzcą zostaje kandydat C .

Ponieważ dla wyborców o preferencjach $B \succ C \succ D \succ A$ zachodzi

$$C \succ A,$$

oznacza to, że wynik po ich rezygnacji z udziału w głosowaniu jest przez nich ściśle preferowany względem wyniku uzyskanego przy ich uczestnictwie.

W konsekwencji metoda Hare'a jest podatna na paradoks nieobecności, mimo że nie spełnia kryterium Condorceta.

Przykład ten pokazuje, że brak spełnienia kryterium Condorceta nie implikuje odporności na paradoks nieobecności.

2.2 Inne twierdzenia

Lemat 2.2.1. *Założmy, że metoda wyborcza M spełnia kryterium Condorceta oraz warunek uczestnictwa. Niech R będzie profilem preferencji, a $B \subseteq K$ zbiorem tzw. złych alternatyw, przy czym każdy wyborca klasyfikuje każdą alternatywę $x \in B$ niżej niż każdą alternatywę $y \in K \setminus B$. Wówczas*

$$M(R) \notin B.$$

Dowód. Dowód przeprowadzimy indukcyjnie względem liczby wyborców.

1 krok indukcyjny Założmy, że elektorat składa się z jednego wyborcy, tj. $R = \{(w, \succ^w)\}$. Wówczas kandydatem Condorceta jest alternatywa znajdująca się na pierwszym miejscu w preferencjach wyborcy w . Z kryterium Condorceta wynika więc, że metoda M wskazuje tę właśnie alternatywę jako zwycięzcę. Ponieważ każda alternatywa z B jest klasyfikowana niżej niż każda alternatywa z $K \setminus B$, zwycięzca nie należy do B .

2 krok indukcyjny Założmy, że teza zachodzi dla każdego profilu złożonego z $n - 1$ wyborców, gdzie $n \geq 2$, i rozważmy profil R złożony z n wyborców. Niech $v \in V$ będzie dowolnym wyborcą.

Z warunku uczestnictwa otrzymujemy

$$M(R) \stackrel{v}{\geq} M(R - v).$$

Przypuśćmy nie wprost, że $M(R) \in B$. Ponieważ każdy kandydat spoza zbioru B jest przez wyborcę v oceniany wyżej niż każdy kandydat należący do B , z powyższej nierówności wynika, że również $M(R - v) \in B$.

Profil $R - v$ ma jednak $n - 1$ wyborców, zatem z założenia indukcyjnego otrzymujemy

$$M(R - v) \notin B,$$

co prowadzi do sprzeczności.

Wobec tego

$$M(R) \notin B.$$

□

Twierdzenie 2.2.1. *Nie istnieje metoda wyborcza spełniająca kryterium Maximina, która jednocześnie spełnia kryterium obecności dla*

$$|K| \geq 4 \quad \text{oraz} \quad |W| \geq 7.$$

Dowód. Niech f będzie rozszerzeniem metody Maximina spełniającym warunek uczestnictwa.

Rozważmy profil sześciu wyborców R przedstawiony na Rysunku 1. (Liczby nad każdą kolumną opisują, ile razy dana relacja preferencji występuje w profilu R . Na przykład w R dokładnie dwóch wyborców ma ranking $bdca$.)

Przypuśćmy, że $f(R) \in \{a, b\}$. Dodanie głosu typu $abcd$ prowadzi do ważonego turnieju, w którym alternatywa c jest jedynym zwycięzcą Maximina, zatem funkcja f musi wskazać c . Prowadzi to jednak do sprzeczności z warunkiem uczestnictwa, ponieważ wyborca, który dodał swój głos, uzyskałby lepszy wynik, gdyby wstrzymał się od głosowania.

Analogicznie, jeśli $f(R) \in \{c, d\}$, to dodanie głosu typu $dcba$ prowadzi do ważonego turnieju, w którym b jest jedynym zwycięzcą Maximina, co ponownie przeczy warunkowi uczestnictwa.

Symetria tego argumentu wynika z automorfizmu profilu R , polegającego na przekształceniu etykiet alternatyw zgodnie z odwzorowaniem $abcd \mapsto dcba$.

Jeżeli $m > 4$, do każdego profilu wyborców w R oraz do wszystkich dodatkowych wyborców użytych w dowodzie dodajemy nowe „złe” alternatywy $x_1, x_2, \dots, x_{m-4}$ umieszczone na dole

każdego rankingu. Z Lematu 1 wynika, że f wybiera w każdym kroku dowodu spośród zbioru $\{a, b, c, d\}$, więc dowód przebiega identycznie jak wcześniej.

Wynik istnienia dla $n \leq 6$ został uzyskany metodami opisanymi w Sekcji 5. $\square$

Twierdzenie 2.2.2. *Nie istnieje metoda wyborcza spełniająca kryterium Kemeny’ego, która jednocześnie spełnia kryterium obecności dla*

$$|K| \geq 4 \quad \text{oraz} \quad |W| \geq 4.$$

Dowód. Niech f będzie rozszerzeniem metody Kemeny’ego spełniającym warunek uczestnictwa.

Rozważmy profil czterech wyborców R przedstawiony na Rysunku 2.

Przypuśćmy, że $f(R) = d$. Wówczas usunięcie preferencji $cbad$ z profilu R prowadzi do ważonego turnieju, w którym ranking $adcb$ jest jedynym rankingiem Kemeny’ego (o wartości 12), a zatem a jest jedynym zwycięzcą Kemeny’ego, co przeczy warunkowi uczestnictwa.

Analogicznie możemy wykluczyć pozostałe trzy możliwe wyniki dla profilu R , rozważając sytuację, w której jeden z wyborców się wstrzymuje od głosowania. W każdym przypadku otrzymujemy jednoznacznego zwycięzcę Kemeny’ego oraz sprzeczność z warunkiem uczestnictwa.

Argumenty te są identyczne, ponieważ profil R jest całkowicie symetryczny w tym sensie, że dla każdej pary alternatyw x i y istnieje automorfizm profilu R , który odwzorowuje x na y .

Podobnie jak w Twierdzeniu 1, jeżeli $m > 4$, do profilu R oraz do dodatkowych wyborców dodajemy nowe „złe” alternatywy $x_1, x_2, \dots, x_{m-4}$ umieszczone na dole każdego rankingu. Z Lematu 1 wynika, że f wybiera w każdym kroku spośród zbioru $\{a, b, c, d\}$, co kończy dowód. $\square$

Twierdzenie 2.2.3. *Nie istnieje metoda wyborcza spełniająca kryterium Condorceta, która jednocześnie spełnia kryterium obecności dla*

$$|K| \geq 4 \quad \text{oraz} \quad |W| \geq 12.$$

Dowód. Rozważmy najpierw przypadek $m = 4$. Dowód ma strukturę przedstawioną na Rysunku 3. Niech R będzie profilem preferencji pokazanym na tym rysunku.

Ponieważ profil R pozostaje niezmienny po przestawieniu etykiet alternatyw zgodnie z odwzorowaniem $abcd \mapsto dcba$ oraz po permutacji wyborców, możemy bez straty ogólności założyć, że $f(R) \in \{a, b\}$. (Jawny dowód dla przypadku $f(R) \in \{c, d\}$ został zaznaczony na Rysunku 3.)

Z warunku uczestnictwa wynika, że z $f(R) \in \{a, b\}$ mamy również $f(R_\alpha := R + 2 \cdot abcd) \in \{a, b\}$, ponieważ wyborcy o preferencjach $abcd$ nie mogą pogorszyć swojego wyniku przez dołączenie do elektoratu.

Jeżeli $f(R_\alpha) = a$, to ponownie z warunku uczestnictwa wynika, że usunięcie dwóch wyborców o preferencjach $bdca$ nie zmienia zwycięzcy, tj. $f(R_\alpha - 2 \cdot bdca) = a$. Dodanie profilu $acdb$ również nie zmienia wyniku, więc

$$f(R_\alpha - 2 \cdot bdca + acdb) = a.$$

Jest to jednak sprzeczne z faktem, że profil $R_\alpha - 2 \cdot bdca + acdb$ posiada zwycięzcę Condorceta, którym jest c .

Zatem musi zachodzić $f(R_\alpha) = b$, co implikuje $f(R_\alpha - dcab) = b$, a więc

$$f(R_\beta := R_\alpha - dcab - 2 \cdot cabd) \in \{b, d\}.$$

Rozpatrujemy ponownie przypadki:

Jeżeli $f(R_\beta) = b$, to możemy dodać dwóch wyborców o preferencjach $badc$, otrzymując profil z jednoznacznym zwycięzcą Condorceta a , co przeczy warunkowi uczestnictwa.

Jeżeli natomiast $f(R_\beta) = d$, to otrzymujemy $f(R_\beta - abcd) = d$, a następnie z warunku uczestnictwa

$$f(R_\beta - abcd + 3 \cdot dcba) = d,$$

co stoi w sprzeczności z istnieniem zwycięzcy Condorceta b . Otrzymujemy więc sprzeczność.

Dla $m > 4$ dodajemy „złe” alternatywy $x_1, x_2, \dots, x_{m-4}$ na dole każdego rankingu w profilu R oraz u wszystkich dodatkowych wyborców. Z Lematu 1 wynika, że f wybiera na każdym etapie spośród zbioru $\{a, b, c, d\}$, co pozwala przeprowadzić dowód identycznie jak w przypadku $m = 4$. $\square$

Twierdzenie 2.2.4 (Twierdzenie 4). *Istnieje rozszerzenie Condorceta f , które spełnia warunek uczestnictwa dla $m = 4$ oraz $n \leq 11$. Ponadto f jest metodą parową, jest efektywne w sensie Pareto oraz stanowi uszczegółowienie cyklu górnego (top cycle).*

Metoda f jest zadana w postaci tablicy wyników (look-up table), która została wyznaczona przy użyciu solvera SAT. Tablica ta zawiera wszystkie 1,204,215 ważonych turniejów indukowanych przez co najwyżej 11 wyborców i przyporządkowuje każdemu z nich alternatywę zwycięską (zob. Rysunek 4 dla fragmentu tej tablicy).

Lemat 2.2.2. *Niech F będzie wielowartościowym rozszerzeniem Condorceta. Niech R będzie profilem preferencji oraz $B \subset A$ zbiorem tzw. „złych” alternatyw, przy czym każdy wyborca klasyfikuje każdą alternatywę $x \in B$ niżej niż każdą alternatywę $y \in A \setminus B$.*

Jeżeli F spełnia optymistyczny warunek uczestnictwa, to

$$F(R) \not\subseteq B,$$

tj. zbiór wyników zawiera przynajmniej jedną nie-złą alternatywę.

Jeżeli F spełnia pesymistyczny warunek uczestnictwa, to

$$F(R) \cap B = \emptyset,$$

tj. żadna zła alternatywa nie należy do zbioru wyników.

Dowód. Optymistyczny warunek uczestnictwa. Dowód przeprowadzamy przez indukcję względem liczby wyborców $|N|$ w profilu R .

Jeżeli R składa się z jednego wyborcy i , to ponieważ F jest rozszerzeniem Condorceta, mamy $F(R) = \{x\}$, gdzie x jest najlepszą alternatywą wyborcy i , a więc nie jest alternatywą złą.

Jeżeli R zawiera co najmniej dwóch wyborców i $i \in N$, to z optymistycznego warunku uczestnictwa wynika, że

$$\max_{\prec_i} F(R) \succ_i \max_{\prec_i} F(R - i),$$

ponieważ $R = R - i + \prec_i$.

Z założenia indukcyjnego zbiór $F(R - i)$ zawiera alternatywę nie-złą x , zatem również $\max_{\prec_i} F(R - i)$ nie jest alternatywą złą. Wynika stąd, że $\max_{\prec_i} F(R)$ również nie jest złą, a więc $F(R)$ zawiera alternatywę nie-złą.

Pesymistyczny warunek uczestnictwa. Dowód prowadzimy przez indukcję względem $|N|$.

Jeżeli R składa się z jednego wyborcy i , to $F(R) = \{x\}$, gdzie x jest najlepszą alternatywą wyborcy i , a więc nie jest alternatywą złą.

Jeżeli R zawiera co najmniej dwóch wyborców i $i \in N$, to z pesymistycznego warunku uczestnictwa mamy

$$\min_{\prec_i} F(R) \succ_i \min_{\prec_i} F(R - i).$$

Z założenia indukcyjnego zbiór $F(R - i)$ nie zawiera alternatyw złych, zatem $\min_{\prec_i} F(R - i)$ również nie jest alternatywą złą. Wynika stąd, że $\min_{\prec_i} F(R)$ nie jest złą, a więc — z definicji minimum — zbiór $F(R)$ nie zawiera żadnej alternatywy złej. $\square$

Twierdzenie 2.2.5 (Twierdzenie 5). *Istnieje wielowartościowe rozszerzenie Condorceta F , które spełnia optymistyczny warunek uczestnictwa dla $m = 4$ oraz $n \leq 16$, a ponadto jest efektywne w sensie Pareto oraz stanowi uszczegółowienie cyklu górnego (top cycle).*

Twierdzenie 2.2.6 (Twierdzenie 6). *Nie istnieje wielowartościowe rozszerzenie Condorceta, które spełnia optymistyczny warunek uczestnictwa dla $m \geq 4$ oraz $n \geq 17$.*

Dowód. Niech F będzie taką funkcją i rozważmy profil 10 wyborców R przedstawiony na Rysunku 5.

Przypuśćmy, że $a \in F(R)$ lub $b \in F(R)$. (Przypadek $c \in F(R)$ lub $d \in F(R)$ jest symetryczny.) Niech $R_\alpha := R + 2 \cdot abcd$. Z optymistycznego warunku uczestnictwa wynika, że również $a \in F(R_\alpha)$ lub $b \in F(R_\alpha)$.

Jeżeli $a \in F(R_\alpha)$, to z warunku uczestnictwa otrzymujemy także

$$a \in F(R_\alpha + 3 \cdot acbd),$$

jednak profil ten posiada zwycięzcę Condorceta c , co prowadzi do sprzeczności.

Jeżeli natomiast $b \in F(R_\alpha)$, to również

$$b \in F(R_\alpha + 5 \cdot bacd),$$

lecz ten profil ma zwycięzcę Condorceta a , co również prowadzi do sprzeczności.

Dowód dla więcej niż 4 alternatyw wynika bezpośrednio z Lematu 2. $\square$

Twierdzenie 2.2.7 (Twierdzenie 7). *Nie istnieje wielowartościowe rozszerzenie Condorceta, które spełnia pesymistyczny warunek uczestnictwa dla $m \geq 4$ oraz $n \geq 14$. Z drugiej strony, dla $m = 4$ oraz $n \leq 13$ istnieje taka wielowartościowa reguła wyborcza.*

Dowód. Dowód ma podobną strukturę jak dowód Twierdzenia 3 i został przedstawiony w formie graficznej na Rysunku 6.

Początkowy profil w tym dowodzie ma postać

$$R^* := R + 2 \cdot abcd + 2 \cdot dcba,$$

gdzie R jest profilem z Rysunku 3. W dalszej części zastępujemy kroki, w których dodawani są wyborcy, analogicznymi krokami, w których wyborcy są usuwani, i w każdym kroku stosujemy pesymistyczny warunek uczestnictwa, aby otrzymać sprzeczność.

Ponieważ profil R^* pozostaje niezmienny po relabelingu alternatyw zgodnie z $abcd \mapsto dcba$ oraz permutacji wyborców, możemy bez straty ogólności założyć, że $a \in F(R^*)$ lub $b \in F(R^*)$.

Niech $R_\alpha := R^* - 2 \cdot dcba$. Z pesymistycznego warunku uczestnictwa wynika, że również $a \in F(R_\alpha)$ lub $b \in F(R_\alpha)$, ponieważ wyborcy o preferencjach $abcd$ nie powinni być lepiej sytuowani po opuszczeniu elektoratu.

Jeżeli $a \in F(R_\alpha)$, to z warunku uczestnictwa mamy także

$$a \in F(R_\alpha - 3 \cdot bdca),$$

jednak profil $R_\alpha - 3 \cdot bdca$ posiada zwycięzcę Condorceta c , co prowadzi do sprzeczności.

Zatem musi zachodzić $b \in F(R_\alpha)$, co implikuje $b \in F(R_\alpha - dcab)$. Niech

$$R_\beta := R_\alpha - dcab - 3 \cdot cabd.$$

Wówczas z warunku uczestnictwa wynika, że $F(R_\beta)$ zawiera b lub d .

Rozpatrujemy przypadki. Jeżeli $b \in F(R_\beta)$, to usunięcie wyborcy $dcab$ prowadzi do profilu z jednoznacznym zwycięzcą Condorceta a , co przeczy warunkowi uczestnictwa.

Jeżeli natomiast $d \in F(R_\beta)$, to mamy $d \in F(R_\beta - 2 \cdot abcd)$, a następnie z warunku uczestnictwa

$$F(R_\beta - 2 \cdot abcd - abdc)$$

zawiera c lub d , co stoi w sprzeczności z istnieniem zwycięzcy Condorceta b . Otrzymujemy więc sprzeczność. $\square$

Twierdzenie 2.2.8 (Twierdzenie 8). *Nie istnieje wielowartościowe rozszerzenie Condorceta, które jednocześnie spełnia optymistyczny oraz pesymistyczny warunek uczestnictwa dla $m \geq 4$ oraz $n \geq 12$. Z drugiej strony, dla $m = 4$ oraz $n \leq 11$ istnieje taka wielowartościowa reguła wyborcza (która dodatkowo jest efektywna w sensie Pareto oraz stanowi uszczegółowienie cyklu górnego).*

Dowód. Wykorzystujemy dowód Twierdzenia 3, przy czym stosujemy optymistyczny warunek uczestnictwa dla krawędzi oznaczonych dodaniem wyborcy (+), natomiast pesymistyczny warunek uczestnictwa dla krawędzi oznaczonych usunięciem wyborcy (−).

Z drugiej strony, jednoznaczna (rozstrzygająca) reguła wyborcza z Twierdzenia 4 spełnia zarówno optymistyczny, jak i pesymistyczny warunek uczestnictwa. $\square$

Rozdział 3

Silny paradoks nieobecności

Klasyczny paradoks nieobecności polega na tym, że pewna grupa wyborców może uzyskać bardziej preferowany wynik poprzez rezygnację z udziału w głosowaniu. W wielu przypadkach zjawisko to nie wydaje się jednak szczególnie istotne, jeżeli uzyskana w ten sposób poprawa dotyczy alternatywy, która nie jest dla tej grupy zdecydowanie preferowana.

Prowadzi to do naturalnego wzmocnienia rozważanego zjawiska.

Definicja 3.0.1 (Silny paradoks nieobecności). *Mówimy, że metoda wyborcza M jest podatna na silny paradoks nieobecności, jeżeli istnieje profil preferencji $R \in \mathcal{R}^V$, grupa wyborców $S \subseteq V$ oraz kandydat $a \in K$, taki że:*

- *kandydat a jest najbardziej preferowaną alternatywą dla wszystkich wyborców z S ,*
- *przy pełnym udziale S w głosowaniu wynik $M(R)$ jest przez nich mniej preferowany niż a ,*
- *natomiast po rezygnacji grupy S z udziału w głosowaniu zachodzi*

$$a \succ M(R - S).$$

Innymi słowy, w silnej wersji paradoksu nieobecności grupa wyborców może doprowadzić do wyboru swojej najbardziej preferowanej alternatywy poprzez wstrzymanie się od głosu, mimo że aktywny udział w głosowaniu prowadzi do wyniku dla niej gorszego.

Zjawisko to można zilustrować na przykładzie procedury głosowania sekwencyjnego.

Przykład 3.0.1 (Silny paradoks nieobecności – procedura sekwencyjna). *Rozważmy profil preferencji:*

2	3	2	2
A	B	C	C
B	C	A	B
C	A	B	A

Przy ustalonej agendzie głosowań:

$$A \text{ vs } B, \quad \text{następnie zwycięzca vs } C,$$

wynikiem końcowym przy pełnej frekwencji jest kandydat B .

Rozważmy teraz sytuację, w której dwóch wyborców o preferencjach

$$C \succ A \succ B$$

rezygnuje z udziału w głosowaniu. Wówczas zmodyfikowany profil prowadzi do zwycięstwa kandydata C , który jest dla tej grupy najbardziej preferowaną alternatywą.

Oznacza to, że rezygnacja z udziału w głosowaniu prowadzi do wyniku bardziej korzystnego dla tych wyborców niż ich aktywny udział.

Silny paradoks nieobecności może występować nie tylko w procedurach zależnych od agendy, ale również w metodach bezpośrednich, takich jak metoda Coombsa czy metoda Nansona.

W metodzie Coombsa oraz Nansona możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której przy pełnej frekwencji wygrywa kandydat B , natomiast po rezygnacji części wyborców zwyciężcą zostaje kandydat C , który jest dla tej grupy bardziej preferowany.

Zjawisko silnego paradoksu nieobecności prowadzi do naturalnego pytania o jego związek z kryteriami racjonalności metod wyborczych, w szczególności z kryterium Condorceta.

Twierdzenie 3.0.1 (Moulin). *Jeżeli $\#K \geq 4$, to każda metoda wyborcza spełniająca kryterium Condorceta jest podatna na silny paradoks nieobecności.*

Twierdzenie to pokazuje, że zgodność z kryterium Condorceta nie eliminuje możliwości wystąpienia silnego paradoksu nieobecności.

W literaturze rozważane są również metody odporne na to zjawisko. Przykładowo metoda maximina nie wykazuje podatności na silny paradoks nieobecności.

Istotnym pytaniem jest również istnienie warunków strukturalnych, które pozwalają kontrolować możliwość wystąpienia tego typu paradoksów. Jednym z podejść jest wprowadzenie ograniczeń typu q -majority.

Niech $q \in [\frac{1}{2}, 1]$. Mówimy, że kandydat a dominuje kandydata b w sensie q -większości, jeżeli

$$\#\{w \in V : a \overset{w}{>} b\} \geq q \cdot \#V.$$

Zbiór kandydatów niedominowanych definiujemy jako

$$C(q, R) = \{a \in K \mid \nexists b \in K \text{ takie, że } b \text{ dominuje } a\}.$$

Definicja 3.0.2 (q -warunek zgodności). *Metoda wyborcza M spełnia warunek q -zgodności, jeżeli dla każdego profilu preferencji R zachodzi:*

$$C(q, R) \neq \emptyset \Rightarrow M(R) \in C(q, R).$$

W tym kontekście można sformułować następujący wynik.

Twierdzenie 3.0.2 (Holzman). *Dla zbioru kandydatów K warunek q -zgodności oraz odporność na silny paradoks nieobecności są zgodne wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$q \geq \frac{\#K - 1}{\#K} \quad \text{lub} \quad \#K \leq 3.$$

Wynik ten pokazuje, że im większa liczba kandydatów, tym bardziej restrykcyjne warunki większościowe są konieczne, aby uniknąć występowania silnego paradoksu nieobecności.

Podsumowanie

Bibliografia

- [1] Ministry of Education and Science, Bulgaria, *Official Website*, available online: <https://www.mon.bg/>, accessed March 26, 2026.

Spis symboli i oznaczeń

Spis symboli i oznaczeń

- W — zbiór wszystkich wyborców, $\#W = n$,
- K — zbiór wszystkich kandydatów, $\#K = m$,
- $\mathcal{P}(W)$ — zbiór potęgowy zbioru W ,
- $\mathcal{E}(W) := \mathcal{P}(W) \setminus \{\emptyset\}$ — zbiór wszystkich elektoratów (niepustych podzbiorów zbioru W),
- $\mathcal{R}$ — zbiór wszystkich relacji preferencji na zbiorze K ,
- $\mathcal{R}^V$ — zbiór wszystkich profili preferencji określonych na elektoracie V ,
- $\overset{w}{>}$ — relacja ścisłej preferencji wyborcy $w \in W$,
- $\overset{w}{\geq}$ — relacja słabej preferencji wyborcy $w \in W$,
- $R : V \rightarrow \mathcal{R}$ — profil preferencji na elektoracie V ,
- $\Sigma = (V, R)$ — model wyborczy,
- $M : \mathcal{R}^V \rightarrow \mathcal{P}(K)$ — metoda wyborcza,
- $M : \mathcal{R}^V \rightarrow K$ — metoda rozstrzygająca (szczególny przypadek metody wyborczej),
- $g_R : K \times K \rightarrow \mathbb{Z}$ — funkcja marginesu większości,
- T_R — ważony turniej indukowany przez profil preferencji R ,
- $\#A$ — liczność zbioru A .

Skorowidz