

MEDICAL SURGICAL NURSING

Clinical Practice

تأمل ومراجعة سريعة

دليل دراسي احترافي يجمع بين النص الإنجليزي والترجمة العربية
خطوات الإجراءات السريرية الأساسية في تريض الجراحة الباطنية

IV Therapy

Suture Removal

Wound Care

NGT Insertion

Chest Physiotherapy

إعداد مرجعي للامتحان • English & Arabic Bilingual Edition

المحتويات | Table of Contents

العناية بالجروح — Wound Care	1
إزالة الغرز الجراحية — Surgical Suture Removal	2
العلاج الوريدي — IV Therapy	3
العلاج التنفسي — Chest Physiotherapy	4
تركيب أنبوبة المعدة الأنفية — NGT Insertion & Care	5
مراجعة سريعة للامتحان — Quick Review	6
نصائح أخيرة — Final Tips	7

العناية بالجروح | Wound Care (1

Applying a Dry Sterile Dressing — وضع ضمادة جافة معقمة

المصطلحات المهمة — Key Vocabulary

عربي	English
جرح	Wound
ضمادة	Dressing
معقم	Sterile
شاش	Gauze
قفازات	Gloves
شريط لاصق	Tape
أنبوبة تصريف	Drain
تلوث	Contamination
محلول ملحي	Saline
لاصق	Adhesive

الأدوات — Equipment

- **Clean disposable gloves** — قفازات نظيفة للاستعمال مرة واحدة
- **Sterile gloves** — قفازات معقمة
- **Moisture-proof bag** — كيس مقاوم للرطوبة (للنفايات)
- **Bath blanket** — بطانية للتغطية
- **Tape** — شريط لاصق
- **Adhesive remover or cotton with saline** — مزيل اللاصق أو قطن بمحلول ملحي
- **Cleansing solution** — محلول للتنظيف

• **Sterile dressing set** — طقم ضمادات معقم يحتوي على:

Sterile drape — غطاء معقم

Gauze dressing (Surgi pads) — ضمادات شاش

Sterile container — وعاء معقم للمحلول

Precut gauze if a drain is present — شاش مقصوص مسبقاً لو فيه أنبوبة تصريف

(Action & Rationale) الخطوات — Procedure

#	Action — الإجراء	Rationale — السبب
1	Review medical orders — راجع أوامر الطبيب	— Physician's order is needed لازم يكون فيه أمر طبي
2	Explain procedure to patient — اشرح الإجراء للمريض	Decreases anxiety, increases cooperation — يقلل القلق ويزيد التعاون
3	Gather equipment — جهز الأدوات	Promotes efficient time management — يوفر الوقت
4	Wash your hands — اغسل يديك	Decreases spread of microorganisms — يقلل انتشار الميكروبات
5	Keep patient privacy (close door/curtain) — حافظ على خصوصية المريض	Provides privacy and warmth — يوفر الخصوصية والدفع
6	Position the patient with bath blanket — ضع المريض في وضع مناسب وغطه	Prevents chilling — يمنع البرد
7	Place moisture-proof bag within reach — ضع كيس النفايات قريب	Receptacle for contaminated dressings — مكان للضمادات الملوثة
8	Assist patient to comfortable position — ساعد المريض على وضع مريح	Comfort + good body mechanics — راحة المريض
9	Wear disposable gloves & loosen tape — البس قفازات وفك الشريط	Prevents transmission of microorganisms — يمنع نقل الميكروبات
10	Assess the wound (odor, drainage, color) — افحص الجرح (الرائحة، الإفرازات، اللون)	Assess for complications and healing — لتقييم المضاعفات والشفاء
11	Open sterile dressing tray — افتح طقم الضمادات المعقم	— Maintains sterile technique يحافظ على التعقيم
12	Pour solution into sterile basin — اسكب المحلول في الوعاء المعقم	Keeps supplies sterile — يحافظ على التعقيم

#	Action — الإجراء	Rationale — السبب
13	Don sterile gloves — البس القفازات المعقمة	Prevents introduction of microorganisms — يمنع دخول الميكروبات
14	Clean wound from center to outer area (least to most) — نظف الجرح من المركز للخارج (من الأقل تلوثاً للأكثر، شاشة جديدة كل مرة)	Avoids contamination — يمنع التلوث
15	If drain present, apply precut dressing around it — لو فيه drain ضع شاش مقصوص حواليه	Absorbs exudate — يمتص الإفرازات
16	Apply sterile dressing over wound — ضع الضمادة المعقمة على الجرح	Provides protection — يحمي الجرح
17	Secure dressing with tape (paper tape for fragile skin) — ثبت الضمادة بالشريط (شريط ورقي للجلد الحساس)	Prevents skin breakdown — يمنع تلف الجلد
18	Remove gloves, dispose, wash hands — اخلع القفازات وارمها واغسل يديك	Prevents transfer of pathogens — يمنع نقل الجراثيم
19	Reassess patient — أعد تقييم المريض	Determines effect of dressing — change — لتحديد تأثير تغيير الضمادة
20	Document findings — وثق كل ما حدث	Records for evaluation — للتقييم لاحقاً

Important Tip — نصيحة مهمة

Always clean from clean to dirty (center → outer).
دائماً نظف من النظيف للمتسخ (من المنتصف للخارج).

إزالة الغرز الجراحية | Surgical Suture Removal (2)

التعريفات — Definitions

Wound suturing — خياطة الجرح

A procedure to close a wound using stitches to hold edges together
إجراء لإغلاق الجرح باستخدام غرز تثبت حواف الجرح مع بعض.

Suture removal — إزالة الغرز

Procedure to take sutures out of the skin to prevent scarring
إجراء لإخراج الغرز من الجلد لمنع التندب.

أهداف الخياطة — Purposes of Suturing

- Stop bleeding — إيقاف النزيف
- Reduce pain and infection — تقليل الألم والعدوى
- Repair the cutaneous wound — إصلاح الجرح الجلدي
- Minimize scarring — تقليل الندوب
- Maximize wound healing — تعزيز شفاء الجرح

أنواع الغرز — Types of Sutures

A) According to Material — حسب المادة

أمثلة — Examples	المعنى	Type
Catgut, Chromic gut	يمتصها الجسم	Absorbable
Nylon, Prolene, Silk	لا يمتصها الجسم	Non-absorbable
Nylon, Monocryl, Prolene	خيوط واحد	Monofilament
Vicryl, Silk	مصفور (عدة خيوط)	Multifilament (braided)
Catgut, Silk	طبيعي	Natural
Nylon, Vicryl, Monocryl	صناعي	Synthetic

B) According to Technique — حسب التقنية

1. **Interrupted suture** — غرز متقطعة (كل غرزة مستقلة)
2. **Continuous suture** — غرز متصلة (خيوط واحد متواصل)
3. **Vertical mattress** — غرز عمودية (للحواف المقعرة - الرقبة، الجبهة)

Suture Sizes — مقاسات الغرز

Smaller number = Larger thread | الرقم الأصغر = الخيط الأكبر
 Example: **6-0** is larger than **1-0** — مثال: 0-1 أكبر من 0-6.

Timing of Suture Removal — مواعيد إزالة الغرز

Location — المكان	Days — الأيام
Face / الوجه	3 – 5
Eyeblink, Nose, Lip / الحاجب، الأنف، الشفة	3 – 5
Scalp / فروة الرأس	7 – 10
Arms / الذراعين	7 – 10
Chest & abdomen / الصدر والبطن	8 – 10
Torso / الجذع	10 – 14
Legs / الساقين	10 – 14
Hands/feet (back) / ظهر اليدين والقدمين	10 – 14
Palms or soles / الراحة والأخمص	14 – 21
Diabetic / corticosteroid patients / مرضى السكر والكورتيزون	14 – 21

Principles of Suture Removal — مبادئ إزالة الغرز

1. Use **sterile forceps + suture scissors** — استخدم ملقط معقم ومقص غرز
2. **Cut at skin level** — اقطع عند مستوى الجلد
3. **Pull gently and smoothly** — اسحب برفق وسلاسة
4. **Don't pull contaminated suture through skin** — لا تسحب غرزة ملوثة عبر الجلد
5. **Support at exit point** — ادعم نقطة الخروج
6. **Remove knots first** — أزل العقد أولاً
7. **Pull at 45-degree angle** — اسحب بزاوية 45 درجة

Equipment — الأدوات

- Sterile suture removal set (forceps + scissors) — طقم معقم (ملقط + مقص)
- Disposable waterproof biohazard bag — كيس نفايات طبية
- Sterile antiseptic swabs — مسحات مطهرة معقمة
- Gauze pads — شاش
- Steri-Strips or butterfly tape — شرائط فراشة

قفازات نظيفة — Clean gloves •

الخطوات — Procedure |

#	Action — الإجراء	Rationale — السبب
1	Confirm physician's order — تأكد من أمر الطبيب	Safety — السلامة
2	Assess pain, give analgesic 30 min before قبل 30 دقيقة — قَيِّم الألم وأعط مسكن	Allow time for absorption — ليتم الامتصاص
3	Prepare equipment — جهز الأدوات	Organization — للتنظيم
4	Explain procedure — اشرح الإجراء	Decrease anxiety — يقلل القلق
5	Keep privacy — حافظ على الخصوصية	—
6	Place waterproof pad, position patient المريض في وضع مريح — ضع فوطة مقاومة وضع	Decreases contamination — يقلل التلوث
7	Wash hands, wear disposable gloves — اغسل يديك والبس قفازات	Prevents microorganisms — يمنع الميكروبات
8	Remove old dressing, clean with antiseptic (side to side, new swab each swipe) — أزل الضمادة القديمة ونظف بمطهر	Decrease infection risk — يقلل خطر العدوى
9	Assess wound (appearance, color, pus) — افحص الجرح	Confirms healing — يؤكد الشفاء
10	Don sterile gloves — البس قفازات معقمة	Prevent infection — يمنع العدوى
11	Open sterile packages — افتح الأطقم المعقمة	Organized procedure — إجراء منظم
12	Remove interrupted sutures place gauze, scissors in dominant hand, forceps in non-dominant hand, forceps in non-dominant hand, forceps in non-dominant hand — ضع الشاش، المقص في اليد المسيطرة، الملقط في الأخرى	Receptacle for sutures — لوضع الغرز
13	Grasp suture at knot with forceps — أمسك الغرزة عند العقدة بالملقط	—
14		

#	Action — الإجراء	Rationale — السبب
	— Gently pull knot, slip scissor tip under knot near skin اسحب العقدة برفق وضع طرف المقص تحتها قرب الجلد	— To release suture لتحرير الغرزة
15	— Cut suture close to skin اقطع الغرزة قريب من الجلد	—
16	— Pull suture out smoothly in one piece بسلاسة اسحب الغرزة كاملة	Smooth removal إزالة — without tension بدون شد
17	— Discard onto sterile gauze ارمها على شاش معقم	— Avoid contamination منع التلوث
18	— Remove alternate sutures first (...3rd, 5th, 7th) بالتناوب (الثالثة، الخامسة، السابعة...) — أزل الغرز	— Prevents dehiscence يمنع انفتاح الجرح
19	If no dehiscence remove rest. If little dehiscence apply butterfly tape. If large dehiscence cover with sterile gauze report to physician immediately and لو فيه فتح بسيط ضع شريط فراشة، لو الفتح كبير غط وأبلغ الطبيب فوراً	Prevents wound exposure — يمنع تعرض الجرح
20	— Clean again with antiseptic نظف مرة أخرى بمطهر	Prophylactic — وقائي
21	— Apply Steri-Strips if separation > 2 stitches الفتح أكبر من غرزتين — ضع شرائط ستيري لو	— Distributes tension يوزع الشد
22	— Apply sterile dressing ضع ضمادة معقمة	Protection from microorganisms — حماية من الميكروبات
23	— Remove gloves, wash hands اخلع القفازات واغسل يديك	—
24	— Instruct patient on follow-up care علم المريض المتابعة	Early detection of problems — الاكتشاف المبكر
25	— Document وثق	For evaluation — للتقييم

Important — مهم

Dehiscence = انفتاح الجرح.

!Cover and call doctor immediately If large dehiscence happens

لو حدث انفتاح كبير غط واتصل بالطبيب فوراً!

العلاج الوريدي | IV Therapy (3

التعريف — Definition

producing rapid effect ,**directly into the vein** An effective method of supplying fluids
طريقة فعالة لتوصيل السوائل **مباشرة في الوريد**، تعطي تأثير سريع.

الاستخدامات — Indications

- **Provide fluids & electrolytes** — توفير السوائل والأملاح
- **Administer medications** — إعطاء الأدوية
- **Administer blood & blood products** — إعطاء الدم ومشتقاته
- **Keep vein open** — إبقاء الوريد مفتوح للوصول السريع
- **Maintain urine output** — الحفاظ على إخراج البول

أماكن الوريد — Vein Puncture Sites

- **Basilic & Cephalic veins** — الأوردة في ثنية الذراع (الأكثر شيوعاً) in antecubital space
- **Hand veins** :Dorsal Venous network, Dorsal Metacarpal — أوردة اليد
- **Median cubital vein** — الوريد المتوسط
- **Ulnar Vein, Radial Vein** — الوريد الزندي والكعبري

Vein Should Be — مواصفات الوريد المناسب

- Large — كبير
- Visible — واضح
- Straight — مستقيم
- Superficial — سطحي
- Palpable — ملموس
- Strong — قوي
- In non-dominant arm — في الذراع غير المسيطرة

Veins to AVOID — الأوردة الواجب تجنبها

- / Mastectomy / dialysis graft / paralysis side
- Sites distal to previous puncture
- Hardened, infiltrated, bruised areas
- Thrombosis / fibroid
- Inflamed
- Thin / fragile / mobile
- Near bony prominences
- Infection, edema, phlebitis

Cannula Color Codes — ألوان الكانيولا (مهم جداً للامتحان!)

Flow Rate — السرعة	Gauge — المقاس	Color — اللون
mL/min 270	14G	Orange / برتقالي 
mL/min 180	16G	Grey / رمادي 
mL/min 125	17G	White / أبيض 
mL/min 80	18G	Green / أخضر 
mL/min 54	20G	Pink / وردي 
mL/min 33	22G	Blue / أزرق 
mL/min 20	24G	Yellow / أصفر 
mL/min 19	26G	Violet / بنفسجي 

Remember: Smaller gauge number = Larger cannula = Faster flow

تذكر: الرقم الأصغر = كانيولا أكبر = تدفق أسرع.

الأدوات — Equipment

- IV infusion tray (tourniquet, alcohol swab, tape) — صينية تحتوي على رباط ضاغط، مسحة كحول، شريط لاصق
- Extension tubing & stand — أنبوبة وحامل
- IV catheter (cannula) — كانيولا
- Prescribed fluid — السائل الموصوف
- Saline syringe — حقنة محلول ملحي
- Clean gloves — قفازات نظيفة
- Sterile gauze or transparent dressing — شاش معقم أو ضمادة شفافة

الخطوات — Procedure |

#	Step — الخطوة	Rationale — السبب
1	Review physician's orders — راجع أوامر الطبيب	— Safe administration لإعطاء آمن
2	Assess clinical factors (edema, dry skin, turgor) — قيّم الحالة	— Baseline assessment تقييم أساسي
3	Prepare equipment, check fluid (5 rights, color, expiry) — جهّز الأدوات وافحص السائل	— Reduce risk for error يقلل الأخطاء
4	Prepare environment (lighting, privacy) — جهّز البيئة	— Privacy — الخصوصية
5	Hand washing, wear gloves — اغسل يديك والبس قفازات	— Reduce infection العدوى
6	Verify patient identity (2 identifiers) — تأكد من هوية المريض	— Patient safety المريض
7	Introduce yourself, explain procedure — عرّف نفسك واطرح	— Reduce anxiety القلق
8	Comfortable position — وضع مريح	— Comfort — الراحة
9	Ask patient to open and close fist — اطلب من المريض فتح وقفل اليد	— To distend vein الوريد
10	Inspect both arms, palpate vein — افحص الذراعين	— Find suitable vein وريد مناسب
11	Apply tourniquet 10-15 cm above site — ضع الرباط الضاغط 15-10 سم فوق المكان	— Distends veins الأوردة
12	Select site, palpate, promote distention — اختر المكان	—
13	Cleanse with alcohol swab in circular motion (outward center) — نظف بمسحة كحول بحركة دائرية من الداخل للخارج	Remove microorganisms — إزالة الميكروبات
14	Insert cannula bevel up at 30° angle, lower to 10° when flashback occurs — أدخل الكانيولا بالحافة لأعلى بزاوية 30° ثم اخفض لـ 10° عند ظهور الدم	— Smooth entry سلس
15	Watch for blood return (flashback) — راقب رجوع الدم	

#	Step — الخطوة	Rationale — السبب
		Confirms vein placement — يؤكد الدخول للوريد
16	Stabilize cannula, release tourniquet — ثبت الكانيولا وحرر الرباط	Confirm placement — تأكيد المكان
17	Thread plastic catheter into vein — أدخل الكانيولا في الوريد	Decreases vein rupture يقلل تمزق الوريد
18	Apply pressure, remove guide needle, attach tubing — اضغط، اسحب الإبرة، وصل الأنبوبة	Prevents dislodging — يمنع الخلع
19	Ask patient to relax hand — اطلب من المريض إرخاء يده	—
20	Secure & dress site with tape — ثبت المكان بشريط لاصق	Maintain catheter للتثبيت
21	Flush cannula with saline — اشطف الكانيولا بمحلول ملحي	Check patency — للتأكد من الفتح
22	Label site and tubing — ضع ملصق على المكان والأنبوبة	Reminder to change للتذكير بالتغيير
23	Open valve, connect IV, adjust flow rate — افتح الصمام واضبط السرعة	Provide therapy — للعلاج
24	Discard equipment, remove gloves, wash hands — ارم الأدوات	—
25	Document date, time, site, cannula size, fluid type, flow rate, problems — وثق التاريخ، الوقت، المكان، المقاس، نوع السائل، السرعة، المشاكل	—

Insertion Angle Tip

Start at 30° when you see blood (flashback) drop to 10°. ابدأ بزاوية 30° لما تشوف الدم اخفض لـ 10°.

Chest Physiotherapy (4) | العلاج التنفسي

Definition — التعريف

Group of airway clearance techniques to mobilize lung secretions and improve breathing. مجموعة تقنيات لـ تحريك إفرازات الرئة وتحسين التنفس.

Purposes — الأهداف

1. Reduce airway obstruction — تقليل انسداد المجرى التنفسي
2. Reduce infection severity — تقليل شدة العدوى
3. Maintain optimal respiratory function — الحفاظ على وظيفة التنفس

Indications — الاستخدامات

- Bronchitis, Asthma, Pneumonia
- التهاب شعب، ربو، التهاب رئوي
- Bronchiectasis, Atelectasis
- توسع شعب، انخماص رئة
- Mucous plugs / Lobular collapse
- سدادات مخاطية / انخماص فص
- Post-operative patients — مرضى ما بعد الجراحة

Contraindications — موانع الاستخدام

- Increased ICP — ارتفاع ضغط داخل المخ
- Unstable head/neck injury — إصابة رأس/رقبة غير مستقرة
- Active hemorrhage / hemothysis — نزيف نشط / نفث دم
- Recent spinal injury — إصابة عمود فقري حديثة
- Empyema — صديد بالرئة
- Bronchopleural fistula — ناسور
- Rib fracture / Flail chest — كسر ضلع / صدر متخلخل
- Vertebral fractures — هشاشة عظام
- Osteoporosis — كسور فقرية / هشاشة عظام

Four Techniques — أربع تقنيات

1 Chest Percussion — النقر على الصدر

to break secretions **cupped hands** Rhythmically striking chest with ضرب الصدر بإيقاع باليدين على شكل **كوب** لكسر الإفرازات.

- Cupped hand position — وضعية اليد مقعرة
- Tap rib cage over affected area — اضرب القفص الصدري فوق المنطقة المصابة
- Smooth rhythm, 1-2 minutes — إيقاع سلس، 1-2 دقيقة
- **AVOID spinal column and kidneys** — تجنب العمود الفقري والكلى

2 Chest Vibration — الاهتزاز

during expiration Fine tremorous action اهتزاز خفيف **أثناء الزفير**.

- **deep breathing** Performed during — أثناء التنفس العميق
- Hands against chest — اليدين على الصدر
- **during exhalation** Quick contracting/relaxing of arm muscles — تقلص واسترخاء سريع أثناء الزفير
- Repeat 6-8 trials — كرر 6-8 مرات
- Finish with huffing/coughing — انته بالكحة

3 Postural Drainage — التصريف الوضعي

by gravity **flow of secretions** Various positions to facilitate أوضاع مختلفة لتسهيل **تدفق الإفرازات** بالجاذبية.

Lung anatomy

- lobes (upper, middle, lower) 3 = **Right lung** — الرئة اليمنى 3 فصوص
- lobes (upper, lower) 2 = **Left lung** — الرئة اليسرى فصان

#	Step — الخطوة	Rationale — السبب
1	Explain procedure — اشرح	Cooperation — التعاون
2	Cover patient, expose chest — غطِّ واكشف الصدر	Privacy — الخصوصية
3	Wash hands, wear PPE — اغسل واللبس وقاية	Reduce microorganisms — تقليل الميكروبات
4	Close windows/doors — أغلق النوافذ	Avoid air streams — تجنب التيارات
5	Auscultate before & after — اسمع قبل وبعد	Determine effectiveness — تحديد الفعالية
6	Bronchodilator/saline nebulized before شعب قبل	Decrease mucus thickness — تقليل سماكة المخاط
7	4-2 times daily before meals & bedtime — 4-2 مرات يوميًا قبل الوجبات والنوم	Avoid nausea/vomiting — تجنب الغثيان
8	Each position 5-10 min — كل وضعية 5-10 دقائق	—
9	Breathe in through nose, out through pursed lips شهيق من الأنف، زفير بشفايف مزمومة	—
10	Cough twice during exhalation — اكح مرتين مع الزفير	Remove secretions — لإخراج الإفرازات
11	Mouth care after — نظافة الفم بعد	—
12	Document amount, color, viscosity — وثق الكمية واللون	—

4 Deep Breathing Exercise — تمارين التنفس العميق

1. **Sit or stand**, pull elbows back, **inhale deeply** — اجلس أو قف واسحب الكوعين للخلف وخذ نفس

عميق

2. **Hold breath for 5 counts** — احبس النفس 5 ثواني

3. **Exhale slowly and completely** — ازفر ببطء وبالكامل

تركيب أنبوبة المعدة | NGT Insertion & Care (5 الأنفية

Definition — التعريف

NG tubes are inserted through the **nose posterior oropharynx esophagus stomach** أنابيب تدخل من الأنف البلعوم المريء المعدة.

Indications — الاستخدامات

- **Gastric decompression** — تفريغ المعدة (انسداد، علوص، ركود)
- **Small bowel obstruction relief** — تخفيف انسداد الأمعاء
- **Aspiration of toxic material** — شفط مواد سامة
- **Medication administration** — إعطاء أدوية
- **Feeding** — التغذية
- **Bowel irrigation** — غسيل الأمعاء
- **Removal of blood/clots in GI bleeding** — إزالة الدم في النزيف
- **Activated charcoal administration** — إعطاء فحم منشط
- **Diagnostic**: contrast agents, gastric content sample — تشخيصي: صبغات، عينة محتوى معدة

Contraindications — موانع الاستخدام

Absolute — مطلقة

- **Mid face trauma** — إصابة منتصف الوجه
- **Recent nasal surgery** — جراحة أنف حديثة

Relative — نسبية

- **Coagulation abnormalities** — اضطرابات تجلط
- **Recent alkaline ingestion** — ابتلاع قلوي حديث (خطر تمزق المريء)
- **Esophageal varices** — دوالي المريء
- **Esophageal strictures** — ضيق المريء

المضاعفات — Complications

- Gagging or vomiting — تهوع أو قيء
- Nasopharyngeal trauma/hemorrhage — إصابة/نزيف بلعومي
- Sinusitis, sore throat — التهاب جيوب، التهاب حلق
- **Pulmonary aspiration** — شفت رئوي (خطير)
- Esophageal/gastric perforation — ثقب مريء أو معدة

الأدوات — Equipment

- Nasogastric tube (fine bore) — أنبوبة دقيقة
- Disposable gloves — قفازات
- **Lubricant + gauze** — مزلق وشاش
- Disposable bowl (for vomiting) — وعاء للقيء
- Paper towels — مناديل ورقية
- **Large syringe** (for aspirate) — حقنة كبيرة للسحب
- **pH testing strips** — شرائط فحص الحموضة
- Dressing/tape — شريط لاصق
- Glass of water — كوب ماء (إذا البلع آمن)

الخطوات — Procedure |

#	Step — الخطوة	Rationale — السبب
1	Check doctor's orders (suction or drainage?) الأمر الطبي — راجع	Safety — السلامة
2	Explain procedure, agree on a pause signal واتفق على إشارة الإيقاف — اشرح	Reduces anxiety — يقلل القلق
3	Hand hygiene + gather supplies اغسل يديك وجهاز — Prevent microorganisms	Prevent microorganisms
4	Patient assessment nasal cavity, best nostril, septum history, palpate (occlude one, breathe other) — abdomen, bowel sounds, level of consciousness افحص الأنف، اختر الأفضل، تاريخ الحاجز، البطن	Document findings
5	Position patient at 45-90° pillow under head, raise bed, stand on patient's right (if right-handed) — وضع المريض جالس بزاوية 45-90 درجة	Allows easy passage المرور — سهولة
6	Place towel on chest, provide tissues + emesis basin — ضع فوطة وقدم مناديل ووعاء	For secretions/vomiting
7	Apply clean gloves البس قفازات — Decreases microorganisms	Decreases microorganisms
8	MEASUREMENT Measure from tip of nose and mark xiphoid process earlobe — قس من طرف الأنف للأذن للقص الصدري وعلم	Correct length — الطول الصحيح
9	Lubricate tube tip زلق طرف الأنبوبة — Easier insertion	Easier insertion
10	Curve 10-15 cm of tube around finger سم من الأنبوبة حول الإصبع — لف 10-15	Conforms to nasopharynx curve — ليتوافق مع انحناء البلعوم
11	Hyperflex patient's head breathe through mouth — اخفض رأس المريض للأمام وتنفس من الفم	Closes trachea, opens esophagus — يغلق القصبة ويفتح المريء
12	sip water If resistance: twist tube, ask patient to through straw, or dry swallow. If significant resistance — remove and try other nostril مقاومة: لف الأنبوبة، اطلب رشفة ماء، أو بلع جاف لو في	If continues to gag check tube isn't coiled in mouth
13	Continue advancing until reaching the mark حتى تصل للعلامة — استمر	Accurate placement

#	Step — الخطوة	Rationale — السبب
14	Temporarily anchor tube to cheek with tape — ثبت مؤقتاً بالخد	Prevent displacement
15	VERIFY PLACEMENT : pH paper — acidic pH < 5 — استخدم ورق pH (الحموضة أقل من 5). X-ray confirms — الأشعة تؤكد قبل التغذية before feeding	If pH > 6 may be respiratory or small bowel — REMOVE الحموضة أكبر من 6 ممكن يكون في الرئة اخلعها
16	Mark length with permanent marker, record — علم بقلم دائم وسجل الطول	Identify migration — لمعرفة لو تحركت
17	Secure tube to gown — ثبت الأنبوبة بالقميص	Keeps NG in place
18	Document procedure, report unexpected findings — وثق وأبلغ عن أي شيء غريب	Patient safety

Special Considerations — ملاحظات خاصة

1. **Always assess placement before infusing anything** — دائماً تأكد من المكان قبل أي إعطاء.
2. **DO NOT instill air to test location** — لا تضخ هواء لاختبار المكان (طريقة قديمة وغير آمنة).
3. **Don't give food/drink without swallowing assessment** — لا تعط طعام بدون تقييم البلع.
4. **unpin and re-pin tube** When changing gown — لما تغير القميص فك الأنبوبة وثبتها مرة أخرى.

Golden Tip — نصيحة ذهبية

NEX — The 3 measurement points

use tipN — طرف الأنف • **arlobeE** — شحمة الأذن • **iphoid processX** — الناتئ الخنجري (قص الصدر)

Quick Review (6) | مراجعة سريعة لامتحان

Wound Care — العناية بالجروح

Q: How do you clean a wound — إزاي تنظف جرح؟

A: From center to outer area new swab each stroke — من المنتصف للخارج، شاش جديد كل مرة.

Suture Removal — إزالة الغرز

Q: When do you remove face sutures — إمتى تشيل غرز الوجه؟

A: days 5-3 — من 5-3 أيام.

Q: Which sutures do you remove first — أي غرز تشيل الأول؟

A: Alternate ones (3rd, 5th, 7th) — الغرز بالتناوب.

IV Therapy — الوريدي

Q: What angle for IV insertion — إيه زاوية الإدخال؟

A: 30°, drop to 10° after flashback — 30° drop to 10° after flashback — 10° drop to 30°.

Q: Tourniquet placement — مكان الرباط؟

A: 10-15 cm above the site — 10-15 سم فوق المكان.

Q: Largest cannula color — أكبر لون كانيولا؟

A: Orange (14G) — البرتقالي.

Chest Physiotherapy — العلاج التنفسي

Q: When to do postural drainage — إمتى نعمل تصريف وضعي؟

A: Before meals & bedtime, 2-4 times daily — قبل الأكل والنوم.

?Q: Hand position for percussion — شكل اليد للنقر؟

A: Cupped — مقعرة (شكل كوب).

— أنبوبة المعدة NGT

?Q: How to measure NG tube — إزاي نقيس؟

A: (NEX) Nose Earlobe Xiphoid.

?Q: pH for correct placement — الحموضة الصحيحة؟

A: pH < 5 (acidic) — أقل من 5 (حمضي).

?Q: Gold standard for placement confirmation — أفضل طريقة للتأكد؟

A: X-ray — الأشعة.

Final Tips for Exam (7) | نصائح أخيرة لامتحان

1. **Read questions carefully** — اقرأ الأسئلة بتركيز.
2. **Pay attention to numbers** (angles, days, pH) — ركز على الأرقام.
3. **Memorize cannula colors** — احفظ ألوان الكانيولا.
4. **Memorize suture removal timing** — احفظ مواعيد إزالة الغرز.
5. **Always:** Hand washing Gloves Privacy Explain Document. دائماً: غسل يدين قفازات خصوصية اشرح وثق.

Remember — تذكر

:Almost every procedure shares the same core steps

كل إجراء فيه نفس الخطوات الأساسية:

1. Check order — راجع الأمر

2. Explain — اشرح

3. Hand wash — اغسل

4. Gloves — قفازات

5. Privacy — خصوصية

6. Document — وثق

!Good luck — بالتوفيق!

.May your study sessions be as effective as a sterile technique