
INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA E IA

Exercícios: Matrizes


Diretoria de Matemática

Diretor: Manuel F. Junior

Membro: Yann N. G. Nóbrega

`tail.ufpb@gmail.com`

`https://aria.ci.ufpb.br/tail/`



Sumário

Matrizes

Matriz Transposta

Matriz diagonal

Matriz identidade

Operações simples com matrizes

Exemplos

Multiplicação de Matrizes

Exemplos

Determinante

Exemplos

Matriz Inversa

Exemplos

Regressão Linear

Exemplo



Matrizes

Um matriz é composta por valores em um formato de "arranjo", possuindo dimensões, chamadas por linhas e colunas. Vamos ver um exemplo de matriz:

$$A_{m \times n} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix} \quad (1)$$

Note que temos uma matriz com **m** linhas e **n** colunas, onde cada linha e coluna, pode ser tratado como um vetor com **m** ou **n** entradas, respectivamente. Quando temos $m = n$, temos o caso especial chamado de **matriz quadrada**, que será a base para os proximos conceitos.



Matriz Transposta

A matriz transposta de uma matriz é obtida escrevendo as linhas da matriz como colunas, ou simplesmente,

$$A_{2 \times 3} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}, A^T = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}, \dim(A^T) = 3 \times 2 \quad (2)$$



Matriz diagonal

Podemos definir uma matriz diagonal como uma **matriz quadrada** ($m = n$), onde todos os a_{ij} são iguais a 0, para todo $i \neq j$, ou seja, apenas a diagonal da matriz é diferente de 0.

$$A_M = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mathbf{a}_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{a}_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \mathbf{a}_{mn} \end{vmatrix} \quad (3)$$



Matriz Identidade

A matriz identidade é um caso específico da matriz diagonal, onde a_{ij} são iguais a 1, para todos $i = j$ e $a_{ij} = 0$, para todo $i \neq j$. Olhe um exemplo para entender melhor:

$$I_M = \begin{vmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \mathbf{1} \end{vmatrix} \quad (4)$$

Dado que a matriz identidade é um caso específico da matriz diagonal, logo ela é quadrada, e podemos definir suas dimensões pelo índice **M**, então esse exemplo temos que I é uma matriz $M \times M$.



Soma e subtração

Assim como os números, matrizes também admitem operações básicas como soma, subtração, multiplicação entre eles, ou ate mesmo vezes outro número qualquer. As operações de soma e subtração nas matrizes ocorrem de forma *Termo a termo*, ou seja, $a_{ij} + b_{ij}$ ou $a_{ij} - b_{ij}$.

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & b_{21} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{vmatrix} = \quad (5)$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{vmatrix} \quad (6)$$



Multiplicação por constante

Como vocês viram, a soma e subtração são feitos termo a termo, mas quando queremos multiplicar todos os valores de uma matriz por apenas um número ?! simples, cada termo daquela matriz é multiplicado pelo valor que você quer. Da seguinte, vamos tomar um α como qualquer valor no conjunto dos **Reais** :

$$\alpha \cdot \mathbf{A} = \alpha \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha \cdot a_{11} & \alpha \cdot a_{21} & \cdots & \alpha \cdot a_{1n} \\ \alpha \cdot a_{21} & \alpha \cdot a_{22} & \cdots & \alpha \cdot a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha \cdot a_{m1} & \alpha \cdot a_{m1} & \cdots & \alpha \cdot a_{mn} \end{vmatrix} \quad (7)$$



Exemplos

Sejam A e B matrizes de dimensão 3×3 , tal que:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}, B = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \\ 5 & 1 & 7 \end{vmatrix} \quad (8)$$



Exemplos

► Exemplo 1.1:

$$A + B = \begin{vmatrix} \textcolor{red}{1} & 2 & 3 \\ -4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \textcolor{blue}{2} & 0 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \\ 5 & 1 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (\textcolor{red}{1} + \textcolor{blue}{2}) & 2 & 6 \\ 1 & 5 & 8 \\ 6 & 2 & 9 \end{vmatrix} \quad (9)$$

► Exemplo 1.2:

$$3 \cdot A - 2 \cdot B = \begin{vmatrix} (\textcolor{red}{3} \cdot \textcolor{red}{1}) & 6 & 9 \\ -12 & 3 & 6 \\ 3 & 3 & 6 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} (\textcolor{blue}{2} \cdot \textcolor{blue}{2}) & 0 & 6 \\ 10 & 8 & 12 \\ 10 & 2 & 14 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (\textcolor{red}{3} - \textcolor{blue}{4}) & 6 & 3 \\ -22 & -5 & -6 \\ -7 & 1 & -8 \end{vmatrix} \quad (10)$$



Multiplicação de Matrizes

Multiplicar matrizes é um processo um pouco diferente, porém simples, o primeiro cuidado é que o **número de colunas da primeira matriz** deve ser igual ao **número de linhas da segunda**. O que devemos fazer em seguida é isolar a primeira linha da primeira matriz e somar a multiplicação do elemento correspondente da primeira coluna da segunda matriz. E assim sucessivamente até completar o resultado.



Multiplicação de Matrizes

Vamos definir A e B da seguinte forma:

$$B \times A = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} b_{11} \cdot a_{11} + b_{12} \cdot a_{21} + b_{13} \cdot a_{31} & b_{11} \cdot a_{12} + b_{12} \cdot a_{22} + b_{13} \cdot a_{32} \\ b_{21} \cdot a_{11} + b_{22} \cdot a_{21} + b_{23} \cdot a_{31} & b_{21} \cdot a_{12} + b_{22} \cdot a_{22} + b_{23} \cdot a_{32} \end{vmatrix}$$



Multiplicação de Matrizes

Vamos definir A e B da seguinte forma:

$$B \times A = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} b_{11} \cdot a_{11} + b_{12} \cdot a_{21} + b_{13} \cdot a_{31} & b_{11} \cdot a_{12} + b_{12} \cdot a_{22} + b_{13} \cdot a_{32} \\ b_{21} \cdot a_{11} + b_{22} \cdot a_{21} + b_{23} \cdot a_{31} & b_{21} \cdot a_{12} + b_{22} \cdot a_{22} + b_{23} \cdot a_{32} \end{vmatrix}$$



Exemplos

Sejam A e B matrizes de dimensão 3×2 e 2×3 , respectivamente, tal que:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} \quad (11)$$



Exemplos

► Exemplo 2.1:

$$A \times B = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (1 \cdot 2) + (2 \cdot 1) & 1 & 7 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix} \quad (12)$$



Exemplos

► Exemplo 2.1:

$$A \times B = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & (1 \cdot 1 + 2 \cdot 0) & 7 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix} \quad (13)$$



Exemplos

► Exemplo 2.1:

$$A \times B = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 1 & (1 \cdot 3 + 2 \cdot 2) \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix} \quad (14)$$



Exemplos

► Exemplo 2.2:

$$B \times A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (2 \cdot 1) + (1 \cdot 0) + (3 \cdot 1) & 6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \quad (15)$$



Exemplos

► Exemplo 2.2:

$$B \times A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & (2 \cdot 2) + (1 \cdot 1) + (3 \cdot 1) \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \quad (16)$$



Exemplos

► Exemplo 2.2:

$$B \times A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} \quad (17)$$



Exemplos

► Exemplo 2.2:

$$B \times A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ \color{red}{1} & \color{red}{0} & \color{red}{2} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1 & \color{blue}{2} \\ 0 & \color{blue}{1} \\ 1 & \color{blue}{1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 3 & (\color{red}{1} \cdot \color{blue}{2}) + (\color{red}{0} \cdot \color{blue}{1}) + (\color{red}{2} \cdot \color{blue}{1}) \end{vmatrix} \quad (18)$$



Exemplos

► Exemplo 2.1:

$$A \times B = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 7 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix} \quad (19)$$

► Exemplo 2.2:

$$B \times A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \quad (20)$$

Note que $A \times B \neq B \times A$, e também que $\dim(A \times B) \neq \dim(B \times A)$, a menos que A e B sejam matrizes quadradas.



Determinante

O determinante de uma matriz é o número associado a esta matriz **quadrada**, como o achamos? Há alguns algoritmos utilizados para encontrar esse número, por Sarrus, referenciado na pág. 04, seção 1.2 do ebook Introdução à Matemática para a Inteligência Artificial. Por cofatores, isolamos uma linha ou coluna (aquela com valores mais simples) e para cada elemento deste vetor calculamos o determinante da matriz de ordem menor que não está na linha, nem na coluna deste elemento. Multiplicamos, então, o elemento com o determinante e somamos todos os resultados do vetor escolhido.



Exemplos

Sejam A e B matrizes de dimensão 3×3 , ambas, tal que:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \\ 5 & 1 & 7 \end{vmatrix}$$



Exemplos

► Exemplo 3.1:

$$\det(A) = \left| \begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ -4 & 1 & 2 & -4 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right|$$



Exemplos

Diagonais principais (**dp**)

$$\det(A) = \begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} \\ -4 & \mathbf{1} & \mathbf{2} \\ 1 & 1 & \mathbf{2} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(\mathbf{1} \cdot \mathbf{1} \cdot \mathbf{2}) + (\mathbf{2} \cdot \mathbf{2} \cdot \mathbf{1}) + (\mathbf{3} \cdot \mathbf{-4} \cdot \mathbf{1})$$



Exemplos

Diagonais secundárias

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(2 \cdot -4 \cdot 2) + (1 \cdot 2 \cdot 1) + (3 \cdot 1 \cdot 1)$$



Exemplos

$$\begin{aligned} & \left[(1 \cdot 1 \cdot 2) + (2 \cdot 2 \cdot 1) + (3 \cdot -4 \cdot 1) \right] - \left[(2 \cdot -4 \cdot 2) + (1 \cdot 2 \cdot 1) + (3 \cdot 1 \cdot 1) \right] = \\ & \left[2 + 4 + (-12) \right] - \left[(-16) + 2 + 3 \right] = \\ & -6 - (-11) = 5 \end{aligned}$$



Exemplos

► Exemplo 3.2:

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \\ 5 & 1 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{(i+j)} \cdot a_{ij} \cdot A_{ij}$$



Matriz Inversa

A inversa de uma matriz é aquela que resulta a matriz identidade I_M quando multiplicada pela matriz original. Para encontrar os seus termos, podemos facilmente realizar um sistema linear.



Exemplos

Sejam A e B matrizes de dimensão 2×2 , ambas, tal que:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, B = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$$



Exemplos

► Exemplo 4.1:

$$A \times A^{-1} = I_2 \implies \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} (1 \cdot a) + (2 \cdot c) & (1 \cdot b) + (2 \cdot d) \\ (3 \cdot a) + (1 \cdot c) & (3 \cdot b) + (1 \cdot d) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$1 \cdot a + 2 \cdot c = 1 \qquad a = -1/5$$

$$3 \cdot a + 1 \cdot c = 0 \qquad c = 3/5$$

$$1 \cdot b + 2 \cdot d = 0 \qquad b = 2/5$$

$$3 \cdot b + 1 \cdot d = 1 \qquad d = -1/5$$



Exemplos

► Exemplo 4.2:

$$B \times B^{-1} = I_2 \implies \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \quad (21)$$

$$\begin{vmatrix} (2 \cdot a) + (0 \cdot c) & (2 \cdot b) + (0 \cdot d) \\ (5 \cdot a) + (4 \cdot c) & (5 \cdot b) + (4 \cdot d) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \quad (22)$$

$$2 \cdot a + 0 \cdot c = 1 \quad a = 1/2$$

$$5 \cdot a + 4 \cdot c = 0 \quad c = -5/8$$

$$2 \cdot b + 0 \cdot d = 0 \quad b = 0$$

$$5 \cdot b + 4 \cdot d = 1 \quad d = 1/4$$



Regressão Linear

Com tantos expostos, tantas definições, fica a pergunta: Onde eu usarei isso?. Aqui está, vamos mostrar um exemplo claro do uso da matemática, de modo bem simples, de um método estatístico muito frequente para resolução de problemas lineares: A Regressão Linear.



Regressão Linear


Na estatística, a regressão é uma equação utilizada para estimar valores para uma variável Y (Variável dependente ou explicada), dado um valor para X (Variável independente ou explicativa). A regressão linear tem esse nome "linear", pelo fato de querer assumir uma relação Linear entre as variáveis, ou seja, Y é uma função linear, tendo alguns valores como parâmetros. A equação abaixo define a expressão para regressão linear multipla, escrita em sua forma matricial:

$$Y = X \cdot \hat{\beta}$$




Regressão Linear

Podemos ver 4 possíveis comportamentos dos dados:



Regressão Linear

Number of people who drowned by falling into a pool
correlates with
Films Nicolas Cage appeared in



tylervigen.com



Regressão Linear

Onde podemos definir Y como uma matriz $n \times 1$ ou simplesmente um vetor com n entradas, X uma matriz de dimensões $n \times p + 1$ (sendo a primeira coluna preenchida sempre de 1), $\hat{\beta}$ uma matriz de dimensões $p + 1 \times 1$ ou um vetor com $p + 1$ entradas.

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} 1 & X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1p} \\ 1 & X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{np} \end{bmatrix}, \hat{\beta} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \\ \vdots \\ \hat{\beta}_p \end{bmatrix} \quad (23)$$



Regressão Linear

Dado que conhecemos os valores de X e queremos estimar Y , apenas nos resta estimar os valores de β , então utilizamos a seguinte expressão para o caso da regressão múltipla:

$$\hat{\beta} = (X^T \cdot X)^{-1} \cdot X^T \cdot Y \quad (24)$$



Exemplo

- ▶ **Exemplo 4.1:** Uma equipe de segurança de redes decidiu desenvolver varias formas para conter ataques aos servidores, e agora decidiram estimar um valor para o sucesso dos meios desenvolvidos. Para isso foi desenvolvido um **Índice de sucesso** baseado em dois fatores:
 - ▶ Tempo de experimento (duração);
 - ▶ Número de ataques no período.

Logo em seguida, definido como seria feito o experimento, observaram os seguintes dados amostrais:



Exemplo

Esquema	Nº Ataques	Duração	Índice
A	5	118	8.1
B	13	132	6.8
C	20	119	7.0
D	28	153	7.4
E	41	91	7.7
F	49	118	7.5
G	61	132	7.6
H	62	105	8.0



Exemplo

O primeiro passo, dado os dados amostrais, é definir X e Y da seguinte forma matricial:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 118 \\ 1 & 13 & 132 \\ 1 & 20 & 119 \\ 1 & 28 & 153 \\ 1 & 41 & 91 \\ 1 & 49 & 118 \\ 1 & 61 & 132 \\ 1 & 62 & 105 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 8.1 \\ 6.8 \\ 7.0 \\ 7.4 \\ 7.7 \\ 7.5 \\ 7.6 \\ 8.0 \end{bmatrix}$$



Exemplo

Lembre-se que queremos encontrar:

$$\hat{\beta} = (X^T \cdot X)^{-1} \cdot X^T \cdot Y$$



Exemplo

Então, vamos calcular primeiro $(X^T \cdot X)^{-1}$, uma multiplicação matricial, logo em seguida, basta calcularmos a inversa do resultado.

$$X^T \cdot X = \begin{vmatrix} 8 & 279 & 968 \\ 279 & 13025 & 33045 \\ 968 & 33045 & 119572 \end{vmatrix} \Rightarrow (X^T \cdot X)^{-1} = \begin{vmatrix} 7.7134 & -0.0227 & -0.0562 \\ -0.0227 & 0.0003 & 0.0001 \\ -0.0562 & 0.0001 & 0.0004 \end{vmatrix}$$

E então, calculamos agora $X^T \cdot Y$.

$$X^T \cdot Y = \begin{vmatrix} 60.1 \\ 2118.9 \\ 7247.5 \end{vmatrix}$$



Exemplo

Por fim, $\hat{\beta}$ é estimado da seguinte forma:

$$\hat{\beta} = (X^T \cdot X)^{-1} \cdot X^T \cdot Y = \begin{bmatrix} 8.37 \\ 0.005 \\ -0.009 \end{bmatrix}$$

Agora que está estimado o $\hat{\beta}$, podemos estimar \hat{Y} da seguinte forma:

$$\hat{Y} = X \cdot \hat{\beta} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 118 \\ 1 & 13 & 132 \\ 1 & 20 & 119 \\ 1 & 28 & 153 \\ 1 & 41 & 91 \\ 1 & 49 & 118 \\ 1 & 61 & 132 \\ 1 & 62 & 105 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 8.37 \\ 0.005 \\ -0.009 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7.4 \\ 7.3 \\ 7.4 \\ 7.2 \\ 7.8 \\ 7.6 \\ 7.5 \\ 7.8 \end{bmatrix}$$

