研修医向け・15 分

学びを「ゲーム」の構造で設計する

チャレンジ・安全な失敗・フィードバックループ ― ポイントとバッジの、
その先

参考文献

2026-09-12 ・ AI(Claude)作成・主な出典は原典で確認

PART 1

症例: 学びが止まる場面

症例: 専攻医2年目、外来3か月目の「伸び悩み」

- 週2コマの外来、主訴は風邪・高血圧・腰痛の繰り返し
- 指導医の確認は診療後のカルテチェックのみ、コメントは「特に問題なし」
- 先月の見逃し(虫垂炎、翌日再診で判明)はカンファで言い出せないまま
- 本人の言葉:「毎日やっているのに、伸びている気がしない」
- → **症例は足りている。足りないのは学びの「設計」**

今日のゴール

- ゲームデザインの3原則(チャレンジ・安全な失敗・フィードバックループ)を、学習理論の言葉で説明できる
- ゲーミフィケーションのメタ分析を、効果量と研究の質から批判的に読める
- 明日の外来・カンファの自分の学習に、3原則のどれか1つを設計して入れられる

前提: ポイント・バッジはなぜ短命か

- 表面の仕掛け: ポイント・バッジ・リーダーボード(いわゆる PBL: Points・Badges・Leaderboards)
- Hanus & Fox 2015: 16週の大学講義、バッジ+リーダーボード群で内発的動機と満足感が低下、期末成績も低下
- Deci ら 1999(128研究): 予告された有形報酬は内発的動機を下げる(d = −0.28〜−0.40)
- 自己決定理論: 効くのは「自律性・有能感・関係性」を満たす設計
- → 問うべきは「何を配るか」でなく「**学びの構造をどう組むか**」

PART 2

3つの原則とエビデンス

ゲーミフィケーションは効くのか: 3つの統合研究

研究	対象	主な結果
Sailer & Homner 2020	一般教育、k = 9〜19	認知 g = 0.49 / 動機 0.36 / 行動 0.25
van Gaalen 2021	医療職教育 44研究	負の結果なし。「評価 × チャレンジ」の組合せで教材利用が増加
Lee 2026	臨床推論 10研究 N = 931	SMD 1.11 → 出版バイアス補正後 0.75

- g / SMD = 標準化効果量(目安: 0.2 小・0.5 中・0.8 大)、k = 研究数

数字をどう読むか: 効果量の裏側

- 認知の効果(g = 0.49)は厳格な研究に絞っても安定、動機・行動の効果は不安定(Sailer)
- Lee 2026: 異質性 I^2 = 85%、GRADE 評価は「確実性が低い」、含まれた26研究の69%が学部教育 — 研修医への外挿は慎重に
- van Gaalen: 対照群が不明確な研究が多く、仕組み(メカニズム)を検討したのは 7/44
- 新奇性効果: 数週間の介入が中心、1年後の保持データはほぼ無い
- → 「ゲーム化すれば効く」でなく「**どの要素が、なぜ効くか**」を読む

原則1: 適切なチャレンジ ― 「少し難しい」を設計する

- ゲーム: 難易度がプレイヤーの腕に合わせて段階的に上がる
- 理論: 発達の最近接領域（Vygotsky）、フロー（Csikszentmihalyi）、望ましい困難（Bjork）
- 望ましい困難: 学習中の「やりにくさ」が長期保持と転移を高める
- 外来では: 慣れた主訴に**1つだけ縛りを足す**（検査前に診断確率を宣言する、など）
- 落とし穴: 難しすぎると回避、易しすぎると退屈 ― 難度は指導医と調整する

原則2: 安全な失敗 — 誤りを「データ」に変える

- ゲーム: 失敗は罰でなくフィードバック、すぐやり直せる
- Sinha & Kapur 2021「生産的失敗」: 先に解かせてから教えると概念理解・転移が向上(53研究、g = 0.36、忠実度が高いと 0.37〜0.58)
- Edmondson 1996: 病棟ユニット比較で、良いチームほど**報告される**投薬エラーが多い
- Edmondson 1999: 心理的安全性 → 学習行動 → チーム成果(51チーム)
- カンファでは: 「見逃し」を語る枠を先に用意し、語った人を責めない運用にする

原則3: 進捗が見えるフィードバックループ

- ゲーム: 行動 → 結果 → 次の行動、が秒単位で回る
- Hattie & Timperley 2007: フィードバックの平均効果 d = 0.79 — ただし種類で大差
- Kluger & DeNisi 1996（607効果量、教育に限らない統合）: **3分の1以上**の介入で成績がむしろ低下（平均は d = 0.41）
- 効くのは課題・プロセス・自己調整へのフィードバック、効かないのは「人」へのほめ・叱り
- 外来では: 担当患者の**転帰を自分で追って記録**する — 自前のループを持つ

PART 2・3つの原則とエビデンス

ゲームデザインの3原則

チャレンジ・安全な失敗・フィードバックループ

原則 1

チャレンジ

「少し難しい」を
設計する

外来では

慣れた主訴に
1つだけ縛りを足す

原則 2

安全な失敗

誤りを「データ」に
変える

外来では

「見逃し」を語る枠を
先に用意し、
責めない運用にする

原則 3

フィードバックループ

行動 → 結果 →
次の行動

外来では

担当患者の転帰を
自分で追って記録する

効くのは「配る報酬」でなく「学びの構造」

PART 3

明日の自分の学習設計へ

PART 3・明日の自分の学習設計へ

研修医で試すと:
Kaizen-IM(米国内科レジデント、2012–13)

- 毎日出題される Web 問題 + チーム / 個人のリーダーボード
- 16,427問が回答され、53%が17〜8時、29%が週末
- 同じ問題の再テストで正答率 +11.9%(1,046ペア)
- 脱落のオッズ比: 毎日やらない人で 4.5倍(95%CI 1.5〜13.6)、PGY3 で 4.3倍(1.4〜12.6)— 区間は広い
- → **毎日の小さな習慣**が残るかどうかを分けた(ただし2施設・対照群なし)

PART 3・明日の自分の学習設計へ

外来前5分のストリーク: マイクロゲーミフィケーション

- 発想: 短いチャレンジ・ストリーク・ナッジを日常業務に埋め込む(教材側の提案)
- 例: 外来前の5分で「今日1人だけ、診察前に診断仮説を紙に書く」→ 診察後に答え合わせ
- 3原則が全部入る: 少し難しい(仮説を先に言う)/ 安全(紙は自分だけ)/ ループ(即日答え合わせ)
- 根拠の一部: ログ上で連続記録が目立つと、次の行動が増える(Silverman & Barasch 2023、消費者行動の7実験。学習場面での検証ではない)
- 注意: 途切れたら「修復可」にしておく — 完璧主義には逆効果

PART 3・明日の自分の学習設計へ

ペアで2分: 自分の学習に1つ入れる

1. 3原則から1つ選ぶ(チャレンジ / 安全な失敗 / ループ)
2. 明日の外来かカンファで「何を・いつ・どう記録するか」を1文で
3. 相手に言う、相手の設計を聞く(各1分)
4. **全体で2〜3人に共有**

PART 3・明日の自分の学習設計へ

ふりかえり: 3つの問い

- ポイント・バッジと3原則の違いを、理論の言葉で一言で言うと?
- Lee 2026 の SMD 1.11 を、そのまま信じない理由を2つ挙げると?
- 自分の「1つ」は、1か月後に何で続いているか確かめる?

まとめ

- 効くのは「配る報酬」でなく「学びの構造」: 少し難しい・失敗できる・進捗が見える
- 効果量は小〜中（g ≈ 0.3〜0.5）、医学教育の証拠は質が低い — 期待は控えめに、設計は本気で
- 明日の一手: 外来前5分、診断仮説を1つ紙に書く
- **症例は足りている。足りないのは学びの設計**

参考文献

Sailer M, Homner L. The Gamification of Learning: a Meta-analysis. Educ Psychol Rev 2020;32:77–112. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w
van Gaalen AEJ, et al. Gamification of health professions education: a systematic review. Adv Health Sci Educ 2021;26(2):683–711. https://doi.org/10.1007/s10459-020-10000-3
Nevin CR, et al. Gamification as a tool for enhancing graduate medical education. Postgrad Med J 2014;90(1070):685–693. https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2013-132486
Hattie J, Timperley H. The Power of Feedback. Rev Educ Res 2007;77(1):81–112. https://doi.org/10.3102/003465430298487