利用可能性バイアスと診断推論

研修医・専攻医向け勉強会スライド（15分）

参考文献

2026-03-29 ・ AI(Claude)作成・主な出典は原典で確認

オープニング — あなたの診断は「記憶」に支配されている？

「先週インフルエンザを5人診た翌週、咳と発熱の患者さんが来たら何を考えますか？」

- 今日の問い: **なぜ経験を積むほど、特定の誤診パターンにはまるのか？**
- 2026年、1015名の医師を対象とした大規模横断調査がその答えを示した

学習目標

この勉強会の後、あなたは以下ができるようになります:

1. **説明できる**: 利用可能性バイアス（Availability Bias）の定義と発生メカニズムを自分の言葉で説明できる
2. **批判的に吟味できる**: Moura et al.（2026）の研究デザイン・結果・限界を分析できる
3. **計画を立てられる**: 自身の臨床推論において利用可能性バイアスを軽減するための構造化された振り返りを設計できる

認知バイアスの復習 — System 1とSystem 2

- **双対プロセス理論**(Kahneman, 2011)
  - **System 1**(速い思考): 直感的・自動的・省エネ → 臨床のほとんどの判断
  - **System 2**(遅い思考): 分析的・意識的・高負荷 → 複雑な鑑別診断
- 認知バイアスはSystem 1のショートカット(ヒューリスティクス)から生じる
- 代表的なバイアス:
  - **利用可能性バイアス**: 思い出しやすい情報を過大評価する
  - **アンカリング**: 最初の情報に固執する
  - **確証バイアス**: 自分の仮説を支持する情報ばかり集める

速い思考と遅い思考

System 1 と System 2

System 1　速い思考

直感的

自動的

省エネ

→ 臨床のほとんどの判断

System 2　遅い思考

分析的

意識的

高負荷

→ 複雑な鑑別診断

認知バイアスは System 1 のショートカット（ヒューリスティクス）から生じる

利用可能性バイアスとは何か

定義: 記憶から容易に想起できる情報（最近の経験、印象的な事例）を、実際の頻度や確率よりも重要視する認知傾向

- Tversky & Kahneman（1973）が最初に記述
- 臨床場面での発動条件:
  - **直近の経験:** 先週同じ疾患を診た
  - **感情的インパクト:** 印象に残った重症例
  - **メディア露出:** ニュースで話題の疾患

  例: インフルエンザ流行期に連続で診断した後、同じ症状の市中肺炎を見逃す

研究紹介 — Moura et al.（2026）

論文情報

- **誌名**: BMJ Quality & Safety（2026年2月）
- **著者**: Moura EC et al.
- **DOI**: 10.1136/bmjqs-2025-019520

研究デザイン

- **デザイン**: 横断調査（Cross-sectional study）
- **対象**: 1015名の医師（複数の専門科・経験年数）
- **方法**: 臨床ビネット（仮想症例）を用いた診断課題
- **主要曝露**: 直近7日以内に特定疾患の患者を診察した経験の有無
- **主要アウトカム**: 誤診率

主要結果

指標	値	意味
回帰係数（b）	0.165	直近の臨床遭遇が誤診率を有意に上昇させる
p値	0.018	統計的に有意
経験年数の影響	専門医では10年以上で誤診が減少（b=-0.361, p=0.046）	年数と専門性の組み合わせで効き方が変わる。年数だけで自動的に減るわけではない

主要結果(続き)

核心的メッセージ:

- 「たくさん診ている」こと自体はバイアス軽減にならない
- 重要なのは **「構造化された経験(Structured Experience)」**と**「フィードバック」** の蓄積

主要結果の数字

回帰係数 (b)

0.165

直近の臨床遭遇が
誤診率を有意に上昇させる

p値

0.018

統計的に有意

経験年数の影響

-0.361

専門医では10年以上で
誤診が減少
p = 0.046

「たくさん診ている」こと自体はバイアス軽減にならない

出典: Moura et al., BMJ Quality & Safety 2026（医師1015名・横断調査）

批判的吟味 — この研究の強みと限界

強み

- 大規模サンプル（n＝1015）
- 実際の臨床経験を曝露変数として使用（実験室ではなく現場に近い設計）
- 複数の専門科を横断的に調査

限界

- 横断研究のため因果関係は断定できない

批判的吟味 — この研究の強みと限界（続き）

- 臨床ビネットは実臨床の複雑性を完全には再現しない
- 自己申告ベースの直近臨床経験（想起バイアスの可能性）
- 「構造化された経験」の操作的定義が曖昧

関連エビデンス: American Journal of Medicine（2025）のレビューでも、認知バイアスが過剰検査（Over-investigation）につながるメカニズムが報告されている

ペアディスカッション（4分間）

以下の問いについてペアで話し合ってください:

> ***問い1:*** *「自分が直近の経験に引きずられて診断を変えた（または変えそうになった）エピソードはありますか？」*
>
> ***問い2:*** *「その時、何がきっかけで気づけた（または気づけなかった）のか？」*

- 1人2分ずつ
- 具体的な症例でなくても、「あのとき危なかった」レベルでOK

共有とフィードバック

全体共有（2-3名から）:

- どんな場面で利用可能性バイアスが発動しやすいと感じた？
- 「気づけた」要因は何だった？

ファシリテーターからの補足ポイント:

- 「忙しい時ほどSystem 1に頼りがち」
- 「一人で診断を完結させる場面」が最もリスクが高い
- フィードバックなしの経験は「バイアスの強化練習」になりうる

利用可能性バイアスへの対策 — 構造化されたアプローチ

個人レベル

1. **診断タイムアウト**（実践的な呼び名。Mamede 2010 の反省的推論に近い発想）: 最初の診断仮説を立てた後、意図的に10秒間「他の可能性」を考える
2. **鑑別リストの外在化**: 頭の中だけでなく、紙やカルテに3つ以上の鑑別を書き出す

利用可能性バイアスへの対策 — 構造化されたアプローチ(続き)

3. **診断日記:** 自分の診断パターンを記録し、定期的に振り返る(バイアス較正)

システムレベル

1. **構造化されたカンファレンス:** 診断過程のプロセスを振り返る場の設計
2. **ピアレビュー:** 同僚との診断共有と相互フィードバック
3. **チェックリスト活用:** 認知バイアスに対する構造化された防御策

振り返りと理解度確認

確認クイズ:

1. 利用可能性バイアスの定義を一文で述べてください
2. この研究で、経験年数と専門性は誤診率にどう関係したか？
3. 著者らは、年数に加えて何が重要だと考察したか？

まとめ

持ち帰りの問い — 明日の臨床から

> ***今週1つだけ試すなら:*** *外来で最初の診断仮説を立てた直後に、「本当にそうか？先週の経験に引きずられていないか？」と自問する10秒間を作る*

さらに深めたい人へ:

- Croskerry P. (2009) "A Universal Model of Diagnostic Reasoning" — Academic Medicine
- Kahneman D. (2011) "Thinking, Fast and Slow" — ファスト&スロー

まとめ

持ち帰りの問い — 明日の臨床から（続き）

- 今回の論文: Moura EC et al. (2026) BMJ Quality & Safety, DOI: 10.1136/bmjqs-2025-019520
- 関連文献: Chatterjee et al. ”When caution becomes harm: Understanding the psychology of over-investigation.” Am J Med. 2026;139(2):154-160. DOI: 10.1016/j.amjmed.2025.10.013