

# Appunti di Analisi Matematica 2

**Federico Cerutti**  
**Mauro Conte**

Dal corso del professor  
*Rinaldo M. Colombo*



Università degli Studi di Brescia

Ultimo aggiornamento: 9 maggio 2020

*Le sezioni di questo documento scritte in testo verde non son state trattate a lezione e son state riportate dal libro per completezza.*

Quest'opera è distribuita con licenza [Creative Commons](#) “Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale”.



# Indice

<b>1</b>	<b>Spazi Metrici</b>	<b>1</b>
1	Preliminari . . . . .	1
2	Successioni e Completezza . . . . .	11
2.1	Insiemi Connessi . . . . .	16
2.2	Insiemi Compatti . . . . .	17
3	Limiti e Continuità . . . . .	19
3.1	Uniforme Continuità . . . . .	25
3.2	Lipschitzianità . . . . .	27
4	Il Teorema delle Contrazioni . . . . .	31
5	Funzioni a Valori in $\mathbb{R}^n$ . . . . .	37
5.1	Il Caso Generale . . . . .	37
<b>2</b>	<b>Calcolo Differenziale</b>	<b>39</b>
6	Preliminari . . . . .	39
7	Derivate Parziali e Direzionali . . . . .	40
8	Derivata Totale . . . . .	43
8.1	Regole di Derivazione . . . . .	50
8.2	La Formula degli Accrescimenti Finiti . . . . .	50
9	Derivate Seconde . . . . .	55
9.1	Il Lemma di Schwarz . . . . .	56
9.2	Sviluppo in Serie di Taylor al II Ordine . . . . .	58
9.3	Derivate di Ordine Superiore . . . . .	60
10	Il Teorema della Funzione Implicita . . . . .	62
10.1	Il Teorema della Funzione Inversa . . . . .	69
11	Massimi e Minimi Liberi . . . . .	72
11.1	Condizioni Necessarie . . . . .	74
11.2	Condizioni Sufficienti . . . . .	76
12	Massimi e Minimi Vincolati . . . . .	78
13	Il Caso $n = 2, m = 1$ . . . . .	80
13.1	Il Significato Geometrico del Gradiente . . . . .	80
13.2	Il Significato Geometrico del Gradiente $n=2, m=1$ . . . . .	80
14	Derivate e Integrali . . . . .	82
15	Funzioni a Valori in $\mathbb{C}$ . . . . .	83
<b>3</b>	<b>Integrali Doppi</b>	<b>85</b>
16	Regole di Calcolo . . . . .	86
17	Cambiamento di Variabili . . . . .	87
<b>4</b>	<b>Successioni e Serie di Funzioni</b>	<b>89</b>
18	Preliminari . . . . .	89
19	Tipi Di Convergenza . . . . .	90
19.1	Convergenza Puntuale . . . . .	90
19.2	Convergenza Uniforme . . . . .	92

19.3	Convergenza Quadratica . . . . .	97
20	Serie di Funzioni Particolari . . . . .	98
20.1	Serie di Potenze . . . . .	98
20.2	Serie di Taylor . . . . .	100
20.3	Serie di Fourier . . . . .	104
<b>5</b>	<b>Equazioni Differenziali</b>	<b>115</b>
21	Preliminari . . . . .	115
22	Teoria Locale . . . . .	121
22.1	Esistenza e Unicit� . . . . .	122
22.2	Dipendenza Continua . . . . .	128
23	Teoria Globale . . . . .	134
23.1	Il Caso Lipschitziano . . . . .	135
23.2	Il Caso Sublineare . . . . .	136
24	Equazioni Autonome . . . . .	140
25	Equazioni Differenziali Lineari . . . . .	142
26	Equazioni Lineari a Coefficienti Costanti . . . . .	146
27	Esempi . . . . .	148
27.1	La Legge di Malthus . . . . .	148
<b>6</b>	<b>Calcolo delle Variazioni</b>	<b>149</b>
28	Preliminari . . . . .	150
29	L'Equazione di Eulero . . . . .	152
<b>7</b>	<b>Temi Esame</b>	<b>155</b>
30	T.E. 2012/2013 scritto n.1 . . . . .	155
	<b>Appendici</b>	<b>157</b>
A	Forme Quadratiche . . . . .	159

# Capitolo 1

## Spazi Metrici

### 1 Preliminari

**Definizione 1.1** (Spazio Vettoriale)

Siano  $K$  un **campo** e  $V$  un **insieme**. Si dice che **Spazio Vettoriale** sul campo  $K$  se sono definite due operazioni:

1. **Somma**, operazione interna binaria
2. **Prodotto per scalari** operazione esterna

**Nota.** Questa definizione è stata riportata per ricordare il concetto, si consiglia la consultazione di un libro di Algebra Lineare per una definizione più precisa.

**Definizione 1.2** (Spazio Metrico)

Si dice Spazio Metrico  $(X, d)$  un insieme  $X$  non vuoto in cui sia definita una **distanza** (o **metrica**), vale a dire una funzione  $d : X \times X \mapsto \mathbb{R}$  con le seguenti proprietà:

1.  $d(x, y) \geq 0 \quad \forall x, y \in X$
2.  $d(x, y) = 0 \quad \forall x, y \in X \iff x = y$
3.  $d(x, y) = d(y, x) \quad \forall x, y \in X$  (*simmetria*)
4.  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad \forall x, y, z \in X$  (*disuguaglianza triangolare*)

**Nota.** D'ora in poi, quando si userà  $d$  come metrica, dove non diversamente specificato, si intenderà la **Metrica Euclidea** di [Esempio 1.7 \(Esempi di Metriche\)](#)

Unendo le due definizioni si giunge naturalmente a

**Definizione 1.3** (Spazio Vettoriale Metrico)

Uno Spazio Vettoriale Metrico è uno spazio vettoriale  $V$  su cui è definito un prodotto scalare  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  definito positivo, la sua **metrica**.

**Nota.** Analogamente si definisce il Sottospazio Vettoriale Metrico

**Definizione 1.4** (Metrica Indotta)

Siano  $(X, d)$  spazio metrico e  $S \subseteq X$  con  $S \neq \emptyset$

Allora  $d|_S = d|_{S \times S}$  è una metrica su  $S$ , cioè la metrica  $d|_S$  è la **metrica indotta**, definita come la **restrizione** della metrica  $d$  ai soli elementi di  $S$ . Si definisce formalmente come

$$\begin{aligned} d|_S & : S \times S \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto d(x, y) \end{aligned}$$

**Definizione 1.5** (Sottospazio Metrico)

Siano  $(X, d)$  spazio metrico e  $S \subseteq X$  con  $S \neq \emptyset$

Allora  $(S, d|_S)$  con la [Definizione 1.4 \(Metrica Indotta\)](#) è a sua volta Spazio Metrico ed è chiamato **Sottospazio Metrico di  $(X, d)$**

*Dimostrazione.* La  $d|_S$ , essendo restrizione della metrica  $d$ , rispetta ancora tutti i punti della [Definizione 1.2 \(Spazio Metrico\)](#).  $\square$

### Proposizione 1.6

Sia  $(V)$  uno spazio vettoriale metrico sul campo  $K$  e sia  $\emptyset \neq U \subseteq V$ . Il sottoinsieme  $U$  è un sottospazio vettoriale metrico se, e soltanto se, sono verificate le seguenti condizioni:

1.  $\forall \mathbf{u}, \mathbf{u}' \in U \quad \mathbf{u} + \mathbf{u}' \in U$
2.  $\forall \lambda \in K, \forall \mathbf{u} \in U \quad \lambda \cdot \mathbf{u} \in U$

*Dimostrazione.* Non richiesta, analoga a quella per Spazi Vettoriali reperibile in un libro di Algebra Lineare  $\square$

### Esempio 1.7 (Esempi di Metriche)

Si dimostri che le seguenti funzioni sono distanze:

**Nota.** Si noti che alcuni degli esempi sottostanti sono relativi a metriche trattate molto più avanti e dunque potrebbe essere conveniente ignorarli temporaneamente per tornare qui quando saranno stati fatti i successivi argomenti.

1.  $X = \mathbb{R}^2, \quad d(x, y) = d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2}$  **Metrica Euclidea in  $\mathbb{R}^2$**

1  $d(x, y) \geq 0$  è verificata poiché l'argomento della radice è sempre positivo o al più nullo essendo una somma di quadrati, e la radice mantiene la positività.

2  $d(x, y) = 0 \iff x = y$

$$\begin{aligned}
 d = 0 &\iff \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2} = 0 \\
 &\iff (y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 = 0 \\
 &\iff \begin{cases} (y_1 - x_1)^2 = 0 \\ (y_2 - x_2)^2 = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_2 \end{cases} \\
 &\iff (x_1, x_2) = (y_1, y_2)
 \end{aligned}$$

3  $d(x, y) = d(y, x)$  invertendo le coordinate di  $x$  con quelle di  $y$  la somma non cambia, quindi la simmetria è rispettata

$$d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2} = \sqrt{(y_2 - x_2)^2 + (y_1 - x_1)^2} = d((y_1, y_2), (x_1, x_2))$$

4  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$  da [Proposizione 1.11 \(Metrica Indotta da una Norma\)](#), la metrica indotta dalla norma ([Definizione 1.8 \(Norma\)](#)), applicata ad  $\mathbb{R}^2$  è

$$\|x - y\| = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2}$$

che corrisponde alla metrica in oggetto. Dunque, grazie alle proprietà dell'operatore  $\|\cdot\|$  (nello specifico la *disuguaglianza triangolare*), si ottiene

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|(x - z) + (z - y)\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y)$$



2.  $X = \mathbb{R}, \quad d(x, y) = |y - x|$

Metrica Euclidea in  $\mathbb{R}$ 

1.  $d(x, y) \geq 0$  per definizione valore assoluto
2.  $d(x, y) = 0 \iff x = y$  perché  $|\cdot| = 0 \iff \cdot = 0$  per definizione valore assoluto
3.  $d(x, y) = d(y, x)$  perché  $|x - y| = |y - x|$  per definizione valore assoluto
4.  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$  in quanto

$$d(x, y) = |x - y| = |x - z + z - y| \leq |x - z| + |z - y| = d(x, z) + d(z, y)$$

3.  $X = \mathbb{R}^n$  con  $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n), \quad d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2}$

Metrica Euclidea in  $\mathbb{R}^n$ 

Analogo al primo esempio

4.  $X \neq \emptyset, \quad d(x, y) = \begin{cases} 0 & x = y \\ 1 & x \neq y \end{cases}$

Metrica Discreta

1.  $d(x, y) \geq 0$  per definizione
2.  $d(x, y) = 0 \iff x = y$  per definizione
3.  $d(x, y) = d(y, x)$  per definizione (sia che  $x = y$ , sia che  $x \neq y$ )
4.  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$  perché  $d(x, z) + d(z, y)$  può essere:
  - 0 se  $x = y = z$ , ma in questo caso anche  $d(x, y) = 0$
  - 1 se  $x = y \neq z$  o  $x \neq y = z$ , ma in questo caso  $d(x, y) \leq 1$
  - 2 se  $x \neq y \neq z$ , quindi sicuramente  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

5.  $X = \mathbf{C}^0([a, b], \mathbb{R}) \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad a < b \quad d_\infty(f, g) = \sup_{x \in [a, b]} |g(x) - f(x)|$

Distanza della Convergenza Infinita  
Distanza della Convergenza Uniforme

**Nota.** La metrica viene trattata in [Definizione 19.18 \(Convergenza Uniforme\)](#)**Nota.**  $X$  contiene infiniti elementi (funzioni)

1.  $d(x, y) \geq 0$  per definizione, il valore è sicuramente appartenente a  $[0, +\infty]$ , ma  $+\infty$  non è un valore accettabile, in quanto la metrica è definita come funzione a valori in  $\mathbb{R}$  e  $+\infty \notin \mathbb{R}$ . D'altro canto, si nota che  $X$  è definito come l'insieme delle funzioni continue definite su un intervallo **chiuso e limitato** a valori in  $\mathbb{R}$  ( $\mathbf{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ ). Questa definizione permette di applicare il [Esercizio 3.16 \(Teorema di Weierstrass - Analisi 1\)](#) ed avere la certezza che esista sup finito.

2.  $d(x, y) = 0 \iff x = y$  per definizione,  $d_\infty(f, g) = 0 \iff \sup_{x \in [a, b]} |g(x) - f(x)| = 0$ , cioè se e solo se le due funzioni hanno lo stesso dominio e, per ogni punto di esso, la stessa immagine.
3.  $d(x, y) = d(y, x)$  semplicemente  $d_\infty(f, g) = \sup_{x \in [a, b]} |f - g| = \sup_{x \in [a, b]} |g - f| = d_\infty(g, f)$
4.  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$  dalla disuguaglianza triangolare per  $|\cdot|$  si ottiene

$$|g(x) - f(x)| \leq |g(x) - h(x)| + |h(x) - f(x)|$$

Applicando il sup la disuguaglianza resta vera.

**Nota.** Si sottolinea che queste conclusioni sono valide finché  $[a, b]$  chiuso e limitato, altrimenti non varrebbe più il [Esercizio 3.16 \(Teorema di Weierstrass - Analisi 1\)](#) necessario per il punto 1.

6.  $X = \mathbb{R}^2$ ,  $d$  distanza Euclidea e  $P$  punto arbitrario

$$d_P(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = y \\ d(x, P) + d(P, y) & \text{se } x \neq y \end{cases}$$

Distanza di Parigi  
Distanza Ferroviaria Francese

1.  $d(x, y) \geq 0$  per definizione
2.  $d(x, y) = 0 \iff x = y$  per definizione
3.  $d(x, y) = d(y, x)$  essendo basata sulla metrica Euclidea
4.  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$  essendo basata sulla metrica Euclidea

7.  $X = \mathbf{C}^0([a, b], \mathbb{R})$   $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$   $d_2(f, g) = \sqrt{\int_a^b [g(x) - f(x)]^2 dx}$

Distanza Quadratica

**Nota.** La metrica viene trattata in [Proposizione 19.46](#)

1.  $d(x, y) \geq 0$  per definizione, essendo integrale di un valore positivo (quadrato) tra estremi ordinati ( $a < b$  per ipotesi)
2.  $d(x, y) = 0 \iff x = y$  Per definizione della metrica,  $d_2(f, g) = 0 \iff \sqrt{\int_a^b [g(x) - f(x)]^2 dx} = 0$ , cioè se e solo se le due funzioni hanno lo stesso dominio e, per ogni punto di esso, la stessa immagine.
3.  $d(x, y) = d(y, x)$  semplicemente  $d_2(f, g) = \sqrt{\int_a^b [g(x) - f(x)]^2 dx} = \sqrt{\int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx} = d_2(g, f)$
4.  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) \dots$

### Definizione 1.8 (Norma)

Dato uno spazio vettoriale  $V$  sul campo  $\mathbb{K}$ , si definisce **norma** una funzione  $\|\cdot\| : V \mapsto \mathbb{R}$  con le proprietà:

1.  $\|x\| \geq 0 \quad \forall x \in V$
2.  $\|x\| = 0 \iff x = 0 \quad \forall x \in V$
3.  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in V$
4.  $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\| \quad \forall x \in V, \lambda \in \mathbb{K}$

**Nota.** La funzione Norma associa dunque ad un vettore di qualsiasi dimensione uno scalare, fornendo (anche) una metrica per ordinare vettori tra loro.

### Definizione 1.9 (Spazio Normato)

Uno spazio normato è uno spazio vettoriale  $V$  sul campo  $\mathbb{K}$  in cui è definita una norma.

**Nota.** Nel seguito verranno considerati esclusivamente spazi vettoriali su  $\mathbb{R}$  o su  $\mathbb{C}$ , cioè  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  o  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

### Esempio 1.10 (Esempi di Spazi Normati)

1.  $\mathbb{R}$  con  $\|x\| = |x|$
2.  $\mathbb{C}$  con  $\|x\| = |x|$



$$3. \mathbb{R}^n \text{ con } \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \implies \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 = x \cdot x$$

$$4. \mathbf{C}^0([0, 1]; \mathbb{R}) \text{ con } \|f\| = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$$

**Proposizione 1.11** (Metrica Indotta da una Norma)

Sia  $V$  uno spazio normato. Allora  $(V, d)$  è uno spazio metrico con la distanza

$$d(x, y) = \|y - x\|$$

ed inoltre la distanza così definita è:

1. Invariante per traslazioni:

$$\forall x, y, z \in V, d(x, y) = d(x + z, y + z)$$

2. Positivamente omogenea:

$$\forall x, y \in V \text{ e } \forall \lambda \in \mathbb{R}, d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$$

*Dimostrazione.*

$$1. d(x, y) = d(x + z, y + z) = \|y + z - x - z\| = \|y - x\| = d(x, y)$$

2. Con la proprietà 4 della [Definizione 1.8 \(Norma\)](#)

$$d(\lambda x, \lambda y) = \|\lambda y - \lambda x\| = \|\lambda(y - x)\| = |\lambda| \|y - x\| = |\lambda| d(x, y)$$

□

**Nota.** Nel caso in cui  $V = \mathbb{R}^n$ , la metrica indotta è ovviamente la **Metrica Euclidea** di [Esempio 1.7 \(Esempi di Metriche\)](#)

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2}$$

**Definizione 1.12** (Metriche Equivalenti)

Siano  $d_1$  e  $d_2$  due distanze sullo stesso insieme  $X$ .

$d_1$  e  $d_2$  sono **equivalenti**

$\iff$

$$\exists c, C \in ]0, +\infty[ : \forall x, y \in X \quad c \cdot d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq C \cdot d_1(x, y)$$

Cioè se è sempre possibile "limitare" una metrica con l'altra (moltiplicata per un opportuno coefficiente). Questo implica che distanze infinite per una metrica devono esserlo anche per l'altra.

**Nota.** Dato uno spazio metrico  $(X, d)$ , passare dalla distanza  $d$  ad un'altra ad essa equivalente è concettualmente analogo ad un cambio di unità di misura. Come esempio si veda [Esercizio 2.43](#)

**Esempio 1.13**

La [Distanza Ferroviaria Francese](#) da [Esempio 1.7 \(Esempi di Metriche\)](#) e la [Metrica Euclidea](#) da [Esempio 1.7 \(Esempi di Metriche\)](#) non sono equivalenti

*Soluzione.* Operando in  $\mathbb{R}$  e avendo un  $n \in \mathbb{N}$ :

- $P = 0$
- $x = n$
- $y = n + 1$

Ora, per ogni  $n$  la  $d = 1$ , mentre la  $d_P = 2n + 1$ , dunque è impossibile trovare un  $C \in ]0, +\infty[$  (quindi finito) tale per cui

$$d_P(x, y) \leq C \cdot d(x, y)$$

■

**Esempio 1.14**

In  $\mathbb{R}^2$ , le distanze:

$$\begin{aligned} d_1(x, y) &= |y_1 - x_1| + |y_2 - x_2| \\ d(x, y) &= \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2} \\ d_\infty(x, y) &= \max(|y_1 - x_1|, |y_2 - x_2|) \end{aligned}$$

sono tutte equivalenti tra di loro.

**Definizione 1.15****Definizione 1.16** (Sfera)

Sia  $(X, d)$  uno spazio metrico e siano  $x_0 \in X$ ,  $r > 0$ . Si dice **Sfera** (o **Bolla**, o ancora **Palla**) **Aperta** di centro  $x_0$  e raggio  $r$  l'insieme:

$$B(x_0, r) = \{x \in X : d(x, x_0) < r\}$$

**Osservazione 1.17**

Se  $r = 0 \Rightarrow B(x_0, r) = \emptyset$

Se  $r > 0 \Rightarrow x_0 \in B(x_0, r)$

**Esempio 1.18** (Sfere ed Altri Enti)

- In  $\mathbb{R}$  con  $d$ ,  $B(x_0, r)$  è un intervallo simmetrico centrato in  $x_0$
- In  $\mathbb{R}^2$  con  $d$ ,  $B(x_0, r)$  è una un cerchio con centro in  $x_0$
- In  $\mathbb{R}^3$  con  $d$ ,  $B(x_0, r)$  è una sfera con centro in  $x_0$

**Esercizio 1.19**

Descrivere le sfere nelle distanze dell'[Esempio 1.14](#).

**Definizione 1.20** (Intorno)

Sia  $(X, d)$  uno spazio metrico e sia  $x \in X$ . **Intorno di  $x$**  è un qualunque sottoinsieme di  $X$  che contenga una sfera aperta contenente  $x$

**Definizione 1.21** (Punti e Spazi Metrici)

Siano  $(X, d)$  uno Spazio Metrico,  $A \subseteq X$  e  $x_0 \in X$ :

- $x_0$  **Interno** ad  $A$   $\iff \exists r > 0 : B(x_0, r) \subseteq A$   
Cioè è possibile individuare una sfera interamente contenuta in  $A$
- $x_0$  **Esterno** ad  $A$   $\iff \exists r > 0 : B(x_0, r) \subseteq X \setminus A$   
Cioè è possibile individuare una sfera interamente contenuta in  $X$  e NON in  $A$
- $x_0$  **di Frontiera** per  $A$   $\iff \forall r > 0, B(x_0, r) \not\subseteq A$  e  $B(x_0, r) \not\subseteq X \setminus A$   
Cioè, per qualsiasi  $r$ , la sfera non appartiene completamente né ad  $A$ , né a  $X \setminus A$
- $x_0$  **Isolato** per  $A$   $\iff \exists r > 0 : B(x_0, r) \cap A = \{x_0\}$   
Cioè è possibile trovare un  $r$  per cui l'intersezione tra la sfera ed  $A$  contiene solo  $x_0$  (Esempio: i numeri naturali con  $r = 0, 5$ )
- $x_0$  **di Accumulazione** per  $A$   $\iff \forall r > 0, (B(x_0, r) \cap A) \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$   
Cioè, per qualsiasi  $r$ , l'intersezione tra la sfera ed  $A$  è sempre non vuota (non considerando  $x_0$  stesso)

**Definizione 1.22**

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico e  $A \subseteq X$ . Si definisce:

- $\overset{\circ}{A} = \{x \in X : x \text{ è interno ad } A\}$  **Parte Interna di  $A$**
- $\partial A = \{x \in X : x \text{ è di frontiera per } A\}$  **Frontiera di  $A$**

$$\bullet \quad \bar{A} = \left\{ x \in X : x \left\{ \begin{array}{l} \text{appartiene ad } A \\ \text{è di accumulazione per } A \end{array} \right\} \right\}$$

Chiusura di  $A$ **Esempio 1.23**

Siano  $X = \mathbb{R}$  con  $d(x, y) = |y - x|$ ,  $A = \{1\} \cup [2, 3[$ .

1 è un punto isolato per  $A$ , 5 è esterno ad  $A$ .

$$\bar{A} = \{1\} \cup [2, 3], \quad \overset{\circ}{A} = ]2, 3[, \quad \partial A = \{1, 2, 3\}$$

**Esempio 1.24**

Sia  $X = \mathbb{R}$  con  $d(x, y) = |y - x|$

Valgono le uguaglianze  $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$ ,  $\overset{\circ}{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$ ,  $\partial \mathbb{R} = \emptyset$

**Proposizione 1.25**

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico,  $A \subseteq X$ ,  $A \neq \emptyset$ . Allora

$$\bar{A} = \{x \in A \text{ è isolato per } A\} \cup \{x \in A : x \text{ è di accumulazione per } A\}$$

*Dimostrazione.* Un punto isolato, per definizione, appartiene ad  $A$ , e rientra quindi automaticamente nella definizione di  $\bar{A}$ . È dunque necessario dimostrare solo il caso  $x_*$  di accumulazione per  $A$ .

Partiamo dunque dall'ipotesi:

$$\begin{aligned} x_* \in A \text{ e } x_* \text{ non isolato per } A \\ \implies x_* \in A \text{ e non } [\exists r > 0 : B(x_*, r) \cap A = \{x_*\}] \\ \implies x_* \in A \text{ e } [\forall r > 0 : B(x_*, r) \cap A \neq \{x_*\}] \end{aligned}$$

Questo significa che in  $B \cap A$  ci son sicuramente altri punti, che poi è come dire

$$\implies x_* \in A \text{ e } \underbrace{B(x_*, r) \cap A \setminus \{x_*\}}_{\text{Definizione di punto di accumulazione}} \neq \emptyset$$

□

**Proposizione 1.26**

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico,  $x_0 \in X$  e  $A \subseteq X$ ,  $A \neq \emptyset$ . Allora valgono le seguenti relazioni

1.  $x_0$  **isolato** per  $A \implies x_0 \in A$
2.  $x_0$  **isolato** per  $A \implies \begin{cases} A = \{x_0\} \\ \text{o} \\ \inf_{A \setminus \{x_0\}} d(x, x_0) > 0 \end{cases}$
3.  $x_0$  **interno** ad  $A \implies x_0 \in A$
4.  $x_0$  **esterno** ad  $A \iff \inf_A d(x, x_0) > 0$

**Proposizione 1.27** (Condizione Punti Accumulazione)

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico,  $x_0 \in X$  e  $A \subseteq X$ ,  $A \neq \emptyset$ . Allora

$$\begin{aligned} x_0 \text{ è di accumulazione per } A \\ \iff \\ \inf \{d(x, x_0) : x \in A, x \neq x_0\} = 0 \end{aligned}$$

Cioè se la "minima distanza" tra  $x_0$  ed un altro punto qualsiasi di  $A$  è 0.

**Proposizione 1.28**

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico,  $x_0 \in X$  e  $A \subseteq X$ ,  $A \neq \emptyset$ . Valgono le seguenti relazioni:

1.  $\bar{A} = \left\{ x_0 \in X : \inf_{x \in A} d(x, x_0) = 0 \right\}$

2.  $\overline{\emptyset} = \emptyset$
3.  $\partial A = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$
4.  $\overset{\circ}{A} \cap \partial A \neq \emptyset$
5.  $\overline{A} = \overset{\circ}{A} \cup \partial A$

**Esercizio 1.29**

Dimostrare nel dettaglio le proposizioni [Proposizione 1.25](#), [Proposizione 1.26](#), [Proposizione 1.27](#) (Condizione Punti Accumulazione), [Proposizione 1.28](#).

**Definizione 1.30** (Insieme Aperto)

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico e  $A \subseteq X$ ,  $A \neq \emptyset$ . Si definisce

$$A \text{ è aperto} \Leftrightarrow A = \emptyset \quad \text{oppure} \quad A = \overset{\circ}{A}$$

**Definizione 1.31** (Insieme Chiuso)

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico e  $A \subseteq X$ ,  $A \neq \emptyset$ . Si definisce

$$A \text{ è chiuso} \Leftrightarrow A = \emptyset \quad \text{oppure} \quad A = \overline{A}$$

**Osservazione 1.32**

$A$  non chiuso  $\not\Leftrightarrow A$  aperto

$A$  non aperto  $\not\Leftrightarrow A$  chiuso

**Esempio 1.33**

L'insieme  $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\} \setminus \{(1, 0)\}$  è né aperto né chiuso.

*Soluzione.*

Non è chiuso in quanto la sua frontiera è  $\partial C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ , dunque  $(1, 0) \in \partial C$ , ma per definizione  $(1, 0) \notin \partial C$

Non è aperto in quanto, prendendo  $(0, 1) \in C$ , è impossibile trovare un intorno di  $(0, 1)$  contenuto completamente in  $C$  ■

**Esercizio 1.34**

Dimostrare che in uno spazio metrico  $(X, d)$ :

1. Ogni sfera di raggio strettamente positivo è un aperto
2.  $\overline{B(x_0, r)} \subseteq \{x \in X : d(x, x_0) \leq r\}$
3.  $X$  è aperto ed anche chiuso
4.  $\emptyset$  è aperto ed anche chiuso
5. Sia  $A \subseteq X$ . Se  $A$  è aperto, allora il complementare di  $A$  in  $X$  è chiuso
6. Sia  $A \subseteq X$ . Se  $A$  è chiuso, allora il complementare di  $A$  in  $X$  è aperto
7. Sia  $A \subseteq X$ . Allora  $\overline{A}$  è chiuso e  $\overset{\circ}{A}$  è aperto

**Proposizione 1.35**

Sia  $(X, d)$  lo spazio metrico con la Metrica Discreta (da [Esempio 1.7](#) (Esempi di Metriche)).

Allora, preso un  $x_0 \in X$  ed un  $r > 0$ , l'inclusione  $B(x_0, r) \subseteq \{x \in X : d(x, x_0) \leq r\}$  è stretta se e soltanto se  $r = 1$

**Esercizio 1.36**

Esibire in un opportuno spazio metrico esempi di insiemi né aperti né chiusi.

**Definizione 1.37** (Diametro Spazio Metrico)

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico e  $A \subseteq X$ ,  $A \neq \emptyset$ . Si definisce

$$\mathbf{diam}(A) = \sup_{x, y \in A} d(x, y)$$

Cioè la "distanza massima" tra due suoi qualsiasi elementi.

**Definizione 1.38** (Spazio Metrico Limitato)

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico e  $A \subseteq X$ ,  $A \neq \emptyset$ . Allora

$$A \text{ è } \mathbf{Limitato} \iff \mathbf{diam}(A) \text{ è finito}$$

$$A \text{ è } \mathbf{Illimitato} \iff \mathbf{diam}(A) \text{ è infinito}$$

**Nota.** L'insieme vuoto  $\emptyset$  ha diametro nullo ed è dunque limitato.

**Esempio 1.39** (Diametri e Limitatezza in Spazi Metrici)

1.  $\mathbb{R}$  con  $d(x, y) = |y - x|$  è uno spazio metrico illimitato. Inoltre se  $A \subseteq \mathbb{R}$  con  $A \neq \emptyset$ , allora  $\mathbf{diam}(A) = \sup A - \inf A$
2.  $\mathbb{R}$  con  $d(x, y) = \frac{|y-x|}{1+|y-x|}$  è uno spazio metrico limitato di diametro 1 (la distanza massima tra due punti con questa metrica è 1)
3. Sia  $X$  un insieme con almeno 2 elementi munito della Metrica Discreta (da [Esempio 1.7 \(Esempi di Metriche\)](#)) è uno spazio metrico limitato di diametro 1
4.  $\mathbf{C}^0([0, 1]; \mathbb{R})$  con  $d(f, g) = \sup_{[0, 1]} |g(x) - f(x)|$  è uno spazio metrico illimitato utilizzato in [sottosezione 19.2 \(Convergenza Uniforme\)](#)

**Esercizio 1.40**

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico e  $A, B \subseteq X$ . Dimostrare le seguenti implicazioni:

1.  $\left. \begin{array}{l} A \subseteq B \\ A \text{ illimitato} \end{array} \right\} \implies B \text{ illimitato}$
2.  $\left. \begin{array}{l} A \subseteq B \\ B \text{ limitato} \end{array} \right\} \implies A \text{ limitato}$
3.  $\left. \begin{array}{l} A \text{ limitato} \\ B \text{ limitato} \end{array} \right\} \implies A \cup B \text{ limitato}$

**Esercizio 1.41**

Dimostrare che in  $\mathbb{R}$  le distanze

$$d(x, y) = |y - x| \quad \text{e} \quad d(x, y) = \frac{|y - x|}{1 + |y - x|}$$

non sono equivalenti.

*Soluzione.* Suggerimento: utilizzare la nozione di limitatezza. ■

**Esercizio 1.42**

Dimostrare che in uno spazio metrico  $(X, d)$ :

1. Se  $x_0 \in X$  e  $r > 0$ , allora  $\mathbf{diam}(B(x_0, r)) \leq 2r$  (si veda [Esercizio 1.44](#))
2. Se  $A \subseteq X$  e  $x_0 \in A$ , allora  $A$  è limitato se e solo se esiste un  $r > 0$  :  $A \subseteq B(x_0, r)$

**Esercizio 1.43**

Sia  $X = \mathbb{R}$  con la distanza  $d(x, y) = |y - x|$ .

Dimostrare che  $\mathbf{diam}(B(0, 1)) = 2$

**Esercizio 1.44**

Sia  $X = [0, 2]$  con la distanza  $d(x, y) = |y - x|$ .  
 Dimostrare che  $\text{diam}(B(0, 1)) = 1$

**Proposizione 1.45**

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico e  $A, B \subseteq X$ :

$$A \subseteq B \implies \text{diam}(A) \leq \text{diam}(B)$$

*Dimostrazione.* Immediata □

**Esercizio 1.46**

Dimostrare con esempi che:

1.  $A \subset B \not\Rightarrow \text{diam}(A) < \text{diam}(B)$
2.  $\text{diam}(A) < \text{diam}(B) \not\Rightarrow A \subset B$
3.  $\text{diam}(A) \leq \text{diam}(B) \not\Rightarrow A \subseteq B$
4.  $\text{diam}(A) = 0 \not\Rightarrow A = \emptyset$

**Esercizio 1.47**

Esibire in  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{R}^2$  ed in  $\mathbf{C}^0([0, 1]; \mathbb{R})$  (con le metriche usuali) esempi di insiemi aperti/chiusi e limitati/illimitati.

**Definizione 1.48** (Insieme Finito ed Infinito)

Un insieme si dice **Finito** se il numero dei suoi elementi è finito.

Un insieme si dice **Infinito** se non è finito.

**Osservazione 1.49**

Con la metrica Euclidea, ogni insieme finito è limitato e ogni insieme illimitato è infinito. Non valgono i viceversa.

## 2 Successioni e Completezza

### Definizione 2.1 (Successione)

Sia  $X$  un insieme non vuoto. **Successione** in  $X$  è una funzione  $x : \mathbb{N} \mapsto X$

**Nota.** Altre possibili notazioni per le successioni sono:  $x_n$ ,  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  e  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ .

Con  $x_n$  si indica spesso anche il **valore assunto** dalla successione  $x$  al suo  $n$ -esimo elemento.

### Definizione 2.2 (Successione Limitata e Illimitata)

Una successione  $x : \mathbb{N} \mapsto X$  di elementi di uno spazio metrico  $(X, d)$  si dice **Limitata** se il suo codominio  $x(\mathbb{N})$  è limitato.

Una successione è **Illimitata** se il suo codominio  $x(\mathbb{N})$  è illimitato.

### Definizione 2.3 (Limite per Successioni)

Data una successione  $x : \mathbb{N} \mapsto X$  di elementi di uno spazio metrico  $(X, d)$  e dato  $x_\infty \in X$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_\infty \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, x_\infty) = 0$$

Se  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_\infty$ , allora la successione  $x_n$  è **Convergente** a  $x_\infty$ . Si può scrivere:  $x_n \rightarrow x_\infty$  per  $n \rightarrow \infty$ .

Cioè la convergenza della successione  $x : \mathbb{N} \mapsto X$  a  $x_\infty$  equivale alla convergenza a 0 della successione di numeri reali  $\{d(x_n, x_\infty) : n \in \mathbb{N}\}$

**Nota.** Essendo posto  $x_\infty \in X$ ,  $x_\infty$  deve appartenere allo spazio metrico. In caso alternativo il limite non esiste.

**Nota.** Questa definizione è *implicita*, cioè non porta a nessun metodo *costruttivo* per calcolare il limite di una successione.

La definizione di limite permette soltanto di verificare se una nota quantità è limite della successione data o meno.

### Proposizione 2.4

Data la successione  $x : \mathbb{N} \mapsto X$  di elementi dello spazio metrico  $(X, d)$  e dato  $x_\infty \in X$ :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_\infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n > \nu \text{ vale } d(x_n, x_\infty) < \varepsilon$$

*Dimostrazione.*

□

### Teorema 2.5 (di Unicità del Limite per Successioni)

Sia  $(X, d)$  uno spazio metrico e siano  $x_\infty, x^\infty$  elementi di  $X$  e  $x : \mathbb{N} \mapsto X$  una successione in  $X$ .

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_\infty \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x^\infty \end{array} \right\} \Rightarrow x_\infty = x^\infty$$

*Dimostrazione.* Per ogni  $n \in \mathbb{N}$ , per la proprietà 4 da [Definizione 1.2 \(Spazio Metrico\)](#)

$$d(x_\infty, x^\infty) \leq d(x_\infty, x_n) + d(x_n, x^\infty)$$

Passando al lim per  $n \rightarrow +\infty$

$$\underbrace{\lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_\infty, x^\infty)}_{\geq 0} \leq \underbrace{\lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_\infty, x_n)}_{\leq \varepsilon} + \underbrace{\lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, x^\infty)}_{\leq \varepsilon} \leq 2\varepsilon$$

Per def. distanza      Per def. lim succ.      Per def. lim succ.

Dovendo essere questa forma valida  $\forall \varepsilon > 0$ , si concludere che non può esser altro che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_\infty, x^\infty) = 0$$

Che, per la proprietà 2 da [Definizione 1.2 \(Spazio Metrico\)](#), significa

$$x_\infty = x^\infty$$

□

**Proposizione 2.6**

Sia  $p \in \mathbb{N}$ ,  $p \geq 2$ . In  $\mathbb{R}^p$ , con  $d(x, y) = \|y - x\|$ , una successione  $x : \mathbb{N} \rightarrow X$  converge a  $x_\infty$  se e solo se le successioni delle componenti convergono alle rispettive componenti di  $x_\infty$ .

*Dimostrazione.* Applicare la [Definizione 2.3 \(Limite per Successioni\)](#) ricordando che

$$|y_i| \leq \|y\| \leq \left| \sum_{i=1}^p |y_i| \right| \quad \forall y \in \mathbb{R}^p \text{ e per } i = 1, \dots, p$$

□

**Esercizio 2.7**

Esibire un esempio di successione in  $\mathbb{R}^2$  convergente a  $(1, 1)$  con le distanze introdotte ai punti 3 e 4 dell'[Esempio 1.7 \(Esempi di Metriche\)](#).

**Esercizio 2.8**

Esibire un esempio di successione in  $\mathbb{C}$  convergente a  $1 + i$  con la distanza  $d(z, w) = |w - z|$ .

**Proposizione 2.9** (Caratterizzazione dei Punti di Accumulazione)

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico,  $A \subseteq X$  e  $x_* \in X$ . Allora

$$x_* \text{ di accumulazione per } A \iff \left\{ \begin{array}{l} \text{esiste una successione di elementi di } A, \\ \text{diversi da } x_*, \text{ convergente a } x_* \end{array} \right.$$

*Dimostrazione.*

$\implies$  Grazie alla [Proposizione 1.27 \(Condizione Punti Accumulazione\)](#)

$$\begin{aligned} & x_* \text{ è di accumulazione per } A \\ \implies & \inf \{d(x, x_*) : x \in A, x \neq x_0\} = 0 \end{aligned}$$

Che equivale a scrivere

$$\implies \forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in A : x_\varepsilon \neq x_* \text{ e } d(x_\varepsilon, x_*) < \varepsilon$$

Quindi si può scegliere arbitrariamente un  $\varepsilon = \frac{1}{n}$ , ponendo  $n \neq 0$  ed arrivare a

$$\implies \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \exists x_n \in A : x_n \neq x_* \text{ e } d(x_n, x_*) < \frac{1}{n}$$

La successione delle distanze è convergente a 0 per  $n \rightarrow +\infty$ , quindi con la [Definizione 2.3 \(Limite per Successioni\)](#) si può concludere che la successione  $x_n$  converge a  $x_*$

$\Leftarrow$  Dalla [Definizione 2.3 \(Limite per Successioni\)](#)

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n > \nu \quad x_n \in A, x_n \neq x_*, \quad d(x_n, x_*) < \varepsilon$$

Ma se  $d(x_n, x_*) < \varepsilon$ , allora si può anche scrivere  $x_n \in B(x_*, \varepsilon)$ , quindi sicuramente

$$\implies \forall \varepsilon > 0 \quad B(x_*, \varepsilon) \cap A \setminus \{x_*\} \neq \emptyset$$

Dunque stando alla [Definizione 1.21 \(Punti e Spazi Metrici\)](#)

$$\implies x_* \text{ è di accumulazione per } A$$

□

**Corollario 2.10**

Siano  $(X, d)$  uno Spazio Metrico,  $A \subseteq X$  e  $x_* \in X$ . Allora:

$$x_* \in \overline{A} \iff \left\{ \begin{array}{l} \text{esiste una successione di elementi di } A, \\ \text{diversi da } x_*, \text{ convergente a } x_* \end{array} \right.$$



*Dimostrazione.*

$\Rightarrow$  – Se  $x_* \in A$   
È sufficiente scegliere  $x_n = x_*$ , successione costante, dunque

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_* = x_*$$

– Se  $x_*$  di accumulazione per  $A$   
Per [Definizione 1.22](#) e grazie alla [Proposizione 2.9 \(Caratterizzazione dei Punti di Accumulazione\)](#) si giunge direttamente alla tesi.

$\Leftarrow$  Per [Definizione 1.22](#) e grazie alla [Proposizione 2.9 \(Caratterizzazione dei Punti di Accumulazione\)](#) si giunge direttamente alla tesi.

□

**Definizione 2.11** (Condizione di Cauchy)

Sia  $(X, d)$  uno spazio metrico e  $x : \mathbb{N} \mapsto X$  una successione d in  $X$ .

$x : \mathbb{N} \mapsto X$  è **di Cauchy**

$\Leftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n, m > \nu \text{ vale } d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

Cioè se la distanza tra due punti qualsiasi della successione, presi dopo un certo valore  $\nu$ , è minore di un  $\varepsilon$  piccolo a piacere.

**Nota.** Questa definizione, differentemente dalla [Definizione 2.3 \(Limite per Successioni\)](#), è *esplicita e intrinseca*: dipende esclusivamente dalla successione e dalla distanza definita.

**Proposizione 2.12**

Sia  $(X, d)$  uno spazio metrico.

$$x : \mathbb{N} \mapsto X \text{ è convergente} \Rightarrow x : \mathbb{N} \mapsto X \text{ è di Cauchy}$$

*Dimostrazione.* Sia  $x : \mathbb{N} \mapsto X$  convergente a  $x_\infty$ . Allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n > \nu \quad d(x_n, x_\infty) < \varepsilon$$

Prendendo dunque due elementi qualsiasi  $n$  e  $m$  con  $n, m > \nu$ , la distanza di ognuno di essi da  $x_\infty$  dovrà essere  $< \varepsilon$ . Applicando la proprietà 4 da [Definizione 1.2 \(Spazio Metrico\)](#), otteniamo

$$d(x_n, x_m) \leq [d(x_n, x_\infty) + d(x_m, x_\infty)] < 2\varepsilon$$

Quindi

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n, m > \nu \quad d(x_n, x_m) \leq [d(x_n, x_\infty) + d(x_m, x_\infty)] < 2\varepsilon$$

Cioè ci si è ricondotti alla definizione della Condizione di Cauchy

□

**Definizione 2.13** (Spazio Metrico Completo)

Uno Spazio Metrico  $(X, d)$  si dice **Completo** se e solo se **ogni successione di Cauchy in  $X$  ammette limite in  $X$  stesso**.

**Esempio 2.14** (Esempi di Spazi Metrici Completi e non)

1.  $\mathbb{R}$  con  $d(x, y) = |y - x|$  è uno spazio metrico completo
2.  $\mathbb{Q}$  con  $d(x, y) = |y - x|$  è uno spazio metrico *non* completo
3.  $\mathbb{R}^n$  con  $d(x, y) = \|y - x\|$  è uno spazio metrico completo.

Altre distanze che rendono  $\mathbb{R}^n$  uno spazio metrico completo sono, ad esempio

- $d(x, y) = \max_{i=1, \dots, n} |y_i - x_i|$
- $d(x, y) = \left( \sum_{i=1}^n |y_i - x_i|^\alpha \right)^{\frac{1}{\alpha}}$  con  $\alpha \in [1, +\infty[$

4.  $]0, 1[$  con  $d(x, y) = |y - x|$  è uno spazio metrico *non* completo.

*Dimostrazione.* La successione  $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}, n \neq 0\}$  è di Cauchy ma non ammette limite in  $]0, 1[$  □

5. Sia  $X$  un insieme con almeno 2 elementi, munito della metrica discreta

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & x = y \\ 1 & x \neq y \end{cases}$$

$X$  è uno spazio metrico completo in cui le uniche successioni convergenti sono le successioni **definitivamente costanti** (cioè costanti da un certo indice in poi).

6.  $\mathbf{C}^0([0, 1]; \mathbb{R})$  è uno spazio metrico completo con la distanza

$$d(f, g) = \sup_{[0, 1]} |g(x) - f(x)|$$

Vedasi [Proposizione 19.33](#) per la dimostrazione.

7.  $\mathbf{C}^0([0, 1]; \mathbb{R})$  è uno spazio metrico *non* completo con la distanza

$$d(f, g) = \sqrt{\int_0^1 [g(x) - f(x)]^2 dx}$$

Vedasi [Proposizione 19.47](#) per la dimostrazione.

8. L'insieme  $\mathbb{C}$  dei numeri complessi è uno spazio metrico completo con la distanza  $d(z, w) = |w - z|$

### Esercizio 2.15

Esibire una successione di Cauchy di numeri razionali non convergente in  $\mathbb{Q}$ .

*Soluzione.* La seguente successione

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

è convergente a  $e \notin \mathbb{Q}$  ■

### Proposizione 2.16

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico **completo** e  $C \subseteq X$  un sottoinsieme **chiuso** di  $X$ . Allora  $(C, d|_C)$  è **sottospazio metrico completo**, con  $d|_C$  da [Definizione 1.4 \(Metrica Indotta\)](#).

*Dimostrazione.* Essendo  $C$  chiuso, per [Definizione 1.31 \(Insieme Chiuso\)](#):

$$C = \overline{C} \implies \forall x_* \in C \ x_* \in \overline{C}$$

Si può dunque applicare il [Corollario 2.10](#) e concludere che

$$\forall x_* \in C \text{ esiste una successione di elementi di } C \text{ convergenti a } x_*$$

Questo permette di individuare tante successioni  $x_i$  quanti sono gli elementi di  $C$  e, grazie alla [Proposizione 2.12](#), si sa che ognuna di queste successioni è di Cauchy.

Si giunge dunque alla [Definizione 2.13 \(Spazio Metrico Completo\)](#) □

**Nota.** La chiusura di  $C$  è fondamentale perché diversamente non sarebbe applicabile il [Corollario 2.10](#) e dunque non si avrebbe certezza sulla convergenza in  $C$  delle successioni.

**Proposizione 2.17**

Sia  $(X, d)$  uno spazio metrico. Data la successione  $x : N \mapsto X$  **di Cauchy**:

$$x : N \mapsto X \text{ di Cauchy} \implies x : N \mapsto X \text{ limitata}$$

*Dimostrazione.*

$$x : N \mapsto X \text{ di Cauchy}$$

$$\iff$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n, m > \nu \text{ vale } d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

La dimostrazione prevede di dividere in due "parti" la successione

1. Per la definizione di cui sopra è sicuramente possibile individuare un certo  $\bar{\nu}$  per cui

$$\exists \bar{\nu} : \forall n > \bar{\nu} \quad d(x_n, x_{\bar{\nu}}) < 1 \text{ (1 è scelto arbitrariamente)}$$

In tal modo è stata esplicitata la limitatezza di  $x$  da  $\bar{\nu}$  in poi.

2. Si ponga invece  $K = \max_{n=0, \dots, \bar{\nu}-1} d(x_n, x_{\bar{\nu}})$ , cioè  $K$  è la massima tra tutte le distanze  $d(x_n, x_{\bar{\nu}})$  con  $n < \bar{\nu}$ .

Essendo  $n < \bar{\nu}$ ,  $n$  è sicuramente finito, per cui anche  $K$  sarà finito. Infatti, avendo un numero finito  $n$  di valori  $x_n$  assunti dalla successione, anche il massimo di tali valori (cioè  $K$ ) sarà finito.

In questo modo si è trovato un valore  $K$  che limita la  $x$  prima di  $\bar{\nu}$ .

Quindi, concludendo, sicuramente

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad d(x_n, x_{\bar{\nu}}) < \max \{K, 1\}$$

Cioè la successione è limitata. □

**Esercizio 2.18**

Definire in un opportuno spazio metrico una successione limitata non di Cauchy.

*Soluzione.* In  $(\mathbb{N}, d)$  la successione  $x(n) = (-1)^n$ . ■

**Corollario 2.19**

Sia  $(X, d)$  uno spazio metrico. Data la successione  $x : N \mapsto X$  **convergente**:

$$x : N \mapsto X \text{ convergente} \implies x : N \mapsto X \text{ limitata}$$

*Dimostrazione.* Grazie alla [Proposizione 2.12](#) ed alla [Proposizione 2.17](#)

$$\text{convergente} \implies \text{di Cauchy} \implies \text{limitata}$$

□

**Esercizio 2.20**

Definire in un opportuno spazio metrico una successione limitata non convergente.

*Soluzione.* Come da [Esercizio 2.18](#) ■

**Esercizio 2.21**

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico completo,  $A \subseteq X$  chiuso e non vuoto. Allora, detta  $d|_A$  la restrizione di  $d$  ad  $A$ ,  $(A, d|_A)$  è uno spazio metrico completo.

È indispensabile l'ipotesi " $A$  chiuso"?

*Soluzione.* Vedere nota alla [Proposizione 2.16](#) ■

**Esercizio 2.22**

Dimostrare che ogni sottosuccessione di una successione di Cauchy è a sua volta una successione di Cauchy.

**Esercizio 2.23**

Dimostrare che se una successione ammette una sottosuccessione convergente, allora l'intera successione è convergente.

## 2.1 Insiemi Connessi

Concettualmente, un insieme è connesso se è *un pezzo solo*. Per dare una definizione formale conviene prima caratterizzare gli insiemi formati *da più pezzi* e poi definire come connessi quelli *non* formati *da più pezzi*.

**Definizione 2.24** (Insiemi Separati)

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico,  $A \subseteq X$  e  $B \subseteq X$

$$A \text{ e } B \text{ sono } \mathbf{Separati} \Leftrightarrow \overline{A} \cap B = \emptyset \text{ e } A \cap \overline{B} = \emptyset$$

**Definizione 2.25** (Insiemi Connessi e Sconnessi)

Un insieme è **Sconnesso** se e solo se è **unione** di due insiemi **separati**.

Un insieme è **Connesso** se e solo se **non è Sconnesso**.

*Nota.* In uno spazio metrico un insieme può essere alternativamente connesso o sconnesso, ma sicuramente deve essere di un tipo o dell'altro. Ciò differisce con la classificazione Aperto/Chiuso secondo la quale potevano esistere insiemi né aperti né chiusi (vedasi [Esempio 1.33](#))

**Esempio 2.26**

In  $\mathbb{R}$  con l'usuale distanza Euclidea:

1.  $[0, 1]$  e  $]1, 2]$  non sono separati
2.  $[0, 1[$  e  $]1, 2]$  sono separati
3.  $\{0\} \cup [1, 2]$  è sconnesso
4.  $\mathbb{R}$  è connesso

**Esercizio 2.27**

Dimostrare che gli insiemi  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$  e  $\mathbb{Q}$  sono sottoinsiemi sconnessi di  $\mathbb{R}$  con la distanza Euclidea.

**Esercizio 2.28**

Dimostrare che se due insiemi sono separati, allora sono disgiunti. Esibire un controesempio all'implicazione inversa.

**Esercizio 2.29**

Esibire esempi di insiemi:

1. connessi/sconnessi ed aperti/chiusi
2. connessi/sconnessi e limitati/illimitati

**Proposizione 2.30**

In  $\mathbb{R}$  con la metrica Euclidea, sia  $A \subseteq \mathbb{R}$ .

$$A \text{ è } \mathbf{Connesso} \Leftrightarrow A \text{ è un } \mathbf{Intervallo}$$

*Dimostrazione.* Omessa. □

**Proposizione 2.31** (Poligonale Congiungente due Punti)

In  $\mathbb{R}^n$  con la distanza Euclidea, sia  $A$  un **aperto connesso**. Allora, comunque scelti  $x$  e  $y$  in  $A$ , esiste una **poligonale** interamente contenuta in  $A$  con i lati paralleli agli assi e congiungente  $x$  a  $y$ .

*Dimostrazione.* Omessa. □

**Esercizio 2.32**

Mostrare con un esempio che nella [Proposizione 2.31 \(Poligonale Congiungente due Punti\)](#) l'ipotesi " $A$  aperto" è essenziale.

*Soluzione.* Dato lo spazio metrico  $(\mathbb{R}^2, d)$ , tutti i punti del sottoinsieme  $\{x \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$  sono di frontiera, dunque non è un aperto. È impossibile individuare una poligonale che colleghi due qualsiasi punti della circonferenza in quanto, appunto circonferenza. ■

## 2.2 Insiemi Compatti

**Definizione 2.33** (Insieme Compatto)

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico e  $A \subseteq X$ .  $A$  è **Compatto** se e solo se **ogni successione di elementi di  $A$  ammette una sottosuccessione avente limite in  $A$** .

*Nota.* Questa è la definizione di **Compattezza per Successioni**, in spazi più generali può essere necessario utilizzare una definizione più debole che, nel caso degli spazi metrici, coincide con la precedente.

**Proposizione 2.34**

*Nota.* Questo teorema è anche noto come *Teorema di Heine-Borel*

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico e  $A \subseteq X$

$$A \text{ compatto} \implies A \text{ chiuso e limitato}$$

*Dimostrazione.* Per assurdo negando una per una le conclusioni.

- $A$  non è chiuso

$$\begin{aligned} & A \text{ non è chiuso} \\ \implies & A \neq \overline{A} \\ \implies & A \subset \overline{A} \\ \implies & \exists x_0 \in \overline{A}, x_0 \notin A \end{aligned}$$

Dunque, per [Definizione 1.22](#), si deve concludere che

$$\implies \exists x_0 \text{ di accumulazione per } A, x_0 \notin A$$

Quindi dalla [Proposizione 2.9 \(Caratterizzazione dei Punti di Accumulazione\)](#)

$$\implies x : \mathbb{N} \mapsto X \text{ con } \begin{cases} x_n \in A \forall n \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0, x_0 \notin A \end{cases}$$

Cioè abbiamo ottenuto una successione non convergente in  $A$ , dunque negando l'ipotesi

$$\implies A \text{ non è compatto - } \textit{Assurdo}$$

- $A$  non è limitato

$$\begin{aligned} & A \text{ non è limitato} \\ \implies & \sup \{d(x, y) : x, y \in A\} = +\infty \end{aligned}$$

Fissato dunque un  $x_0 \in A$ , continuerò ad aver distanza infinita, in quanto  $A$  non limitato per ipotesi.

$$\begin{aligned} \implies & \sup_{x \in A} d(x, x_0) = +\infty \\ \implies & \forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in A : d(x_n, x_0) > n \end{aligned}$$

Dunque qualsiasi sottosuccessione di  $x : \mathbb{N} \mapsto X$  è illimitata

$$\begin{aligned} \implies & x : \mathbb{N} \mapsto X \text{ è una successione in } A \text{ senza sottosuccessioni convergenti} \\ \implies & A \text{ non è compatto - } \textit{Assurdo} \end{aligned}$$

□

**Proposizione 2.35**

In  $\mathbb{R}^n$  con l'usuale metrica Euclidea, sia  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ . Allora:

$$A \text{ è Compatto} \iff A \text{ è Chiuso e Limitato}$$

*Dimostrazione.* Omessa a lezione.

Nel caso  $n = 1$ , segue dalle (note) proprietà di  $\mathbb{R}$ . Nel caso  $n > 1$ , si veda [Esercizio 2.36](#).

□

**Nota.** La [Proposizione 2.34](#) vale in ogni spazio metrico, mentre la [Proposizione 2.35](#) solo in  $A \subseteq \mathbb{R}^n$

### Esercizio 2.36

Completare la dimostrazione della [Proposizione 2.35](#).

Suggerimento: utilizzare il caso  $n = 1$  e la [Proposizione 2.6](#)

### Esercizio 2.37

Confrontare la dimostrazione della [Proposizione 2.35](#) con [Esempio 19.21](#)

### Esercizio 2.38

In uno spazio metrico, esibire esempi di insiemi connessi/sconnessi e compatti/non compatti.

### Esercizio 2.39

In  $\mathbb{R}$  con la distanza Euclidea, esibire esempi di insiemi che siano intervalli/non intervalli compatti/non compatti

### Esercizio 2.40

Sia  $(X, d)$  uno spazio metrico. Siano  $K_1$  e  $K_2$  due sottoinsiemi compatti di  $X$ . Allora  $K_1 \cup K_2$  è compatto

*Soluzione.* Posto  $K = K_1 \cup K_2$ , per definizione di **unione**, ogni elemento di  $K$  è in  $K_1$  o  $K_2$ .

Visto che, per ipotesi,  $K_1$  e  $K_2$  sono compatti, sappiamo che ogni successione in uno dei due avrà una sottosuccessione convergente nello stesso insieme. A questo punto possiamo concludere che ogni successione in  $K$  ammetterà una sottosuccessione convergente ad un elemento  $x_\infty \in K_1$  oppure  $x_\infty \in K_2 \implies x_\infty \in K$  ■

### Proposizione 2.41

Sia  $(X, d)$  uno spazio metrico. Allora

$$X \text{ è Compatto} \implies X \text{ è Completo}$$

*Dimostrazione.* Sia  $x : \mathbb{N} \mapsto X$  una successione di Cauchy di elementi di  $X$ .

$X$  è compatto quindi, per definizione, esiste una sottosuccessione convergente ad un  $x_\infty \in X$ . Ciò implica, grazie all'[Esercizio 2.23](#), che l'intera successione converga a  $x_\infty$ , dunque  $X$  è completo. □

### Osservazione 2.42

Sia  $X$  un insieme munito di due distanze tra loro equivalenti  $d_1$  e  $d_2$  (si veda [Definizione 1.12 \(Metriche Equivalenti\)](#)). Allora *ciò che vale in  $(X, d_1)$ , vale in  $(X, d_2)$*

Il seguente esercizio rende rigorosa questa affermazione

### Esercizio 2.43

Sia  $X$  un insieme munito delle due distanze  $d_1$  e  $d_2$  tra loro equivalenti. **Se un insieme è aperto** (chiuso, compatto, connesso, limitato) **in  $(X, d_1)$** , allora **lo è anche in  $(X, d_2)$** .

Inoltre, se  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_\infty$  in  $(X, d_1)$ , allora  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_\infty$  anche in  $(X, d_2)$

### Esempio 2.44

Sia  $(X, d)$  lo spazio  $\mathbb{R}^n$  munito della distanza Euclidea. Sia  $d_p$  come in [Esempio 1.7 \(Esempi di Metriche\)](#) con  $p \in \mathbb{R}^n$

È interessante notare che in  $(X, d)$ ,  $d_p$  stessa non è continua e quindi gli insiemi aperti (chiusi) rispetto a  $d_p$ , possono non essere aperti (chiusi) rispetto alla distanza Euclidea. Di conseguenza sono proprietà diverse nei due spazi metrici: convergenza di successioni, continuità di funzioni, connessione, compattezza, essere o meno punto di accumulazione, punto interno, punto esterno...

### Esercizio 2.45

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico e  $A \subseteq X$  un **compatto**. Dimostrare che se  $C \subseteq A$  è un **chiuso**, allora è anche **compatto**.

L'ipotesi " $C$  chiuso" è indispensabile?

### 3 Limiti e Continuità

#### Definizione 3.1 (Limite per Funzione)

Siano:

- $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici
- $A \subseteq X$
- $x_0$  di accumulazione per  $A$
- $f : A \mapsto Y$  una funzione
- $l \in Y$

Allora si definisce

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \\ \iff \\ \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \text{ e } x \neq x_0 \text{ vale } d_Y(f(x), l) < \varepsilon \end{aligned}$$

Che si legge *il limite per  $x$  tendente a  $x_0$  di  $f(x)$  converge a  $l$* .

#### Esercizio 3.2

Sarebbe comodo definire

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \\ \iff \\ \lim_{x \rightarrow x_0} d(f(x), l) = 0 \end{aligned}$$

Perché non è corretto farlo?

*Soluzione.* Non è corretto perché questa definizione implica  $l = f(x)$  con  $x \rightarrow x_0$  per proprietà 2 di [Definizione 1.2 \(Spazio Metrico\)](#). Ciò è diverso dalla [Definizione 3.1 \(Limite per Funzione\)](#) ed è inoltre più restrittivo, in quanto, con questa definizione "semplificata", sarebbe richiesto  $x_0 \in A$ , mentre  $x_0$  deve essere solo di accumulazione nell'altro caso. Un punto di accumulazione non è necessariamente incluso nell'insieme a cui è riferito. ■

#### Teorema 3.3 (di Unicità del Limite per Funzioni)

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici,  $A \subseteq X$ ,  $x_0$  di accumulazione per  $A$ ,  $f : A \mapsto Y$  una funzione e  $l', l'' \in Y$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l' \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l'' \end{aligned} \right\} \implies l' = l''$$

*Dimostrazione.*

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l' \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l'' \end{aligned} \right\} \implies \\ & \implies \begin{cases} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta' > 0 : \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta' \text{ e } x \neq x_0 \text{ vale } d_Y(f(x), l') < \varepsilon \\ \forall \varepsilon > 0, \exists \delta'' > 0 : \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta'' \text{ e } x \neq x_0 \text{ vale } d_Y(f(x), l'') < \varepsilon \end{cases} \end{aligned}$$

Posto  $\delta = \min \{\delta', \delta''\}$ , si può sicuramente concludere

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \text{ e } x \neq x_0 \text{ vale } d_Y(f(x), l') < \varepsilon \text{ e vale } d_Y(f(x), l'') < \varepsilon \\ \implies \forall \varepsilon > 0 \quad d_Y(l', l'') < 2\varepsilon \\ \implies d_Y(l', l'') = 0 \end{aligned}$$

□

**Proposizione 3.4** (Continuità per Successioni)

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici,  $A \subseteq X$ ,  $x_0$  di accumulazione per  $A$ ,  $f : A \mapsto Y$  e  $l \in Y$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \\ \iff \\ \forall \text{ successione } x : \mathbb{N} \mapsto X \text{ tale che } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0 \text{ e } x_n \neq x_0 \\ \text{vale } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l \end{aligned}$$

**Nota.** Specificare "∀ successione" è fondamentale in quanto bisogna considerare tutti i punti  $x \in A$ , non solo le divisioni discrete degli  $n \in \mathbb{N}$

*Dimostrazione.*

$\implies$  Dalle [Definizione 3.1 \(Limite per Funzione\)](#) e [Definizione 2.3 \(Limite per Successioni\)](#)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l &\implies \begin{cases} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in A \\ d(x, x_0) < \delta, x \neq x_0 \implies d(f(x), l) < \varepsilon \end{cases} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0 &\implies \begin{cases} \forall \delta > 0 \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu, x_n \in A \\ x_n \neq x_0 \implies d(x_n, x_0) < \delta \end{cases} \end{aligned}$$

Con il secondo limite per la successione  $x_n$  convergente a  $x_0$  costruita appositamente e sicuramente sempre esistente, grazie alla [Proposizione 2.9 \(Caratterizzazione dei Punti di Accumulazione\)](#).

Unendo le due definizioni di cui sopra, si ottiene la

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu, x_n \in A, x_n \neq x_0 \\ d(x_n, x_0) < \delta \implies d(f(x_n), l) < \varepsilon \end{aligned}$$

**Nota.** La prima parte si può leggere come  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ . Il  $\delta$  viene poi usato per scegliere un  $\nu = \delta$  e per questo  $\nu$  vale il resto dell'espressione.

Che corrisponde alla definizione di limite per funzione di  $f(x_n)$

$\Leftarrow$  Per assurdo, negando  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$ .

$$\begin{aligned} \text{non } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l \\ \implies \exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 \exists x_\delta \in A, x_\delta \neq x_0, \quad d(x_\delta, x_0) < \delta, \quad d(f(x_\delta), l) > \varepsilon \end{aligned}$$

Ponendo  $\delta = \frac{1}{n+1}$  si passa alla successione convergente a 0, dunque compatibile con il  $\delta$  precedente

$$\implies \exists \varepsilon > 0 : \forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in A, x_n \neq x_0, \quad d(x_n, x_0) < \frac{1}{n+1}, \quad d(f(x_n), l) > \varepsilon$$

Essendo  $d(f(x_n), l) > \varepsilon$  si sa per certo che non avrò limite ad  $l$

$$\implies \begin{cases} \text{Esiste una successione } x_n, x_n \in A, x_n \neq x_0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0 \\ \text{e} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \text{ o non esiste, oppure non è } l \end{cases}$$

Quindi l'ipotesi è contraddetta.

□



**Definizione 3.5** (Funzione Continua)

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici e sia  $f : A \mapsto Y$  con  $A \subseteq X$  e  $x_0 \in A$

$$f \text{ è continua in } x_0 \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \text{ vale } d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

Inoltre

$$f \text{ è continua in } A \iff f \text{ è continua in ogni punto di } A$$

**Nota.** Non andrebbe detto semplicemente " $f$  è continua" perché la continuità dipende in modo essenziale dall'insieme di punti su cui la funzione viene considerata. In assenza di ulteriori specificazioni, spesso si sottintende che l'insieme in esame è l'intero dominio della funzione.

**Nota.** Ha senso valutare la continuità di una funzione esclusivamente nell'insieme in cui è definita. Quindi una frase come:

la funzione  $x \mapsto \frac{1}{x}$  è discontinua in 0,

non è (a rigore) sensata. Andrebbe riformulata come:

la funzione  $x \mapsto \frac{1}{x}$  non può essere estesa ad una funzione definita e continua anche in 0.

**Nota.** La continuità di una funzione dipende in modo essenziale anche dalla distanza adottata, tuttavia è prassi sottintendere questa precisazione, soprattutto per funzioni  $\mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ , se la distanza adottata è quella Euclidea.

**Osservazione 3.6**

Alcuni testi definiscono la continuità semplicemente attraverso la nozione di limite. Il  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  è però definito solo se  $x_0$  è punto di accumulazione del dominio di  $f$ , come da [Definizione 3.1 \(Limite per Funzione\)](#).

Una definizione di continuità basata sul limite non permetterebbe, ad esempio, di valutare la continuità della funzione  $x \mapsto \sqrt{x^2(x-1)}$  su tutto il suo insieme di definizione.

**Esercizio 3.7**

Data

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt{x^2(x-1)} \end{aligned}$$

determinare l'insieme di definizione e l'insieme dei punti in cui è continua.

**Esercizio 3.8** (Continuità in Punti Isolati)

Formulare con precisione e dimostrare: ogni funzione è continua in ogni suo punto isolato del suo insieme di definizione.

*Soluzione.*

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici e sia  $f : A \mapsto Y$  con  $A \subseteq X$  e  $x_0 \in A$  **Punto Isolato**. Allora  $f$  è **Continua in  $x_0$**

*Dimostrazione.* Per [Definizione 1.21 \(Punti e Spazi Metrici\)](#)

$$\exists r > 0 : B(x_0, r) \cap A = \{x_0\}$$

Quindi esiste una sfera centrata in  $x_0$  che non contenga altri punti oltre  $x_0$ . Ricordando la [Definizione 3.5 \(Funzione Continua\)](#)

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \text{ vale } d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

Si vede che questo unico  $x_0$  rispetta la condizione  $d_X(x, x_0) < \delta$ , inoltre è sicuramente valida la condizione  $d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$ , verificando la continuità in  $x_0$

□

**Proposizione 3.9**

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici e sia  $f : A \mapsto Y$  con  $A \subseteq X$  e  $x_0 \in A$

$$f \text{ è Continua in } x_0 \iff \begin{cases} x_0 \text{ è } \mathbf{Isolato} \text{ per } A \\ \text{oppure} \\ x_0 \text{ è di } \mathbf{Accumulazione} \text{ per } A \text{ e } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \end{cases}$$

*Dimostrazione.*

- $x_0$  di accumulazione: per definizione di  $f$  continua
- $x_0$  isolato: per [Definizione 1.21 \(Punti e Spazi Metrici\)](#)

$$\exists r > 0 : B(x_0, r) \cap A = \{x_0\}$$

Posto ora  $r = \delta$ , si ottiene che, per certo,  $x = x_0$ , che è quanto richiesto per verificare la continuità

□

**Esercizio 3.10**

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici e sia  $k \in Y$ . Sia  $f : X \mapsto Y$  definita da  $f(x) = k \forall x \in X$ . Dimostrare che  $f$  è continua su  $X$

**Proposizione 3.11** (Continuità e Continuità per Successioni)

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici e sia  $f : A \mapsto Y$  con  $A \subseteq X$  e  $x_0 \in A$

$$\begin{aligned} f \text{ è Continua in } x_0 & \iff \\ \underbrace{\forall \text{ successione } x : \mathbb{N} \mapsto A : \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0 \text{ vale } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x_0)}_{\text{cioè per ogni successione convergente a } x_0} \end{aligned}$$

**Nota.** Il primo limite è in  $X$ , il secondo in  $Y$

**Nota.** Questo enunciato mostra l'equivalenza tra la [Definizione 3.5 \(Funzione Continua\)](#) e [Proposizione 3.4 \(Continuità per Successioni\)](#).

*Dimostrazione.*

$\implies$

$$f \text{ continua in } x_0 \iff \begin{cases} x_0 \text{ di accumulazione} \\ \text{oppure} \\ x_0 \text{ isolato} \end{cases}$$

Dividendo nei due casi:

- $x_0$  di accumulazione:

Sia  $x : \mathbb{N} \mapsto X$  una successione convergente a  $x_0$  con  $x_0 \in A$ , da cui, per [Definizione 2.3 \(Limite per Successioni\)](#)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0 & \implies \\ \implies \forall \delta > 0 \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n \geq \nu & \quad d_X(x_n, x_0) < \delta \end{aligned}$$

Essendo, per ipotesi,  $f$  continua in  $x_0$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \text{ vale } d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

Procedendo come nella prima parte della dimostrazione di [Proposizione 3.4 \(Continuità per Successioni\)](#), si ottiene:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \nu > 0 : \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ con } n > \nu \text{ vale } d_Y(f(x_n), f(x_0)) < \varepsilon$$

Che è la definizione di  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x_0)$

–  $x_0$  isolato:

L'unica successione di elementi di  $A$  convergente a  $x_0$  è la successione costante  $x_n = x_0$ , dunque sicuramente  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x_0)$

$\Leftarrow$  Dividendo ancora nei due casi:

–  $x_0$  di accumulazione:

Ponendo, per assurdo

$$\begin{aligned} & f \text{ non continua in } x_0 \\ \implies & \exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 \exists x \in A, \quad d_X(x, x_0) < \delta, \quad d_Y(f(x), f(x_0)) > \varepsilon \\ & \text{limvarepsilonpsilon} \end{aligned}$$

Procedendo di nuovo come nella dimostrazione di [Proposizione 3.4 \(Continuità per Successioni\)](#), posto  $\delta = \frac{1}{n+1}$  si passa alla successione convergente a 0, dunque compatibile con il  $\delta$  precedente

$$\implies \exists \varepsilon > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in A, \quad d_X(x_n, x_0) < \frac{1}{n+1}, \quad d_Y(f(x_n), f(x_0)) > \varepsilon$$

Quindi si è costruita una successione  $x : \mathbb{N} \mapsto X$  ( $X$  generico) convergente a  $x_0$ , ma la successione  $f \circ x$  (cioè la  $\{f(x_n) : n \in \mathbb{N}\}$ ) non convergerebbe a  $f(x_0)$ . Questo è contrario all'ipotesi da cui si è partiti, per cui  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x_0)$

–  $x_0$  isolato:

Immediatamente da [Esercizio 3.8 \(Continuità in Punti Isolati\)](#)

□

### Corollario 3.12

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici e sia  $f : A \mapsto Y$  con  $A \subseteq X$  e  $x : \mathbb{N} \in X$  una successione in  $A$

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ Continua in } A \\ \exists \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \in A \end{array} \right\} \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n\right)$$

*Dimostrazione.* Essendo  $f$  continua per ipotesi, dalla [Proposizione 3.11 \(Continuità e Continuità per Successioni\)](#) è noto che

$$\forall \text{ successione } x : \mathbb{N} \mapsto A : \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x_0)$$

Inoltre  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0 \in A$  per ipotesi e, grazie alla continuità di  $f$ ,  $\exists f(x_0) \quad \forall x_0 \in A$ .

Unendo le due conclusioni si ottiene la tesi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x_0) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n\right)$$

□

### Proposizione 3.13 (Continuità di $f$ in un Insieme)

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici e sia  $f : A \mapsto Y$  con  $A \subseteq X$ .

$f$  Continua in  $A$

$\iff$

$$\underbrace{\forall x_0 \in A}_{\text{unica aggiunta}} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \quad \text{vale} \quad d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

**Nota.** Questa proposizione espande la [Definizione 3.5 \(Funzione Continua\)](#) di continuità su un insieme grazie alla stessa definizione di continuità in un punto

*Dimostrazione.* Segue direttamente dalla [Definizione 3.5 \(Funzione Continua\)](#) □

**Proposizione 3.14** (Continuità Funzioni Composte)

Siano  $(X, d_X)$ ,  $(Y, d_Y)$  e  $(Z, d_Z)$  spazi metrici e siano:

- $f : A \mapsto Y$  con  $A \subseteq X$
- $g : B \mapsto Z$  con  $B \subseteq Y$
- $x_0 \in A$
- $f(x_0) \in B$

Allora

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ Continua in } x_0 \\ g \text{ Continua in } f(x_0) \end{array} \right\} \implies (g \circ f) \text{ è Continua in } x_0$$

*Dimostrazione.* Dalla [Definizione 3.5 \(Funzione Continua\)](#)

$$f \text{ continua in } x_0 \implies \forall \eta > 0 \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \quad \text{vale} \quad d_Y(f(x), f(x_0)) < \eta$$

Da  $d_Y(f(x), f(x_0)) < \eta$  sappiamo che la distanza in  $Y$  è limitata, dunque possiamo utilizzarla nella seguente definizione

$$g \text{ continua in } f(x_0) \implies \forall \varepsilon > 0 \exists \eta > 0 : \quad \forall y \in B \text{ con } d_Y(y, f(x_0)) < \eta \quad \text{vale} \quad d_Z(g(y), g(f(x_0))) < \varepsilon$$

**Nota.**  $\eta$  è la lettera greca Eta

Dunque, posto  $y = f(x)$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \quad \text{vale} \quad d_Z(g(f(x)), g(f(x_0))) < \varepsilon$$

Oppure, ugualmente, utilizzando il formalismo delle composizioni di funzioni

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \quad \text{vale} \quad d_Z((g \circ f)(x), (g \circ f)(x_0)) < \varepsilon$$

Che è, per [Definizione 3.5 \(Funzione Continua\)](#), la continuità di  $g \circ f$  in  $x_0$  □

**Teorema 3.15** (Generale di Weierstrass)

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici e sia  $f : K \mapsto Y$  con  $K \subseteq X$ .

$$\left. \begin{array}{l} K \text{ Compatto} \\ f \text{ Continua su } K \end{array} \right\} \implies f(K) \text{ Compatto}$$

*Dimostrazione.* Siano le successioni

- $y : \mathbb{N} \mapsto Y$  tale che  $y_n \in f(K) \forall n \in \mathbb{N}$ , cioè  $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in K : f(x_n) = y_n$
- $x : \mathbb{N} \mapsto X$  tale che  $x_n \in K \forall n \in \mathbb{N}$

**Nota.** Abbiamo una successione che, attraverso la  $f$  (non direttamente: le successioni non sono  $X \mapsto Y$ !), associa indirettamente valori in  $K \subseteq X$  a valori in  $f(K) \subseteq Y$

La successione  $x$  ammetterà sicuramente una sottosuccessione  $x_{n_k}$  convergente ad un elemento  $\bar{x} \in K$ . Questo per [Definizione 2.33 \(Insieme Compatto\)](#), avendo  $K$  compatto per ipotesi, ed essendo  $x$  a valori in  $K$ .

Data la continuità di  $f$  in  $K$ , abbiamo  $y_{n_k} = f(x_{n_k}) \in f(K)$ , ma essendo  $x_{n_k}$  convergente ad  $\bar{x}$ , anche  $y_{n_k}$  converge, verificando così la [Definizione 2.33 \(Insieme Compatto\)](#). □

*Dimostrazione.* (Alternativa)

La successione  $x$  ammette una sottosuccessione  $x_{n_k}$  convergente ad un elemento  $\bar{x} \in K$ , dunque da [Proposizione 2.4](#):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_* \iff \forall \eta > 0 \exists \nu \in \mathbb{N} : \quad \forall n > \nu \quad d(x_n, x_*) < \eta$$

Dalla [Definizione 3.5 \(Funzione Continua\)](#) e sapendo che  $f(x)$  è continua per ipotesi, si ottiene:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in K \quad d_X(x, x_*) < \delta \quad d_Y(f(x_n), f(x_*)) < \varepsilon$$

Unendo ora le due definizioni:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu \in \mathbb{N} : \quad \forall n > \nu \quad d_Y(f(x_n), f(x_*)) < \varepsilon$$

Che equivale, per come è definita  $y_n$ , a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = y_*$$

Cioè la definizione di successione convergente. Ho dunque individuato una sottosuccessione convergente per ogni successione in  $f(K)$ , verificando così la [Definizione 2.33 \(Insieme Compatto\)](#).  $\square$

**Esercizio 3.16** (Teorema di Weierstrass - Analisi 1)

Cosa c'entra il [Teorema 3.15 \(Generale di Weierstrass\)](#) con il "vecchio" Teorema di Weierstrass di Analisi 1?

*Soluzione.*

**Nota.**  $Y$  deve necessariamente essere in  $\mathbb{R}^1$ , perché, per individuare sup ed inf, è necessario che l'insieme sia ordinabile. Considerando il caso  $X \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $Y \subseteq \mathbb{R}$  si ottiene:

$$f : K \mapsto f(K) \text{ con } f(K) \text{ compatto.}$$

Il fatto che  $f(K) \subseteq \mathbb{R}$  sia compatto, implica che sia **Chiuso** e **Limitato** per [Proposizione 2.34](#)

- Essendo limitato, per certo  $\exists \sup \in \mathbb{R} \neq \infty$  e  $\exists \inf \in \mathbb{R} \neq \infty$
- Essendo chiuso, sicuramente  $\sup = \max$  e  $\inf = \min$

Dunque  $f$  ammette  $\max$  e  $\min \in \mathbb{R} \neq \infty$ , che è la conclusione del Teorema di Weierstrass in Analisi 1.  $\blacksquare$

**Proposizione 3.17**

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici e sia  $f : K \mapsto Y$  con  $K \subseteq X$ .

$$\left. \begin{array}{l} K \text{ Connesso} \\ f \text{ Continua su } K \end{array} \right\} \implies f(K) \text{ Connesso}$$

*Dimostrazione.* Omessa.  $\square$

**Esercizio 3.18**

Sia  $(X, d)$  uno spazio metrico. Dimostrare che, fissato un punto  $x_0 \in X$ , la funzione:

$$\begin{array}{ccc} f & : & X \rightarrow \mathbb{R} \\ & & x \mapsto d(x, x_0) \end{array}$$

è continua in  $X$

### 3.1 Uniforme Continuità

**Definizione 3.19** (Funzione Uniformemente Continua)

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici e sia  $f : A \mapsto Y$  con  $A \subseteq X$ .


$f$  è **Uniformemente Continua** in  $A$

$\iff$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \text{ tale che } \forall x, x_0 \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \quad \text{vale } d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

Cioè è una funzione continua per la quale piccole variazioni della  $x$  implicano piccole variazioni di  $f(x)$ .

Graficamente si può vedere che il grafico "non impenna" e non "oscilla liberamente". Buon indicatore della uniforme continuità è la presenza di asintoti orizzontali.

**Esempio 3.20****Esercizio 3.21**

Confrontare la [Proposizione 3.13 \(Continuità di  \$f\$  in un Insieme\)](#) con la [Definizione 3.19 \(Funzione Uniformemente Continua\)](#)

*Soluzione.* In [Proposizione 3.13 \(Continuità di  \$f\$  in un Insieme\)](#) si definiva la continuità della funzione sull'insieme applicando la [Definizione 3.5 \(Funzione Continua\)](#) a ogni  $x_0 \in A$ , cioè ogni punto di  $A$ . Questo non ha particolari implicazioni sul comportamento della funzione, informa solamente sulla continuità in ogni punto di  $A$ .

[Definizione 3.19 \(Funzione Uniformemente Continua\)](#) invece prevede, per definizione, la possibilità di scegliere un qualsiasi  $x_0$  quando  $\varepsilon$  è già stato scelto. Ciò implica che  $\varepsilon$  debba essere valido per ogni  $x_0 \in A$ , non scelto *a priori*. ■

**Proposizione 3.22**

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici. Sia  $f : A \mapsto Y$  con  $A \subseteq X$ .

Se  $f$  è **uniformemente continua** in  $A$ , allora  $f$  è **continua** in  $A$ .

*Dimostrazione.* Deriva da [Esercizio 3.21](#) in quanto, se è possibile scegliere un qualsiasi  $x_0$  quando  $\varepsilon$  è già stato fissato, sicuramente sarà possibile fare questa scelta anche in ordine inverso (la continuità è condizione meno stringente). □

**Esercizio 3.23**

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici e  $k \in Y$ . Data  $f : X \mapsto Y$  definita da  $f(x) = k \quad \forall x \in X$ .

Dimostrare che  $f$  è uniformemente continua.

**Esercizio 3.24**

Formulare e dimostrare il teorema sulla uniforme continuità della composizione di funzioni uniformemente continue in spazio metrici.

**Esempio 3.25**

Sia  $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  data da  $f(x) = x^2$ .  $f$  è continua in  $\mathbb{R}$ , ma *non* è uniformemente continua in  $\mathbb{R}$

**Esercizio 3.26**

Esibire esempi di funzioni  $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  che siano limitate/illimitate ed uniformemente continue.

**Esempio 3.27**

Sia  $f : ]0, 1] \mapsto \mathbb{R}$  data da  $f(x) = \sin(\frac{1}{x})$ .

In  $]0, 1]$ ,  $f$  è continua e limitata, ma non è uniformemente continua.

**Proposizione 3.28 (Teorema di Cantor)**

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici e sia  $f : K \mapsto Y$  con  $K \subseteq X$ .

$$\left. \begin{array}{l} K \text{ Compatto} \\ f \text{ Continua su } K \end{array} \right\} \implies f \text{ Uniformemente Continua su } K$$

*Dimostrazione.* Per assurdo, negando la conclusione

$$\begin{aligned} & f \text{ non è uniformemente continua in } K \\ \implies & \exists \varepsilon > 0 \text{ tale che } \forall \delta > 0 \quad \exists x', x'' \in K \text{ con } d(x', x'') < \delta \text{ e } d(f(x'), f(x'')) > \varepsilon \end{aligned}$$

Ponendo  $\delta = \frac{1}{n+1}$  si passa alla successione convergente a 0, dunque compatibile con il  $\delta$  precedente

$$\implies \exists \varepsilon > 0 \text{ tale che } \forall n \in \mathbb{N} \quad \exists x'_n, x''_n \in K \text{ con } \underbrace{d(x'_n, x''_n)}_{(1)} < \frac{1}{n+1} \text{ e } \underbrace{d(f(x'_n), f(x''_n))}_{(2)} > \varepsilon \quad (3.28.1)$$

Essendo  $K$  compatto per ipotesi, per le due successioni  $x'_n$  e  $x''_n$  esistono due sottosuccessioni  $x'_{n_k}$  e  $x''_{n_k}$  convergenti a  $x'_\infty, x''_\infty \in K$ .

Da (1) di Eq. (3.28.1) si sa che  $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(x'_n, x''_n) = 0$ , dunque  $x'_\infty = x''_\infty$  per  $n \rightarrow +\infty$

Da (2) di Eq. (3.28.1), d'altro canto, è esplicitato che  $d(f(x'_n), f(x''_n))$  rimane sempre  $> \varepsilon$  strettamente positivo, dunque è negata la [Definizione 3.5 \(Funzione Continua\)](#) in  $x'_\infty = x''_\infty$ . Così è negata l'ipotesi sulla continuità della funzione.  $\square$

### Proposizione 3.29

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici,  $A \subseteq X$  e  $f : A \mapsto Y$  **Uniformemente Continua** su  $A$ . Allora, per ogni successione  $x : \mathbb{N} \mapsto X$  **di Cauchy** in  $X$ , la successione  $f \circ x$  delle immagini  $f(x_n)$  è **di Cauchy** in  $Y$ .

*Dimostrazione.* Omessa.  $\square$

### Proposizione 3.30

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici,  $A \subseteq X$  e  $f : A \mapsto Y$  **Uniformemente Continua** su  $A$ . Allora esiste un'unica funzione

$$\bar{f} : \bar{A} \mapsto Y$$

continua su  $\bar{A}$  e tale che  $f|_A = f$  (cioè la  $f$  ristretta ad  $A$ , dove definita, corrisponde a  $f$ )

*Dimostrazione.* Omessa.  $\square$

## 3.2 Lipschitzianità

### Definizione 3.31 (Funzione Lipschitziana)

Siano:

- $(X, d_X), (Y, d_Y)$  spazi metrici
- $A \subseteq X$
- $f : A \mapsto Y$

Allora

$f$  è **Lipschitziana**

$$\iff$$

$$\exists L > 0 : \forall x', x'' \in X, \quad d_Y(f(x''), f(x')) \leq L \cdot d_X(x'', x')$$


**Nota.** La costante  $L$  sopra introdotta non è univocamente determinata. Nei risultati seguenti non sarà mai rilevante il valore di  $L$ , ma il fatto stesso che  $L$  esista.

### Definizione 3.32 (Costante di Lipschitz)

Fissate le distanze  $d_X$  e  $d_Y$  e la funzione  $f$ , allora la più piccola  $L$  positiva soddisfacente

$$d_Y(f(x''), f(x')) \leq L \cdot d_X(x'', x') \quad \forall x', x'' \in X$$

si definisce **Costante di Lipschitz** della funzione  $f$  in  $X$

**Esempio 3.33****Esempio 3.34**

Sono dati gli spazi metrici  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  ed una funzione Lipschitziana  $f : X \mapsto Y$ .

Determinare una nuova distanza  $\delta_X$  su  $X$  che sia equivalente a  $d_X$  ed in modo che la costante di Lipschitz di  $f$  rispetto a  $\delta_X$  sia minore o uguale ad 1.

**Esempio 3.35**

Sono dati gli spazi metrici  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  ed una funzione Lipschitziana  $f : X \mapsto Y$ .

Determinare una nuova distanza  $\delta_Y$  su  $Y$  che sia equivalente a  $d_Y$  ed in modo che la costante di Lipschitz di  $f$  rispetto a  $\delta_Y$  sia minore o uguale ad 1.

**Esercizio 3.36**

Sia  $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ . Come si fa a capire se  $f$  è Lipschitziana o no dal suo grafico?

**Proposizione 3.37**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  un insieme **Convesso** (Definizione 8.40 (Insieme Convesso)) e  $f \in \mathbf{C}^1(A; \mathbb{R})$ . Se tutte le derivate parziali sono limitate in  $A$ , allora  $f$  è Lipschitziana.

*Dimostrazione.* Segue direttamente da Definizione 8.40 (Insieme Convesso) e Teorema 8.38 (degli Accrescimenti Finiti)  $\square$

**Proposizione 3.38**

Sia  $f : X \mapsto Y$  una funzione **Lipschitziana**. Allora  $f$  è **Uniformemente Continua** su  $X$ .

*Dimostrazione.* Dall'ipotesi di Lipschitzianità, applicando la Definizione 3.31 (Funzione Lipschitziana), si sa per certo che

$$d_Y(f(x''), f(x')) \leq L \cdot d_X(x'', x')$$

Posti ora

- $d_X(x'', x') < \delta$  senza perdere generalità (il  $\delta$  nella unif. continuità è a scelta)
- $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$  come semplice posizione

Si ottiene

$$d_Y(f(x''), f(x')) \leq L \cdot d_X(x'', x') < L \cdot \delta = L \cdot \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon$$

Da cui, prendendo il primo e l'ultimo membro,

$$d_Y(f(x''), f(x')) < \varepsilon$$

che è la condizione di uniforme continuità.  $\square$

**Esempio 3.39**

La funzione

$$\begin{array}{ccc} f & : & [0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sqrt{x} \end{array}$$

è uniformemente continua ma non è Lipschitziana. Vedere grafico in [Esempio 3.33](#)



**Esempio 3.40**

La funzione

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

è uniformemente continua ma non è Lipschitziana.

**Esempio 3.41**

La funzione

$$f : [0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2$$

è di classe  $C^\infty$  ma non è Lipschitziana. Vedere grafico in [Esempio 3.33](#)

**Esempio 3.42**

La funzione

$$f : [0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto |x|$$

è Lipschitziana ma non è derivabile in 0.

**Esercizio 3.43**

La composizione di funzioni Lipschitziane è Lipschitziana?

Per funzioni reali di variabile reale, la somma/il prodotto di funzioni Lipschitziane è una funzione Lipschitziana?

Enunciare formalmente e dimostrare.

**Proposizione 3.44**

Siano  $(X, d_X)$  e  $(Y, d_Y)$  spazi metrici. Sia  $f : A \mapsto \mathbb{R}^n$  con  $A \subseteq X$ .

$f$  è Lipschitziana  $\iff$  ogni componente di  $f$  è Lipschitziana

*Dimostrazione.* Immediata. □

**Definizione 3.45** (Norma di Matrice)

Sia  $A \in \text{Mat}(m \times n)$ . **Norma** di  $A$  è la quantità

$$\|A\| = \max_{x \in \overline{B(0,1)}} \|A x\|$$

con  $x$  vettore  $\in \mathbb{R}^n$  e  $A x \in \mathbb{R}^m$  risultato del prodotto righe per colonne.

**Esercizio 3.46**

Verificare che la norma introdotta in [Definizione 3.45 \(Norma di Matrice\)](#) soddisfi alle condizioni della [Definizione 1.8 \(Norma\)](#) con  $V = \text{Mat}(m \times n)$

**Esercizio 3.47**

Con la notazione della [Definizione 3.45 \(Norma di Matrice\)](#), verificare le seguenti uguaglianze

$$\begin{aligned} \|A\| &= \sup_{x \in \overline{B(0,1)}} \|A x\| = \sup_{x \in B(0,1)} \|A x\| \\ &= \max_{\|x\|=1} \|A x\| = \sup_{\|x\|=1} \|A x\| \\ &= \sup_{x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} \frac{\|A x\|}{\|x\|} \end{aligned}$$

**Proposizione 3.48**

Sia  $A \in \text{Mat}(m \times n)$ . Allora

$$\|A x\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

*Dimostrazione.* Sia  $x = 0$  la tesi è immediata.

Sia  $x \neq 0$ , allora

$$\begin{aligned}\|A x\| &= \left\| A x \cdot \frac{\|x\|}{\|x\|} \right\| = \left\| \|x\| \cdot \left( A \frac{x}{\|x\|} \right) \right\| \\ &= \|x\| \cdot \left\| A \frac{x}{\|x\|} \right\|\end{aligned}$$

Essendo  $\frac{x}{\|x\|}$  il versore di  $x$ , esso ha, per definizione, norma unitaria e, grazie a [Esercizio 3.47](#), si sa che  $\|A\| \leq \sup_{\|x\|=1} \|A x\|$ , dunque

$$\leq \|A\| \cdot \|x\|$$

□

### Esercizio 3.49

Esibire una matrice  $A \in \text{Mat}(2 \times 3)$  tale che  $\|A\| = 2$

### Esercizio 3.50

Sia  $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$  una funzione lineare. Allora è Lipschitziana (rispetto alla metrica Euclidea). Suggerimento: utilizzare la [Proposizione 3.48](#)

**Nota.** In spazi più generali di  $\mathbb{R}^n$  (spazi di dimensione *infinita*) l'affermazione contenuta in questo esercizio può essere falsa. Vedasi [Proposizione 19.20](#)

### Esercizio 3.51

Se  $A$  e  $B$  sono matrici tali che se ne possa fare il prodotto (regole del prodotto righe per colonne), dimostrare che

$$\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

## 4 Il Teorema delle Contrazioni

### Definizione 4.1 (Contrazione)

Sia  $(X, d)$  uno spazio metrico. Si dice **Contrazione** una funzione  $T: X \mapsto X$  soddisfacente a:

$$\exists K \in [0, 1[ \text{ tale che } \forall x', x'' \in X \text{ vale } d_X(T(x''), T(x')) \leq K \cdot d_X(x'', x') \quad (4.1.1)$$

Una contrazione è quindi una funzione con insieme di partenza e di arrivo coincidenti e Lipschitziana con costante di Lipschitz strettamente minore di 1.

È generalmente inutile considerare contrazioni definite tra spazi diversi. Infatti, data una funzione  $T: X \rightarrow Y$  Lipschitziana, sarebbe sempre possibile riscalare la distanza in uno dei due spazi  $X$  o  $Y$  per ottenere una costante di Lipschitz minore di 1.

**Nota.** D'ora in poi si utilizzerà spesso la notazione  $Tx$  per intendere  $T(x)$

### Esempio 4.2 (Esempi di Contrazioni)

1.  $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  data da  $f(x) = \frac{x}{2}$ .  $f$  è una contrazione.
2.  $f: [0, 2] \mapsto [0, 2]$  data da  $f(x) = 1 + \frac{x}{2}$ .  $f$  è una contrazione
3.  $f: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$  data da  $f(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ .  $f$  è una contrazione

### Esercizio 4.3

La composizione di contrazioni è una contrazione. Enunciare formalmente e dimostrare.

Esibire esempi che mostrino come la somma ed il prodotto di contrazioni possano non essere contrazioni.

*Soluzione.*

Sia  $(X, d)$  uno spazio metrico, siano  $f, g: X \mapsto X$  **due contrazioni** in  $X$ . Allora  $f \circ g$  è una **contrazione**

*Dimostrazione.* Sappiamo che:

$$\begin{aligned} \forall x', x'' \in X, \quad d(f(x''), f(x')) &\leq K_f \cdot d(x'', x') \\ \forall x', x'' \in X, \quad d(g(x''), g(x')) &\leq K_g \cdot d(x'', x'). \end{aligned}$$

$f \circ g = f(g(x))$ , quindi presi  $x', x'' \in X$  si ha

$$d(f(g(x'')), f(g(x'))) \leq K_f \cdot d(g(x''), g(x')) \leq K_f K_g \cdot d(x'', x')$$

□

Esempi: ■

### Proposizione 4.4

Sia  $f \in \mathbf{C}^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ . Se esiste  $k \in [0, 1[$  tale che per ogni  $x \in \mathbb{R}^n$  vale  $\|Df(x)\| < k$ , allora  $f$  è **contrazione**.

*Dimostrazione.* Segue dal [Teorema 8.38 \(degli Accrescimenti Finiti\)](#) □

### Definizione 4.5 (Punto Fisso)

Sia  $X$  un insieme e  $f: X \rightarrow X$ . Un **Punto Fisso** di  $f$  è un elemento  $x \in X$  tale che:

$$x = f(x)$$

### Teorema 4.6 (delle Contrazioni)

**Nota.** Questo teorema è anche noto come *Teorema di Banach-Caccioppoli*

Sia  $(X, d)$  uno spazio metrico e  $T : X \mapsto X$ . Allora

$$\left. \begin{array}{l} X \text{ Completo} \\ T \text{ Contrazione} \end{array} \right\} \implies \exists! x_* \in X : T(x_*) = x_*$$

Cioè esiste un **unico Punto Fisso** di  $T$  in  $X$ .

*Dimostrazione.* La dimostrazione si divide in 3 passaggi

1. *Individuazione di una Successione di Cauchy*

Dato un generico  $x_0 \in X$  si costruisce una successione  $x$  nel seguente modo:

$$x_0 \in X \quad x_1 = T(x_0) \quad x_2 = T(x_1) \quad \dots \quad x_{n+1} = T(x_n) \quad (4.6.1)$$

La successione  $x : \mathbb{N} \mapsto X$  è sicuramente ad elementi in  $X$  in quanto  $T$ , contrazione, è per definizione  $T : X \mapsto X$ . È necessario dimostrare che la  $x$  sia di Cauchy ([Definizione 2.11 \(Condizione di Cauchy\)](#)) cioè che:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n, m > \nu \text{ vale } d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

Presi ora due qualunque  $n$  e  $m$  e sfruttando il modo in cui è definita  $T$

$$d(x_n, x_m) = d(T(x_{n-1}), T(x_{m-1}))$$

Grazie al fatto che  $T$  è contrazione per definizione, esiste un  $K \in [0, 1[$

$$\begin{aligned} &\leq K \cdot d(x_{n-1}, x_{m-1}) \\ &= d(T(x_{n-2}), T(x_{m-2})) \\ &\leq K^2 \cdot d(x_{n-2}, x_{m-2}) \end{aligned}$$

Ipotizzando ora  $n < m$ , sicuramente dopo un  $n$  numero di passi analoghi si arriverà a 0

$$\leq K^n \cdot d(x_0, x_{m-n})$$

Quindi, andando dal primo all'ultimo passaggio, si è ottenuta la disuguaglianza

$$d(x_n, x_m) \leq K^n \cdot d(x_0, x_{m-n}) \quad (4.6.2)$$

Ora, applicando ripetutamente la disuguaglianza triangolare al secondo membro della Eq. (4.6.2)

$$K^n \cdot d(x_0, x_{m-n}) \leq K^n \cdot (d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + \dots + d(x_{m-n-1}, x_{m-n}))$$

Applicando ora quanto ottenuto in Eq. (4.6.2) a tutti gli addendi tranne il primo (che avrebbe  $n = 0$ )

$$\begin{aligned} &\leq K^n \cdot (d(x_0, x_1) + K \cdot d(x_0, x_1) + \dots + K^{m-n-1} \cdot d(x_0, x_1)) \\ &\leq K^n \cdot (1 + K + \dots + K^{m-n-1}) \cdot d(x_0, x_1) \end{aligned}$$

Quindi riassunto, partendo dal primo membro dalla Eq. (4.6.2), si è arrivati a

$$d(x_n, x_m) \leq K^n \cdot \underbrace{(1 + K + \dots + K^{m-n-1})}_{(1)} \cdot d(x_0, x_1) \quad (4.6.3)$$

Posta ora la (1) di Eq. (4.6.3) come  $s$  si ha:

$$s = 1 + K + \dots + K^{m-n-1} \quad \text{e, moltiplicando per } K, \quad K \cdot s = K + K^2 + \dots + K^{m-n}$$

Da cui, eseguendo la differenza tra  $s$  e  $K \cdot s$

$$\begin{aligned} &s - K \cdot s \\ &= (1 + \cancel{K} + \cancel{K^2} + \dots + K^{m-n-1}) - (\cancel{K} + \cancel{K^2} + \dots + K^{m-n}) \\ &= 1 - K^{m-n} \end{aligned}$$

si ottiene l'equivalenza

$$\begin{aligned} s - K \cdot s &= 1 - K^{m-n} \\ s(1 - K) &= 1 - K^{m-n} \\ s &= \frac{1 - K^{m-n}}{1 - K} \end{aligned}$$

Sostituendo la formulazione di  $s$  appena trovata in Eq. (4.6.3) si ottiene

$$d(x_n, x_m) \leq K^n \cdot \frac{1 - K^{m-n}}{1 - K} \cdot d(x_0, x_1) \quad (4.6.4)$$

Essendo  $k \in [0, 1[$ , eseguendone l'elevamento a potenza otterrò un numero ancor più piccolo. È dunque certo che

$$1 - K^{m-n} \geq 1 - K \implies \frac{1 - K^{m-n}}{1 - K} \leq 1$$

per cui è sicuramente possibile minorare la Eq. (4.6.4) che diventa

$$d(x_n, x_m) \leq K^n \cdot d(x_0, x_1) \quad (4.6.5)$$

**Nota.** La Eq. (4.6.5), per come è scritta, fornisce un importante risultato. Grazie a questa equazione, noto  $n$  e calcolando solo la distanza tra gli elementi 0 ed 1 della successione (facilmente individuabili) si ha un limite superiore per la  $d(x_n, x_m) \forall n, m$ . Non sarebbe stato invece possibile calcolare la  $d(x_0, x_{n-m})$  trovata ancora prima.

Questa minorazione permette di verificare la definizione di successione di Cauchy, dunque la  $x$  definita in Eq. (4.6.1) è di Cauchy.  $\square$

## 2. Individuazione del Punto Fisso

La successione  $x$  definita in Eq. (4.6.1) ammette sicuramente  $\lim x \in X$  per [Definizione 2.13 \(Spazio Metrico Completo\)](#), essendo stata dimostrata di Cauchy nel passo precedente. Inoltre

$$\begin{array}{ccccccc} & \text{Come da} & & \text{Per} & & \text{Per} & \\ & \text{Definizione 4.1 (Contrazione)} & & \text{Proposizione 3.38} & & \text{Proposizione 3.22} & \\ T \text{ Contrazione} & \implies & T \text{ Lipschitziana} & \implies & T \text{ Unif. Cont.} & \implies & T \text{ Continua} \end{array}$$

Posto quindi

$$T(x_*) = T\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n\right)$$

Grazie alla continuità di  $T$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} (T(x_n))$$

Dunque, per come è definita  $x$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1})$$

Dunque, essendo  $x$  di Cauchy

$$= x_*$$

$\square$

## 3. Dimostrazione unicità punto fisso

Si suppone non sia unico

$$x_0, y_0 \in X \quad x_0 \neq y_0 \quad T(x_0) = x_0, \quad T(y_0) = y_0$$

Calcolando la distanza tra i due punti, sfruttando il fatto che siano punti fissi per definizione ed, infine, essendo  $T$  contrazione si ottiene

$$\begin{aligned} d(x_0, y_0) &= d(T(x_0), T(y_0)) \leq K \cdot d(x_0, y_0) \\ &\implies \\ d(x_0, y_0) - K \cdot d(x_0, y_0) &\leq 0 \\ (1 - K)(d(x_0, y_0)) &\leq 0 \end{aligned} \tag{4.6.6}$$

Però

- $1 - k > 0$  strettamente positivo perché, per [Definizione 4.1 \(Contrazione\)](#)  $k \in [0, 1[$
- $d(x_0, y_0) \geq 0$  per [Definizione 1.2 \(Spazio Metrico\)](#)

Allora deve essere per forza  $d(x_0, y_0) = 0$  per non contraddire la Eq. (4.6.6), dunque per proprietà delle distanze  $x_0 = y_0$ . □

#### Esercizio 4.7

I passaggi da Eq. (4.6.2) a Eq. (4.6.5) sono necessari?

*Soluzione.* Vedere [nota alla dimostrazione del delle Contrazioni](#) ■

#### Esempio 4.8

Se  $X$  non è completo:

Siano  $X = ]0, 1[$  e  $T : X \mapsto X$  data  $T(x) = \frac{x}{2}$ .  $T$  è una contrazione senza punti fissi in  $X$

#### Esempio 4.9

Se  $T$  è *quasi* una contrazione possono non esserci punti fissi:

Sia  $X = \mathbb{R}$  e sia  $T : X \mapsto X$  data da  $T(x) = x + \frac{\pi}{2} - \arctan x$ . Grazie al Teorema di Lagrange (da Analisi 1, essendo in  $\mathbb{R}$ ) si può facilmente dimostrare che  $\forall x', x'' \in X$

$$|T(x'') - T(x')| < |x'' - x'|$$

però  $T$  non è una contrazione ed infatti non ammette punti fissi.

#### Esempio 4.10

Se  $T$  è *quasi* una contrazione possono esserci infiniti punti fissi:

Sia  $X = \mathbb{R}$  e sia  $T : X \mapsto X$  data da  $T(x) = x$ . Evidentemente

$$|T(x'') - T(x')| = |x'' - x'|$$

e  $T$  ammette infiniti punti fissi.

#### Esercizio 4.11

Sia  $f : [0, 1] \mapsto [1, 2]$  data da  $f(x) = 1 + \frac{x}{2}$

$f$  è una funzione Lipschitziana con costante di Lipschitz  $\frac{1}{2}$  definita tra spazi metrici completi ma senza punti fissi. È in contraddizione con il [Teorema 4.6 \(delle Contrazioni\)](#)?

#### Esercizio 4.12

Sia  $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  derivabile su  $\mathbb{R}$  e tale che  $f'(x) \leq \frac{1}{2} \forall x \in \mathbb{R}$ .

Dimostrare che allora esiste un unico  $x_* \in \mathbb{R}$  tale che  $f(x_*) = x_*$

#### Osservazione 4.13

È utile considerare **contrazioni** che dipendono da uno o più **parametri**. Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico completo,  $P$  un **insieme** di parametri e  $T : X \times P \mapsto X$ .

Grazie al [Teorema 4.6 \(delle Contrazioni\)](#) è data l'esistenza di un punto fisso di  $T$  indipendentemente dal parametro. È dunque possibile definire una funzione  $\varphi : P \mapsto X$  che ad ogni parametro  $p \in P$  associa  $\varphi(p)$ , unico punto fisso della contrazione.

In generale, la regolarità della funzione  $\varphi$  è la stessa con cui  $T$  dipende dal parametro  $p$ . Vedasi [Teorema 4.15 \(delle Contrazioni con Parametro\)](#) e [Teorema 4.17](#)

**Definizione 4.14** (Contrazione con Parametro)

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico e  $P$  un **Insieme**

$T$  è una **Contrazione** in  $x \in X$  **Uniformemente** in  $p \in P$

$\Leftrightarrow$

$$\exists K \in [0, 1[ : \forall p \in P, \forall x', x'' \in X \quad \text{vale} \quad d(T(x', p), T(x'', p)) \leq K \cdot d(x', x'') \quad (4.14.1)$$

Cioè, indipendentemente da qualsiasi  $p \in P$ , la  $T$  rimane contrazione.

**Teorema 4.15** (delle Contrazioni con Parametro)

Siano:

- $(X, d_X)$  uno spazio metrico completo
- $(P, d_P)$  uno spazio metrico
- $T : X \times P \mapsto X$  una contrazione in  $x \in X$  uniformemente in  $p \in P$
- $T$  continua

Allora  $\forall p \in P$  esiste un unico punto fisso  $x_p$  per la funzione  $x \mapsto T(x, p)$  e la funzione  $p \mapsto x_p$  è continua.

*Dimostrazione.* Come già detto in [Osservazione 4.13](#), il [Teorema 4.6 \(delle Contrazioni\)](#) assicura l'esistenza di una funzione  $\varphi : P \mapsto X$  che ad ogni  $p \in P$  associa un unico punto fisso di  $x \mapsto T(x, p)$ .  $\varphi$  è continua. Infatti se  $p_n \rightarrow p_0$

$$d_X(\varphi(p_n), \varphi(p_0)) =$$

Essendo  $\varphi(p_n)$  per definizione punto fisso di  $T$  con parametro  $p_n$

$$= d_X(T(\varphi(p_n), p_n), T(\varphi(p_0), p_0))$$

Applicando la disuguaglianza triangolare

$$\leq d_X(T(\varphi(p_n), p_n), T(\varphi(p_0), p_n)) + d_X(T(\varphi(p_0), p_n), T(\varphi(p_0), p_0))$$

Con la definizione di contrazioni

$$\leq K \cdot d_X(\varphi(p_n), \varphi(p_0)) + d_X(T(\varphi(p_0), p_n), T(\varphi(p_0), p_0))$$

Dunque

$$d_X(\varphi(p_n), \varphi(p_0)) \leq K \cdot d_X(\varphi(p_n), \varphi(p_0)) + d_X(T(\varphi(p_0), p_n), T(\varphi(p_0), p_0))$$

Da cui, infine

$$d_X(\varphi(p_n), \varphi(p_0)) \leq \frac{1}{1-K} \cdot d_X(T(\varphi(p_0), p_n), T(\varphi(p_0), p_0))$$

Ed il secondo membro tende a 0 per  $n \rightarrow +\infty$  grazie alla continuità di  $T$ , quindi da [Proposizione 3.11 \(Continuità e Continuità per Successioni\)](#) la  $\varphi$  è continua.  $\square$

**Definizione 4.16** (Contrazione Lipschitziana in Parametro)

Siano  $(X, d_X)$  e  $(P, d_P)$  spazi metrici

$T$  è una **Contrazione** in  $x \in X$  **Lipschitziana** in  $p \in P$

$\Leftrightarrow$

$$\exists K \in [0, 1[, \exists L > 0 : \forall p', p'' \in P, \forall x', x'' \in X \quad \text{vale} \\ d_X(T(x', p'), T(x'', p'')) \leq K \cdot d_X(x', x'') + L \cdot d_P(p', p'')$$

Cioè, si aggiunge la Lipschitzianità rispetto al parametro

**Teorema 4.17**

Siano:

- $(X, d_X)$  uno spazio metrico completo

- $(P, d_P)$  uno spazio metrico
- $T : X \times P \rightarrow X$  una contrazione in  $x \in X$  Lipschitziana in  $p \in P$

Allora esiste un'unica funzione Lipschitziana  $\varphi : P \rightarrow X$  tale che  $\varphi(p)$  è l'unico punto fisso della funzione  $x \mapsto T(x, p)$

**Nota.** L'unicità del punto fisso implica automaticamente l'unicità della funzione  $\varphi$

*Dimostrazione.* Come già detto in [Osservazione 4.13](#), il [Teorema 4.6 \(delle Contrazioni\)](#) assicura l'esistenza di una funzione  $\varphi : P \rightarrow X$  che ad ogni  $p \in P$  associa un unico punto fisso di  $x \mapsto T(x, p)$ .  $\varphi$  è Lipschitziana. Infatti

$$d_X(\varphi(p'), \varphi(p'')) =$$

Essendo  $\varphi(p)$  per definizione punto fisso di  $T$  con parametro  $p$

$$= d_X(T(\varphi(p'), p'), T(\varphi(p''), p''))$$

Applicando la [Definizione 4.16 \(Contrazione Lipschitziana in Parametro\)](#)

$$\leq K \cdot d_X(\varphi(p'), \varphi(p'')) + L \cdot d_P(p', p'')$$

Dunque

$$d_X(\varphi(p'), \varphi(p'')) \leq K \cdot d_X(\varphi(p'), \varphi(p'')) + L \cdot d_P(p', p'')$$

Da cui, infine

$$d_X(\varphi(p'), \varphi(p'')) \leq \frac{L}{1-K} \cdot d_P(p', p'')$$

Che dimostra la Lipschitzianità di  $\varphi$  □

#### Esercizio 4.18

Nel presente capitolo, ambientato in spazi metrici, non viene trattata la derivabilità del punto fisso rispetto al parametro. Perché?

#### Definizione 4.19 (Funzione Iterata)

Data  $F : X \rightarrow X$ , si dice **Funzione Iterata**  $n$  volte di  $F$  la  $F^n$  che corrisponde all'**applicazione**  $n$  volte di  $F$  su sè stessa. Formalmente:

$$f^{n+1} = f \circ f^n \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

Se  $n = 0$ , per definizione,  $f^0 = \text{Id}_X$  con  $\text{Id}_X$  funzione identità su  $X$

#### Teorema 4.20 (dell'Iterata Contrazione)

Sia  $(X, d_X)$  uno spazio metrico completo e sia  $T : X \rightarrow X : \exists n \in \mathbb{N}, T^n$  **Iterata** è contrazione.

Allora  $T$  ammette un unico punto fisso in  $X$

**Nota.** La  $n$  non è univocamente definita e non potrebbe esserlo.

Se infatti  $T^n$  è contrazione, allora anche  $T^{2n}, T^{3n}, \dots, T^{\alpha n}$  lo sono.

*Dimostrazione.* Per il [Teorema 4.6 \(delle Contrazioni\)](#) esiste un unico punto fisso  $x_* \in X$  per  $T^n$ , quindi

$$T^n x_* = x_*$$

applicando  $T$  ad entrambi i membri

$$T(T^n x_*) = T x_*$$

e per la [Definizione 4.19 \(Funzione Iterata\)](#)

$$T(T^n x_*) = T^n(T x_*) = T x_*$$

Dunque  $T x_*$  è punto fisso della  $T^n$ . Avevamo però già trovato che  $x_*$  era punto fisso della  $T^n$  e, per il [Teorema 4.6 \(delle Contrazioni\)](#), può esistere un unico punto fisso. Ciò permette di concludere che  $T x_* = x_*$  □

#### Esercizio 4.21

Enunciare e dimostrare formalmente il *Teorema dell'Iterata Contrazione con Parametro*



## 5 Funzioni a Valori in $\mathbb{R}^n$

In tutto questo paragrafo  $n \in \mathbb{N}$  e  $n \geq 1$ . Con  $\mathbb{R}^n$  viene indicato lo spazio metrico  $\mathbb{R}$  dotato dell'usuale metrica Euclidea:  $d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2}$  da [Esempio 1.7 \(Esempi di Metriche\)](#). Questo spazio si dice anche [Definizione 1.3 \(Spazio Vettoriale Metrico\)](#)

**Nota.** Diverse dimostrazioni di questo capitolo sono omesse in quanto estremamente simili a quelle di Analisi 1.

### 5.1 Il Caso Generale

#### Proposizione 5.1

Siano  $(X, d)$  uno spazio metrico,  $A \subseteq X$ ,  $f : A \mapsto \mathbb{R}^n$  e  $g : A \mapsto \mathbb{R}^n$ . Sia  $x_0$  di accumulazione per  $A$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ esiste finito} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \text{ esiste finito} \end{array} \right\} \implies \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) \text{ } \exists \text{ finito e } \lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x) \text{ } \exists \text{ finito e } \lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \end{array} \right.$$

**Nota.**  $f \cdot g$  indica il prodotto scalare  $f \cdot g = \sum_{i=1}^n f_i \cdot g_i$

*Dimostrazione.* Omissa. □

#### Esercizio 5.2

Dimostrare la [Proposizione 5.1](#)

*Soluzione.* Dalla [Definizione 3.1 \(Limite per Funzione\)](#)

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_f > 0 : \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta_f \text{ e } x \neq x_0 \text{ vale } \|f(x) - l_f\| < \varepsilon \\ \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_g > 0 : \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta_g \text{ e } x \neq x_0 \text{ vale } \|g(x) - l_g\| < \varepsilon \end{aligned}$$

Fissato  $\varepsilon$ , si può scegliere  $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$  e quindi è possibile dire che

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta : \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \text{ e } x \neq x_0 \text{ vale } \|(f + g)(x) - (l_f + l_g)\| < \varepsilon \quad (5.2.1)$$

Essendo

$$\begin{aligned} & \|(f + g)(x) - (l_f + l_g)\| \\ &= \|(f(x) - l_f) + (g(x) - l_g)\| \end{aligned}$$

Per proprietà 3 da [Definizione 1.8 \(Norma\)](#)

$$\leq \|f(x) - l_f\| + \|g(x) - l_g\|$$

Quest'ultima forma è sicuramente  $< \varepsilon$  per Eq. (5.2.1), quindi la somma dei limiti corrisponde al limite della somma.

Analogamente si svolge per il prodotto. ■

#### Esercizio 5.3

Enunciare e dimostrare un analogo della [Proposizione 5.1](#) per il prodotto vettoriale

#### Proposizione 5.4

Siano:

- $(X, d)$  spazio metrico
- $A \subseteq X$
- $x_0$  di accumulazione per  $A$
- $f : A \mapsto \mathbb{R}^n$  e  $g : A \mapsto \mathbb{R}^m$  funzioni
- $F : A \mapsto \mathbb{R}^{n+m}$  definita da  $F(x) = (f(x), g(x))$

Allora

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ esiste finito} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \text{ esiste finito} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0} F(x) \text{ esiste finito} \\ e \\ \lim_{x \rightarrow x_0} F(x) = \left( \lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \right) \end{array} \right.$$

*Dimostrazione.* Omessa

□

### **Esercizio 5.5**

Dimostrare la [Proposizione 5.4](#)

## Capitolo 2

# Calcolo Differenziale

In questo capitolo sono trattate funzioni  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$  con  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ , dove  $n, m \in \mathbb{N}$  e  $n, m \geq 1$ .

Generalmente, effettuata una dimostrazione per  $m = 1$  è abbastanza semplice passare ad un  $m > 1$  affiancando le componenti, mentre non è altrettanto triviale il passaggio a  $n > 1$ .

### 6 Preliminari

In  $\mathbb{R}^n$  verranno usate le (note) strutture vettoriali con la metrica Euclidea di [Esempio 1.7 \(Esempi di Metriche\)](#)

La base canonica di  $\mathbb{R}^n$  è indicata con  $(e_1, \dots, e_n)$ ,  $e_i$  è il vettore di  $\mathbb{R}^n$  con tutte le componenti nulle tranne la  $i$ -esima che vale 1. È dunque possibile scrivere un generico vettore  $x$  si può quindi scrivere come combinazione

lineare dei vettori della base canonica  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ .

Nel caso  $n = 2$  è usata la notazione  $(x, y) = xi + yj$ . Nel caso  $n = 3$  è usata la notazione  $(x, y, z) = xi + yj + zk$

Alcune classi di funzioni  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  hanno nomi particolari:

- $n = 1, m = 1$ :  $f$  è una *funzione reale di una variabile reale*;
- $n = 1, m > 1$ :  $f$  è una *curva* in  $\mathbb{R}^m$  (purché  $f$  sia almeno continua e  $A$  su un intervallo)
- $n > 1, m = 1$ :  $f$  è un *campo scalare*
- $n > 1, m > 1$ :  $f$  è un *campo vettoriale* (soprattutto nei casi  $n = m = 2$  e  $n = m = 3$ )

## 7 Derivate Parziali e Direzionali

Direttamente dalla nozione di Analisi 1 di derivata, cioè

$$f'(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0)}{t} \quad (\text{NB. Analisi 1!})$$

si estende il concetto di derivata alle funzioni in spazi  $n$ -dimensionali mediante la seguente

**Definizione 7.1** (Derivata Direzionale e Parziale)

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$ ,  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$  e  $v \in \mathbb{R}^n$  un vettore non nullo. Quando il limite

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t}$$

esiste finito, il suo valore è la **Derivata Direzionale** di  $f$  in  $x_0$  nella direzione  $v$  e si indica con  $D_v f(x_0)$

**Nota.** Non è richiesto che la funzione sia **continua nello spazio** per calcolarne la derivata direzionale, è sufficiente sia continua nella direzione considerata. Vedasi [Esempio 7.2](#)

**Nota.** L'introduzione del vettore  $v$  permette di eseguire un'operazione "sensata" in quanto sottrarre uno scalare, come in Analisi 1, non avrebbe avuto significato per una funzione  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$ .

Nel caso in cui  $v = e_i$ , allora  $D_{e_i} f(x_0)$  è la **Derivata Parziale  $i$ -esima**, che può anche essere indicata con  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)$ . Quindi le derivate parziali sono *un caso particolare* delle derivate direzionali.

Una funzione derivabile parzialmente in ogni direzione è detta **Derivabile**.

**Nota.** Altre notazioni comunemente utilizzate per le derivate direzionali sono:  $D_i f$ ,  $D_{x_i} f$ ,  $\partial_i f$ ,  $\partial_{x_i} f$ ,  $f_{x_i}$

**Nota.** Nel calcolo delle derivate parziali è bene distinguere tra la variabile rispetto a cui si deriva ed il valore in cui la derivata viene calcolata.

**Nota.** Per una funzione  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$  con  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ , la derivata direzionale di  $f$  in  $x_0$  lungo una qualunque direzione, se esiste, è un vettore con  $m$  componenti.

**Nota.**


Nel caso  $n = 2$  le derivate parziali di  $f$  si indicano  $\frac{\partial f}{\partial x}$  e  $\frac{\partial f}{\partial y}$  o, equivalentemente,  $\partial_x f$  e  $\partial_y f$ .

Nel caso  $n = 3$  le derivate parziali di  $f$  si indicano  $\frac{\partial f}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y}$  e  $\frac{\partial f}{\partial z}$  o, equivalentemente,  $\partial_x f$ ,  $\partial_y f$  e  $\partial_z f$ .

Nel caso  $n > 3$ , notazioni usate sono  $\frac{\partial f}{\partial x_i}$  o  $\partial_{x_i} f$  per  $i = 1, \dots, n$ .

### Esempio 7.2

La funzione del seguente grafico è derivabile in  $(0,0)$  solo lungo  $y$  perché non presenta discontinuità. Scegliendo una qualsiasi altra direzione non risulta continua e, dunque, nemmeno derivabile.



**Esercizio 7.3**

Sia  $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^m$  derivabile in  $x_0 \in \mathbb{R}^2$ . Sia  $g : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^m$  definita da  $g(x, y) = f(y, x)$ . Come sono legate le derivate parziali di  $f$  e  $g$  in  $x_0$ ?

**Esercizio 7.4**

Sia  $f : A \mapsto \mathbb{R}$  con  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ , derivabile in  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ . Determinare le derivate parziali in  $x_0$  delle funzioni

- $F : A \mapsto \mathbb{R}^2$  definita da  $(f(x), f(x))$
- $G : A \times A \mapsto \mathbb{R}$  definita da  $G(x, y) = f(x) + f(y)$

**Proposizione 7.5**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ .  $f$  è **derivabile parzialmente** rispetto alla  $i$ -esima coordinata se e solo se **esiste** finito il limite

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + t, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{t} \quad (7.5.1)$$

*Dimostrazione.* Da [Definizione 7.1 \(Derivata Direzionale e Parziale\)](#), scegliendo  $v = e_i$  della base canonica si ottiene la Eq. (7.5.1)  $\square$

**Esercizio 7.6**

Formulare in modo rigoroso e dimostrare:

1. La somma di funzioni parzialmente derivabili è parzialmente derivabile.
2. La composizione di funzioni parzialmente derivabili è parzialmente derivabile.
3. Prodotto e rapporto, quando definiti, di funzioni parzialmente derivabili sono funzioni parzialmente derivabili.

**Esempio 7.7**

Sia  $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^3$  data da

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} 2x + 3y \\ \sin(xy^2) \\ e^{xy} \end{bmatrix}$$

La funzione  $f$  è derivabile parzialmente su tutto  $\mathbb{R}^2$ . Inoltre

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{bmatrix} 2 \\ y^2 \cos(xy^2) \\ ye^{xy} \end{bmatrix} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{bmatrix} 3 \\ 2xy \cos(xy^2) \\ xe^{xy} \end{bmatrix}$$

**Proposizione 7.8**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$  e  $v \in \mathbb{R}^n$  con  $v \neq 0$ . Sia  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$ , allora

$f$  è **Derivabile** in  $x_0$  nella direzione  $v$

$\iff$

$\forall i = 1, \dots, m$  la **componente**  $f_i$  è **derivabile** in  $x_0$  nella direzione  $v$


*Dimostrazione.* Applicando [Proposizione 2.6](#) e [Proposizione 3.11 \(Continuità e Continuità per Successioni\)](#)  $\square$

**Esercizio 7.9**

La derivabilità in ogni direzione non implica la continuità. Verificare che la funzione

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \begin{cases} 1 & \text{se } y = x^2 \text{ e } x \neq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

ammette nell'origine derivate direzionali in ogni direzione ma che *non* è continua nell'origine.



*Soluzione.* Le derivate direzionali sono

$$\begin{aligned}\partial_x f(0,0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0+t,0) - f(0,0)}{t} = 0 \\ \partial_y f(0,0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,0+t) - f(0,0)}{t} = 0 \\ D_v f(0,0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0+t_1,0+t_2) - f(0,0)}{t} = 0\end{aligned}$$

Dunque, per ogni derivata parziale o direzionale in  $(0,0)$  il valore della derivata sarà 0.

D'altro canto  $f$  in 0 *non* è continua in  $(0,0)$ , quindi si è verificato che la derivabilità non implichi la continuità con  $\dim A > 1$  ■

### Esercizio 7.10

Esibire una funzione  $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$  che ammetta in (almeno) un punto una derivata parziale rispetto ad  $x$  ma non rispetto a  $y$

*Soluzione.* La

$$\begin{aligned}f &: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x,y) &\mapsto x + \sqrt{y}\end{aligned}$$

È derivabile parzialmente rispetto a  $x$  ma non rispetto a  $y$  in  $(0,0)$ , infatti

$$\begin{aligned}\partial_x f(0,0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0+t,0) - f(0,0)}{t} = \frac{t-0}{t} = 1 \\ \partial_y f(0,0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,0+t) - f(0,0)}{t} = \frac{\sqrt{t}-0}{t} = +\infty \implies \nexists \text{ limite finito}\end{aligned}$$

■

## 8 Derivata Totale

**Teorema 8.1** (di Lagrange)

**Nota.** Questo teorema viene trattato approfonditamente nel corso di Analisi 1 e si applica solo a funzioni  $\mathbb{R}^1 \mapsto \mathbb{R}^1$ , qui verrà solo riportato rapidamente l'enunciato

**Nota.** Questo teorema è anche noto come *Teorema del Valor Medio Differenziale*

Sia  $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$  una funzione **Continua** nell'intervallo chiuso  $[a, b]$  e **Derivabile** nell'intervallo aperto  $]a, b[$ . Allora esiste almeno un punto

$$c \in ]a, b[ : f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

O, alternativamente, nella forma

$$\xi \in ]0, 1[ : f'(x_0 + \xi h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

**Definizione 8.2** (o piccolo)

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ . Siano  $f, g : A \mapsto \mathbb{R}^m$  due funzioni.

$$f = o(g) \text{ per } x \rightarrow x_0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\|f(x)\|}{\|g(x)\|} = 0$$

che si legge  $f$  è **o piccolo** di  $g$ .

**Nota.** Scrivere  $f(x) = o(x^k)$  per  $x \rightarrow 0$  significa che  $f = o(g)$  con  $g = x^k$

**Nota.** Con  $o(1)$  per  $x \rightarrow x_0$  si intende una qualunque funzione tendente a 0 per  $x \rightarrow x_0$ .

**Esercizio 8.3**

Perché son state utilizzate le norme nella [Definizione 8.2 \(o piccolo\)](#)?

*Soluzione.* Perché l'operazione di divisione è sensata solo tra due scalari, non tra vettori. ■

**Esercizio 8.4**

Quali tra le seguenti uguaglianze sono vere? (In tutte,  $x \rightarrow 0$ )

- |                              |                     |                      |
|------------------------------|---------------------|----------------------|
| • $o(x) = o(x) + o(x)$       | • $\sqrt{x} = o(x)$ | • $o(x) = 10^6 o(x)$ |
| • $o(x^2) = o(x) \cdot o(x)$ | • $o(x) =  o(x) $   | • $x + x^2 = o(x)$   |
| • $o(x^2) = o(x) - o(x)$     | • $x = o(\sqrt{x})$ | • $x = o(x + x^2)$   |

La seguente definizione è da ritenersi già nota da Analisi 1

**Definizione 8.5** (Derivata in  $\mathbb{R}$ )

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}$  e  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ . Sia  $f : A \mapsto \mathbb{R}$

$$f \text{ Derivabile in } x_0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \text{ esiste finito}$$

Direttamente dalla nozione di Analisi 1 di derivata, si ottiene la seguente relazione tra derivata e coefficiente angolare della retta tangente in un punto

**Proposizione 8.6** (Derivata Analisi 1)

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}$  e  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ . Sia  $f : A \mapsto \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f \text{ è derivabile in } x_0 \\ \Longleftrightarrow \\ \exists m \in \mathbb{R} : f(x_0 + h) = f(x_0) + mh + o(h) \text{ per } h \rightarrow 0 \end{aligned}$$

*Dimostrazione.*

$$\begin{aligned}
 & f \text{ è derivabile in } x_0 \\
 \iff & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \text{ esiste finito} \\
 \iff & \exists m \in \mathbb{R} : \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = m \\
 \iff & \exists m \in \mathbb{R} : \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - m = 0 \\
 \iff & \exists m \in \mathbb{R} : \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - mh}{h} = 0
 \end{aligned}$$

Per la nota alla [Definizione 8.2](#) (o piccolo)

$$\begin{aligned}
 \iff & \exists m \in \mathbb{R} : f(x_0 + h) - f(x_0) - mh = o(h) \text{ per } h \rightarrow 0 \\
 \iff & \exists m \in \mathbb{R} : f(x_0 + h) = f(x_0) - mh + o(h) \text{ per } h \rightarrow 0
 \end{aligned}$$

□

Analogamente a quanto fatto nella [Proposizione 8.6](#) ([Derivata Analisi 1](#)), si definisce

**Definizione 8.7** (Differenziale)

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ . Sia  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$

$$\begin{aligned}
 & f \text{ è Differenziabile in } x_0 \\
 \iff & \\
 & \exists M \in \text{Mat}(m \times n) : f(x_0 + h) = f(x_0) + Mh + o(h) \text{ per } h \rightarrow 0
 \end{aligned}$$

La matrice  $M$  è la **Derivata Totale** di  $f$  calcolata in  $x_0$  e si indica con  $Df(x_0)$ .  $Df(x_0)$  è l'applicazione *lineare* che meglio approssima la variazione di  $f$  nelle vicinanze di  $x_0$ .

**Nota.** Verrà spiegato più avanti in [Corollario 8.15](#) un metodo pratico di calcolo della Derivata Totale.

**Osservazione 8.8** (Matrici Derivata Totale Particolari)

Data la matrice  $Df(x_0)$  con  $m$  righe e  $n$  colonne:

- Se  $n = 1$  e  $m = 1$   $Df(x_0)$  è **Derivata** di [Analisi 1](#), uno scalare
- Se  $n > 1$  e  $m = 1$   $Df(x_0)$  è **Gradiente** di  $f$  e si indica con  $\nabla f(x_0)$  (*nabla f*) o  $\text{grad } f(x_0)$
- Se  $n = 1$  e  $m > 1$   $Df(x_0)$  è **Vettore Tangente** alla  $f$
- Se  $n > 1$  e  $m > 1$   $Df(x_0)$  è **Matrice Jacobiana** di  $f$  e si può anche indicare con  $J_f(x_0)$

Come si vedrà in [Corollario 8.15](#), il Gradiente della  $i$ -esima variabile è la  $i$ -esima colonna di  $Df(x_0)$ . Il Vettore Tangente della  $j$ -esima variabile è invece la  $j$ -esima riga di  $Df(x_0)$ .



**Esempio 8.9**

Esempi relazioni tra Derivata Totale e derivate parziali

$$\begin{aligned}
n = 2 \quad m = 1 \quad Df &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} \\
n = 3 \quad m = 1 \quad Df &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{bmatrix} \\
n = 1 \quad m = 2 \quad Df &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} \end{bmatrix} \\
n = 2 \quad m = 2 \quad Df &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} \\
n > 2 \quad m > 2 \quad Df &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

**Esercizio 8.10**

Perché non è stata data una definizione di derivata attraverso il limite del rapporto incrementale?

**Esempio 8.11**Siano  $M \in \text{Mat}(m \times n)$  una matrice fissata,  $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$  data da  $f(x) = Mx$ .Allora  $f$  è differenziabile ovunque e per ogni  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  si ha  $Df(x_0) = M$ **Proposizione 8.12** (Unicità della Derivata Totale)Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ ,  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$  e  $M_1, M_2 \in \text{Mat}(m \times n)$ 

$$\left. \begin{array}{l} M_1 \text{ derivata totale di } f \text{ in } x_0 \\ M_2 \text{ derivata totale di } f \text{ in } x_0 \end{array} \right\} \implies M_1 = M_2$$

*Dimostrazione.* Sia  $h \in \mathbb{R}$ . Fissato un vettore  $e_i$  della base canonica di  $\mathbb{R}^n$ 

$$M_2 e_i - M_1 e_i =$$

Moltiplicando e dividendo per  $h$ 

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{h} M_2 e_i h - \frac{1}{h} M_1 e_i h \\
&= \frac{1}{h} [M_2 e_i h - M_1 e_i h]
\end{aligned}$$

Grazie alla [Definizione 8.7 \(Differenziale\)](#)

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{h} [f(x_0 + h e_i) - f(x_0) + o(h)] - \frac{1}{h} [f(x_0 + h e_i) - f(x_0) + o(h)] \\
&= o(h) \text{ per } h \rightarrow 0
\end{aligned}$$

Passando al limite per  $h \rightarrow 0$ , si deduce che le applicazioni lineari  $M_1$  e  $M_2$  hanno le stesse immagini sui vettori della base canonica, quindi coincidono.  $\square$ **Proposizione 8.13**Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$  e  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$ 

$$f \text{ Differenziabile in } x_0 \implies f \text{ Continua in } x_0$$

*Dimostrazione.* Per ipotesi  $x_0 \in \mathring{A}$ , dunque  $x_0$  è di accumulazione. A questo punto, grazie alla [Proposizione 3.9](#) basta verificare che  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ . Dalla [Definizione 8.7 \(Differenziale\)](#)

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + Mh + o(h) \text{ per } h \rightarrow 0$$

Quindi, posto  $h = x - x_0$  ed essendo  $M = Df(x_0)$  per [Definizione 8.7 \(Differenziale\)](#)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x_0) + Df(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)] = f(x_0)$$

□

### Proposizione 8.14

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in \mathring{A}$  e  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$

$$f \text{ Differenziabile in } x_0 \implies \begin{cases} f \text{ ammette ogni } \mathbf{Derivata Direzionale} \text{ in } x_0 \\ \forall v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} D_v^e f(x_0) = Df(x_0)v \end{cases}$$

*Dimostrazione.* Sia  $v \in \mathbb{R}^n$  non nullo. Partendo dalla [Definizione 7.1 \(Derivata Direzionale e Parziale\)](#)

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t}$$

Sostituendo ora  $f(x_0 + tv)$  con il secondo membro della [Definizione 8.7 \(Differenziale\)](#), dopo aver posto  $h = tv$

$$\begin{aligned} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cancel{f(x_0)} + Df(x_0)(tv) + o(tv) - \cancel{f(x_0)}}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{Df(x_0)(tv)}{t} + \lim_{t \rightarrow 0} \frac{o(tv)}{t} \\ &= Df(x_0)v \end{aligned}$$

□

### Corollario 8.15

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in \mathring{A}$  e  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$

$$f \text{ Differenziabile in } x_0 \implies \begin{cases} f \text{ ammette ogni } \mathbf{Derivata Parziale} \text{ in } x_0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = Df(x_0) \cdot e_i \end{cases}$$

Dove  $Df(x_0) \cdot e_i$  non è altro che

$$Df(x_0) \cdot e_i = \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1i} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & \cdots & x_{2i} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{ni} & \cdots & x_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & x_{1i} & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & x_{2i} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & x_{ni} & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Cioè l' $i$ -esima colonna della  $Df(x_0)$ , come da [Osservazione 8.8 \(Matrici Derivata Totale Particolari\)](#)

**Nota.** Per quanto detto, il presente corollario offre il principale metodo di calcolo della **Derivata Totale** Inoltre è anche una dimostrazione alternativa della [Proposizione 8.12 \(Unicità della Derivata Totale\)](#)

*Dimostrazione.* Direttamente dalla [Proposizione 8.14](#) e dalla [Definizione 7.1 \(Derivata Direzionale e Parziale\)](#) (sezione sulle derivate parziali) □

### Osservazione 8.16

Sia [Proposizione 8.14](#) che [Corollario 8.15](#) non possono essere invertiti, come verificato in [Esercizio 7.9](#).

**Corollario 8.17**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$  e  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$

$$f \text{ Differenziabile in } x_0 \implies f \text{ Derivabile in } x_0$$

*Dimostrazione.* Mediante il [Corollario 8.15](#) si vede immediatamente che rispetta la [Definizione 7.1 \(Derivata Direzionale e Parziale\)](#)  $\square$

**Corollario 8.18**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$  e  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$ . Sia  $f$  derivabile parzialmente in  $x_0$  e sia  $M$  la  $Df(x_0)$ , matrice dei coefficienti  $M_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$

$$f \text{ Differenziabile in } x_0$$

$$\iff$$

$$f(x_0 + h) - f(x_0) - Mh = o(h) \text{ per } h \rightarrow 0$$

*Dimostrazione.* Direttamente dalla [Definizione 8.7 \(Differenziale\)](#), per mezzo del [Corollario 8.15](#).  $\square$

**Esercizio 8.19**

Verificare che, nel caso  $n = 2$  ed  $m = 1$  il [Corollario 8.18](#) si scrive

$$f \text{ Differenziabile in } x_0$$

$$\iff$$

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} = o(\sqrt{h^2 + k^2}) \text{ per } h, k \rightarrow 0$$

**Esercizio 8.20**

Scrivere il [Corollario 8.18](#) nel caso  $n = 3$  ed  $m = 1$

**Teorema 8.21** (del Differenziale Totale)

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$  e  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$ .

$$\left. \begin{array}{l} \text{Per } i = 1, \dots, m \text{ e } j = 1, \dots, n \\ \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \text{ è definita in un intorno di } x_0 \text{ e Continua in } x_0 \end{array} \right\} \implies f \text{ è Differenziabile in } x_0$$

**Nota.** È specificata la necessità di continuità in un intorno di  $x_0$  in quanto, come detto in [Definizione 7.1 \(Derivata Direzionale e Parziale\)](#), l'esistenza di derivate parziali non garantisce la continuità.

*Dimostrazione.* Si può supporre  $n = 2$  e  $m = 1$  in quanto il caso più generale è del tutto analogo. È necessario verificare la [Definizione 8.7 \(Differenziale\)](#), dunque in  $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^2$  si ha

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + Df(x_0, y_0) \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} + o(h, k) \text{ per } h, k \rightarrow 0 \quad (8.21.1)$$


Considerando solo i primi due addendi, aggiungendo e sottraendo la stessa quantità, si ottiene

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = \underbrace{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0)}_{(1)} + \underbrace{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}_{(2)} \quad (8.21.2)$$

Considerando la (1) e la (2) di Eq. (8.21.2) come funzioni in una sola variabile, si può applicare il [Teorema 8.1 \(di Lagrange\)](#)

- La (1) rispetto a  $y$ , con  $x_0 + h$  fissato
- La (2) rispetto a  $x$ , con  $y_0$  fissato

Spostandosi lungo le direzioni parallele agli assi è possibile andare da  $(x_0 + h, y_0 + k)$  a  $(x_0, y_0)$



Quindi, applicando il [Teorema 8.1 \(di Lagrange\)](#):

$$\begin{aligned} \exists \alpha, \beta \in ]0, 1[ \quad \text{per cui} \quad & (1) \quad f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, y_0 + \beta k)k \\ & (2) \quad f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \alpha h, y_0)h \end{aligned}$$

Tornando alla Eq. (8.21.1), si ottiene

$$\begin{aligned} & f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - Df(x_0, y_0) \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} \\ &= \underbrace{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0)}_{(1)} + \underbrace{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}_{(2)} - Df(x_0, y_0) \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} \\ &= \underbrace{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, y_0 + \beta k)k}_{(1)} + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \alpha h, y_0)h}_{(2)} - Df(x_0, y_0) \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Si esegue il prodotto tra matrice Derivata Totale e vettore, infine si separano i termini

$$= \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, y_0 + \beta k) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, y_0) \right) k + \left( \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \alpha h, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right) h$$

Si passa dunque alla norma

$$\left\| f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - Df(x_0, y_0) \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} \right\|$$

Separando come fatto prima ed applicando la disuguaglianza triangolare

$$\leq \left\| \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, y_0 + \beta k) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, y_0) \right) k \right\| + \left\| \left( \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \alpha h, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right) h \right\|$$

Per proprietà 4 da [Definizione 1.8 \(Norma\)](#)

$$= \left\| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, y_0 + \beta k) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, y_0) \right\| |k| + \left\| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \alpha h, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right\| |h|$$

Presa ora la norma del vettore  $(h, k)$ , cioè  $\|(h, k)\| = \sqrt{h^2 + k^2}$ , sicuramente  $|h| \leq \|(h, k)\|$  e  $|k| \leq \|(h, k)\|$ , dunque

$$\leq \left\| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, y_0 + \beta k) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, y_0) \right\| \sqrt{h^2 + k^2} + \left\| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \alpha h, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right\| \sqrt{h^2 + k^2}$$

Essendo  $h, k \rightarrow 0$  da Eq. (8.21.1) e grazie alla continuità delle derivate, le due norme tendono a 0. Inoltre, per [Definizione 8.2](#) (o piccolo)

$$\begin{aligned} &= o(1)\sqrt{h^2 + k^2} \text{ per } \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} \rightarrow 0 \\ &= o(\sqrt{h^2 + k^2}) \text{ per } \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Da cui la tesi, avendo verificato la [Definizione 8.7 \(Differenziale\)](#). □

### Esercizio 8.22

Data la funzione

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Verificare che  $f$  è differenziabile su  $\mathbb{R}$  ma non ha derivata continua su  $\mathbb{R}$ .

### Definizione 8.23 (Funzioni di Classe $\mathbf{C}^1$ )

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  un **Aperto**.

$\mathbf{C}^1(A; \mathbb{R}^m)$  è l'insieme delle funzioni  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$  con **tutte le Derivate Parziali prime continue** in ogni punto di  $A$

Si può anche leggere  $f$  è di classe  $\mathbf{C}^1$  su  $A$  con valori in  $\mathbb{R}^m$ .

### Corollario 8.24

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  un **Aperto**. Se  $f \in \mathbf{C}^1(A; \mathbb{R}^m)$  allora  $f$  è **Differenziabile** su  $A$ .

*Dimostrazione.* Applicare la [Teorema 8.21 \(del Differenziale Totale\)](#) □

### Proposizione 8.25

Siano  $m \in \mathbb{N}, m \geq 1$  e  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  un **Aperto**

$$f \in \mathbf{C}^1(A; \mathbb{R}^m) \iff \forall i = 1, \dots, m \quad f_i \in \mathbf{C}^1(A; \mathbb{R})$$

*Dimostrazione.* Immediata. □

### Esercizio 8.26

Dimostrare la [Proposizione 8.25](#).

### Esercizio 8.27

Dimostrare che  $\mathbf{C}^1(A; \mathbb{R})$  non coincide con l'insieme delle funzioni differenziabili su  $A$  con valori in  $\mathbb{R}$ .

### Proposizione 8.28

Siano  $I \in \mathbb{R}$  un intervallo reale e  $f(x)$  una funzione **Derivabile** in  $I$ . Se la  $f'(x)$  è una **Funzione Limitata** in  $I$ , allora  $f$  è **Uniformemente Continua** in  $I$

*Dimostrazione.* Omessa. □

## 8.1 Regole di Derivazione

### Proposizione 8.29

Siano  $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  e  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$

$f$  differenziabile in  $x_0$ ,  $g$  differenziabile in  $x_0$  allora  $f + g$  differenziabile in  $x_0$  e  $D(f + g)(x_0) = Df(x_0) + Dg(x_0)$

*Dimostrazione.*  $f$  è differenziabile, allora  $f(x_0 + h) = f(x_0) + Df(x_0)h + o(h)$  per  $h \rightarrow 0$

anche  $g$  lo è, quindi  $g(x_0 + h) = g(x_0) + Dg(x_0)h + o(h)$  per  $h \rightarrow 0$

sommando membro a membro si ottiene  $(f + g)(x_0 + h) = (f + g)(x_0) + [Df(x_0) + Dg(x_0)]h + o(h)$  per  $h \rightarrow 0$

Questa è la definizione di differenziabilità, allora  $f + g$  è differenziabile e  $D(f + g)(x_0) = Df(x_0) + Dg(x_0)$   $\square$

### Proposizione 8.30

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  e  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$  e  $\lambda \in \mathbb{R}$

$f$  differenziabile in  $x_0$  allora  $\lambda f$  differenziabile in  $x_0$  e  $D(\lambda f)(x_0) = \lambda Df(x_0)$

*Dimostrazione.*  $f$  è differenziabile, allora  $f(x_0 + h) = f(x_0) + Df(x_0)h + o(h)$  per  $h \rightarrow 0$

valuto ora  $(\lambda f)(x_0 + h) = (\lambda f)(x_0) + \lambda Df(x_0)h + o(h)$  per  $h \rightarrow 0$

Questa è la definizione di differenziabilità, allora  $\lambda f$  è differenziabile e  $D(\lambda f)(x_0) = \lambda Df(x_0)$   $\square$

### Proposizione 8.31

Sia  $g : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  e  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$

Sia  $f : B \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$  e  $g(x_0) \in \overset{\circ}{B}$

$f$  differenziabile in  $g(x_0)$ ,  $g$  differenziabile in  $x_0$  allora  $f \circ g$  differenziabile in  $x_0$  e  $D(f \circ g)(x_0) = Df(g(x_0)) * Dg(x_0)$

*Dimostrazione.*  $g$  è differenziabile in  $x_0$ , allora  $g(x_0 + h) = g(x_0) + Dg(x_0)h + o(h)$  per  $h \rightarrow 0$

$f$  è differenziabile in  $g(x_0)$  allora  $g(g(x_0) + k) = f(g(x_0)) + Df(g(x_0))k + o(k)$  per  $k \rightarrow 0$

valuto ora

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x_0 + h) &= f(g(x_0 + h) + Dg(x_0)h + o(h)) = \\ &= f(g(x_0)) + Df(g(x_0))(Dg(x_0)h + o(h)) + o(Dg(x_0)h + o(h)) = \\ &= (f \circ g)(x_0) + Df(g(x_0))Dg(x_0)h + Df(g(x_0))o(h) + Dg(x_0)o(h) + o(h) \end{aligned}$$

con  $h$  un vettore  $n \times 1$

con  $Dg$  una matrice  $m \times n$

con  $Df$  una matrice  $p \times m$

da rivedere un pochino ....

Questa è la definizione di differenziabilità, allora  $f \circ g$  è differenziabile e  $D(f \circ g)(x_0) = Df(g(x_0))Dg(x_0)$   $\square$

### Proposizione 8.32

DERIVATA DEL PRODOTTO

### Esercizio 8.33

## 8.2 La Formula degli Accrescimenti Finiti

### Definizione 8.34 (Segmento)

Siano  $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^n$ , si dice **Segmento** di estremi  $x_0$  e  $x_1$  l'insieme che li unisce, cioè

$$S = \{tx_1 + (1 - t)x_0 \in \mathbb{R}^n : t \in [0, 1]\}$$

### Osservazione 8.35

La [Definizione 8.34 \(Segmento\)](#) può essere formulata in ogni spazio affine o vettoriale

### Esercizio 8.36

Dimostrare che ogni **Segmento** in  $\mathbb{R}^n$  è **Compatto** e **Connesso**.

*Soluzione.* Posta

$$\begin{aligned} \varphi : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto tx_1 + (1-t)x_0 \end{aligned}$$

- $[0, 1] \subset \mathbb{R}^n$ , essendo sottoinsieme di  $\mathbb{R}^n$  chiuso e limitato, grazie alla [Proposizione 2.35](#), è compatto. Inoltre, grazie al [Teorema 3.15 \(Generale di Weierstrass\)](#),  $\varphi([0, 1])$  è sicuramente compatto a sua volta, dunque il segmento  $S$  è compatto.
- Dalla [Proposizione 3.17](#), essendo  $\varphi$  continua, il segmento  $S$  è sicuramente Connesso.

■

### Esercizio 8.37

Ispirandosi alla [Definizione 8.34 \(Segmento\)](#) è possibile dare una possibile definizione di Semiretta uscente da  $x_0$  e passante per  $x_1$ ?

*Soluzione.*

$$s = \{x_0 + (x_1 - x_0)t \in \mathbb{R}^n : t \in [0, +\infty[ \}$$

■


### Teorema 8.38 (degli Accrescimenti Finiti)

Sia  $f \in \mathbf{C}^1(A; \mathbb{R}^m)$ , con  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ . Siano  $x_0, x_1 \in \overset{\circ}{A}$  tali che il **Segmento**  $S$  di estremi  $x_0$  e  $x_1$  sia **interamente contenuto** in  $\overset{\circ}{A}$ . Allora

$$\|f(x_1) - f(x_0)\| \leq \sup_{\xi \in S} \|Df(\xi)\| \cdot \|x_1 - x_0\| \quad (8.38.1)$$

**Nota.** Con  $\mathbb{R}^m = \mathbb{R}^1$  e  $A \subseteq \mathbb{R}^1$  è come dire

$$|f(x_1) - f(x_0)| \leq M \cdot |x_1 - x_0| \quad \text{con} \quad M = \sup \left\{ \begin{array}{l} \text{coefficiente angolare di tutte le} \\ \text{rette tangenti alla curva} \end{array} \right\}$$



*Dimostrazione.* Si può dare per scontato che  $x_1 \neq x_0$ , in quanto, se  $x_1 = x_0$ , allora  $f(x_1) = f(x_0)$  e la Eq. (8.38.1) diventerebbe  $0 \leq 0$ . La tesi sarebbe quindi verificata direttamente.

Fissato un qualsiasi  $v \in \mathbb{R}^m$ , si definisce così la funzione  $F$  legata ad  $f$  tramite la [Definizione 8.34 \(Segmento\)](#):

$$\begin{aligned} F : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto v \cdot f(tx_1 + (1-t)x_0) \end{aligned} \quad (8.38.2)$$

**Nota.** Nella Eq. (8.38.2),  $\cdot$  è Prodotto Scalare tra due vettori di dimensione  $\mathbb{R}^m$ , dunque il risultato è correttamente uno scalare.

$F$  è continua e derivabile sull'intervallo di definizione  $[0, 1]$ . È dunque possibile utilizzare il [Teorema 8.1 \(di Lagrange\)](#), che garantisce:

$$\exists c \in ]0, 1[ : \quad F(1) - F(0) = F'(c) (1 - 0)$$

Tornando dunque a  $f$  dalla definizione di  $F$

$$v \cdot f(x_1) - v \cdot f(x_0) = v \cdot Df(cx_1 + (1 - c)x_0)(x_1 - x_0)$$

Ricordando che la  $F$  è a valori in  $\mathbb{R}$ , si può calcolare il valore assoluto mantenendo l'uguaglianza

$$|v \cdot f(x_1) - v \cdot f(x_0)| = |v \cdot Df(cx_1 + (1 - c)x_0)(x_1 - x_0)|$$

Essendo il secondo membro il valore assoluto di un prodotto scalare, si può applicare ad esso la **Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz** ed ottenere

$$|v \cdot (f(x_1) - f(x_0))| \leq \|v\| \cdot \|Df(cx_1 + (1 - c)x_0)(x_1 - x_0)\|$$

Dunque, seaparando ulteriormente le norme si arriva alla:

$$|v \cdot (f(x_1) - f(x_0))| \leq \|v\| \cdot \|Df(cx_1 + (1 - c)x_0)\| \cdot \|x_1 - x_0\| \quad (8.38.3)$$

Essendo, come detto all'inizio,  $f(x_1) \neq f(x_0)$  è ora possibile scegliere un  $v$  "comodo", come:

$$v = \frac{1}{\|f(x_1) - f(x_0)\|} \cdot (f(x_1) - f(x_0))$$

**Nota.** La norma di  $v$ , grazie poi alla proprietà 4 da [Definizione 1.8 \(Norma\)](#), è

$$\begin{aligned} \|v\| &= \left\| \underbrace{\frac{1}{\|f(x_1) - f(x_0)\|}}_{\text{Scalare}} \cdot \underbrace{(f(x_1) - f(x_0))}_{\text{Vettore}} \right\| \\ &= \left| \frac{1}{\|f(x_1) - f(x_0)\|} \right| \cdot \|f(x_1) - f(x_0)\| \\ &= \frac{1}{\|f(x_1) - f(x_0)\|} \cdot \|f(x_1) - f(x_0)\| \\ &= 1 \end{aligned}$$

Sostituendo dunque in Eq. (8.38.3) si ottiene

$$\left\| \frac{1}{\|f(x_1) - f(x_0)\|} \cdot (f(x_1) - f(x_0)) \cdot (f(x_1) - f(x_0)) \right\| \leq \|Df(cx_1 + (1 - c)x_0)\| \cdot \|x_1 - x_0\|$$

Dal punto 3 di [Esempio 1.10 \(Esempi di Spazi Normati\)](#), si ottiene

$$\left\| \frac{1}{\|f(x_1) - f(x_0)\|} \cdot \|f(x_1) - f(x_0)\|^2 \right\| \leq \|Df(cx_1 + (1 - c)x_0)\| \cdot \|x_1 - x_0\|$$

Da cui

$$\|f(x_1) - f(x_0)\| \leq \|Df(cx_1 + (1 - c)x_0)\| \cdot \|x_1 - x_0\|$$

e passando al sup su  $t \in ]0, 1[$  si ottiene la tesi. □

Il seguente esercizio mostra come il [Teorema 8.1 \(di Lagrange\)](#) non possa essere esteso al caso di funzioni a valori in  $\mathbb{R}^n$  con  $n > 1$ .



**Esercizio 8.39**

Sia  $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}^2$  data da  $f(t) = (\cos t, \sin t)$ . Mostrare che non esiste nessun numero reale  $c$  tale che

$$f(2\pi) - f(0) = Df(c) \cdot 2\pi$$

**Definizione 8.40** (Insieme Convesso)

Sia  $C \subseteq \mathbb{R}^n$

$C$  è **Convesso**

$\iff$

$$\forall x_0, y_1 \in C \quad \{tx_1 + (1-t)x_0 : t \in [0, 1]\} \subseteq C$$

Cioè un insieme è Convesso se, dati qualsiasi due suoi punti, contiene anche il segmento che li congiunge.

**Esercizio 8.41**

Dimostrare la [Proposizione 3.37](#)

**Esercizio 8.42**

In  $\mathbb{R}^n$  dimostrare che ogni segmento è convesso, così come anche ogni sfera.

Esibire un esempio di insieme non convesso.

**Corollario 8.43**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $f : A \mapsto \mathbb{R}$

$$\left. \begin{array}{l} A \text{ Aperto Convesso} \\ f \text{ Differenziabile in } A \\ \forall x \in A \quad \nabla f(x) = 0 \end{array} \right\} \implies f \text{ è Costante su } A$$

**Nota.** Come da [Osservazione 8.8 \(Matrici Derivata Totale Particolari\)](#),  $\nabla f(x) = Df(x) \in \text{Mat}(1 \times n)$ , cioè un vettore riga.

*Dimostrazione.* Se  $\nabla f(x) = Df(x) = 0$ , la Eq. (8.38.1) da [Teorema 8.38 \(degli Accrescimenti Finiti\)](#) diventa

$$\begin{aligned} \|f(x_1) - f(x_0)\| &\leq \sup_{\xi \in S} 0 \cdot \|x_1 - x_0\| \\ \|f(x_1) - f(x_0)\| &\leq 0 \\ f(x_1) &= f(x_0) \end{aligned}$$

□

**Esercizio 8.44**

Dimostrare che un insieme **Convesso** è anche **Connesso**.

Esibire un controesempio al viceversa.

*Soluzione.* Supponendo, per assurdo,  $C \in \mathbb{R}^n$  sconnesso. In questo caso, per [Definizione 2.25 \(Insiemi Connessi e Sconnessi\)](#), esistono due insiemi separati  $S_1$  e  $S_2$  che costituiscono  $C$ , inoltre  $S_1 \cup S_2 = C$  e  $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ . Questo implica che

$$\exists t \in [0, 1] : \forall x_1 \in S_1 \text{ e } \forall x_2 \in S_2 \quad tx_1 + (1-t)x_2 \notin S_1 \text{ e contemporaneamente } \notin S_2$$

Questo implica la non convessità di  $C$  - *Assurdo*. ■

*Soluzione.* Preso il cerchio di raggio unitario  $S = (x, y) : x^2 + y^2 = 1$ , questo verifica la [Definizione 2.25 \(Insiemi Connessi e Sconnessi\)](#) ma sicuramente non la [Definizione 8.40 \(Insieme Convesso\)](#). ■

**Esercizio 8.45**

Esibire esempi di insiemi convessi/non convessi e aperti/chiusi, limitati/illimitati.

**Definizione 8.46** (Funzione Convessa)

Sia  $I$  un intervallo reale e  $f : I \mapsto \mathbb{R}$ .

$$f \text{ è } \mathbf{Convessa} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \forall x_0, x_1 \in I, \forall t \in [0, 1] \\ f((1-t)x_0 + tx_1) \leq (1-t)f(x_0) + tf(x_1) \end{cases}$$

Cioè se il segmento che congiunge due qualsiasi punti del suo grafico si trova al di sopra del grafico stesso.

**Esercizio 8.47**

Verificare che  $f$  è **Convessa** se e solo se il suo **Epigrafo** (cioè l'insieme di punti che stanno al di sopra o sul grafico della funzione) è un sottoinsieme **Convesso** di  $\mathbb{R}^2$  nel senso della [Definizione 8.40 \(Insieme Convesso\)](#).

**Proposizione 8.48**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $f : A \mapsto \mathbb{R}$

$$\left. \begin{array}{l} A \text{ Aperto Connesso} \\ f \text{ Differenziabile in } A \\ \forall x \in A \quad \nabla f(x) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow f \text{ è Costante su } A$$

**Nota.** Si sta parlando di insiemi Connessi

*Dimostrazione.* Sia  $x_0 \in A$ . Per la [Proposizione 2.31 \(Poligonale Congiungente due Punti\)](#), ogni punto  $x \in A$  può essere unito a  $x_0$  con una poligonale interamente contenuta in  $A$  dai lati paralleli agli assi. A questo punto è possibile applicare il [Teorema 8.38 \(degli Accrescimenti Finiti\)](#) ad ogni segmento della poligonale ed, essendo  $\nabla f(x) = 0$ , come in [Corollario 8.43](#), la  $f$  è costante.  $\square$

## 9 Derivate Seconde

Quanto detto circa le derivate prime può essere ripetuto introducendo derivate di ordine superiore.

**Definizione 9.1** (Derivate Parziali Seconde)

Sia  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$  con  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  derivabile parzialmente in  $x_0$  lungo  $e_i$ .

Se la funzione  $\frac{\partial f}{\partial x_i}$  è a sua volta derivabile parzialmente in  $x_0$ , questa volta lungo  $e_j$ , allora la quantità

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} \text{è la **Derivata Parziale Seconda**} \\ \text{di } f \text{ in } x_0 \text{ rispetto a } x_j, x_i \text{ (in quest'ordine)} \end{array}$$

e si indica con

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0)$$

**Nota.** Altre notazioni comunemente utilizzate per le derivate parziali seconde sono:  $D_{x_j x_i}^2 f$ ,  $\partial_{ji}^2 f$ ,  $\partial_{x_j x_i} f$ ,  $f_{x_j x_i}$ ,  $f_{ji}$

**Nota.** L'ordine qui utilizzato, cioè

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial f}{\partial x_i} \quad i, j = 1, \dots, n$$

non è sempre condiviso da tutti i testi di Analisi Matematica.

**Osservazione 9.2**

Le regole di derivazione fornite in [sottosezione 8.1 \(Regole di Derivazione\)](#) sono adeguate anche per il calcolo delle Derivate Seconde.

**Esercizio 9.3**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$ . Ammesso che esistano tutte, quante sono le derivate parziali seconde di  $f$  in un qualche punto  $x_0$ ?

Confrontare quanto ottenuto con il caso  $n = m = 1$  di Analisi 1.

*Soluzione.* Ognuna delle  $n$  derivate di  $f$  ha, a sua volta,  $n$  derivate, di conseguenza il numero di derivate seconde di  $f$  è  $n^2$ . Nel caso di Analisi 1, le derivate seconde erano  $1^2 = 1$  ■

**Definizione 9.4** (Differenziale Seconda)

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$  e  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$

$$f \text{ è Differenziabile 2 volte in } x_0 \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} f \text{ è Differenziabile in un intorno di } x_0 \\ e \\ f' \text{ è Differenziabile in } x_0 \end{array} \right.$$

Dove  $f'$  è una funzione definita in un intorno di  $x_0$  a valori in  $\text{Mat}(m \times n) \in \mathbb{R}^{mn}$ .

**Nota.** Questa definizione è utilizzata comunemente nel linguaggio parlato, ma viene raramente formalizzata come definizione.

**Nota.** Avendo una funzione *scalare*  $f : A \mapsto \mathbb{R}$  con  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ , la sua derivata prima è un *vettore*. La derivata seconda sarà una *matrice* e così via.

**Definizione 9.5** (Matrice Hessiana)

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$  e  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ , inoltre  $f$  ammette tutte le Derivate Parziali Seconde in  $x_0$ .

La matrice di queste derivate seconde si chiama **Matrice Hessiana** di  $f$  in  $x_0$  e si indica con  $H_f(x_0)$

$$H_f(x_0) = D^2 f(x_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n} \end{bmatrix}$$

**Nota.** La Matrice Hessiana non va confusa con la Matrice Jacobiana da [Osservazione 8.8 \(Matrici Derivata Totale Particolari\)](#), quest'ultima infatti è la matrice delle Derivate Parziali **Prime**, mentre la Hessiana contiene le **Seconde**.

## 9.1 Il Lemma di Schwarz


**Lemma 9.6** (di Schwarz)

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^2$ ,  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$  e  $(x_0, y_0) \in \overset{\circ}{A}$ . Se  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$  e  $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$  **esistono** in un intorno di  $(x_0, y_0)$  e sono **Continue** in  $(x_0, y_0)$ , allora

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

*Dimostrazione.* Scelti  $h, k \in \mathbb{R}$  sufficientemente piccoli, in modo tale che le derivate parziali di  $f$  siano definite in tutto il rettangolo di estremi

$$(x_0, y_0) \quad (x_0 + h, y_0) \quad (x_0, y_0 + k) \quad (x_0 + h, y_0 + k)$$



Per come son state scelte  $h$  e  $k$ , è possibile definire sicuramente la quantità

$$q = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0)$$

Per dimostrare la tesi si può ora verificare che la  $q$ , calcolata lungo percorsi differenti fornisce lo stesso risultato. È possibile fare ciò riconducendo la  $q$  a due diverse funzioni in una sola variabile ed applicando il [Teorema 8.1 \(di Lagrange\)](#) due volte ad ognuna di esse.

1. Posta  $\varphi(\xi) = f(x_0 + \xi, y_0 + k) - f(x_0 + \xi, y_0)$ , si ottiene, riordinando i termini della  $q$

$$\begin{aligned} q &= \left( f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) \right) - \left( f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0) \right) \\ &= \varphi(h) - \varphi(0) \end{aligned}$$

Applicando Lagrange

$$= h \varphi'(\alpha' h)$$

Grazie alla [Proposizione 8.29](#) si passa alle derivate parziali rispetto a  $x$  (la  $y$  è fissa)

$$= h \left( \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \alpha' h, y_0 + k) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \alpha' h, y_0) \right)$$

Si definisce ora  $\Phi(\xi) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \alpha'h, y_0 + \xi)$

$$= h(\Phi(k) - \Phi(0))$$

Per la  $\Phi$  valgono nuovamente le ipotesi di Lagrange, dunque si ottiene

$$\begin{aligned} &= hk \Phi'(\beta'k) \\ &= hk \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0 + \alpha'h, y_0 + \beta'k) \end{aligned}$$

2. Posta  $\psi(\xi) = f(x_0 + h, y_0 + \xi) - f(x_0, y_0 + \xi)$ , si ottiene, riordinando i termini della  $q$

$$\begin{aligned} q &= (f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k)) - (f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)) \\ &= \psi(k) - \psi(0) \end{aligned}$$

Applicando Lagrange

$$= k \psi'(\beta''k)$$

Grazie alla [Proposizione 8.29](#) si passa alle derivate parziali rispetto a  $y$  (la  $x$  è fissa)

$$= k \left( \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, y_0 + \beta''k) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0 + \beta''k) \right)$$

Si definisce ora  $\Psi(\xi) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + \xi, y_0 + \beta''k)$

$$= k(\Psi(k) - \Psi(0))$$

Per la  $\Psi$  valgono nuovamente le ipotesi di Lagrange, dunque derivando rispetto a  $x$  si ottiene

$$\begin{aligned} &= kh \Psi'(\alpha''h) \\ &= kh \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0 + \alpha''h, y_0 + \beta''k) \end{aligned}$$

Si è quindi giunti a due diverse formulazioni di  $q$  per degli  $\alpha', \alpha'', \beta', \beta'' \in ]0, 1[$

$$kh \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0 + \alpha'h, y_0 + \beta'k) = kh \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0 + \alpha''h, y_0 + \beta''k)$$

A questo punto si calcola il limite per  $(h, k) \rightarrow (0, 0)$ . Spostandosi, anche  $\alpha', \alpha'', \beta', \beta''$  cambieranno, ma essendo limitati  $\in ]0, 1[$ , non si presentano complicazioni di sorta in quanto vengono moltiplicati per una quantità tendente a zero.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)$$

□

### Osservazione 9.7

Il [Lemma 9.6 \(di Schwarz\)](#) ha importanti applicazioni in fisica e nella teoria dei campi. Grazie al lemma è infatti possibile distinguere tra campi **conservativi** e non: uno dei criteri è appunto il controllo dell'uguaglianza delle derivate parziali miste.

### Esercizio 9.8

Verificare se il [Lemma 9.6 \(di Schwarz\)](#) si applica alla funzione

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \begin{cases} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \end{aligned}$$

**Corollario 9.9**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$  e  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ . Se  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$  e  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$  **esistono** in un intorno di  $x_0$  e sono **Continue** in  $x_0$ , allora

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

*Dimostrazione.* Segue dal [Lemma 9.6 \(di Schwarz\)](#) applicandolo a tutte le variabili prese 2 a 2.  $\square$

**Definizione 9.10** (Funzioni di Classe  $\mathbf{C}^2$ )

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  un **Aperto**.

$\mathbf{C}^1(A; \mathbb{R}^m)$  è l'insieme delle funzioni  $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$   
con **tutte le Derivate Parziali seconde continue** in ogni punto di  $A$

Si può anche leggere  $f$  è di classe  $\mathbf{C}^2$  su  $A$  con valori in  $\mathbb{R}^m$ .

**Corollario 9.11**

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  un aperto.

$$f \in \mathbf{C}^2(A; \mathbb{R}) \implies D^2 f \text{ è una matrice } \mathbf{simmetrica}$$

*Dimostrazione.* Segue dal [Lemma 9.6 \(di Schwarz\)](#), in quanto  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$  per ogni  $i, j$  della matrice, andando a verificare la definizione di Matrice Simmetrica.  $\square$

**Esercizio 9.12**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $f \in \mathbf{C}^2(A; \mathbb{R}^m)$ .

Quante sono le derivate parziali seconde di  $f$  che bisogna necessariamente calcolare? Calcolare questa risposta con quella dell'[Esercizio 9.3](#).

*Soluzione.* Bisogna calcolare  $\frac{n(n+1)}{2}$  derivate diverse, invece che  $n^2$ .  $\blacksquare$

**Esercizio 9.13**

Esibire un esempio di funzione  $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$  che ammetta tutte le derivate parziali seconde in un punto, ma che non sia continua in quel punto

**9.2 Sviluppo in Serie di Taylor al II Ordine**

**Nota.** Differentemente da quanto fatto sul libro, tutte le funzioni in esame saranno a valori in  $\mathbb{R}^1$ , visto che a lezione è trattato solo questo caso e che il Resto di Lagrange non è applicabile nel caso di  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ .

Fino ad ora son stati visti 2 "livelli" di approssimazione di una funzione  $f$  in un intorno del punto  $x_0$ , appartenente all'insieme di definizione di  $f$ . Per  $x \rightarrow x_0$ :

- Livello 0:  $f$  continua  $f(x) = f(x_0) + o(1)$
- Livello 1:  $f$  derivabile  $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$

A livello 0, la funzione è stata approssimata dal *miglior* polinomio di grado 0, cioè la costante  $f(x_0)$ ; a livello 1 dal *miglior* polinomio di grado 1,  $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ . Per *migliore* si intende che usando un qualsiasi altro polinomio di grado 1 passante per  $(x_0, f(x_0))$  il resto sarebbe andato a 0 come  $x - x_0$  e non più velocemente. Queste approssimazioni ci permettono di capire se una funzione sia crescente o meno, ma non è possibile, ad esempio, studiarne la concavità. Per ottenere più informazioni è possibile estendere questi risultati a polinomi di grado superiore al primo.

Come nel caso Analisi 1, gli **Sviluppi di Taylor** permettono di approssimare localmente una funzione con un polinomio nelle variabili indipendenti a patto di conoscere opportune derivate parziali della funzione.

La seguente sezione in **verde** non è richiesta in quanto non presentata sul libro, ma necessaria per chiarire i concetti con cui si sta lavorando. Deve essere considerata come un approfondimento da leggere.

**Definizione 9.14** (Polinomio di Taylor)

Siano:

- $f \in \mathbf{C}^n(A; \mathbb{R}^m)$  con  $A \subseteq \mathbb{R}^n$
- $x_0 \in \overset{\circ}{A}$
- $h \in \mathbb{R}^n$
- Il segmento di estremi  $x_0$  e  $x_0 + h$  è interamente contenuto in  $A$

Allora

$$T_{n-1}(f, x_0) = f(x_0) + Df(x_0; h) + \frac{1}{2!} D^2 f(x_0; h) + \cdots + \frac{1}{(n-1)!} D^{n-1} f(x_0; h)$$

Oppure, in forma più compatta

$$T_{n-1}(f, x_0) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i!} D^i f(x_0; h) \quad (9.14.1)$$

si dice **Polinomio di Taylor** di grado  $n-1$  della funzione  $f$  centrato nel punto  $x_0$ .

**Nota.** Nella Eq. (9.14.1), con la forma  $D^i f(x_0; h)$  si intende lo *scalare* ottenuto applicando all'incremento  $h$  il differenziale  $i$ -esimo calcolato in  $x_0$ .

Supponendo  $f: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^1$ , la  $D^i f(x_0; h)$  diventa, ad esempio:

- $i = 1$       $Df(x_0; h) = \nabla f(x_0) \cdot h$
- $i = 2$       $D^2 f(x_0; h) = h^T \cdot H_f(x_0) \cdot h$      dove  $h^T$  è  $h$  trasposto e  $H_f$  è la [Definizione 9.5 \(Matrice Hessiana\)](#)

Con  $\cdot$ , in questo caso, si intende il prodotto righe per colonne.Vedasi [Osservazione 8.8 \(Matrici Derivata Totale Particolari\)](#) per le possibili "forme" assunte dalla  $Df(x_0; h)$  in base ai valori di  $n$  e  $m$ .**Osservazione 9.15**Il Polinomio di Taylor è caratterizzato dall'avere in comune con la funzione  $f$  il valore di tutte le derivate fino all'ordine  $n-1$  nel punto  $x_0$ .**Teorema 9.16** (di Taylor)

Siano:

- $f \in \mathbf{C}^n(A; \mathbb{R}^m)$  con  $A \subseteq \mathbb{R}^n$
- $x_0 \in \overset{\circ}{A}$
- $h \in \mathbb{R}^n$
- Il segmento di estremi  $x_0$  e  $x_0 + h$  è interamente contenuto in  $A$

Allora

$$f(x) = T_{n-1}(f, x_0) + R_n(f, x_0, h) \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

Dove  $R_n(f, x_0, h)$  è **Resto** espresso nella forma di Peano o di Lagrange.*Dimostrazione.* Omessa. □**Definizione 9.17** (Resto di Peano)Nelle ipotesi del [Teorema 9.16 \(di Taylor\)](#), dalla [Definizione 8.2 \(o piccolo\)](#) si definisce il **resto** nella forma di **Peano**:

$$R_n(f, x_0, h) = \frac{1}{n!} D^n f(x_0; h) + o(\|h\|^2)$$

Cioè che la differenza tra la funzione ed il polinomio tende a zero quando la  $x$  tende al centro dello sviluppo, cioè  $x_0$ **Definizione 9.18** (Resto di Lagrange)Nelle ipotesi del [Teorema 9.16 \(di Taylor\)](#), ma con  $f \in \mathbf{C}^n(A; \mathbb{R}^1)$  si definisce il **resto** nella forma di **Lagrange**

$$\exists \theta \in [0, 1] : \quad R_n(f, x_0, h) = \frac{1}{n!} D^n f(x_0; \theta h) = \frac{D^n f(x + \theta h)}{n!} (x + \theta h)$$

Cioè che esiste un punto (senza sapere quale sia) all'interno del segmento di estremi  $x_0$  e  $x_0 + h$  in cui si ha un'equivalenza precisa tra la funzione ed il polinomio.

**Osservazione 9.19**

Il Resto di Lagrange, a differenza del [Definizione 9.17 \(Resto di Peano\)](#), offre informazioni quantitative sul resto, ma **NON** è applicabile a funzioni a valori in  $\mathbb{R}^m$ , solo a funzioni a valori reali.

Passando ora al caso specifico degli sviluppi del secondo ordine

**Proposizione 9.20** (Sviluppo di Taylor al Secondo Ordine con resto di Peano)

Siano:

- $f \in \mathbf{C}^2(A; \mathbb{R}^m)$  con  $A \subseteq \mathbb{R}^n$
- $x_0 \in \overset{\circ}{A}$
- $h \in \mathbb{R}^n$
- Il segmento di estremi  $x_0$  e  $x = x_0 + h$  è interamente contenuto in  $A$

Allora

$$f(x) = f(x_0) + Df(x_0)h + \frac{1}{2}h^T D^2 f(x_0)h + o(\|h\|^2)$$

**Nota.**  $h^T$  è il vettore riga trasposto del vettore colonna  $h$ .

*Dimostrazione.* Omessa in aula. □

**Proposizione 9.21** (Sviluppo di Taylor al Secondo Ordine con resto di Lagrange)

Siano:

- $f \in \mathbf{C}^2(A; \mathbb{R})$  con  $A \subseteq \mathbb{R}^n$
- $x_0 \in \overset{\circ}{A}$
- $h \in \mathbb{R}^n$
- Il segmento di estremi  $x_0$  e  $x_0 + h$  è interamente contenuto in  $A$

Allora

$$f(x) = f(x_0) + Df(x_0)h + \frac{1}{2}h^T D^2 f(x + \theta h)h$$

**Nota.** Come detto in [Osservazione 9.19](#), il resto di lagrange si può applicare solo a funzioni in  $\mathbb{R}$ .

*Dimostrazione.* Omessa in aula. □

**Esercizio 9.22**

Sfruttando i noti sviluppi di funzioni reali di una variabile reale, scrivere lo sviluppo di Taylor al secondo ordine centrato nell'origine delle seguenti funzioni:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| • $(x, y) \mapsto 2x^2 + 3xy + 4xy^3$   | • $(x, y) \mapsto e^{x-y^2} \ln(1+x+y^2)$                                       | • $(x, y, z) \mapsto \sin(x+3z) \cos(z-y)$   |
| • $(x, y) \mapsto \sin(xy)$             | • $(x, y, z) \mapsto \sqrt{1+2x+3y+4z}$   | • $(x, y) \mapsto \frac{x+y^2}{\cos(x+y)}$   |
| • $(x, y, z) \mapsto (x+z) \cos(2x+3y)$ | • $(x, y) \mapsto \begin{bmatrix} \cos(x^2+y^2) \\ \sin(x^2-y^2) \end{bmatrix}$ | • $(x, y, z) \mapsto \begin{bmatrix} z \ln(1+xy) \\ \frac{y}{1+x+z} \\ (y+z) \sin x \end{bmatrix}$ |

**9.3 Derivate di Ordine Superiore****Definizione 9.23**

Sia  $k \in \mathbb{N}$  e sia  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  un **Aperto**.  $\mathbf{C}^0(A; \mathbb{R}^m)$  è l'insieme delle funzioni continue su  $A$  con valori in  $\mathbb{R}^m$ . Se  $k \geq 1$ ,  $\mathbf{C}^k(A; \mathbb{R}^m)$  è l'insieme delle funzioni continue su  $A$  con valori in  $\mathbb{R}^m$  con tutte le derivate parziali prime di classe  $\mathbf{C}^{k-1}$  su  $A$ .

Inoltre

$$\mathbf{C}^\infty(A; \mathbb{R}^m) = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \mathbf{C}^k(A; \mathbb{R}^m)$$

Si può anche leggere  $f$  è di classe  $\mathbf{C}^k$  o  $\mathbf{C}^\infty$  su  $A$  con valori in  $\mathbb{R}^m$ .



**Esercizio 9.24**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  ed  $f \in \mathbf{C}^3(A; \mathbb{R}^m)$ . Quante sono le derivate parziali terze di  $f$  in totale? E quante quelle che, in generale, bisogna necessariamente calcolare?

## 10 Il Teorema della Funzione Implicita

I risultati esposti in questo paragrafo permettono di studiare funzioni senza averne l'espressione analitica esplicita a disposizione, fatto estremamente importante per l'utilizzo reale dell'analisi. Non è infatti sempre possibile ottenere la forma analitica di una funzione, ma ci può comunque essere necessità di studiarla.

### Definizione 10.1 (Funzione Implicita)

Dati

- $X \subseteq \mathbb{R}^n, Y \subseteq \mathbb{R}^m$
- $f : X \times Y \mapsto \mathbb{R}^l$
- $(x_0, y_0) \in X \times Y$  (un punto)

Si dice che l'equazione  $f(x, y) = 0$  **Definisce Implicitamente una Funzione**  $\varphi$  in un intorno di  $(x_0, y_0)$  se:

1.  $f(x_0, y_0) = 0$
2. Esistono due aperti  $\mathcal{X}$  e  $\mathcal{Y}$  tali che:

- $x_0 \in \mathcal{X} \subseteq X$
- $y_0 \in \mathcal{Y} \subseteq Y$

**Nota.** Oppure, alternativamente,  $x_0 \in \overset{\circ}{\mathcal{X}}$  e  $y_0 \in \overset{\circ}{\mathcal{Y}}$  con  $\mathcal{X}$  e  $\mathcal{Y}$  non aperti.

3. Esiste  $\varphi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$

Tali che:

$$\left. \begin{array}{l} x \in \mathcal{X} \\ y \in \mathcal{Y} \\ f(x, y) = 0 \end{array} \right\} \implies y = \varphi(x)$$

Con  $\varphi$  **Funzione Implicita** definita da  $f(x, y) = 0$ .

Cioè la Funzione Implicita associa un sottoinsieme delle variabili dell'equazione alle variabili rimanenti. Da questo deriva il nome *implicita*, in quanto la  $f$  definisce "implicitamente" la  $\varphi$ , perchè l'immagine di  $f$  è influenzata da tutte le variabili della funzione, che dunque son legate tra loro.

**Nota.** La **Funzione Inversa** di una qualche funzione è anche **Funzione Implicita** di questa funzione.

### Esempio 10.2

Posti  $m = n = l = 1$

$$\begin{array}{lll} f & : & \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ & & (x, y) \mapsto x^2 + y^2 + 1 \end{array}$$

Non definisce alcuna funzione implicita poiché  $f(x, y) = 0$  non è mai verificata.

### Esempio 10.3

Posti  $m = n = l = 1$

$$\begin{array}{lll} f & : & \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ & & (x, y) \mapsto x^2 + y^2 - 1 \end{array}$$

**Nota.** Il Teorema della Funzione Implicita è particolarmente utile quando non è possibile esprimere in forma analitica un parametro rispetto agli altri, ma è ovviamente utilizzabile anche quando è fattibile.

Per prima cosa si osserva che è possibile trovare dei punti che verifichino l'uguaglianza  $f(x, y) = 0$ , cioè tutti i punti della circonferenza di raggio unitario centrata nell'origine. Il punto  $(0, 1)$  definisce implicitamente, tra le altre, una funzione


$$\begin{array}{lll} \varphi_1 & : & ]-1, 1[ \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ & & x \mapsto \sqrt{1 - x^2} \end{array} \quad (10.3.1)$$

**Nota.**  $\varphi_1$  non avrebbe potuto essere definita  $] -1, 1[ \rightarrow ] 0, 1[$  perché sarebbe contrario al punto 2 della [Definizione 10.1 \(Funzione Implicita\)](#), non essendo  $\mathcal{Y}$  un aperto, in questo caso. Estendendo  $\mathcal{Y}$  a  $\mathbb{R}^+$  si ha un aperto contenente tutti i valori assunti da  $\varphi_1$ .

Un primo problema nasce dalla scelta degli insiemi  $\mathcal{X}$  e  $\mathcal{Y}$ , per esempio sarebbero stati altrettanto accettabili  $\mathcal{X} = ] -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$  e  $\mathcal{Y} = \mathbb{R}^+$ . Un secondo problema è la scelta del punto nel cui intorno si cercherà la funzione implicita: sarebbe stato possibile scegliere il punto  $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$  oppure ancora  $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ . Sicuramente  $(1, 0)$  non è un punto valido, dato che non si verifica il punto 3 della [Definizione 10.1 \(Funzione Implicita\)](#), perché una eventuale relazione come  $\varphi_3$  da [Figura 2.3](#) non sarebbe una funzione.

**Nota.** La  $\varphi_1$  di Eq. (10.3.1) potrebbe essere scritta in funzione di  $y$  poiché, a priori, non c'è distinzione tra le variabili.

Figura 2.3: Esempi di funzioni implicite della  $f$



#### Esempio 10.4

Posti  $m = n = l = 1$

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto x^2 + y^2 \end{aligned}$$

L'uguaglianza  $f(x, y) = 0$  non definisce implicitamente alcuna funzione in quanto  $\text{Dom } f = \{(0, 0)\}$  che è composto da un solo punto isolato, dunque non esistono  $\mathcal{X} \subseteq X$  e  $\mathcal{Y} \subseteq Y$  aperti.

#### Esempio 10.5

Posti  $m = n = l = 1$

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto x^2 - y^2 \end{aligned}$$

L'uguaglianza  $f(x, y) = 0$  definisce implicitamente infinite funzioni distinte in un intorno di  $(0, 0)$ .

#### Esercizio 10.6

Determinare (almeno) 5 funzioni diverse definite implicitamente dalla funzione nell'[Esempio 10.5](#) sullo stesso insieme

#### Esempio 10.7 (Equazione di Keplero)

Nella meccanica orbitale, l'**Equazione di Keplero** è un importante risultato che mette in relazione varie proprietà dell'orbita di un oggetto soggetto ad una forza centrale fornendo la legge oraria del suo moto. Dati

- *M Anomalia Media*: frazione di periodo orbitale trascorsa dall'ultimo passaggio al pericentro  $z$ , espressa come angolo.
- *E Anomalia Eccentrica*: valore angolare utilizzato per correggere lo scostamento tra l'anomalia vera, cioè quella osservata, e quella media (da sopra)
- *e Eccentricità* dell'orbita del corpo

- $n$  Velocità angolare media del corpo
- $t$  Istante di tempo in cui si vuol calcolare la posizione del corpo
- $\tau$  Istante di tempo di passaggio per il pericentro (perielio nel caso del Sole)

Si ha la

$$\underbrace{E - e \sin(E)}_{=M} = n(t - \tau)$$

Dalla quale è però impossibile esplicitare la  $E$ , necessaria per il calcolo della posizione, in funzione del tempo  $t$ . È possibile, al massimo, avvicinarsi alla soluzione con metodi di approssimazione.

Per funzioni lineari il Teorema della Funzione Implicita si riduce alla semplice inversione di una matrice.

**Teorema 10.8** (della Funzione Implicita - Caso Lineare)

Siano:

- $A \in \text{Mat}(p \times n)$  matrice
- $B \in \text{Mat}(p \times m)$  matrice
- $C \in \text{Mat}(p \times 1)$  vettore colonna
- $p = m$
- $\det(B) \neq 0$

e la funzione

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m &\rightarrow \mathbb{R}^p \\ (x, y) &\mapsto Ax + By - C \end{aligned}$$

Allora esiste un'unica funzione  $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  tale che:

$$Ax + By = C \iff f(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x)$$

**Nota.** Dimensionalmente, avendo  $p = m$  ed eseguendo i prodotti righe per colonne, ci si porta ad avere da entrambi i lati dell'uguaglianza matriciale dei vettori colonna  $\in \text{Mat}(p \times 1)$

*Dimostrazione.*

$$\begin{aligned} Ax + By &= C \\ By &= C - Ax \end{aligned}$$

Essendo  $p = m$  e  $\det(B) \neq 0$ , la matrice  $B$  è invertibile, dunque

$$\begin{aligned} B^{-1}By &= B^{-1}(C - Ax) \\ y &= B^{-1}(C - Ax) \end{aligned}$$

Quindi è possibile esprimere la  $y$  in funzione della sola  $x$ , verificando la tesi. □

**Osservazione 10.9** (Metodo di Newton, o delle Tangenti)

**Nota.** Questo metodo, leggermente modificato, sarà utile nella dimostrazione del [Teorema 10.10 \(della Funzione Implicita\)](#).


Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  con  $f \in \mathbf{C}^2([a, b], \mathbb{R})$ . Se l'intervallo  $[a, b]$  contiene una sola radice della  $f$ , allora si può individuare la radice per mezzo di successive approssimazioni della curva con le sue tangenti.

Procedendo in modo iterativo si dimostra che la relazione di ricorrenza del metodo è:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \tag{10.9.1}$$

Che è una successione convergente alla radice.

Graficamente si vede come utilizzando le tangenti ci si possa spostare rapidamente verso la radice:

**Teorema 10.10** (della Funzione Implicita)

**Nota.** Questo teorema è anche noto come *Teorema di Dini*

Siano:

1.  $X \subseteq \mathbb{R}^n$  e  $Y \subseteq \mathbb{R}^m$  **Aperti**
2.  $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}^m$  e  $f$  **Continua** in  $X \times Y$
3.  $(x_0, y_0) \in X \times Y$  e  $f(x_0, y_0) = 0$
4.  $D_y f$  **esiste Continua** in  $(x_0, y_0)$
5.  $D_y f(x_0, y_0)$  ammette **inversa**

**Nota.** Nel Teorema 10.8 (della Funzione Implicita - Caso Lineare) si utilizzava direttamente la matrice dell'applicazione lineare, mentre qui si ha la matrice Derivata Totale. Questo perché il differenziale è la funzione che meglio approssima una funzione in un suo punto, permettendo una pseudo linearità malgrado la  $f$  non sia (necessariamente) lineare.

**Nota.** Nei punti 4 e 5 delle ipotesi si ha  $D_y f$  perché si sta cercando una funzione implicita che esprima la  $y$ , se la si stesse cercando per la  $x$  si dovrebbe utilizzare la  $D_x f$

**Nota.** Il punto 5 delle ipotesi richiede che la matrice  $D_y f$  sia invertibile, cioè quadrata e con  $\det(D_y f) \neq 0$ . Il fatto che sia quadrata è garantito per ipotesi, in quanto  $Y \subseteq \mathbb{R}^m$  e  $f$  è a valori in  $\mathbb{R}^m$ . Nel caso molto comune di  $f : \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^1$ , bisogna verificare che  $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$ , cioè che la derivata parziale rispetto ad  $y$  non sia nulla.

Allora

1. Esistono degli intorni  $\mathcal{X}$  di  $x_0$  e  $\mathcal{Y}$  di  $y_0$  ed esiste la **funzione Continua**  $\varphi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  tale che, con  $x \in \mathcal{X}$  e  $y \in \mathcal{Y}$

$$f(x, y) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y = \varphi(x) \quad (10.10.1)$$

2. Se  $\varphi_1 : \mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{Y}_1$  e  $\varphi_2 : \mathcal{X}_2 \rightarrow \mathcal{Y}_2$  soddisfano alla Eq. (10.10.1) con  $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2 \subseteq \mathcal{X}$  intorni di  $x_0$  e  $\mathcal{Y}_1, \mathcal{Y}_2 \subseteq \mathcal{Y}$  intorni di  $y_0$ , allora

$$\varphi_1 = \varphi_2 \quad \text{su} \quad \mathcal{X} \cap \mathcal{X}_1 \cap \mathcal{X}_2$$

**Nota.** Il punto 2 significa che prendendo due  $\varphi$  definite su intervalli diversi, esse assumeranno gli stessi valori nei punti comuni ad entrambi gli intervalli (se esistono). Questa proprietà viene spesso indicata dalla forma " $\varphi$  è unica localmente".

*Dimostrazione.* Analogamente alla Eq. (10.9.1), passando al caso multidimensionale, si definisce la funzione

$$\begin{aligned} T : \mathcal{X} \times \mathcal{Y} &\rightarrow \mathcal{Y} \\ (x, y) &\mapsto y - [D_y f(x_0, y_0)]^{-1} \cdot f(x, y) \end{aligned} \quad (10.10.2)$$

**Nota.**  $[D_y f(x_0, y_0)]^{-1}$  è la matrice inversa della  $D_y f$

Considerando la  $x$  della  $T$  come un parametro, si può dire che  $T$  sia una [Definizione 4.14 \(Contrazione con Parametro\)](#). Bisogna però verificare che sia effettivamente una contrazione, cioè che rispetti due condizioni:

1. *La  $T$  esegue una contrazione delle distanze*

Questo si può dimostrare grazie al [Teorema 8.38 \(degli Accrescimenti Finiti\)](#). Infatti se il  $\sup_{\xi \in S} \|Df(\xi)\|$  dell'Eq. (8.38.1) è un numero  $\in [0, 1[$ , allora (sostituendo la distanza con la norma per [Definizione 1.8 \(Norma\)](#)) la Eq. (8.38.1) diventa comparabile alla Eq. (4.14.1), cioè:

$$\begin{aligned} d(T(x, y_1), T(x, y_2)) &\leq K \cdot d(y_1, y_2) \\ &\iff \\ \|T(x, y_1) - T(x, y_2)\| &\leq \sup_{\xi \in S} \|D_y T(\xi)\| \cdot \|y_1 - y_2\| \end{aligned}$$

Per poter applicare il [Teorema 8.38 \(degli Accrescimenti Finiti\)](#) è necessario che il segmento di estremi  $y_1, y_2$  sia interamente contenuto nella parte interna dell'insieme di definizione di  $T$ .

Dato che nell'enunciato del teorema è solo indicata l'esistenza di  $\mathcal{X}$  e  $\mathcal{Y}$ , è possibile scegliere questi insiemi a piacimento. Ponendo dei  $r_x$  ed  $r_y$  sufficientemente piccoli, saranno accettabili:

$$\mathcal{X} = \overline{B(x_0, r_x)} \quad \mathcal{Y} = \overline{B(y_0, r_y)}$$

A questo punto il [Teorema 8.38 \(degli Accrescimenti Finiti\)](#) è applicabile, dunque si procede a quantificare il  $\sup_{\xi \in S} \|Df(\xi)\|$  differenziando rispetto ad  $y$  la Eq. (10.10.2)

$$D_y T(x, y) = \text{Id}_Y - [D_y f(x_0, y_0)]^{-1} D_y f(x, y)$$

Essendo  $\text{Id}_Y = [D_y f(x, y)]^{-1} \cdot D_y f(x, y)$  per qualsiasi  $(x, y)$ , si ha

$$\begin{aligned} &= [D_y f(x_0, y_0)]^{-1} \cdot D_y f(x_0, y_0) - [D_y f(x_0, y_0)]^{-1} D_y f(x, y) \\ &= [D_y f(x_0, y_0)]^{-1} \cdot [D_y f(x_0, y_0) - D_y f(x, y)] \end{aligned}$$

Passando alle norme

$$\|D_y T(x, y)\| = \left\| [D_y f(x_0, y_0)]^{-1} \cdot \underbrace{[D_y f(x_0, y_0) - D_y f(x, y)]}_{(1)} \right\|$$

Essendo, come detto prima,  $r_x$  ed  $r_y$  piccoli a piacere, si può presupporre che il fattore indicato come (1) tenda a 0, essendo una differenza tra funzioni continue (per ipotesi). A questo punto, sicuramente, si può minorare con un valore arbitrario: si sceglie  $\frac{1}{2}$  in quanto sarà successivamente "comodo" nel corso della dimostrazione.

$$\|D_y T(x, y)\| \leq \frac{1}{2}$$

Dunque, finalmente, applicando il [Teorema 8.38 \(degli Accrescimenti Finiti\)](#)

$$\|T(x, y_1) - T(x, y_2)\| \leq \frac{1}{2} \cdot \|y_1 - y_2\|$$

□

2. *La  $T$  è a valori nell'insieme di partenza ( $T$  "ben definita")*

Preso un generico  $y$ , si deve verificare che  $\forall y \in \mathcal{Y} : T(x, y) \in \mathcal{Y}$  cioè, per come è definito  $\mathcal{Y}$ , che la distanza tra  $T(x, y)$  ed  $y_0$ , centro della  $\overline{B(y_0, r_y)}$ , sia minore di  $r_y$ .

Applicando la disuguaglianza triangolare

$$\|T(x, y) - y_0\| \leq \left\| \underbrace{T(x, y) - T(x, y_0)}_{(1)} + \underbrace{T(x, y_0) - y_0}_{(2)} \right\|$$

Applicando nuovamente il [Teorema 8.38 \(degli Accrescimenti Finiti\)](#) ad (1) ed utilizzando la definizione di  $T$  per (2)

$$\leq \underbrace{\sup_{\xi \in S} \|D_y T(\xi)\|}_{(3)} \cdot \underbrace{\|y - y_0\|}_{(4)} + \|y_0 - [D_y f(x_0, y_0)]^{-1} \cdot f(x, y_0) - y_0\|$$

Come dimostrato prima (3) è minorato da  $\frac{1}{2}$ , mentre (4) corrisponde a  $r_y$

$$\begin{aligned} &\leq \frac{1}{2}r_y + \|[D_y f(x_0, y_0)]^{-1} \cdot f(x, y_0)\| \\ &= \frac{1}{2}r_y + \|[D_y f(x_0, y_0)]^{-1}\| \cdot \|f(x, y_0)\| \\ &= \frac{1}{2}r_y + \|[D_y f(x_0, y_0)]^{-1}\| \cdot \|f(x, y_0) - 0\| \end{aligned}$$

Essendo  $f(x_0, y_0) = 0$  per ipotesi

$$= \frac{1}{2}r_y + \underbrace{\|[D_y f(x_0, y_0)]^{-1}\| \cdot \|f(x, y_0) - f(x_0, y_0)\|}_{(5)}$$

Il termine (5) non dipende da  $r_y$ , ma solo da  $r_x$ , dunque scegliendo un  $r_x$  sufficientemente piccolo, è possibile minorare nuovamente con

$$\begin{aligned} &\leq \frac{1}{2}r_y + \frac{1}{2}r_y \\ &\leq r_y \end{aligned}$$

□

Si è quindi verificato che la  $T$  sia effettivamente una **Contrazione** per ogni  $x \in \mathcal{X}$

**Nota.** L'indipendenza dal parametro deriva dall'aver verificato la [Definizione 4.14 \(Contrazione con Parametro\)](#)

Sfruttando il [Teorema 4.15 \(delle Contrazioni con Parametro\)](#) si può essere certi dell'unicità del punto fisso di  $T$ . Inoltre, il punto fisso di  $T$  è anche radice di  $f(x, y) = 0$ . Questo si dimostra applicando la [Definizione 4.5 \(Punto Fisso\)](#) alla  $T$ :

$$\begin{aligned} T(x, y) = y &\iff y - [D_y f(x_0, y_0)]^{-1} \cdot f(x, y) = y \\ &\iff [D_y f(x_0, y_0)]^{-1} \cdot f(x, y) = 0 \end{aligned}$$

Moltiplicando ambo i membri per  $D_y f$

$$\iff D_y f(x_0, y_0) \cdot [D_y f(x_0, y_0)]^{-1} \cdot f(x, y) = D_y f(x_0, y_0) \cdot 0$$

Una matrice moltiplicata per la sua inversa dà la matrice identità, dunque

$$\iff f(x, y) = 0$$

Quindi, effettivamente, il punto fisso della  $T$  è zero della  $f$ .

È ora possibile definire una funzione che associa ad un dato parametro  $x$  una  $T$  in funzione di  $y$  (quindi  $\varphi$  è funzione di funzioni).

$$\begin{aligned} \varphi &: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} \\ x &\mapsto T(x, y) \end{aligned}$$

La continuità di  $\varphi$  è sempre garantita da [Teorema 4.15 \(delle Contrazioni con Parametro\)](#).

□

### Esercizio 10.11

Confrontare le ipotesi del [Teorema 10.8 \(della Funzione Implicita - Caso Lineare\)](#) e del [Teorema 10.10 \(della Funzione Implicita\)](#).

*Soluzione.* Vedere [seconda nota alle ipotesi del della Funzione Implicita](#)

■

### Esercizio 10.12

Come mai il [Teorema 10.10 \(della Funzione Implicita\)](#) è stato ambientato in  $\mathbb{R}^n$  e non in un generico spazio metrico?

**Teorema 10.13**

Nelle stesse ipotesi del [Teorema 10.10 \(della Funzione Implicita\)](#) ed aggiungendo  $f \in \mathbf{C}^1$ , allora  $\varphi \in \mathbf{C}^1$  e vale

$$D\varphi(x) = -\left[D_y f(x, \varphi(x))\right]^{-1} \cdot D_x f(x, \varphi(x)) \quad (10.13.1)$$

*Dimostrazione.* Omessa a lezione.

$f$  è di classe  $\mathbf{C}^1 \implies f$  è Lipschitziana  $\implies$  la funzione  $T$  definita in Eq. (10.10.2) è Lipschitziana anche in  $x$  (si veda [Esercizio 3.43](#))  $\implies$  la funzione implicita  $y = \varphi(x)$  è Lipschitziana (per [Teorema 4.17](#)).

Se  $\varphi$  è derivabile, allora le regole di derivazione garantiscono che (da [Esercizio 8.33](#)):

$$0 = D\left(f(x, \varphi(x))\right) = D_x f(x, \varphi(x)) + D_y f(x, \varphi(x))$$

Dunque

$$\varphi'(x) = -\left(D_y f(x, \varphi(x))\right)^{-1} \cdot D_x f(x, \varphi(x))$$

Si pone ora per brevità

$$A(x) = -\left(D_y f(x, \varphi(x))\right)^{-1} \cdot D_x f(x, \varphi(x))$$

Resta dunque da verificare che

$$\omega_x(h) = \varphi(x+h) - \varphi(x) - A(x) \cdot h \quad \text{allora} \quad \omega_x(h) = o(h) \text{ per } h \rightarrow 0 \quad (10.13.2)$$

Infatti

$$\begin{aligned} 0 &= f(x+h, \varphi(x+h)) \\ &= f(x+h, \varphi(x) + A(x) \cdot h + \omega_x(h)) \\ &= D_x f(x, \varphi(x)) \cdot h + D_y f(x, \varphi(x)) \cdot (A(x) \cdot h + \omega_x(h)) + o\left(\sqrt{\|h\|^2 + \|A(x) \cdot h + \omega_x(h)\|^2}\right) \\ &= D_y f(x, \varphi(x)) \cdot \omega_x(h) + o\left(\sqrt{\|h\|^2 + \|A(x) \cdot h + \omega_x(h)\|^2}\right) \end{aligned}$$

Quindi

$$\omega_x(h) = [D_y f(x, \varphi(x))]^{-1} o\left(\sqrt{\|h\|^2 + \|A(x) \cdot h + \omega_x(h)\|^2}\right)$$

Dalla definizione di  $\omega_x$  in Eq. (10.13.2), segue che la funzione  $h \mapsto \omega_x(h)$  è Lipschitziana (da [Esercizio 3.43](#)). Ciò implica che non possa andare a 0 più lentamente di  $h \rightarrow h$ , dunque ne segue che

$$\omega_x(h) = [D_y f(x, \varphi(x))]^{-1} o(\|h\|) = o(\|h\|)$$

□

**Corollario 10.14** (Caso  $n = 1, m = 1$ )

Il [Teorema 10.13](#) nel caso caso  $\mathbf{n} = \mathbf{1}, \mathbf{m} = \mathbf{1}$ , la Eq. (10.13.1) diventa

$$D\varphi(x) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, \varphi(x))}$$

*Dimostrazione.* Dalla tesi del [Teorema 10.10 \(della Funzione Implicita\)](#), si ha

$$f(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x)$$

Derivando si passa alla

$$\begin{aligned} D\left(f(x, \varphi(x))\right) &= 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, \varphi(x)) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, \varphi(x)) D\varphi(x) &= 0 \end{aligned}$$

Da cui, spostando, la tesi.

□



**Esercizio 10.15**

Tramite la Eq. (10.13.1) dimostrare che se  $f$  soddisfa le ipotesi del [Teorema 10.10 \(della Funzione Implicita\)](#) ed è di classe  $\mathbf{C}^k$ , allora anche la **Funzione Implicita** è di classe  $\mathbf{C}^k$ .

**Esempio 10.16**

L'uguaglianza  $y^3 = x^6$  definisce un'unica funzione implicita  $y = y(x)$  in un intorno di  $(0, 0)$ , pur non soddisfacendo alle ipotesi del [Teorema 10.10 \(della Funzione Implicita\)](#).

**Esempio 10.17**

Data una funzione  $f \in \mathbf{C}^1(\mathbb{R}^2; \mathbb{R})$ , il luogo geometrico descritto da  $f(x, y) = 0$  coincide con quello descritto da  $(f(x, y))^2 = 0$ , ma anche se la prima equazione soddisfa alle ipotesi del [Teorema 10.10 \(della Funzione Implicita\)](#), la seconda sicuramente non lo fa.

**Esempio 10.18**

Entrambe le funzioni

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) & \mapsto & (x, y) \end{array}$$

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y, z) & \mapsto & x^2 + y^2 \end{array}$$

descrivono l'asse  $z$  attraverso le equazioni

$$f(x, y, z) = 0$$

$$g(x, y, z) = 0$$

Tuttavia, mentre  $f$  soddisfa alle ipotesi del [Teorema 10.10 \(della Funzione Implicita\)](#), la  $g$  le soddisfa. Grazie al citato teorema, la  $f$  (nell'intorno di un qualsiasi punto  $(0, 0, z)$ ) definisce sicuramente una funzione implicita  $(x, y) = \varphi(z)$  data da  $\varphi(z) = 0$ .

**Nota.** L'esempio precedente mostra come, ai fini della determinazione del numero di gradi di libertà di un sistema, possa essere fuorviante fare affidamento sul numero di equazioni che identificano il vincolo

**Corollario 10.19**

Siano

- $A \subseteq \mathbb{R}^n$
- $x_0 \in \overset{\circ}{A}$
- $f \in \mathbf{C}^1(A; \mathbb{R}^m)$
- $f(x_0) = 0$
- $n > m$

Se  $Df(x_0)$  ha rango  $m$ , il vincolo implicito  $f(x) = 0$  equivale ad una relazione esplicita in cui  $n - m$  variabili dipendono dalle rimanenti  $m$ .

*Dimostrazione.* Applicare il [Teorema 10.10 \(della Funzione Implicita\)](#)

□

**Esercizio 10.20**

Studiare il luogo dei punti in cui le coordinate soddisfano a  $y + xe^y = x$  in intorni di  $(-1, 0)$ ,  $(0, 0)$  e  $(1, 0)$ . Tracciarne il grafico globale.

**10.1 Il Teorema della Funzione Inversa**

Data una funzione  $f$ , poterla invertire significa poter risolvere in un unico modo l'equazione (o sistema)  $f(x) = y$  determinando l'incognita  $x$  in funzione del parametro  $y$ , cioè ottenere  $x = f^{-1}(y)$ .

**Teorema 10.21** (della Funzione Inversa - Caso Lineare)

Sia  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  data da  $f(x) = Mx$  e  $M \in \text{Mat}(m \times n)$

$$f \text{ è invertibile} \iff n = m \text{ e } \det M \neq 0$$

*Dimostrazione.* Dalle nozioni di Algebra Lineare

$$\begin{aligned} X \cdot A &= Y \\ A^{-1} \cdot X \cdot A &= A^{-1} \cdot Y \\ X &= A^{-1} \cdot Y \end{aligned}$$

□

**Teorema 10.22** (della Funzione Inversa)

Siano

- $X \subseteq \mathbb{R}^n$  è **Aperto**
- $x_0 \in X$
- $f \in \mathbf{C}^k(A; \mathbb{R}^n)$  con  $k \geq 1$
- $Df(x_0)$  **Invertibile**

**Nota.**  $Df(x_0)$  è Invertibile quando  $\det Df(x_0) \neq 0$ , visto che  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

Allora esiste un **Aperto**  $\mathcal{X} \subseteq X$  tale che:

- $x_0 \in \mathcal{X}$
- $f(\mathcal{X})$  è un **aperto**
- $f|_{\mathcal{X}} : \mathcal{X} \rightarrow f(\mathcal{X})$  è **Invertibile** e l'inversa è  $\mathbf{C}^k$
- $(Df^{-1})(y) = [Df(f^{-1}(y))]^{-1}$

**Nota.**  $f|_{\mathcal{X}}$  è la **Restrizione** di  $f$  ai soli elementi di  $\mathcal{X}$

*Dimostrazione.* Sia  $\Omega = \{x \in X : \det Df(x) \neq 0\}$  l'insieme di tutti i punti in cui la  $Df(x)$  è invertibile. Per ipotesi sicuramente  $\Omega$  è aperto, essendo  $X$  aperto, e  $x_0 \in \Omega$ . Posta ora  $F$

$$\begin{aligned} F &: \Omega \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \\ (x, y) &\mapsto f(x) - y \end{aligned}$$

Si va a verificare che la  $F$  rispetti le ipotesi del **Teorema 10.10 (della Funzione Implicita)**, modificando però le ipotesi per far riferimento alla  $D_x f$ :

- 1 è verificato perché  $\Omega$  aperto, come detto, ed  $\mathbb{R}^n$  è aperto a sua volta
- 2 è verificato perché  $F$  somma di funzioni continue nell'intervallo scelto
- 3 Dalla definizione di  $F$ ,  $F(x_0, y_0) = 0 \iff y_0 = f(x_0)$
- 4 è verificato per ipotesi
- 5 è verificato per definizione dell'insieme  $\Omega$ .  $D_x F(x, y) = Df(x)$  perchè, derivando parzialmente rispetto ad  $x$ , la derivata di  $y$  è 0, essendo  $y$  assimilabile ad una costante.

Esiste dunque una funzione  $\varphi : I \rightarrow J$ , con  $I$  intorno di  $y_0$  e  $J$  intorno di  $x_0$ , tale che:

$$\underbrace{x = \varphi(y) \iff F(x, y) = 0}_{\substack{\text{Per} \\ \text{Teorema 10.10 (della Funzione Implicita)}}} \overset{\substack{\text{Riportandosi} \\ \text{alla } f}}{\iff} y = f(x) \quad (10.22.1)$$

**Nota.** Nella Eq. (10.22.1) è stato applicato il **Teorema 10.10 (della Funzione Implicita)** rispetto alla variabile  $x$ , diversamente da quanto fatto nell'enunciato del teorema stesso, dove la derivata in questione era la  $y$ .

Dunque, con il primo e l'ultimo elemento

$$x = \varphi(y) \iff y = f(x) \quad (10.22.2)$$

È ora necessario individuare l'insieme su cui  $f$  è invertibile. Si pone  $\mathcal{X} = f^{-1}(I) \cap J$  dove:

- $f^{-1}(I)$  è l'insieme controimmagine di  $f$ , cioè "tutti i valori di cui si può calcolare la  $f$ "
- $J$  è l'insieme immagine della  $\varphi$ , quindi "i valori delle  $x$  in funzione delle  $y$ "

**Nota.** Vedere [Esempio 10.23](#) per capire come  $f^{-1}(I)$  possa essere diverso da  $J$

Avendo eseguito l'intersezione, si ha la certezza che nei punti di  $\mathcal{X}$ , la  $f$  sia invertibile e che la  $\varphi$  assuma valori validi. Data la relazione tra  $f$  e  $\varphi$  trovata in Eq. (10.22.2), si può concludere che, per i valori in  $\mathcal{X}$ , la  $f$  è sicuramente invertibile e la sua inversa è  $\varphi$ .

Inoltre  $F$  è funzione di classe  $\mathbf{C}^k$ , essendo somma di  $f \in \mathbf{C}^k$   $y \in \mathbf{C}^\infty$ . Son dunque verificate anche le ipotesi del [Teorema 10.13](#) (ed [Esercizio 10.15](#)), ciò implica che  $\varphi$  sia di classe  $\mathbf{C}^k$ .

Infine si ottiene la regola di derivazione:

$$(Df^{-1})(y) = D\varphi(y)$$

Dal [Teorema 10.13](#)

$$= -\left[D_x F(\varphi(y), y)\right]^{-1} \cdot D_y F(\varphi(y), y)$$

Per definizione di  $F$ , la derivata parziale rispetto a  $y$  è una costante, cioè la matrice identità

$$\begin{aligned} &= -\left[D_x F(\varphi(y), y)\right]^{-1} \cdot (-\text{Id}) \\ &= -\left[D_x F(\varphi(y), y)\right]^{-1} \end{aligned}$$

□

### Esempio 10.23

**Nota.** Questo esempio mostra come il [Teorema 10.22 \(della Funzione Inversa\)](#) non possa essere applicato globalmente, ma solo in intorni. Il fatto che il Teorema valga localmente in tutto il dominio della  $f$  **non implica** valga globalmente.

Sia

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\mapsto (e^x \cos y, e^x \sin y) \end{aligned}$$

La  $f$  è di classe  $\mathbf{C}^\infty$  ed inoltre  $Df(x, y)$  è invertibile per ogni coppia  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , quindi il [Teorema 10.22 \(della Funzione Inversa\)](#) può essere applicato in ogni  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$

$f$  però non è globalmente invertibile, infatti non è iniettiva, ma è  $2\pi$ -periodica nella variabile  $y$ .

**Nota.** La  $f$  può anche essere scritta come  $f(z) = e^z$ , come da [Definizione 15.4 \(Funzione Esponenziale con Esponente Complesso\)](#).

### Esercizio 10.24

**Nota.** Questo esempio mostra come il [Teorema 10.22 \(della Funzione Inversa\)](#) offra una condizione sufficiente a garantire l'invertibilità, ma non necessaria.

Sia

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^3 \end{aligned}$$

$f$  è invertibile con inversa continua, malgrado sia  $f'(0) = 0$ .

### Esercizio 10.25

Date due qualunque funzioni  $f \in \mathbf{C}^1(\mathbb{R}^2; \mathbb{R})$  e  $g \in \mathbf{C}^1(\mathbb{R}; \mathbb{R}^2)$ , verificare che alla funzione  $g \circ f$  non può essere applicato il [Teorema 10.22 \(della Funzione Inversa\)](#).

Esibire un esempio di funzioni  $f \in \mathbf{C}^1(\mathbb{R}^2; \mathbb{R})$  e  $g \in \mathbf{C}^1(\mathbb{R}; \mathbb{R}^2)$  tali che la funzione  $f \circ g$  invece soddisfi le ipotesi del [Teorema 10.22 \(della Funzione Inversa\)](#).

### Esercizio 10.26

La funzione  $f \in \mathbf{C}^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R})$  soddisfa alle ipotesi del [Teorema 10.22 \(della Funzione Inversa\)](#) in  $x_0$  e la funzione  $g \in \mathbf{C}^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$  soddisfa alle ipotesi del [Teorema 10.22 \(della Funzione Inversa\)](#) in  $f(x_0)$ . Verificare che la funzione  $g \circ f$  soddisfa alle ipotesi del [Teorema 10.22 \(della Funzione Inversa\)](#) in  $x_0$ .

## 11 Massimi e Minimi Liberi

### Definizione 11.1 (Massimi e Minimi)

Siano  $(X, d)$  uno **Spazio Metrico**,  $A \subseteq X$ ,  $x_0 \in A$  e  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ . Con  $B \subseteq A$  e  $m, M \in \mathbb{R}$ , si dicono:

- $M$  è il **Massimo** di  $f$  su  $B$   $\Rightarrow M = \max f(B)$
- $m$  è il **Minimo** di  $f$  su  $B$   $\Rightarrow m = \min f(B)$
- $x_0$  punto di **Massimo Assoluto** per  $f$   $\Rightarrow f(x_0) = \max_A f$
- $x_0$  punto di **Minimo Assoluto** per  $f$   $\Rightarrow f(x_0) = \min_A f$
- $x_0$  punto di **Massimo Locale** per  $f$   $\Rightarrow \begin{cases} \exists r > 0 : \forall x \in B(x_0, r) \cap A \\ f(x_0) \geq f(x) \end{cases}$
- $x_0$  punto di **Minimo Locale** per  $f$   $\Rightarrow \begin{cases} \exists r > 0 : \forall x \in B(x_0, r) \cap A \\ f(x_0) \leq f(x) \end{cases}$
- $x_0$  punto di **Massimo Locale Forte** per  $f$   $\Rightarrow \begin{cases} \exists r > 0 : \forall x \in B(x_0, r) \cap A \text{ con } x \neq x_0 \\ f(x_0) > f(x) \end{cases}$
- $x_0$  punto di **Minimo Locale Forte** per  $f$   $\Rightarrow \begin{cases} \exists r > 0 : \forall x \in B(x_0, r) \cap A \text{ con } x \neq x_0 \\ f(x_0) < f(x) \end{cases}$
- $x_0$  di **Estremo** per  $f$   $\Rightarrow x_0$  punto di **Massimo** o di **Minimo**

**Nota.** I punti di massimo/minimo son anche indicati con  $\arg \max f$  e  $\arg \min f$

**Nota.** A volte si parla di estremi (Massimi/Minimi) **Relativi** come sinonimi di estremi **Locali**.

### Osservazione 11.2

Una funzione ha **unico massimo/minimo**, ma può avere **infiniti punti di massimo/minimo assoluto**.

- Il massimo di  $f$  ( $\max f$ ) è un valore nell'insieme di arrivo della funzione ed è unico per definizione di  $\max$ .
- Il punto di estremo assoluto  $x_0$  è, per definizione, il punto appartenente all'insieme di partenza della  $f$  per cui  $f$  assume il suo valore massimo. Questa definizione appena data non è influenzata dall'unicità di  $\max f$ , in quanto possono esistere più valori di  $x$  per cui  $f(x) = \max f$ , il quale  $\max f$  sarà però unico.

Vedere [Esercizio 11.5](#) e [Esercizio 11.6](#).

### Esercizio 11.3

Formulare le definizioni di Massimo/Minimo Assoluto Forte e di Estremo Locale/Assoluto Forte e non.

*Soluzione.*

- $x_0$  punto di **Massimo Assoluto Forte** per  $f$   $\Rightarrow \forall x \in A \quad f(x_0) > f(x)$
- $x_0$  punto di **Minimo Assoluto Forte** per  $f$   $\Rightarrow \forall x \in A \quad f(x_0) < f(x)$
- $x_0$  punto di **Estremo Locale** per  $f$   $\Rightarrow \begin{cases} \text{Unione delle definizioni di} \\ \text{Massimo Locale} \\ \text{e} \\ \text{Minimo Locale} \end{cases}$
- $x_0$  punto di **Estremo Locale Forte** per  $f$   $\Rightarrow \begin{cases} \text{Unione delle definizioni di} \\ \text{Massimo Locale Forte} \\ \text{e} \\ \text{Minimo Locale Forte} \end{cases}$

- $x_0$  punto di **Estremo Assoluto** per  $f \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \text{Unione delle definizioni di} \\ \text{Massimo Assoluto} \\ \text{e} \\ \text{Minimo Assoluto} \end{cases}$
- $x_0$  punto di **Estremo Assoluto Forte** per  $f \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \text{Unione delle definizioni di} \\ \text{Massimo Assoluto Forte} \\ \text{e} \\ \text{Minimo Assoluto Forte} \end{cases}$

■

**Esercizio 11.4**

Esibire esempi di funzioni con infiniti punti di massimo/minimo assoluti.

*Soluzione.*

$$f(x) = 1$$

$$f(x) = \sin(x)$$

■

**Esercizio 11.5**



Esibire esempi di funzioni con infiniti punti di massimo/minimo assoluti e prive di minimo/massimo assoluti.

*Nota.* Notare che son richiesti infiniti **punti** di massimo/minimo, come da [Osservazione 11.2](#).

*Soluzione.*

$f(x) = |\tan(x)|$  ha infiniti punti di minimo assoluto, ma ovviamente unico minimo assoluto  $\min f = 0$

$f(x, y) = -\sqrt{x^2 + y^2 - 1}$  ha dominio  $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > 1\}$ .  
La  $f$  ha infiniti punti di massimo assoluto in  $\partial U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ ,  
ma ovviamente unico massimo assoluto  $\max f = 0$



■

**Esercizio 11.6**

Formulare e dimostrare l'unicità del massimo/minimo assoluto.

*Nota.* Notare che è richiesta l'unicità del **massimo/minimo assoluto**, non dei punti di massimo/minimo. Si ricorda l'[Osservazione 11.2](#).

*Soluzione.* Per definizione,  $x = \max X$  se  $x = \sup X$  e  $x \in X$ . Se poi  $x = \sup X$ , allora  $x$  è per definizione il più piccolo dei maggioranti di  $X$ .

Il sup di un insieme è unico, si dimostra per assurdo:

*Dimostrazione.* Dati  $A \subseteq \mathbb{R}$  e  $B \subseteq A$ , si supponga esistano  $M_1, M_2 \in A$  con  $M_1 \neq M_2$ , due sup diversi di  $B$ . Applicando la definizione di maggiorante:

$$\forall x \in B, x \leq M_1 \quad \text{e} \quad \forall x \in B, x \leq M_2$$

Si può ora supporre che sia  $M_1 > M_2$  senza perdere generalità, però questo significa che  $M_1$  non sia sup, (non è il più piccolo dei maggioranti), negando l'ipotesi - *Assurdo*  $\square$

Per come è definito dunque, anche il max sarà unico, da cui la tesi.  $\blacksquare$

### Esercizio 11.7

In questa sezione compaiono esclusivamente funzioni a valori in  $\mathbb{R}$ . Perché?

*Soluzione.* Perché si stanno considerando i valori assunti dalla  $f$  come punti nello spazio (nella retta reale, essendo in  $\mathbb{R}$ ) e non esistono necessariamente relazioni d'ordine in altri insiemi. Non è possibile ad esempio stabilire se un punto punto sia "maggiore o minore" di un altro in  $\mathbb{R}^2$  o in  $\mathbb{C}$ .  $\blacksquare$

## 11.1 Condizioni Necessarie

### Proposizione 11.8

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  e  $v \in \mathbb{R}^n \setminus 0$ , allora

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ derivabile in } x_0 \text{ lungo } v \\ x_0 \text{ punto di estremo per } f \end{array} \right\} \implies D_v f(x_0) = 0$$

*Dimostrazione.* Se  $x_0$  è di estremo per  $f$ , allora, scelto un opportuno  $\delta > 0 \in \mathbb{R}$ ,  $x_0$  è di estremo anche per la funzione

$$\begin{array}{ccc} \varphi & : & ]-\delta, \delta[ \rightarrow \mathbb{R} \\ & & t \mapsto f(x_0 + tv) \end{array}$$

La  $\varphi$  è una funzione reale di variabile reale e derivabile in 0 perché  $f$  è derivabile per ipotesi. Ciò significa che è possibile applicare alla  $\varphi$  il *Teorema di Fermat* di Analisi 1, avendo la garanzia che in un punto estremante di questa funzione sia  $\varphi'(x_0) = 0$ .

Applicando ora la definizione di derivata di Analisi 1 si ottiene:

$$\varphi'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(t+h) - \varphi(t)}{h}$$

Se si calcola la derivata di  $\varphi$  nel punto 0 ( $\varphi(0) = f(x_0)$ , con  $x_0$  estremante per ipotesi) si ottiene:

$$\begin{aligned} 0 &= \varphi'(0) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(h) - \varphi(0)}{h} \end{aligned}$$

Ma, essendo  $\varphi(h) = f(x_0 + hv)$  e  $\varphi(0) = f(x_0)$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + hv) - f(x_0)}{h} \tag{11.8.1}$$

La Eq. (11.8.1) non è altro che la [Definizione 7.1 \(Derivata Direzionale e Parziale\)](#) di  $f$  in  $x_0$  lungo il vettore  $v$ , dunque si è giunti alla tesi.  $\square$

### Teorema 11.9 (di Fermat)

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$  e  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ , allora

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ Differenziabile in } x_0 \\ x_0 \text{ punto di estremo per } f \end{array} \right\} \implies \nabla f(x_0) = 0$$

*Dimostrazione.* Dalla [Proposizione 8.14](#), si sa che, se  $f$  è differenziabile, allora

$$\forall v \in \mathbb{R}^n \setminus 0 \quad D_v f(x_0) = Df(x_0)v$$

Quindi  $\forall v \in \mathbb{R}^n \setminus 0$  si può applicare la [Proposizione 11.8](#). Visto poi che la  $f$  è a valori in  $\mathbb{R}^1$ , da [Osservazione 8.8 \(Matrici Derivata Totale Particolari\)](#) si sa che  $Df(x_0) = \nabla f(x_0)$ , dunque la tesi:

$$0 = D_v f(x_0) = Df(x_0) = \nabla f(x_0)$$

□

**Definizione 11.10** (Punto Stazionario)

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$  e  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$

$$x_0 \text{ Punto Stazionario per } f \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} f \text{ Differenziabile in } x_0 \\ \nabla f(x_0) = 0 \end{cases}$$

**Nota.** Nella definizione si usa  $\nabla f$  in luogo di  $Df$  perché la  $f$  è a valori in  $\mathbb{R}$ , dunque come visto in [Osservazione 8.8 \(Matrici Derivata Totale Particolari\)](#)  $Df \in \text{Mat}(1 \times n)$ , cioè  $Df = \nabla f$  per definizione di gradiente.

**Osservazione 11.11**

Grazie al [Corollario 8.15](#), se  $f$  **Differenziabile** in  $x_0$ , per verificare che  $\nabla f(x_0) = 0$ , basta verificare che le **Derivate Parziali** siano tutte pari a 0.

**Esercizio 11.12**

Esibire un esempio di funzione che ammetta un punto stazionario non di estremo, cioè la tesi del [Teorema 11.9 \(di Fermat\)](#), ma che non verifichi le ipotesi.

*Soluzione.*  $f(x) = x^3$  ha un punto stazionario in  $x = 0$ , ma sicuramente non è minimo o massimo. ■

**Esercizio 11.13**

Esibire una funzione che ammetta un punto di estremo non stazionario

*Soluzione.* In  $x = 3$  la funzione

$$\begin{aligned} f &: ]0, 3] \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt{x} \end{aligned}$$

è differenziabile, ma  $\nabla f(3) = \frac{1}{2\sqrt{3}} \neq 0$ , dunque non è stazionario. ■

Nelle seguenti proposizioni verranno usate la [Definizione 9.4 \(Differenziale Seconda\)](#) e la notazione introdotta in Appendice nella [sezione A \(Forme Quadratiche\)](#). Si ricorda che  $D^2 f(x_0) = H_f(x_0)$  da [Definizione 9.5 \(Matrice Hessiana\)](#).

**Proposizione 11.14**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$  e  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ Differenziabile 2 volte in } x_0 \\ x_0 \text{ punto di massimo per } f \end{array} \right\} \implies \begin{cases} \nabla f(x_0) = 0 \\ D^2 f(x_0) = H_f(x_0) \text{ Semidefinita Negativa} \end{cases}$$

*Dimostrazione.* Essendo  $x_0$  punto di massimo per ipotesi, è certo che, per un  $h \in \mathbb{R}^n$  in intorno di 0:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \leq 0 \quad (11.14.1)$$

Posto  $x = x_0 + h$ , si ha che  $h = x - x_0$ , dunque dalla [Proposizione 9.20 \(Sviluppo di Taylor al Secondo Ordine con resto di Peano\)](#) si ha:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + Df(x_0)h + \frac{1}{2}h^T D^2 f(x_0)h + o(\|h\|^2) \\ f(x) - f(x_0) &= \nabla f(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^T D^2 f(x_0)(x - x_0) + o(\|(x - x_0)\|^2) \end{aligned}$$

Essendo però  $\nabla f(x_0) = 0$  per ipotesi

$$f(x) - f(x_0) = \frac{1}{2}(x - x_0)^T D^2 f(x_0)(x - x_0) + o\left(\|(x - x_0)\|^2\right)$$

Il termine di sinistra non è altro che il primo termine della Eq. (11.14.1), dunque

$$\frac{1}{2}(x - x_0)^T D^2 f(x_0)(x - x_0) + o\left(\|(x - x_0)\|^2\right) \leq 0$$

L'ordine piccolo può essere ignorato in quanto, per definizione, tende a zero più velocemente del resto della funzione

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(x - x_0)^T D^2 f(x_0)(x - x_0) &\leq 0 \\ (x - x_0)^T D^2 f(x_0)(x - x_0) &\leq 0 \end{aligned}$$

Da cui, per la [Definizione A.7](#), deriva che la  $D^2 f(x_0)$  è Semidefinita Negativa.  $\square$

### Proposizione 11.15

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$  e  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ Differenziabile 2 volte in } x_0 \\ x_0 \text{ punto di minimo per } f \end{array} \right\} \implies \left\{ \begin{array}{l} \nabla f(x_0) = 0 \\ D^2 f(x_0) = H_f(x_0) \text{ Semidefinita Positiva} \end{array} \right.$$

*Dimostrazione.* Applicare la [Proposizione 11.14](#) a  $-f$   $\square$

### Esercizio 11.16

Esibire una funzione soddisfacente alla tesi della [Proposizione 11.14](#), ma non alle ipotesi.

## 11.2 Condizioni Sufficienti

### Proposizione 11.17

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$  e  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ Differenziabile 2 volte in } x_0 \\ \nabla f(x_0) = 0 \\ D^2 f(x_0) = H_f(x_0) \text{ Definita Negativa} \end{array} \right\} \implies x_0 \text{ punto di Massimo Locale per } f$$

*Dimostrazione.* Per un  $h \in \mathbb{R}^n$  in intorno di 0 e posto  $x = x_0 + h$ , sfruttando la [Proposizione 9.20 \(Sviluppo di Taylor al Secondo Ordine con resto di Peano\)](#) si ha:

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) &= f(x_0) + Df(x_0)h + \frac{1}{2}h^T D^2 f(x_0)h + o\left(\|h\|^2\right) \\ f(x_0 + h) - f(x_0) &= \nabla f(x_0)h + \frac{1}{2}h^T D^2 f(x_0)h + o\left(\|h\|^2\right) \end{aligned}$$

Essendo però  $\nabla f(x_0) = 0$  per ipotesi

$$= \frac{1}{2} \underbrace{h^T D^2 f(x_0)h}_{(1)} + o\left(\|h\|^2\right)$$

La (1) è una forma quadratica del tipo  $q(h)$  con  $D^2 f(x_0)$  definita negativa per ipotesi. Dunque, applicando il [Corollario A.11](#) è possibile minorare con

$$\begin{aligned} &\leq -\frac{1}{2}m \|h\|^2 + o(\|h\|^2) \\ &= \underbrace{\left(-\frac{1}{2}m + o(1)\right)}_{\leq 0} \underbrace{\|h\|^2}_{\geq 0} \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

$\square$



**Corollario 11.18**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$  e  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ Differenziabile 2 volte in } x_0 \\ \nabla f(x_0) = 0 \\ D^2 f(x_0) = H_f(x_0) \text{ Definita Positiva} \end{array} \right\} \Rightarrow x_0 \text{ punto di Minimo Locale per } f$$

*Dimostrazione.* Analoga alla precedente applicando [Proposizione A.10](#). □

**Esercizio 11.19**

Applicare, quando possibile, le proposizioni di questa sezione e della precedente alle seguenti funzioni, tutte definite su  $\mathbb{R}^2$

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$f(x, y) = -x^2 + y^2$$

$$f(x, y) = x^4 + y^4$$

$$f(x, y) = -x^4 - y^4$$

$$f(x, y) = |x| + y^2$$

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

$$f(x, y) = -x^2 - y^2$$

$$f(x, y) = x^4 + y^3$$

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

$$f(x, y) = -x|x| - y^3$$

## 12 Massimi e Minimi Vincolati

Spesso la ricerca di punti di massimo o minimo di una funzione  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  deve essere ristretta ad un sottoinsieme  $B \subseteq A$  a causa di eventuali vincoli a cui le variabili indipendenti devono soddisfare. L'insieme  $B$  può essere generalmente descritto da una funzione  $\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}^p$ , nel senso che  $B = \{x \in A : \varphi(x) \leq 0\}$

NOTA::: direi  $n > 1$  poiché se ho una sola variabile e la vincolo ...??????? booooo .

Questo problema è usualmente abbreviato in:

$$\max_{\varphi \leq 0} \quad o \quad \min_{\varphi \leq 0}$$

può essere affrontato in due passi:

1. ricerca dei punti di estremo di  $f$  interni a  $B$ , problema già affrontato.
2. ricerca dei punti di estremo di  $f$  sul bordo di  $B$ , affrontiamo ora.

Sotto opportune condizioni su  $\varphi$ , infatti,  $\overset{\circ}{B} = \{x \in A : \varphi(x) < 0\}$  e  $\partial B = \{x \in A : \varphi(x) = 0\}$

### Proposizione 12.1

Teorema dei Moltiplicatori di Lagrange Siano  $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(x_0, y_0) \in \overset{\circ}{A}$ ,  $g(x_0, y_0) = 0$ ,  $f, g \in \mathbf{C}^1(A; \mathbb{R})$ ,  $\nabla g(x_0, y_0) \neq 0$

Se  $(x_0, y_0)$  è di max(o min) locale per  $f$  su  $g = 0 \Rightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}$  t.c.:  $\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0)$  (all fin fine posso dire che sono paralleli).

### Osservazione 12.2

$\lambda$  si chiama "moltiplicatore di lagrange"

### Osservazione 12.3

Se abbiamo un problema del tipo  $\max_{g(x,y)=0} f$  cioè il massimo di  $f$  sul vincolo  $g(x, y) = 0$ , ci dobbiamo ricondurre

$$\text{ad un sistema del tipo } \begin{cases} \nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0) \\ g(x_0, y_0) = 0 \end{cases} = \begin{cases} \partial_x f(x_0, y_0) = \lambda \partial_x g(x_0, y_0) \\ \partial_y f(x_0, y_0) = \lambda \partial_y g(x_0, y_0) \\ g(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

3 equazioni in 3 incognite  $(x, y, \lambda)$

In certi casi si introduce una funzione  $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$  detta Lagrangiana, i punti stazionari vincolati di  $f$  sono punti stazionari liberi della Lagrangiana.

*Dimostrazione.* Sappiamo che  $\nabla g(x_0, y_0) \neq 0$  quindi  $[\partial_x g(x_0, y_0) \quad \partial_y g(x_0, y_0)] \neq [0 \quad 0]$  quindi o  $\partial_x g(x_0, y_0) \neq 0$  o  $\partial_y g(x_0, y_0) \neq 0$ . Mettiamoci nel caso in cui  $\partial_y g(x_0, y_0) \neq 0$ ,

Per il teorema della funzione implicita ho che :

$\exists \mathcal{X}, \mathcal{Y}$  con  $x_0 \in \overset{\circ}{\mathcal{X}}, y_0 \in \overset{\circ}{\mathcal{Y}}, \exists \varphi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  t.c.:

$$g(x, y) = f(x_0, y_0), x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y} \iff y = \varphi(x)$$

Osserviamo che dire  $(x_0, y_0)$  di massimo o minimo per  $f$  ristretta a  $g(x, y) = 0 \iff x_0$  è di massimo o di minimo per la funzione  $x \rightarrow f(x, \varphi(x))$ .

Per il teorema di Fermat  $\left. \frac{d}{dx} (f(x, \varphi(x))) \right|_{x=x_0} = 0$ , punto stazionario ha derivata nulla, e la derivata di quella funzione in  $x_0$  è:

$$\partial_x f(x_0, \varphi(x_0)) + \partial_y f(x_0, \varphi(x_0)) \cdot \varphi'(x_0)$$

allora

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_x f(x_0, \varphi(x_0)) + \partial_y f(x_0, \varphi(x_0)) \cdot \varphi'(x_0) = \\ &= \partial_x f(x_0, \varphi(x_0)) - \partial_y f(x_0, \varphi(x_0)) \frac{\partial_x g(x_0, \varphi(x_0))}{\partial_y g(x_0, \varphi(x_0))} = \end{aligned}$$

$$= \partial_x f(x_0, \varphi(x_0)) \partial_y g(x_0, \varphi(x_0)) - \partial_y f(x_0, \varphi(x_0)) \partial_x g(x_0, \varphi(x_0)) = \det \begin{pmatrix} \partial_x f(x_0, y_0) & \partial_y f(x_0, y_0) \\ \partial_x g(x_0, y_0) & \partial_y g(x_0, y_0) \end{pmatrix} = 0$$

questo equivale a dire che i vettori riga della matrice sono paralleli quindi  $\exists \alpha \in \mathbb{R} : \nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0)$ . Non è uguale scrivere  $\exists \alpha \in \mathbb{R} : \nabla g(x_0, y_0) = \lambda \nabla f(x_0, y_0)$  poiché non c'è certezza sul valore di  $\nabla f(x_0, y_0)$  che se nullo negherebbe l'ipotesi di  $\nabla g(x_0, y_0) \neq 0$

Se guardiamo ora il caso in cui  $\partial_y g(x_0, y_0) = 0$  e  $\partial_x g(x_0, y_0) \neq 0$ .

Seguendo un ragionamento analogo si esplicita  $x = \psi(y)$  così che cercare max(o min) di  $f$  ristretta a  $g(x, y) = 0$  porti a  $y \rightarrow f(\psi(y), y)$   $\square$

#### Proposizione 12.4

Teorema dei Moltiplicatori di Lagrange caso generale Sia  $A \in \mathbb{R}^n$ ,  $f \in \mathbf{C}^1(A; \mathbb{R})$ ,  $g \in \mathbf{C}^1(A; \mathbb{R}^p)$  con  $p < n$  (n.vincoli < n.variabili), sia poi  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ ,  $g(x_0) = 0$ ,  $Dg(x_0, y_0)$  di rango  $p$ .

Se  $x_0$  è di max(o min) locale per  $f$  su  $g = 0 \Rightarrow \exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \text{ in } \mathbb{R} \text{ t.c: } \nabla f(x_0, y_0) = \sum_{i=1}^p \lambda_i \nabla g(x_0, y_0)$

## 13 Il Caso $n = 2, m = 1$

### 13.1 Il Significato Geometrico del Gradiente

Come detto in [Esercizio 11.7](#), tutte le funzioni tratte in questo capitolo sono a valori in  $\mathbb{R}$ , dunque si avrà  $Df = \nabla f \in \text{Mat}(1 \times n)$  da [Osservazione 8.8 \(Matrici Derivata Totale Particolari\)](#). In questo paragrafo si vedrà graficamente come il gradiente si comporta rispetto alla funzione.

**Proposizione 13.1** (Significato del Gradiente)

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in A$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  con  $f$  **Differenziabile** in  $x_0$ , allora:

$\nabla f(x_0)$  è un vettore **diretto** verso la direzione di **massima pendenza**, "verso l'alto."

*Dimostrazione.* Posto  $x = x_0 + h$ , applicando alla  $f$  il [Teorema 9.16 \(di Taylor\)](#) con il [Definizione 9.17 \(Resto di Peano\)](#) e fermandosi al primo ordine, si ottiene:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \nabla f(x_0)h + o(h) \quad \text{per } h \rightarrow 0 \quad (13.1.1)$$

Se  $x = x_0 + h$ , allora  $h = x - x_0 = \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix}$ , quindi

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix} + o\left(\begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix}\right) \quad \text{per } (x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$$

Il  $\cdot$  della precedente formula è un prodotto righe per colonne, però, essendo alla ricerca di un massimo, conviene considerarlo come un prodotto scalare tra due vettori. Il risultato del prodotto scalare è infatti un valore in  $\mathbb{R}$ , campo ordinabile. Dunque, posto  $\theta$  angolo tra i due vettori:

$$\|\nabla f(x_0, y_0)\| \left\| \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix} \right\| \cos(\theta)$$

Il  $\theta$  che massimizza questo prodotto è sicuramente 0, in quanto  $\cos(0) = 1$ .

$\nabla f$  dipende direttamente dalla  $f$ , dunque la sua direzione è data ed inalterabile. D'altro canto  $\begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix}$  è un vettore a scelta, dunque la sua direzione è variabile. È possibile allora modificare  $\theta$  modificando la direzione di quest'ultimo vettore finché non sarà parallelo al gradiente, portando  $\theta$  a 0.

Si è così dimostrato che l'incremento  $f(x_0 + h) - f(x_0)$  da Eq. (13.1.1) è massimo quando  $h$  ha la direzione del gradiente; dunque il gradiente deve avere direzione e verso del massimo incremento.  $\square$

### 13.2 Il Significato Geometrico del Gradiente n=2 m=1

**Definizione 13.2**

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}^2$  e  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$

La superficie  $z = f(x, y)$  è il grafico di  $f$ , è un sottoinsieme di  $\mathbb{R}^3$

Se  $c \in \mathbb{R}$ , la curva di livello  $c$  di  $f$  è l'insieme  $f^{-1}(c) = \{(x, y) \in A : f(x, y) = c\}$

Se  $f$  è differenziabile in  $(x_0, y_0) \in A$  il piano tangente alla superficie  $z = f(x, y)$  in  $(x_0, y_0)$  ha equazione:

$$z = f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix}$$

$$z = f(x_0, y_0) + \partial_x f(x_0, y_0)(x - x_0) + \partial_y f(x_0, y_0)(y - y_0)$$

**Osservazione 13.3**

geometricamente, il gradiente di una funzione indica la direzione di  $\mathbb{R}^n$  in cui si ha la massima variazione del valore di  $f$ , nel verso di incremento positivo di  $f$ ,

**Osservazione 13.4**

osservazione col grafico che al momento non faccio.

**Proposizione 13.5**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}^n, f: A \rightarrow \mathbb{R}$  differenziabile in  $(x_0, y_0) \in \overset{\circ}{A}$ , l'incremento di  $f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0)$  è massimo quando  $[hk] = \lambda \nabla f(x_0, y_0)$  con  $\lambda > 0$  ed è minimo con  $[hk] = \lambda \nabla f(x_0, y_0)$  con  $\lambda < 0$

*Dimostrazione.* so che posso approssimare la funzione quindi posso scrivere:

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} + o(\sqrt{h^2 + k^2}) = \|\nabla f(x_0, y_0)\| \| [hk] \| \cos(\theta) + o(\sqrt{h^2 + k^2})$$

dove  $\theta$  è l'angolo tra  $\nabla f(x_0, y_0)$  e  $[hk]$  per  $\| [hk] \|$  sufficientemente piccola, l'incremento  $f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0)$  è massimo se  $\cos(\theta) = 1$  ed è minimo se  $\cos(\theta) = -1$ , da cui la tesi.  $\square$

**Proposizione 13.6**

siano  $f \in \mathbf{C}^1(A; \mathbb{R})$  con  $A \subseteq \mathbb{R}^2$  e  $(x_0, y_0) \in \overset{\circ}{A}$  e  $\nabla f(x_0, y_0) \neq 0$  [cioè stazionario]. Allora  $\nabla f(x_0, y_0)$  è perpendicolare alla curva di livello passante per ....

**Osservazione 13.7**

un vettore  $\mathbf{v}$  è perpendicolare a una curva se è perpendicolare alla retta o al vettore tangente alla curva in quel punto.

*Dimostrazione.* La curva di livello è  $f(x, y) = f(x_0, y_0)$  cioè  $f(x, y) - f(x_0, y_0) = 0$ , per trovare la tangente a questa curva è più facile se si ha  $y = \varphi(x)$

Usiamo quindi il teorema della funzione implicita, mi serve che  $\partial_y f(x_0, y_0) \neq 0$ , questa condizione non è assicurata dalle ipotesi, per ipotesi il gradiente è non nulla quindi almeno una delle due componenti è non nulla.

Inizio con il caso  $\partial_y f(x_0, y_0) \neq 0$ .

Il T.F.IMPL. assicura che :

$\exists \mathcal{X}, \mathcal{Y}$  con  $x_0 \in \overset{\circ}{\mathcal{X}}, y_0 \in \overset{\circ}{\mathcal{Y}}, \exists \varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  t.c.:

$$f(x, y) = f(x_0, y_0), x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y} \iff y = \varphi(x)$$

La retta tangente in  $x_0$  a  $y = \varphi(x)$  è  $y = y_0 + \varphi'(x_0)(x - x_0)$

questo vuole dire che un vettore tangente a  $y = \varphi(x)$  in  $(x_0, y_0)$  è  $\begin{bmatrix} 1 \\ \varphi'(x_0) \end{bmatrix}$ .

... calcolo il prodotto scalare

$$\begin{aligned} \nabla f(x_0, y_0) \begin{bmatrix} 1 \\ \varphi'(x_0) \end{bmatrix} &= [\partial_x f(x_0, y_0) \quad \partial_y f(x_0, y_0)] \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{\partial_x f(x_0, y_0)}{\partial_y f(x_0, y_0)} \end{bmatrix} = \\ &= \partial_x f(x_0, y_0) - \partial_y f(x_0, y_0) \frac{\partial_x f(x_0, y_0)}{\partial_y f(x_0, y_0)} = 0 \end{aligned}$$

Allora il gradiente è perpendicolare alla curva di livello.

Guardiamo ora al caso in cui  $\partial_y f(x_0, y_0) = 0$  e  $\partial_x f(x_0, y_0) \neq 0$  quindi il gradiente è non nullo.

Applicando lo stesso ragionamento di sopra, solo esplicitando la  $x$  in funzione della  $y$ . Quindi  $x = \psi(y)$  e

$$\psi'(y_0) = -\frac{\partial_y f(x_0, y_0)}{\partial_x f(x_0, y_0)} \quad \square$$

## 14 Derivate e Integrali

**Proposizione 14.1** (Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale)

Sia  $I \subseteq \mathbb{R}$  un intervallo e sia  $x_0 \in I$ . Data  $f \in C^0(I; R)$  la funzione:

$$\begin{aligned} F : I &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow \int_{x_0}^x f(t) dt \end{aligned}$$

Si ha  $F \in \mathbf{C}^1(I; R)$  e  $F'(x) = f(x) \forall x \in I$

□

**Proposizione 14.2**

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  un aperto, data  $f \in \mathbf{C}^0(A \times \mathbb{R}; R)$  la funzione

$$\begin{aligned} F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times A &\rightarrow \mathbb{R} \\ (\alpha, \beta, x) &\rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) dt \end{aligned}$$

è di classe  $\mathbf{C}^0(R \times \mathbb{R} \times A; R)$

**Proposizione 14.3**

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  un aperto, data  $f \in \mathbf{C}^1(A \times \mathbb{R}; R)$  la funzione

$$\begin{aligned} F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times A &\rightarrow \mathbb{R} \\ (\alpha, \beta, x) &\rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) dt \end{aligned}$$

è di classe  $\mathbf{C}^1(R \times \mathbb{R} \times A; R)$  ed inoltre,  $\forall (\alpha, \beta, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times A$  e  $\forall i = 1, \dots, n$

$$\frac{\partial F}{\partial \alpha} = -f(x, \alpha)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \beta} = f(x, \beta)$$

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x, t) dt$$

$$\nabla F = \int_{\alpha}^{\beta} \nabla f(x, t) dt$$

**Corollario 14.4**

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  un aperto, date le funzioni  $\alpha : x \rightarrow \mathbb{R}, \beta : x \rightarrow \mathbb{R}, f : x \rightarrow \mathbb{R}$ , di classe  $\mathbf{C}^1$ , la funzione

$$\begin{aligned} F : A &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x) &\rightarrow \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, t) dt \end{aligned}$$

è di classe  $\mathbf{C}^1(R \times \mathbb{R} \times A; R)$  ed inoltre,  $\forall x_0 \in A$ :

$$\nabla F(x_0, y_0) = f(x_0, \beta) \nabla \beta(x_0) - f(x_0, \alpha) \nabla \alpha(x_0) + \int_{\alpha(x_0)}^{\beta(x_0)} \nabla f(x, t) dt$$

## 15 Funzioni a Valori in $\mathbb{C}$

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  non vuoto. Ogni funzione  $A \mapsto \mathbb{C}$  può essere identificata in modo naturale con una funzione  $A \mapsto \mathbb{R}^2$  e viceversa.

**Nota.** Quindi è possibile rappresentare una funzione  $A \mapsto \mathbb{C}$  in un piano, detto **piano complesso** o **piano di Gauss**

### Esercizio 15.1

Utilizzando questa identificazione, estendere al caso di funzioni  $A \mapsto \mathbb{C}$  le definizioni di continuità, derivabilità, differenziabilità e degli spazi  $\mathbf{C}^k$  date per funzioni  $A \mapsto \mathbb{R}$

### Proposizione 15.2

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}$  e sia  $t_0 \in A$ . Allora

- Se due funzioni  $f, g : A \mapsto \mathbb{C}$  sono differenziabili in  $t_0$ , anche le funzioni  $f + g$  e  $f \cdot g$  sono differenziabili in  $t_0$ . Inoltre

$$(f + g)'(t_0) = f'(t_0) + g'(t_0) \quad \text{e} \quad (f \cdot g)'(t_0) = f'(t_0)g(t_0) + f(t_0)g'(t_0)$$

- Per ogni  $\lambda \in \mathbb{C}$ , anche  $\lambda f$  è differenziabile e

$$(\lambda f)'(t_0) = \lambda f'(t_0)$$

- Se  $g(t_0) \neq 0$ , anche  $1/g$  e  $f/g$  sono differenziabili in  $t_0$  e

$$(1/g)'(t_0) = -\frac{g'(t_0)}{g^2(t_0)} \quad \text{e} \quad (f/g)'(t_0) = \frac{f'(t_0)g(t_0) - f(t_0)g'(t_0)}{g^2(t_0)}$$

*Dimostrazione.* Omessa

□

### Esercizio 15.3

Dimostrare la [Proposizione 15.2](#)

### Definizione 15.4 (Funzione Esponenziale con Esponente Complesso)

La Funzione Esponenziale con Esponente Complesso è così definita:

$$e^{x+iy} = e^x \cdot (\cos y + i \sin y)$$

### Proposizione 15.5

Qualunque sia  $\lambda \in \mathbb{C}$ ,

$$\frac{d}{dt} e^{\lambda t} = \lambda e^{\lambda t}$$

*Dimostrazione.* Omessa

□

### Esercizio 15.6

Dimostrare la [Proposizione 15.5](#), direttamente o attraverso l'[Esercizio 20.24](#)

### Esercizio 15.7

In questa sezione sulle funzioni a valori complessi non son stati considerati i problemi di massimo/minimo, perché?

*Soluzione.* Perché  $\mathbb{C}$  non è ordinato, dunque non è possibile trovare massimi o minimi. ■





## Capitolo 3

# Integrali Doppi

### Preliminari

Questo capitolo non è trattato in maniera approfondita poiché:

- a** tanti e lunghi teoremi fuori contesto per poter introdurre rigorosamente la teoria di Riemann
- b** tale teoria è "superata" da tempo

Il primo è più grosso problema di tale teoria è che non permette il passaggio del limite sotto il segno di integrale, cioè per poter scrivere

$$\int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n(x)$$

sono necessarie tante ipotesi molto restrittive.

Si è passati così alla teoria dell'integrale secondo Lebesgue, molto diversa e piuttosto complicata.

ESEMPIO.....


disegni.....

.....

Il concetto di integrale è quindi molto legato al concetto di area e anche di volume. La teoria di Lebesgue riparte da assiomi come questi definendoli e caratterizzandoli in modo da definire una volta per tutte in maniera sistematica e rigorosa cosa si può e cosa non si può integrare, e dove ha senso parlare di superfici. volumi, ipervolumi, ...

## 16 Regole di Calcolo

Queste formule permettono di ricondurre il calcolo di integrali doppi a quello di integrali semplici.



Se:

$a, b \in \mathbb{R}$  con  $a < b$

$\alpha, \beta \in \mathbf{C}^0([a, b]; \mathbb{R}), \forall x \in [a, b] \alpha(x) \leq \beta(x)$

$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b] \text{ e } y \in [\alpha(x), \beta(x)]\}$

$f \in \mathbf{C}^0(A; \mathbb{R})$

Allora

$$\iint_A f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \left( \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) \, dy \right) \, dx$$

Analogamente.

ALTRO GRAFICO....

Se:

$c, d \in \mathbb{R}$  con  $c < d$

$\gamma, \delta \in \mathbf{C}^0([c, d]; \mathbb{R}), \forall y \in [c, d] \gamma(y) \leq \delta(y)$

$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [c, d] \text{ e } x \in [\gamma(y), \delta(y)]\}$

$f \in \mathbf{C}^0(A; \mathbb{R})$

Allora

$$\iint_A f(x, y) \, dx \, dy = \int_c^d \left( \int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f(x, y) \, dx \right) \, dy$$

## 17 Cambiamento di Variabili

Se:

$$A \subseteq \mathbb{R}^2$$

$\Phi \in \mathbf{C}^1(A; \mathbb{R}^2)$   $\Phi$  è invertibile  $\Phi^{-1} \in \mathbf{C}^1(\Phi(A); \mathbb{R}^2)$

$\det(D\Phi) \neq 0$  su  $A$

$$f \in \mathbf{C}^0(\Phi(A); \mathbb{R})$$

Allora:

$$\iint_{\Phi(A)} f(x, y) \, dx \, dy = \iint_A ((f \circ \Phi)(u, v)) |\det(D\Phi(u, v))| \, du \, dv$$

La quantità  $\det(D\Phi)$  è spesso chiamato DETERMINANTE JACOBIANO (o semplicemente JACOBIANO) della trasformazione  $\Phi$

Adesso spieghiamo perché il determinante JACOBIANO, ricordando A1:

$$\int_g f(x) \, dx = \int_A f(g(t)) \, dt$$

vari casi

...

...

...



## Capitolo 4

# Successioni e Serie di Funzioni

### 18 Preliminari

#### Definizione 18.1

Sia  $f_n : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una successione ( $n \in \mathbb{N}$ ), la serie  $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$  indica la successione delle somme parziali

$$S_n = \sum_{i=0}^n f_i$$

#### Osservazione 18.2

Qualunque affermazione fatta in riferimento ad una serie va quindi intesa riferita alla successione delle somme parziali

- La serie è limitata  $\Leftrightarrow$  la successione delle somme parziali è limitata
- La serie è illimitata  $\Leftrightarrow$  la successione delle somme parziali è illimitata
- La serie è convergente  $\Leftrightarrow$  la successione delle somme parziali è convergente

#### Osservazione 18.3

Successioni e serie di funzioni possono essere viste:

1. come successioni e serie dipendenti da un parametro
2. come un mezzo per approssimare funzioni
3. come un primo passo verso lo studio di funzioni (a volte dette operatori o funzionali) che a funzioni associano o numeri o altre funzioni.

## 19 Tipi Di Convergenza

### 19.1 Convergenza Puntuale

#### Definizione 19.1

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}$  e  $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  una successione di funzioni definite su  $A$  a valori in  $\mathbb{R}$ . Sia  $B \subseteq A$

- la successione  $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  è puntualmente convergente su  $B$  se  $\forall x \in B$ , esiste finito il limite  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ . In tal caso la funzione  $f : B \rightarrow \mathbb{R}$  definito da  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$
- la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$  è puntualmente convergente su  $B$  se  $\forall x \in B$ , la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  ammette somma finita. In tal caso la funzione  $F : B \rightarrow \mathbb{R}$  definito da  $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  è la somma della serie la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$

#### Osservazione 19.2

La convergenza puntuale su  $A$  della successione  $f_n$  verso  $f$  è indicata con

$$f_n \xrightarrow{p} f \quad su A$$

#### Proposizione 19.3

METAPROPOSIZIONE:

Sia  $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $B \subseteq A$ ,  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : B \rightarrow \mathbb{R}$

Se  $f_n \xrightarrow{p} f$  su  $B$  e se  $f_n$  ha la proprietà  $P$  allora il limite  $f$  ha la proprietà  $P$ .


#### Esempio 19.4

$f_n(x) = \frac{1}{n} \sin(x)$  con  $A \equiv \mathbb{R}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sin(x) = 0 \quad \forall x \in A \Rightarrow f_n \xrightarrow{p} 0$  su  $A$ .

#### Esempio 19.5

$f_n(x) = e^{nx}$  con  $A \equiv \mathbb{R}$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{nx} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x = 0 \\ \infty & x > 0 \end{cases}$$


$$f_n \xrightarrow{p} f \quad su B = ]-\infty, 0]$$

**Osservazione 19.6**

La continuità non passa al limite come proprietà  $P$

**Esempio 19.7**

$f_n(x) = x^n$  con  $A \equiv \mathbb{R}$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} +\infty & x \in ]1, +\infty[ \\ 1 & x \in \{1\} \\ 0 & x \in ]-1, 1[ \\ \nexists & x \in ]-\infty, -1] \end{cases}$$

$$f_n \xrightarrow{p} f \quad \text{su } B = ]-1, 1]$$

**Proposizione 19.8**

PROPRIETÀ P: MONOTONIA

Sia  $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $B \subseteq A$ ,  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : B \rightarrow \mathbb{R}$

Se  $f_n \xrightarrow{p} f$  su  $B$  e se  $f_n$  è debolmente crescente su  $B$  allora il limite  $f$  è debolmente crescente su  $B$ .

*Dimostrazione.* Dire che  $f_n$  è debolmente crescente su  $B$  significa che

$$\forall x_1, x_2 \in B \quad x_1 \leq x_2 \Rightarrow f_n(x_1) \leq f_n(x_2)$$

se si fa tendere  $n \rightarrow \infty$  si ha che  $f(x_1) \leq f(x_2)$ , e questo nell'insieme  $B$  dove i limiti puntuali delle funzioni esistono per ipotesi  $\square$

**Osservazione 19.9**

Questo vale anche nel caso di funzioni debolmente decrescenti

**Osservazione 19.10**

se  $f_n$  è strettamente crescente/decrescente con le stesse ipotesi non possiamo concludere che il limite puntuale mantenga la stessa proprietà

**Esempio 19.11**

$x^n$  con  $x \in [0, 1[$  è strettamente crescente ma il limite puntuale è costante uguale a zero.

**Proposizione 19.12**

PROPRIETÀ P: NON NEGATIVA

Sia  $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $B \subseteq A$ ,  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : B \rightarrow \mathbb{R}$

Se  $f_n \xrightarrow{p} f$  su  $B$  e se  $f_n$  è non negativa,  $f_n \geq 0$ , su  $B$  allora il limite  $f$  è non negativo,  $f \geq 0$ , su  $B$ .

*Dimostrazione.* Sappiamo che  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \forall x \in B$ . Ma  $f_n$  è una successione di valori non negativi quindi il limite esiste ed è non negativo.  $\square$

### Osservazione 19.13

Questo vale anche nel caso di funzioni non positive

### Osservazione 19.14

Questa proposizione non può essere estesa al caso di funzioni strettamente positive/negative.

### Esempio 19.15

$-\frac{e^x}{n}$  con  $x \in [0, 1[$  è strettamente negativa ma il limite è costante uguale a zero.

### Proposizione 19.16

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}, B \subseteq A, \{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  una successione di funzioni definite su  $A$  con valori in  $\mathbb{R}$ . sia  $f : B \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione

$$f_n \xrightarrow{p} f \text{ su } B \text{ per } n \rightarrow \infty \iff \forall x \in B, \forall \epsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n > \nu \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon$$

*Dimostrazione.* direttamene dalla definizione...  $\square$

### Proposizione 19.17

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}, B \subseteq A, \{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  una successione di funzioni definite su  $A$  con valori in  $\mathbb{R}$ . Sia  $F : B \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n \xrightarrow{p} F \text{ su } B \text{ per } n \rightarrow \infty \iff \forall x \in B, \forall \epsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n > \nu \quad \left| \sum_{k=0}^{\infty} f_k(x) - F(x) \right| \leq \epsilon$$

*Dimostrazione.* direttamene dalla definizione...  $\square$

## 19.2 Convergenza Uniforme

### Definizione 19.18 (Convergenza Uniforme)

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}, B \subseteq A$  e  $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  una successione di funzioni definite su  $A$  a valori in  $\mathbb{R}$ .

- La **successione**  $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  è uniformemente convergente su  $B$  se esiste una funzione  $f : B \mapsto \mathbb{R}$  tale che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in B} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

La funzione  $f$  è il **limite uniforme della successione**  $f_n$

- La **serie**  $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$  è uniformemente convergente su  $B$  se esiste una funzione  $F : B \mapsto \mathbb{R}$  tale che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in B} \left| F(x) - \sum_{k=0}^n f_k(x) \right| = 0$$

la funzione  $F$  è il **limite uniforme della serie**  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$

La convergenza uniforme su  $B$  della successione  $f_n$  verso  $f$  è indicata con " $f_n \xrightarrow{u} f$  su  $B$ ".

### Osservazione 19.19

la convergenza uniforme equivale alla convergenza rispetto alla distanza  $d_{C^0}(f, g) = \sup_{x \in A} |g(x) - f(x)|$  ogniqualvolta questa distanza sia definita. La definizione di  $d_{C^0}(f, g)$  come *distanza* è dimostrata in [Esempio 1.7 \(Esempi di Metriche\)](#)

La  $d_{C^0}(f, g)$  può anche essere definita attraverso la **norma**  $\|k\|_{C^0} = \sup_{x \in A} |k|$  con  $k = f - g$  in quanto, in  $\mathbb{R}$  norma e valore assoluto coincidono.



**Proposizione 19.20****Esempio 19.21****Proposizione 19.22**

sia  $f_n : n \in \mathbb{N}$  con  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $f : B \subseteq A \rightarrow \mathbb{R}$

$f_n \xrightarrow{u} f$  su  $B$  per  $n \rightarrow \infty \iff \forall \epsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N}$  t.c.:  $\forall n > \nu, \forall x \in B$  vale che  $|f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon$

**Proposizione 19.23**

sia  $f_n : n \in \mathbb{N}$  con  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $F : B \subseteq A \rightarrow \mathbb{R}$

$\sum_{n=0}^{\infty} f_n \xrightarrow{u} F$  su  $B \iff \forall \epsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N}$  t.c.:  $\forall n > \nu, \forall x \in B$  vale che  $\left| F(x) - \sum_{k=0}^n f_k(x) \right| \leq \epsilon$

**Osservazione 19.24**

La differenza tra queste due proposizioni e le due proposizioni analoghe nel caso di convergenza puntuale giustifica il fatto che la continuità non passa al limite puntuale. Infatti qui  $\nu$  dipende solo dalla scelta di  $\epsilon$  e le  $x$  si guardano tutte insieme, prima invece  $\nu$  dipendeva oltre che alla  $\epsilon$  anche dalla  $x$  questo porta a osservare le  $x$  una alla volta.

**Proposizione 19.25**

Relazione tra convergenza uniforme e puntuale.

Sia  $f_n : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $f : B \subseteq A \rightarrow \mathbb{R}$

Se  $f_n \xrightarrow{u} f$  su  $B$  allora  $f_n \xrightarrow{p} f$  su  $B$ .

*Dimostrazione.* se  $f_n \xrightarrow{u} f$  su  $B$  allora vale che:  $\forall \epsilon, \exists \nu : \forall n > \nu, \forall x \in B$  vale  $|f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon$  in questo modo si trova un  $\nu$  che soddisfa la condizione  $\forall x \in B$  quindi  $\forall x \in B, \forall \epsilon, \exists \nu : \forall n > \nu$  vale  $|f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon$  quindi  $f_n \xrightarrow{p} f$  su  $B$   $\square$

**Proposizione 19.26**

Sia  $f_n : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $\bar{f}, f : B \subseteq A \rightarrow \mathbb{R}$

se  $f_n \xrightarrow{u} f$  su  $B$  e  $f_n \xrightarrow{u} \bar{f}$  su  $B$  allora  $f = \bar{f}$

*Dimostrazione.*  $f_n \xrightarrow{u} f$  e  $f_n \xrightarrow{u} \bar{f}$ , quindi è anche vero che  $f_n \xrightarrow{p} f$  e  $f_n \xrightarrow{p} \bar{f}$  ma il limite puntuale è unico poichè è il limite di una successione. Allora  $f = \bar{f}$   $\square$

**Esempio 19.27**

$f_n(x) = \frac{1}{n} \sin(x)$  con  $A \equiv \mathbb{R}$

Abbiamo già calcolato che  $f_n \xrightarrow{p} 0$  su  $A$ .

Sia ha anche convergenza uniforme :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{\mathbb{R}} |f_n(x) - 0| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{\mathbb{R}} \left| \frac{1}{n} \sin(x) \right|$$

Osservo che  $|\sin(x)| \leq 1$  quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{\mathbb{R}} \left| \frac{1}{n} \sin(x) \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Allora  $f_n \xrightarrow{u} f$  su  $A$

**Esempio 19.28**

$f_n(x) = \sin\left(\frac{1}{n}x\right)$  con  $A \equiv \mathbb{R}$  .....

.....

**Proposizione 19.29**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $\{f_n : A \rightarrow \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}\}$  una successione di funzioni e  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$

$f_n \xrightarrow{u} f$  su  $A$  e  $f_n \in \mathbf{C}^0(A; \mathbb{R}) \forall n \in \mathbb{N}$  allora  $f \in \mathbf{C}^0(A; \mathbb{R})$

*Dimostrazione.* DISEGNO

DISEGNO

DISEGNO

DISEGNO

GIURO CHE LA FARÒ (a distanza di tre anni non son sicurissimo che lo farò) □

### Esempio 19.30

$$f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} \text{ con } A \equiv \mathbb{R}$$

.....

.....

### Definizione 19.31

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $B \subseteq A$  e  $\{f_n : A \rightarrow \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}\}$  una successione di funzioni.

La successione  $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  soddisfa alla condizione di Cauchy per la convergenza uniforme su  $B \iff \forall \epsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n, m > \nu, \forall x \in B \text{ vale } |f_n(x) - f_m(x)| < \epsilon$

### Proposizione 19.32

(Una successione di Cauchy per la convergenza uniforme è uniformemente convergente).

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $B \subseteq A$  e  $\{f_n : A \rightarrow \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}\}$  una successione di funzioni.

La successione  $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  soddisfa alla condizione di Cauchy per la convergenza uniforme su  $B$  allora  $\exists$  una funzione  $f : B \rightarrow \mathbb{R}$  t.c.:  $f_n \xrightarrow{u} f$  su  $B$

*Dimostrazione.* La successione  $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  soddisfa alla condizione di Cauchy per la convergenza uniforme su  $B$  allora  $\forall x \in B$  la successione  $\{f_n(x) : n \in \mathbb{N}\}$  è di Cauchy in  $\mathbb{R}$  allora  $\forall x \in B$  la successione  $\{f_n(x) : n \in \mathbb{N}\}$  ha limite in  $\mathbb{R}$ . (cioè c'è il limite puntuale).

Sia  $f(x)$  questo limite,  $f$  è anche il limite uniforme della successione  $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ , infatti:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall h, k > \nu \forall x \in B \quad |f_h - f_k| < \epsilon$$

$$\sup_B |f_h(x) - f_k(x)|, \forall h, k > \nu$$

$$\Rightarrow |f_h(x) - f_k(x)| < \epsilon, \forall h, k > \nu, \forall x \in B$$

a questo punto si passa al limite e la disuguaglianza diventa debole.

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |f_h(x) - f_k(x)| \leq \epsilon, \forall h > \nu, \forall x \in B$$

$$\Rightarrow |f_h(x) - f(x)| \leq \epsilon, \forall h > \nu, \forall x \in B$$

$$\Rightarrow \sup_B |f_h - f| \leq \epsilon, \forall h > \nu$$

$$\Rightarrow f_n \xrightarrow{u} f \text{ su } B$$

□

### Proposizione 19.33

Sia  $A$  un compatto in  $\mathbb{R}$ . In  $\mathbf{C}^0(A; \mathbb{R})$  sia  $d_{\mathbf{C}^0} = \sup_A |g(x) - f(x)|$ . Allora  $(\mathbf{C}^0(A; \mathbb{R}); d_{\mathbf{C}^0})$  è uno spazio metrico completo.

*Dimostrazione.* prendo  $f_n \in \mathbf{C}^0(A; \mathbb{R})$  successione di Cauchy in  $\mathbf{C}^0(A; \mathbb{R})$   $f_n$  sono di Cauchy rispetto alla convergenza uniforme su  $A \Rightarrow f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$  e  $f_n \xrightarrow{u} f$  su  $A$  e  $f$  è continua

$$\Rightarrow (f \in \mathbf{C}^0(A; \mathbb{R}))$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f \text{ in } \mathbf{C}^0(A; \mathbb{R})$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d_{\infty}(f_n, f) = 0 \Rightarrow f_n \rightarrow f \in \mathbf{C}^0(A; \mathbb{R})$$

□

### Corollario 19.34

ESEMPIO:: In dimensione finita non vi è differenza tra "chiuso e limitato" e "compatto", in dimensione infinita cambiamo molte cose. Prendiamo un insieme chiuso e limitato ma non compatto.

In  $\mathbf{C}^0([0, 1]; \mathbb{R})$  con  $d_\infty(f, g) = \sup_{[0, 1]} |g(x) - f(x)|$ , prendiamo l'insieme  $C = B(0, 1) = \{f \in \mathbf{C}^0([0, 1]; \mathbb{R}) : |f(x)| \leq 1, \forall x \in [0, 1]\}$

1  $C$  è limitato: ha diametro finito.

2  $C$  è chiuso: contiene tutti i suoi punti di accumulazione

Se c'è una successione  $f_n \xrightarrow{u} f$  su  $[0, 1]$  allora voglio mostrare che  $f \in C$

Se  $f_n \xrightarrow{u} f$  su  $[0, 1]$  allora  $f_n \xrightarrow{p} f$  su  $[0, 1]$ . Sappiamo che  $\forall n \in \mathbb{N}$  e  $\forall x \in [0, 1]$  vale che  $-1 \leq f_n(x) \leq 1$ .

Mandando  $n$  al limite si ha che  $-1 \leq f(x) \leq 1$ .

Inoltre  $f$  è continua perché limite uniforme di una successione di funzioni continue allora  $f \in C$  poiché è una funzione continua compresa tra  $-1$  e  $1$

3  $C$  non è compatto, cioè esiste almeno una successione dalla quale non è possibile estrarre una sottosuccessione convergente nello stesso spazio.

Se ad esempio  $f_n(x) = x^n$

so che  $f_n \xrightarrow{p} f$  su  $[0, 1]$  e  $f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, 1] \\ 1 & x \in \{1\} \end{cases}$

Tutta la successione di funzioni  $f_n$  converge puntualmente a  $f$  quindi se estraggo una sottosuccessione comunque venga scelta questa sottosuccessione converge ancora a  $f$  puntualmente. Ma la  $f$  non è continua mentre il limite uniforme di funzioni continue è una funzione continua allora nessuna sottosuccessione ammette limite uniforme.

ESEMPIO:: OPERATORE DERIVATA 0

$D$

ESEMPIO:: OPERATORE DERIVATA 1

$D$

ESEMPIO:: OPERATORE INTEGRALE

$I$

### Proposizione 19.35

fissati  $a, b \in \mathbb{R}$  con  $a < b$  se la successione  $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  in  $\mathbf{C}^0([a, b], \mathbb{R})$   $\xrightarrow{u} f$  su  $[a, b]$

$f_n$  e  $f$  sono integrabili secondo Rimmmmmmmn allora la successione  $\left\{ \int_a^b f_n(x) dx : n \in \mathbb{N} \right\}$  converge a  $\int_a^b f(x) dx$

### Osservazione 19.36

La convergenza uniforme passa sotto il segno di integrale

$$\int_a^b \left( \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) (x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \int_a^b f_n(x) dx \right)$$

### Proposizione 19.37

convergono le derivate allora convergono le funzioni

Fissati  $a, b \in \mathbb{R}$  con  $a < b$ , si consideri una successione di funzioni  $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  con  $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

1.  $\forall n \in \mathbb{N}, f_n \in \mathbf{C}^1([a, b]; \mathbb{R})$
2.  $\exists x_0 \in [a, b] : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = l \in \mathbb{R}$
3.  $\exists g \in \mathbf{C}^0([a, b]; \mathbb{R}) : f'_n \xrightarrow{u} g$  su  $[a, b]$

Allora

1.  $\exists f \in \mathbf{C}^1([a, b]; \mathbb{R})$
2.  $f_n \xrightarrow{u} f$  su  $[a, b]$
3.  $f'(x) = g(x) \forall x \in [a, b]$

*Dimostrazione.* Per il teorema fondamentale del calcolo integrale

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt$$

per  $n \rightarrow \infty$

$$f(x) = l + \int_{x_0}^x g(t) dt$$

Quindi le  $f_n$  convergono puntualmente alla funzione  $f(x)$ , per la convergenza uniforme calcolo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{[a, b]} |f_n(x) - f(x)| \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} (|f_n(x_0) - f(x_0)| + \left| \int_{x_0}^x |f'_n(t) - g(t)| dt \right|) \leq$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[ |f_n(x_0) - f(x_0)| + |b - a| \sup_{[a, b]} |f'_n(x) - g(x)| \right] =$$

Questo perché per ipotesi  $f'_n = g$  e il limite fa 0. Allora  $f_n \xrightarrow{u} f$  su  $[a, b]$

Inoltre si sa che  $f_n \in \mathbf{C}^1$  allora  $f'_n \in \mathbf{C}^0$  allora il limite uniforme di funzioni continue è una funzione continua allora  $g$  è una funzione continua.

La  $f$  è l'integrale di una funzione continua allora la  $f$  è derivabile con derivata continua quindi  $f' = g$  □

#### Osservazione 19.38

Necessaria l'ipotesi  $f_n(x_0) \rightarrow l, \dots$

#### Osservazione 19.39

Serve  $[a, b]$  limitato  $\dots$

.....  
 .....

#### Corollario 19.40

Fissati  $a, b \in \mathbb{R}$  con  $a < b$ , si consideri una successione di funzioni  $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  con  $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

1.  $\forall n \in \mathbb{N}, f_n \in \mathbf{C}^1([a, b]; \mathbb{R})$
2.  $\exists x_0 \in [a, b] : \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x_0) = L \in \mathbb{R}$
3.  $\exists g \in \mathbf{C}^0([a, b]; \mathbb{R}) : \sum_{n=0}^{+\infty} f'_n \xrightarrow{u} g$  su  $[a, b]$

Allora

1.  $\exists f \in \mathbf{C}^1([a, b]; \mathbb{R})$
2.  $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n \xrightarrow{u} f$  su  $[a, b]$
3.  $f'(x) = g(x) \forall x \in [a, b]$

#### Osservazione 19.41

In altre parole questa proposizione afferma che sotto opportune ipotesi

$$\left( \sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} f'_n$$

**Definizione 19.42**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}$  e  $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  una successione di funzioni con  $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$

$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$  converge totalmente su  $A \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \sup_A |f_n(x)| < +\infty$  (è convergente)

**Osservazione 19.43**

la  $\sum_{n=0}^{+\infty} \sup_A |f_n(x)|$  è una serie numerica

**Proposizione 19.44**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}$  e  $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  una successione di funzioni con  $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$

$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$  converge totalmente su  $A \Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$  converge uniformemente su  $A$

*Dimostrazione.*  $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$  converge totalmente su  $A$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \sup_{x \in A} |f_n(x)| < +\infty$$

$$\Rightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n, m \in \mathbb{N} \text{ con } m > n > \nu \text{ vale } \sum_{n=0}^{+\infty} \sup_{x \in A} |f_n| < \epsilon$$

$$\Rightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n, m \in \mathbb{N} \text{ con } m > n > \nu \text{ vale } \sup_{x \in A} \sum_{n=0}^{+\infty} |f_n| < \epsilon$$

$$\Rightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n, m \in \mathbb{N} \text{ con } m > n > \nu \text{ vale } \sup_{x \in A} \left| \sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right| < \epsilon$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} f_n \text{ soddisfa la condizione di Cauchy per la convergenza uniforme su } A.$$

□

**Osservazione 19.45**

Per le serie:

Convergenza Totale  $\Rightarrow$  Convergenza Uniforme  $\Rightarrow$  Convergenza Puntuale.

**19.3 Convergenza Quadratica****Proposizione 19.46**

La definizione di  $d_2(f, g)$  come *distanza* è dimostrata in [Esempio 1.7 \(Esempi di Metriche\)](#)

**Proposizione 19.47**

## 20 Serie di Funzioni Particolari

Questa sezione è dedicata ad alcune tecniche di approssimazione basate su serie di funzioni particolari. In generale, un'approssimazione si riconduce ad una formula del tipo

$$[\text{quantità da calcolare}] = [\text{quantità approssimante}] + \text{errore}$$

La qualità dell'approssimazione è descritta dal senso in cui l'errore è piccolo.

### 20.1 Serie di Potenze

#### Definizione 20.1

Siano  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  una successione con  $a_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$  e  $z_0 \in \mathbb{C}$ .

Si dice serie di potenze centrata in  $z_0 \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$

#### Osservazione 20.2

è ovvio che in  $z = z_0$  si ha convergenza....???? (dire a zero)

#### Osservazione 20.3

Per semplicità verrà considerato il caso  $z_0 = 0$  ESEMPIO::  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \dots + \frac{1}{n!}x^n = e^x$  ESEMPIO::  $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1}{1-x}$

#### Proposizione 20.4

Siano  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  una successione in  $\mathbb{C}$  e  $w \in \mathbb{C}$ .

La serie di potenze  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$  converge in  $w$  (cioè  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n w^n$  converge) quando abbiamo la convergenza nella sfera aperta di centro l'origine e raggio  $|w|$

Allora  $\forall r$  con  $0 < r < |w|$ , la serie di potenze  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$  converge totalmente in  $B(0, r)$

*Dimostrazione.* TIKZPICTURE::::

devo dimostrare che  $\sum_{n=0}^{+\infty} \sup_{B(0, r)} |a_n z^n| < +\infty$ .

È facile vedere che  $a_n z^n = a_n w^n \left(\frac{z}{w}\right)^n$ .

Quindi passando al modulo e poi al sup si ottiene.

$$\sup_{B(0, r)} |a_n z^n| = \sup_{B(0, r)} |a_n w^n| \left| \frac{z}{w} \right|^n \leq$$

Siccome  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n w^n$  converge quindi il suo termine generale tende a 0.

$$\leq \sup_{B(0, r)} \left| \frac{z}{w} \right|^n \leq \left( \frac{r}{|w|} \right)^n$$

per ipotesi  $r < |w|$  e questo è il termine generale di una serie geometrica convergente.

Ne segue che  $\sum_{n=0}^{+\infty} \sup_{B(0, r)} |a_n z^n|$  è maggiorato da  $\left(\frac{r}{|w|}\right)^n$  e quindi la serie converge totalmente.  $\square$

#### Osservazione 20.5

Una volta che abbiamo la convergenza totale abbiamo anche quella uniforme.


#### Proposizione 20.6

la non convergenza in un punto implica la non convergenza fuori dal cerchio

Sia  $a_n : n \in \mathbb{N}$  una successione a valori in  $\mathbb{C}$

La serie  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$  non converge in  $w$

Allora  $\forall z \in \mathbb{C}$  con  $|z| > |w|$  la serie di potenze  $\sum_{n=0}^{+\infty}$  non converge in  $z$



*Dimostrazione.*

Se per assurdo la serie converge in  $z \Rightarrow$  per il teorema precedente avremmo convergenza in ogni sfera con raggio minore di  $|\frac{1}{z}|$ , e quindi anche in  $w$  questo nega l'ipotesi. ASSURDO.  $\square$

### Osservazione 20.7

Come è fatto l'insieme su cui si ha convergenza??

segue da queste due ultime proposizioni che se  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  è una successione in  $\mathbb{C}$  allora l'insieme  $\left\{z \in \mathbb{C} : \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \text{ converge} \right\}$  è un cerchio.

Sulla circonferenza non ci soffermiamo a capire cosa accade poiché tutto può accadere.

### Definizione 20.8

Raggio di convergenza della serie  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \Rightarrow \rho = \sup \left\{ r \geq 0 : \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \text{ converge su } B(0, r) \right\}$

### Osservazione 20.9

Il raggio di convergenza di una serie di potenze può essere 0, un numero reale positivo o  $+\infty$ .

### Osservazione 20.10

una definizione come  $\rho = \inf \left\{ r \geq 0 : \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \text{ non converge su } B(0, r) \right\}$  non sta in piedi poiché questo insieme potrebbe essere vuoto, mentre quello sopra non è mai vuoto, poiché  $r = 0$  c'è sempre poiché in 0 si ha sempre convergenza. Il secondo potrebbe essere vuoto perché ci sono serie che convergono su tutto il piano complesso e quindi non si avrebbe nessun  $r$  fuori da quale non si ha convergenza.

### Proposizione 20.11

CRITERIO DELLA RADICE.

Data la serie di potenze  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ , sia  $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ .

Se questo limite esiste, allora il raggio di convergenza è  $\rho = \begin{cases} 0 & \text{se } l = +\infty \\ \frac{1}{l} & \text{se } l \in ]0, +\infty[ \\ +\infty & \text{se } l = 0 \end{cases}$

### Proposizione 20.12

CRITERIO DEL RAPPORTO.

Data la serie di potenze  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ , sia  $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ .

Se questo limite esiste, allora il raggio di convergenza è  $\rho = \begin{cases} 0 & \text{se } l = +\infty \\ \frac{1}{l} & \text{se } l \in ]0, +\infty[ \\ +\infty & \text{se } l = 0 \end{cases}$  ESEMPIO:  $e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} z^n$

$$a_n = \frac{1}{n!} \dots \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \Rightarrow \rho = +\infty$$

$$\text{ESEMPIO}:: \sin(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} \text{ quindi } a_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ è pari} \\ \dots & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

...

...

...

$$\text{ESEMPIO}:: \sin(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} \text{ quindi } a_n = \begin{cases} \dots & \text{se } n \text{ è pari} \\ 0 & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

...

...

...

ESEMPIO::  $e^{iy}$  con  $y \in \mathbb{R}$ 

$$\begin{aligned} e^{iy} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} (iy)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n)!} (iy)^{2n} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)!} (iy)^{2n+1} = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (y)^{2n} + i \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (y)^{2n+1} = \cos(y) + i \sin(y) \end{aligned}$$

$$1. \ i^{2n} = (i^2)^n = (-1)^n$$

$$2. \ i^{2n+1} = i (i^2)^n = i(-1)^n$$

$$\text{ESEMPIO}:: e^{i\pi} + 1 = \cos(\pi) + i \cdot \sin(\pi) = 0$$

$$\text{ESEMPIO}:: \sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1-z} \text{ con } \rho = 1 \quad \text{ESEMPIO}:: \text{ Sia } f(x) = \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}$$

QUI GRAFICO .....

.....

Questa serie converge esclusivamente per  $|x| < 1$ , mentre la funzione  $f$  è definita su tutto  $\mathbb{R}$ ,  $f \in \mathbf{C}^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ In  $\mathbb{C}$ , la funzione  $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$  è la somma della serie  $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^{2n}$  che ha raggio di convergenza  $\rho = 1$ . Infatti, $f(z)$  è singolare sia in  $z = i$  sia in  $z = -i$ .

ALTRO GRAFICO:.....

.....

## 20.2 Serie di Taylor

ESEMPIO::  $\ln(1+z)$ . Calcolare la Serie di Taylor.

$$D[\ln(1+z)] = \frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^n$$

$$\int \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^n dz = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} z^{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n$$

### Lemma 20.13

Sia  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  una successione a valori in  $\mathbb{C}$ . Le serie:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n z^{n-1} \quad \text{e} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} z^{n+1}$$

hanno lo stesso raggio di convergenza



*Dimostrazione.* Omessa □

### Definizione 20.14

Sia  $r \in \mathbb{R}$  con  $r > 0$ . La funzione  $f$  si dice analitica su  $] -r, r[ \Leftrightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \quad \forall x \in ] -r, r[$  per opportuni  $a_n \in \mathbb{R}$

### Osservazione 20.15

In altre parole chiamiamo analitica una funzione che può essere scritta come somma di una serie di potenze convergente su  $] -r, r[$

ESEMPIO::  $x \rightarrow e^x$  è analitica su  $\mathbb{R}$

ESEMPIO::  $x \rightarrow \frac{1}{1+x^2}$  è analitica su  $] -1, 1[$

### Proposizione 20.16

Se  $f$  è analitica su  $] -r, r[$  per  $r \in \mathbb{R}$  e  $r > 0 \Rightarrow f \in \mathbf{C}^0(] -r, r[; \mathbb{R})$

*Dimostrazione.*  $f$  è analitica allora posso scriverla come  $f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  cioè la funzione è limite di una serie, se la serie converge totalmente allora converge uniformemente. Il limite uniforme di funzioni continue (in questo caso polinomi) è una funzione continua. cioè la  $f$  è continua. □

### Proposizione 20.17

PROP+PROOF

Sia  $f : ] -r, r[ \rightarrow \mathbb{R}$  e  $f$  analitica su  $] -r, r[ \Leftrightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \Rightarrow$  ho convergenza totale  $\Rightarrow$  ho convergenza uniforme di funzioni continue

$$\Rightarrow f \in \mathbf{C}^0(] -r, r[; \mathbb{R}), \quad a_0 = f(0)$$

La serie delle derivate  $\sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$  converge totalmente su  $] -r, r[$  cioè

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n-1} \xrightarrow{u} g$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(0) \rightarrow f(0), f_n \in \text{????????????}$$

Allora la serie delle derivate converge alla derivata della serie

$$\Rightarrow f \in \mathbf{C}^1(] -r, r[; \mathbb{R}), \quad a_1 = f'(0)$$

Questo ragionamento può essere ripetuto:

$$\Rightarrow \forall k \in \mathbb{N}, \quad f \in \mathbf{C}^k(] -r, r[; \mathbb{R}), \quad a_k = k! f^{(k)}(0)$$

e analogamente

$$f \in \mathbf{C}^\infty(] -r, r[; \mathbb{R}), \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(0) x^n$$

### Osservazione 20.18

Qui abbiamo detto se  $f$  è analitica  $\Rightarrow \dots$ , vorrei fare un qualche tipo di viceversa per poter capire se  $f$  è analitica o no.

### Proposizione 20.19

Sia  $f : ] -r, r[ \rightarrow \mathbb{R}$

$$\left. \begin{array}{l} f \in \mathbf{C}^\infty(]-r, r[; \mathbb{R}) \\ \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(0) x^n \text{ converge totalmente su } ]-r, r[ \end{array} \right\} \Rightarrow f \text{ è analitica } \dots$$

Per avere  $f$  analitica necessariamente come ipotesi deve esserci  $f \in \mathbf{C}^\infty$  e  $f$  che si può scrivere come sviluppo in serie di Taylor, dalla proposizione precedente. Questo basta? NO

ESEMPIO::  $f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \end{cases}$

1.  $f \in \mathbf{C}^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{R})$
2.  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(0) x^n$  converge totalmente su  $\mathbb{R}$
3.  $f(x) \neq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(0) x^n$

1. Vediamo se è  $\mathbf{C}^0$ , quindi calcolo  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 = f(0) \Rightarrow f \in \mathbf{C}^0(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ .

Ora calcoliamo la derivata fuori dallo zero, ne facciamo il limite per  $x \rightarrow 0$  da destra e da sinistra e vediamo cosa succede.

Se  $x \neq 0$ ,  $f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}$  e  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0 \Rightarrow f \in \mathbf{C}^1(\mathbb{R}; \mathbb{R})$

.....

ancora una derivata.....

.....

Continuando a derivare avremmo sempre un rapporto di polinomi che moltiplica un esponenziale, e l'esponenziale vince sempre. quindi fa 0. itero il ragionamento.....

.....

2. In (1) abbiamo visto che tutte le derivate nello zero si annullavano, cioè

$$\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(0) = 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(0) x^n$$

è la serie identicamente nulla che banalmente converge totalmente su tutto  $\mathbb{R}$

3. Anche osservando il grafico è chiaro che la  $f$  non è la funzione identicamente nulla cioè è diversa dal suo sviluppo in serie

$$f(x) \neq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(0) x^n$$

Il Problema nasce dall' $o(x^n)$  che scriviamo alla fine dello sviluppo n-esimo di questa funzione, perché l'intorno in cui si ha  $o(x^n)$  diventa sempre più piccolo. GRAFICO...

GRAFICO...

Mandando l'ordine  $n$  all'infinito, l'intervallo su cui si ha l'0 piccolo tende a diventare un punto (lo zero). Quindi abbiamo l'uguaglianza tra la funzione e il suo sviluppo solo nell'origine.???????NON COMPRESA????

???????NON COMPRESA????

???????NON COMPRESA????

???????NON COMPRESA????

Completiamo le ipotesi con la prossima proposizione:

**Proposizione 20.20**

Sia  $f : ]-r, r[ \rightarrow \mathbb{R}$

$$\left. \begin{array}{l} f \in \mathbf{C}^\infty(]-r, r[; \mathbb{R}) \\ \exists H, K > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \sup_{]-r, r[} |f^{(n)}(x)| \leq HK^n \end{array} \right\} \Rightarrow f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(0) x^n$$

**Osservazione 20.21**

L'ipotesi centrale ..... qui non c'è

**Osservazione 20.22**

Sia  $\sum_{n=0}^{+\infty} (z, w)^n$  una serie di potenze in due variabili.

Quando abbiamo due variabili, non si può parlare di raggio di convergenza. Questa serie è una serie geometrica che converge sse  $|zw| < 1$ . È difficile parlare di raggio di convergenza perché essendo  $z, w \in \mathbb{C}$ , se per una variabile servono due dimensioni per due variabili servono quattro dimensioni, e anche se non riusciamo a fare il disegno è evidente che l'insieme su cui la serie converge non è un cerchio(sfera).

**Esempio 20.23** (Esempi di Sviluppi in serie di Taylor)  $e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} x^n$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{(2n+1)}$$

$$\sinh(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)!} x^{(2n+1)}$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{(2n)}$$

$$\cosh(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{(2n)}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$$

$$\arctan(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{(2n+1)}$$

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^\lambda} = \begin{cases} \text{converge sse } \lambda > 1 \\ \text{diverge sse } \lambda \leq 1 \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \begin{cases} \text{converge sse } |q| < 1, S = \frac{1}{1-q} \\ \text{diverge sse } |q| > 1 \text{ o } q = 1 \\ \nexists \text{ sse } q = -1 \end{cases}$$

**Esercizio 20.24**

utilizzando l'Esempio 20.23 (Esempi di Sviluppi in serie di Taylor), il Lemma 20.13 ed il Corollario 19.40.

Determinare le derivate delle funzioni


### 20.3 Serie di Fourier

#### Definizione 20.25


Siano  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  e  $T > 0$ ,  $f$  è  $T$ -periodica  $\Leftrightarrow \forall x \in A \begin{cases} x + T \in A \\ f(x + T) = f(x) \end{cases}$

ESEMPIO::  $\lfloor x \rfloor = \text{parte intera} = \max \{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$

$$\lfloor \pi \rfloor = 3, \quad \lfloor \sqrt{2} \rfloor = 1 \quad \lfloor -e \rfloor = -3$$



è 1-periodica. ESEMPIO::  $\text{mant}(x) = \text{mantissa di } x = x - \lfloor x \rfloor$



è 1-periodica.

**Osservazione 20.26**

La funzione costante è  $T$ -periodica  $\forall T > 0$ , ma non ha un periodo minimo, per questo motivo non la consideriamo.

**Osservazione 20.27**

Sia  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$   $T$ -periodica. Allora possiamo definire  $\bar{f} : \bar{A} \rightarrow \mathbb{R}$  che sia  $2\pi$ -periodica data da:

$$x \rightarrow f\left(\frac{T}{2\pi}x\right), \quad \bar{A} = \frac{2\pi}{T}A$$

**Proposizione 20.28**

Siano  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  e  $T > 0$

$f$  è  $T$ -periodica  $\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}$ ,  $f$  è  $nT$ -periodica.

**Proposizione 20.29**

Sia  $f : [0, 2\pi[ \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow \exists! \hat{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  t.c.:  $\begin{cases} \hat{f} 2\pi\text{-periodica} \\ \hat{f}|_{[0, 2\pi]} = f \end{cases}$

*Dimostrazione.*  $\forall x \in \mathbb{R}. \exists! \hat{x} \in [0, 2\pi[$  t.c.:  $x = 2\pi \cdot k + \hat{x}$  con  $k \in \mathbb{Z}$  e  $k = [?????]$

$$\hat{f}(x) = f(\hat{x})$$

□

cioè se noi estendiamo una funzione definita su  $[0, 2\pi[$  a tutto  $\mathbb{R}$  otteniamo una funzione unica e periodica.

**Osservazione 20.30**

Con i polinomi di Taylor .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Definizione 20.31**

Dati  $2n+1$  numeri reali  $a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$  si dice polinomio trigonometrico di coefficienti  $a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$  la funzione:

$$\begin{aligned} p : [-\pi, \pi] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^N (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) \end{aligned}$$

**Osservazione 20.32**

Essendo un'approssimazione, si deve aggiungere l'errore. Come è fatto?. Per far uscire conti giusti e comodi andrebbe usata la distanza quadratica, ma questo prevede una lunga parte introduttiva, noi allora lo stimiamo con la distanza infinita.

**Definizione 20.33**

Date due successioni di numeri reali  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}, \{b_n : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$ , si definisce serie trigonometrica di coefficienti  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}, \{b_n : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$  la serie

$$\begin{aligned} \mathfrak{F} : [-\pi, \pi] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) \end{aligned}$$

LEMMA::

Se  $h, k \in \mathbb{N}$  valgono le seguenti uguaglianze:

$$* \int_{-\pi}^{\pi} \cos(hx)\cos(kx) = \begin{cases} 0 & h \neq k \\ \pi & 0 \neq h = k \\ 2\pi & 0 = h = k \end{cases}$$

$$* \int_{-\pi}^{\pi} \cos(hx)\sin(kx) = 0$$

$$* \int_{-\pi}^{\pi} \sin(hx)\sin(kx) = \begin{cases} 0 & h \neq k \text{ oppure } h = k = 0 \\ \pi & 0 \neq h = k \end{cases}$$

ESERCIZIO:: IL POLINOMIO DI FOURIER FORNISCE LA MIGLIORE APPROSSIMAZIONE NEL SENSO DELLA DISTANZA QUADRATICA.

Sia  $f : [-\pi, \pi] \mapsto \mathbb{R}$ , quale è la funzione a lei più vicina nel senso della distanza quadratica?

Fisso  $N \in \mathbb{N}$  e prendo il polinomio trigonometrico di grado  $N$

$$p_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

con  $a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ , il problema è quello di minimizzare  $d_2(f, p_n)$  quindi un problema di minimo.

Stiamo cercando i coefficienti del polinomio trigonometrico quindi studiamo una funzione  $\varphi(a_0, a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N) =$

$$\sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - p_n(x)]^2 dx}.$$

Essendo la funzione radice quadrata monotona crescente ne studiamo solo il radicando:

$$\varphi(a_0, a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N) = \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) - f(x) \right]^2 dx$$

### Osservazione 20.34

con  $f \in \mathbf{C}^1$ :

$$F(\alpha, \beta, x) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) dt$$

$$\partial_{\alpha} F(\alpha, \beta, x) = -f(x, \alpha)$$

$$\partial_{\beta} F(\alpha, \beta, x) = f(x, \beta)$$

$$\nabla_x F(\alpha, \beta, x) = \int_{\alpha}^{\beta} \nabla_x f(x, t) dt$$

Quindi applicando al nostro caso otteniamo

$$\begin{aligned} \partial_{a_0} \varphi &= \int_{-\pi}^{\pi} \partial_{a_0} \left( \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) - f(x) \right]^2 \right) dx = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} 2 \left( \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) - f(x) \right) dx = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} dx + \\ &\quad \int_{-\pi}^{\pi} a_1 \cos(x) dx + \dots + \int_{-\pi}^{\pi} a_N \cos(Nx) dx + \\ &\quad \int_{-\pi}^{\pi} b_1 \sin(x) dx + \dots + \int_{-\pi}^{\pi} b_N \sin(Nx) dx - \\ &\quad \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \end{aligned}$$

L'integrale di una sinusoide su un multiplo intero del periodo è 0 quindi

$$= \pi a_0 - \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

Calcolando direttamente anche le derivate seconde si ottiene che

$$\partial_{a_0 a_0}^2 = \pi \quad \partial_{a_0 a_n}^2 = 0 \quad \partial_{a_0 b_n}^2 = 0 \quad \forall n = 1, \dots, N$$

$$\begin{aligned} \partial_{a_k} \varphi &= \int_{-\pi}^{\pi} \partial_{a_k} \left( \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) - f(x) \right]^2 \right) dx = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} 2 \cos(kx) \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) - f(x) \right] dx = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \cancel{a_0 \cos(kx)} dx + \\ &\quad \int_{-\pi}^{\pi} \cancel{2a_1 \cos(x) \cos(kx)} dx + \dots + \int_{-\pi}^{\pi} 2a_k \cos(kx) \cos(kx) dx \dots + \int_{-\pi}^{\pi} \cancel{2a_N \cos(Nx) \cos(kx)} dx + \\ &\quad \int_{-\pi}^{\pi} \cancel{2b_1 \sin(x) \cos(kx)} dx + \dots + \int_{-\pi}^{\pi} \cancel{2b_k \sin(kx) \cos(kx)} dx \dots + \int_{-\pi}^{\pi} \cancel{2b_N \sin(Nx) \cos(kx)} dx - \\ &\quad \int_{-\pi}^{\pi} 2f(x) \cos(kx) dx = \end{aligned}$$

E anche applicando il lemma

$$= 2\pi \left[ a_k - \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx \right]$$

Calcolando direttamente anche le derivate seconde si ottiene che

$$\partial_{a_k a_0}^2 = \pi \quad \partial_{a_k a_n}^2 = \begin{cases} 0 & n \neq k \\ 2\pi & n = k \end{cases} \quad \partial_{a_k b_n}^2 = 0 \quad \forall n = 1, \dots, N$$

$$\begin{aligned} \partial_{b_k} \varphi &= \int_{-\pi}^{\pi} \partial_{b_k} \left( \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) - f(x) \right]^2 \right) dx = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} 2 \sin(kx) \left[ \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) - f(x) \right] dx = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \cancel{a_0 \sin(kx)} dx + \\ &\quad \int_{-\pi}^{\pi} \cancel{2a_1 \cos(x) \sin(kx)} dx + \dots + \int_{-\pi}^{\pi} \cancel{2a_k \cos(kx) \sin(kx)} dx \dots + \int_{-\pi}^{\pi} \cancel{2a_N \cos(Nx) \sin(kx)} dx + \\ &\quad \int_{-\pi}^{\pi} \cancel{2b_1 \sin(x) \sin(kx)} dx + \dots + \int_{-\pi}^{\pi} 2b_k \sin(kx) \sin(kx) dx \dots + \int_{-\pi}^{\pi} \cancel{2b_N \sin(Nx) \sin(kx)} dx - \\ &\quad \int_{-\pi}^{\pi} 2f(x) \sin(kx) dx = \end{aligned}$$

E anche applicando il lemma

$$= 2\pi \left[ b_k - \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx \right]$$

Calcolando direttamente anche le derivate seconde si ottiene che

$$\partial_{b_k a_0}^2 = \pi \quad \partial_{b_k a_n}^2 = \begin{cases} 0 & n \neq k \\ 2\pi & n = k \end{cases} \quad \partial_{b_k b_n}^2 = 0 \quad \forall n = 1, \dots, N$$

Si verifica la condizione  $\nabla \varphi = 0$  con

$$* a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$* a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx$$

$$* b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx$$

La matrice Hessiana di  $\varphi$  risulta

$$H_\varphi = \begin{bmatrix} \pi & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 2\pi & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2\pi & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 \dots & 2\pi \end{bmatrix}$$

è una matrice diagonale quindi si leggono direttamente tutti gli autovalori che sono strettamente positivi quindi la forma quadratica è definita positiva ed il punto in questione è un punto di minimo assoluto.

### Definizione 20.35

Sia  $f : [-\pi, \pi] \mapsto \mathbb{R}$ , i coefficienti di Fourier di  $f$  sono (ovviamente  $f$  deve essere tale da ammetterli finiti):

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx \quad k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx \quad k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

La serie di Fourier di  $f$  è

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)$$

### Proposizione 20.36

Sia  $F : [-\pi, \pi] \mapsto \mathbb{R}$  la somma della serie trigono metrica definita dai coefficienti  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  e  $\{a_n : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$  e la serie trigonometrica converge uniformemente allora  $F$  è una funzione continua e

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos(kx) dx \quad k \in \mathbb{N}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \sin(kx) dx \quad k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

ESEMPIO+DIMOSTRAZIONE:::

sia  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$ . Allora:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) dx = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left( \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(nx) \right) dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left( \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(nx) \right) dx \end{aligned}$$



Poiché si ha convergenza uniforme si può portare l'integrale dentro la sommatoria.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \int_{-\pi}^{\pi} \cancel{a_n \cos(nx) dx} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \int_{-\pi}^{\pi} \cancel{b_n \cos(nx) dx} = \\
 &= \frac{1}{\pi} \frac{a_0}{2} (\pi - (-\pi)) = a_0 \\
 a_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx = \\
 \frac{1}{\pi} &\left[ \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} \cancel{\cos(kx) dx} + \int_{-\pi}^{\pi} \left( \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(nx) \cos(kx) \right) dx + \int_{-\pi}^{\pi} \left( \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(nx) \cos(kx) \right) dx \right] = \\
 \frac{1}{\pi} &\left[ \int_{-\pi}^{\pi} \left( \sum_{n=1}^{k-1} \cancel{a_n \cos(nx) \cos(kx) dx} \right) + \int_{-\pi}^{\pi} a_k \cos(kx) \cos(kx) dx + \int_{-\pi}^{\pi} \left( \sum_{n=k+1}^{+\infty} \cancel{a_n \cos(nx) \cos(kx) dx} \right) \right] = \\
 &= \frac{1}{\pi} \pi a_k = a_k \\
 b_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx = \\
 \frac{1}{\pi} &\left[ \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} \cancel{\sin(kx) dx} + \int_{-\pi}^{\pi} \left( \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(nx) \sin(kx) \right) dx + \int_{-\pi}^{\pi} \left( \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(nx) \sin(kx) \right) dx \right] = \\
 \frac{1}{\pi} &\left[ \int_{-\pi}^{\pi} \left( \sum_{n=1}^{k-1} \cancel{a_n \cos(nx) \sin(kx) dx} \right) + \int_{-\pi}^{\pi} a_k \cos(kx) \sin(kx) dx + \int_{-\pi}^{\pi} \left( \sum_{n=k+1}^{+\infty} \cancel{a_n \cos(nx) \sin(kx) dx} \right) \right] = \\
 &= \frac{1}{\pi} \pi b_k = b_k
 \end{aligned}$$

### Osservazione 20.37


Se  $d_2(f, \text{polinomio di Fourier})$  è minima  $\Rightarrow$  il polinomio di Fourier è costruito con i coefficienti di Fourier di  $f$ .

### Osservazione 20.38

Se  $f$  è somma di una serie di funzioni  $\Rightarrow$  i coefficienti della serie sono i coefficienti di Fourier.

### Osservazione 20.39

Funzioni diverse possono avere gli stessi coefficienti di Fourier, cioè  $\exists f, g$  con  $f \neq g$  ma  $f$  e  $g$  hanno gli stessi coefficienti di Fourier. ESEMPIO::



### Osservazione 20.40

I coefficienti di Fourier non possono identificare univocamente puntualmente una funzione.

**Punto Di Vista Geometrico**

In  $R^2$  Ci sono 2 vettori  $\hat{i}, \hat{j}$  della base, se  $\underline{v} \in \mathbb{R}^2 \Rightarrow \underline{v} = v_1 \cdot \hat{i} + v_2 \cdot \hat{j}$  con  $v_1, v_2$  componenti di  $\underline{v}$   
Calcolo delle componenti:

$$\begin{aligned}\underline{v} \cdot \hat{i} &= v_1 \cdot \hat{i} \cdot \hat{i} + v_2 \cdot \hat{j} \cdot \hat{i} = v_1 \\ \underline{v} \cdot \hat{j} &= v_1 \cdot \hat{i} \cdot \hat{j} + v_2 \cdot \hat{j} \cdot \hat{j} = v_2\end{aligned}$$

Questo vale perché  $\hat{i}, \hat{j}$  è una base ortonormale. In  $R^3$  Ci sono 3 vettori  $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$  della base, se  $\underline{v} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \underline{v} = v_1 \hat{i} + v_2 \hat{j} + v_3 \hat{k}$  con  $v_1, v_2, v_3$  componenti di  $\underline{v}$

Calcolo delle componenti:

$$v_1 = \underline{v} \cdot \hat{i} \quad v_2 = \underline{v} \cdot \hat{j} \quad v_3 = \underline{v} \cdot \hat{k}$$

In  $R^n$  Ci sono  $n$  vettori  $e_1, e_2, \dots, e_n$  della base, se  $\underline{v} \in \mathbb{R}^n \Rightarrow \underline{v} = v_1 \cdot e_1 + v_2 \cdot e_2 + \dots + v_n \cdot e_n = \sum_{k=1}^n v_k \cdot e_k$  con  $v_1, v_2, \dots, v_n$  componenti di  $\underline{v}$

Calcolo delle componenti:

$$v_k = \underline{v} \cdot e_k$$

Con le Serie di Fourier si esegue la stessa operazione sullo spazi  $\mathbf{C}^0([-\pi, \pi]; \mathbb{R})$ . Come elementi di base si ha un insieme di funzioni:

1.  $c_0 : x \rightarrow 1$
2.  $c_1 : x \rightarrow \cos(x)$
3.  $c_2 : x \rightarrow \cos(2x)$
4.  $\dots$
5.  $c_n : x \rightarrow \cos(nx)$
6.  $s_1 : x \rightarrow \sin(x)$
7.  $s_2 : x \rightarrow \sin(2x)$
8.  $\dots$
9.  $s_n : x \rightarrow \sin(nx)$

Si possono osservare due cose:

1. Sono tutte funzioni linearmente indipendenti, poiché l'unica combinazione lineare di questi elementi che da l'elemento nullo è quella a coefficienti tutti nulli.

**Definizione 20.41**

Il prodotto scalare in  $\mathbf{C}^0 \Rightarrow \langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx$  Altre simbologie usate sono:  $f \bullet g, (f|g)$

**Osservazione 20.42**

linearità

$$\begin{aligned}\langle (\alpha \cdot f + \beta \cdot g), h \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} (\alpha \cdot f(x) + \beta \cdot g(x)) \cdot h(x) dx = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} [\alpha \cdot f(x) \cdot h(x) + \beta \cdot g(x) \cdot h(x)] dx = \\ &= \alpha \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot h(x) dx + \beta \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \cdot h(x) dx = \\ &\quad \alpha \langle f, h \rangle + \beta \langle g, h \rangle\end{aligned}$$

Ripetiamo lo stesso ragionamento applicato in  $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ , e  $\mathbb{R}^n$  per ricavare le componenti, possiamo fare questo perché abbiamo una base e abbiamo definito un prodotto scalare.

Se  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) \Rightarrow$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \langle f, c_0 \rangle$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx = \frac{1}{\pi} \langle f, c_k \rangle$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx = \frac{1}{\pi} \langle f, s_k \rangle$$

Quindi come prima le componenti di un vettore si ottengono moltiplicando (prodotto scalare) il vettore per gli elementi della base.

PER IL LEMMA:

$$\langle c_h, c_k \rangle = \begin{cases} 0 & h \neq k \\ 2\pi & 0 = h = k \\ \pi & 0 \neq h = k \end{cases}$$

$$\langle c_h, s_k \rangle = 0$$

$$\langle s_h, s_k \rangle = \begin{cases} 0 & h \neq k \\ \pi & 0 \neq h = k \end{cases}$$

Il prodotto scalare di elementi diversi è nullo quindi la base è ortogonale, ma non è ortonormale in quanto il prodotto scalare tra due elementi diversi della base non è unitario. (ecco perché gli  $\frac{1}{\pi}$  e  $\frac{a_0}{2}$ )

In generale in geometria non è difficile normalizzare una base, è sufficiente dividere tutti gli elementi per la loro norma. In questo caso decidiamo di non applicare questo ragionamento poiché la norma vale  $\sqrt{\pi}$  e se normalizziamo dobbiamo aggiungere questi termini .....

Il prodotto scalare in  $\mathbf{C}^0$  è molto legato alla  $d_2$  infatti:

$$\|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot f(x) dx} = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx}$$

Continuano le analogie:

In  $\mathbb{R}^2$  .....

In  $\mathbb{R}^3$  .....

.....

.....

.....

.....

Passando in dimensione infinita, abbiamo una funzione  $f$  (come vettore  $\underline{v}$ ) nello spazio, e fare il polinomio di Fourier vuole dire proiettare la funzione  $f$  in uno spazio fatto dai primi  $2n+1$  elementi della base che è uno spazio di dimensione finita.

Esempio::: Non ogni funzione ammette coefficienti di Fourier finiti. La funzione

$$f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow \begin{cases} 0 & x = 0 \\ \frac{1}{x^2} & x \neq 0 \end{cases}$$

non ammette coefficienti di Fourier finiti.

Esempio::: Una funzione può ammettere tutti i coefficienti di Fourier finiti ed una serie di Fourier convergente, ma ad un limite diverso da  $f$ . La funzione.

$$f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

ha coefficienti di Fourier

$$a_k = 0 \quad \forall k, \quad \begin{cases} 0 & k \text{ dispari} \\ \frac{4}{k\pi} & k \text{ pari} \end{cases}$$

e serie di Fourier

$$F_f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\sin(2h+1)x}{2h+1}$$

questa serie converge puntualmente in 0 ma  $F_f(0) \neq f(0)$

ESEMPIO:: Due funzioni diverse possono avere gli stessi coefficienti di Fourier:

$$\begin{aligned} f: [-\pi, \pi] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases} \\ g: [-\pi, \pi] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow \begin{cases} -1 & x < 0 \\ \pi & x = 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

#### Osservazione 20.43

Sia  $f$  una funzione pari  $\Rightarrow bn = 0 \forall n = 1, 2, \dots, +\infty$

#### Osservazione 20.44

Sia  $f$  una funzione dispari  $\Rightarrow an = 0 \forall n = 0, 1, \dots, +\infty$

#### Osservazione 20.45

Siano

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) \\ \varphi(x) &= \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (\alpha_n \cos(nx) + \beta_n \sin(nx)) \end{aligned}$$

Allora

$$F(x) = (f + \varphi)(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (A_n \cos(nx) + B_n \sin(nx))$$

con  $A_n = a_n + \alpha_n$ ,  $B_n = b_n + \beta_n$ . cioè i coefficienti di Fourier dipendono linearmente dalla funzione.

Esempio::  $B_3 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \sin(3x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) + \varphi(x)) \sin(3x) dx =$

$$\frac{1}{\pi} \left[ \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(3x) dx + \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) \sin(3x) dx \right] = b_3 + \beta_3$$

Sia  $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum \liminf_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \cos(nx))$  allora  $F = 4f = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (A_n \cos(nx) + B_n \cos(nx))$  con

$$A_n = 4a_n, B_n = 4b_n$$

ESEMPIO Esempio::  $B_3 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \sin(3x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 4f(x) \sin(3x) dx = 4b_3$

#### Definizione 20.46 (Funzione Continua a Tratti)

Siano  $a, b \in \mathbb{R}$  con  $a < b$ , una funzione  $f: [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ . Allora  $f$  è **continua a tratti** se esiste un numero finito di punti  $x_1, x_2, \dots, x_n$  tali che:

1. In ogni punto di  $[a, b] \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$   $f$  è continua
2.  $i = 1, 2, \dots, n$  esistono finiti entrambi i limiti:

$$\lim_{x \rightarrow x_i^-} f(x) \quad \lim_{x \rightarrow x_i^+} f(x)$$

**Osservazione 20.47**

Dato  $A \subseteq \mathbb{R}$  e data una funzione  $f : A \mapsto \mathbb{R}$ , se  $x_0$  è punto interno ad  $A$ , è comoda la notazione

$$f(x-) = \lim_{\xi \rightarrow x-} f(\xi) \quad f(x+) = \lim_{\xi \rightarrow x+} f(\xi)$$

Ovviamente se  $f$  è continua in  $x$  allora  $f(x-) = f(x) = f(x+)$  ESEMPIO:::

GRAFICO:::

GRAFICO:::

.....

.....

.....

.....

**Proposizione 20.48**

Sia  $f : [-\pi, \pi] \mapsto \mathbb{R}$ ,  $f$  è continua a tratti  $\Rightarrow$  esistono finiti tutti i coefficienti di Fourier di  $f$

**Proposizione 20.49**

Sia  $f : [-\pi, \pi] \mapsto \mathbb{R}$ ,

-  $f$  è continua a tratti

-  $\forall \bar{x} \in [-\pi, \pi]$ , esistono finiti:

$$\lim_{x \rightarrow \bar{x}-} = \frac{f(x) - f(\bar{x}-)}{x - \bar{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \bar{x}+} = \frac{f(x) - f(\bar{x}+)}{x - \bar{x}}$$

Allora:

La serie di Fourier di  $f$  converge puntualmente in  $\bar{x}$  e  $F_f(\bar{x}) = \frac{f(\bar{x}-) + f(\bar{x}+)}{2}$  (che è il punto medio del salto.)

**Osservazione 20.50**

NIENTE CUSPIDI E NIENTE TANGENZE VERTICALI.

**Corollario 20.51**

Sia  $f : [-\pi, \pi] \mapsto \mathbb{R}$ ,

$f$  è continua a tratti.

Sia  $\bar{x} \in [-\pi, \pi]$  un punto in cui  $f$  è derivabile. Allora la serie di Fourier  $F_f$  di  $f$  converge in  $\bar{x}$  e  $F_f(\bar{x}) = f(\bar{x})$

**Proposizione 20.52**

Sia  $f : [-\pi, \pi] \mapsto \mathbb{R}$ . Se:

\*  $f \in \mathbf{C}^0([-\pi, \pi]; \mathbb{R})$

\*  $\exists x_1, x_2, \dots, x_n \in [-\pi, \pi]$  t.c.:

- $f$  è derivabile in  $x$
- $f'$  continua in  $x$

\*  $\forall i = 1, 2, \dots, n$  e  $\forall x \in [-\pi, \pi]$  esistono finiti

$$\lim_{x \rightarrow x_i-} \frac{f(x) - f(x_i-)}{x - x_i} \quad \lim_{x \rightarrow x_i+} \frac{f(x) - f(x_i+)}{x - x_i}$$

Allora

La serie di Fourier  $F_f$  di  $f$  converge a  $f$  uniformemente su  $[-\pi, \pi]$

**Corollario 20.53**

Sia  $f : [-\pi, \pi] \mapsto \mathbb{R}$ , e  $f \in \mathbf{C}^1([-\pi, \pi]; \mathbb{R})$ .

Allora la serie di Fourier di  $F_f$  di  $f$  converge uniformemente a  $f$  su  $[-\pi, \pi]$ .



## Capitolo 5

# Equazioni Differenziali

### 21 Preliminari

Equazione è un'uguaglianza in cui c'è almeno una incognita.

Equazione **Funzionale** è un'equazione le cui incognite sono funzioni.

**Nota.** In un'equazione funzionale si cerca l'uguaglianza di: insieme di arrivo, insieme di partenza, corrispondenza.

Equazione **Differenziale** è un particolare tipo di equazione (funzionale) che stabilisce una relazione tra la funzione incognita e le sue derivate.

**Definizione 21.1** (Equazione Differenziale Ordinaria)

Si dice **Equazione Differenziale Ordinaria** (*Ordinary Differential Equation, ODE*) di **ordine**  $n$  nella funzione incognita  $x \in \mathbb{R}^k$  un'espressione del tipo:

$$f(t, x, x', \dots, x^{(n)}) = 0 \quad (21.1.1)$$

**Nota.** La dipendenza delle  $x$  dalla  $t$  non è indicata esplicitamente, ma si potrebbe scrivere  $x(t)$ , rigorosamente nella stessa variabile  $t$  per tutte le  $x^{(i)}$ .

Nella Eq. (21.1.1):

- $A \subseteq \mathbb{R}^{1+(1+n)k}$
- $t \in I$  con  $I$  intervallo  $I \subseteq \mathbb{R}$
- $f : A \mapsto \mathbb{R}^m$

Dimensionalmente, si può osservare che  $m$  e  $k$  caratterizzano il problema e sono dunque libere. La dimensione di partenza  $1 + (1 + n)k$  del problema è obbligata e dovuta alla somma di:

- $1 = \dim(t)$
- $(1 + n)k$ 
  - $(1 + n)$  il numero totale delle funzioni:  $n$  derivate ed  $x$  stessa
  - $k$  la dimensione dell'insieme **di arrivo** di ogni funzione incognita  $x^{(i)}$

**Nota.** Alternativamente si può indicare  $f$  come  $f : I \times A \mapsto \mathbb{R}^m$  a patto di considerare  $A \subseteq \mathbb{R}^{(1+n)k}$

**Soluzione** di questa equazione differenziale è una qualunque funzione  $x : I \rightarrow \mathbb{R}^k$  (in quanto la  $x$  è funzione di  $t \in I$ ) definita sull'intervallo  $I$ , derivabile  $n$  volte in  $I$  (e dunque continua in  $I$ ) e tale che  $\forall t \in I$

$$(t, x, x', \dots, x^{(n)}) \in A$$

$$f(t, x, x', \dots, x^{(n)}) = 0$$

**Soluzione massimale** di un'equazione differenziale ordinaria è una soluzione  $x_m : I_m \rightarrow \mathbb{R}^k$  tale che nessuna soluzione possa essere definita in un intervallo  $I$  con  $I_m \subseteq I$ . Cioè è la soluzione definita sull'intervallo maggiore possibile.

**Nota.** Dalla definizione segue che  $x(t) \in \mathring{A}$ , in quanto se non fosse in  $\mathring{A}$  sarebbe di frontiera, ma un punto di frontiera non può essere derivabile.

**Nota.** Un'equazione differenziale ammette, in generale, infinite soluzioni, come verificato in [Esempio 21.2](#)

**Nota.** La soluzione di un'equazione differenziale può, analiticamente, essere definita su un intervallo  $J \supset I$  ( $I$  intervallo di definizione della funz. differenziale  $f$ ). Non ha però senso considerare il suo comportamento al di fuori di  $I$ , in quanto non ha valore dal punto di vista del sistema. Per questo motivo  $J$  sarà sempre considerato  $J \subseteq I$

**Nota.** dalla [Definizione 21.1 \(Equazione Differenziale Ordinaria\)](#) segue che l'insieme di definizione della soluzione di un'equazione differenziale può essere solo un intervallo

### Esempio 21.2

Un'equazione differenziale ammette in generale infinite soluzioni. Ad esempio,  $x' = 1$  è risolta da  $x(t) = t + \alpha$  per qualunque  $\alpha \in \mathbb{R}$

### Esercizio 21.3

La soluzione di un'equazione differenziale ordinaria non può avere 3 asintoti.

*Soluzione.* La soluzione  $x$  è funzione continua. In quanto continua non può avere più di 2 asintoti verticali e in quanto funzione non può avere più di 2 asintoti orizzontali. ■

### Definizione 21.4 (Equazione Differenziale Ordinaria in Forma Normale)

Un'equazione differenziale è in **Forma Normale** se e solo se si presenta nella forma

$$x^{(n)} = g(t, x, x', \dots, x^{(n-1)})$$

Cioè se la derivata di ordine più alto è isolata al primo membro.

### Osservazione 21.5

Lo studio di un'equazione differenziale ordinaria in forma non normale inizia generalmente con l'utilizzo del [Teorema 10.10 \(della Funzione Implicita\)](#) insieme ai teoremi sulle equazioni differenziali ordinarie in forma normale

**Nota.** Nel seguito saranno considerate **solo** Equazioni Differenziali Ordinarie in Forma Normale.

### Proposizione 21.6

ogni equazione differenziale ordinaria in forma normale di ordine  $n$  è equivalente a una equazione differenziale ordinaria in forma normale di ordine 1, cioè in cui compaiono solamente derivate prime.

*Dimostrazione.* Data l'equazione

$$x^{(n)} = g(t, x, x', x'', \dots, x^{(n-1)})$$

sia  $y$  il vettore  $y = [x \quad x' \quad x'' \quad \dots \quad x^{(n-1)}]$ . Abbiamo ora che le componenti del vettore sono

$$y_1 = x \quad y_2 = x' \quad y_3 = x'' \quad \dots \quad y_n = x^{(n-1)}$$

ed al contempo

$$y'_1 = x' = y_2 \quad y'_2 = x'' = y_3 \quad y'_3 = x''' = y_4 \quad \dots \quad y'_{n-1} = x^{(n-1)} = y_n$$

Cioè, differenziando l' $i$ -esimo elemento (funzione) del vettore  $y$ , mi "sposto" all'elemento (funzione)  $i + 1$  di  $y$ . A questo punto tutti gli elementi di  $y$  sono equazioni differenziali del primo ordine. Quindi l'equazione può essere scritta come il seguente sistema del primo ordine

$$\begin{cases} y'_1 &= y_2 \\ y'_2 &= y_3 \\ \vdots & \\ y'_n &= g(t, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases}$$

□



**Esempio 21.7**

Posto  $n = 2$ , si ha  $x'' = f(t, x, x')$ . Come nella dimostrazione della [Proposizione 21.6](#), si pongono  $X' = \begin{bmatrix} x' \\ x'' \end{bmatrix}$  e

$$X = \begin{bmatrix} x \\ x' \end{bmatrix}$$

Da cui  $X' = f(t, X)$

**Definizione 21.8** (Problema di Cauchy del Primo Ordine)

Si dice Problema di Cauchy del Primo Ordine il problema di determinare una soluzione di un'equazione differenziale ordinaria del primo ordine, soddisfacente ad una condizione iniziale.

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Dove  $f : I \times A \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $I \subseteq \mathbb{R}$  è un intervallo,  $t_0 \in \overset{\circ}{I}$ ,  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ .

Soluzione di un problema di Cauchy è una funzione  $x : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ , definita in un intervallo  $J$  contenente  $t_0$  nella sua parte interna, quindi  $t_0 \in J \subseteq I$ .

La funzione  $x$  è soluzione dell'equazione differenziale  $x' = f(t, x)$  ed è tale che:

1.  $x(t_0) = x_0$
2.  $x(J) \subseteq A$
3.  $x$  derivabile (in quanto soluzione equazione differenziale)

Quindi il problema di Cauchy aggiunge un vincolo ad un'equazione differenziale, così da isolare una singola soluzione.

**Nota.** Si considera un intervallo perché l'idea è di studiare l'andamento nel tempo e sarebbe difficile far previsioni con "buchi" di tempo

**Nota.** La condizione  $x(t_0) = x_0$  viene spesso definita condizione iniziale, malgrado la [Definizione 21.8 \(Problema di Cauchy del Primo Ordine\)](#) indichi che  $t_0 \in \overset{\circ}{I}$ , dunque a rigore non dovrebbe essere sulla frontiera di  $I$ . Questo è dovuto al fatto che, spesso,  $t_0$  è proprio all'inizio dell'intervallo in cui si cerca la soluzione dell'equazione.

Comunque i risultati esposti continuano a valere con piccole modifiche alle dimostrazioni.

**Definizione 21.9** (Problema di Cauchy di Ordine  $n$ )

Si dice problema di Cauchy di ordine  $n$  il seguente problema:

Determinare una soluzione di un'equazione differenziale ordinaria di ordine  $n$  soddisfacente a  $n$  condizioni iniziali:

$$\begin{cases} x^{(n)} = f(t, x, x', \dots, x^{(n-1)}) \\ x(t_0) = \alpha_0 \\ x'(t_0) = \alpha_1 \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t_0) = \alpha_{n-1} \end{cases}$$

**Nota.** Le condizioni iniziali devono essere assegnate tutte nello stesso istante.

**Esempio 21.10**

il problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = x \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

ammette, tra le altre, anche le seguenti soluzioni, tecnicamente distinte tra loro

$$\begin{array}{llll} f_1 & : & [-1, 1] & \rightarrow \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto e^t \end{array} \quad \begin{array}{llll} f_2 & : & [-2, 10] & \rightarrow \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto e^t \end{array}$$

La soluzione massimale è

$$\begin{array}{rcl} f_M & : & \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ & & t \mapsto e^t \end{array}$$

con intervallo di partenza  $\mathbb{R}$ , avente evidentemente diametro maggiore possibile.

**Proposizione 21.11**

Ogni problema di Cauchy di ordine  $n$  è equivalente ad un problema di Cauchy del primo ordine

*Dimostrazione.* Dalla [Proposizione 21.6](#)

□

**Proposizione 21.12**

Ogni problema di Cauchy del primo ordine con secondo membro continuo

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

è equivalente ad un'equazione integrale del tipo

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t (f(\tau, x(\tau))) \, d\tau \quad (21.12.1)$$

*Dimostrazione.* Integrando ambo i membri della prima equazione del problema si ottiene:

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t (x') \, d\tau &= \int_{t_0}^t (f(\tau, x(\tau))) \, d\tau \\ x(t) - x(t_0) &= \int_{t_0}^t (f(\tau, x(\tau))) \, d\tau \\ x(t) &= x_0 + \int_{t_0}^t (f(\tau, x(\tau))) \, d\tau \end{aligned}$$

□

**Definizione 21.13** (Equazione di Volterra)

La Eq. (21.12.1) viene denominata **equazione integrale di Volterra**.

**Nota.** Questa equazione ha senso anche per alcune funzioni  $f$  non continue, ma solo misurabili nel primo argomento. Ne consegue che nei Teoremi di esistenza ed unicità (locali/globali) l'ipotesi “ $f$  continua” può essere sostituita da “ $f$  continua a tratti in  $t$ ,  $\forall x$ , continua in  $x$  e limitata”.

**Esempio 21.14** (Un Problema di Cauchy senza soluzione)

Sia


$$\begin{array}{rcl} f & : & \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ & & x \mapsto \begin{cases} +1 & \text{se } x < 0 \\ -1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

Allora il Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = f(x) \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

Non ammette soluzioni.

*Soluzione.*



La  $f$  è definita su tutto  $\mathbb{R}$ , ma non è possibile trovare una funzione di primo grado, derivabile su tutto  $\mathbb{R}$ , la cui derivata prima assuma quei valori. Infatti la

$$\begin{cases} x & \text{se } t < 0 \\ -x & \text{se } t \geq 0 \end{cases}$$

non è derivabile in  $t = 0$ , perché le derivate destra e sinistra assumono valori diversi. ■

**Esempio 21.15** (Un Problema di Cauchy con infinite soluzioni)

Sia

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt{|x|} \end{aligned}$$

Allora il Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = \sqrt{|x|} \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

ammette le infinite soluzioni

$$x_{a,b}(t) = \begin{cases} -\frac{1}{4}(t-a)^2 & \text{se } t \in ]-\infty, a] \\ 0 & \text{se } t \in [a, b] \\ \frac{1}{4}(t-b)^2 & \text{se } t \in [b, +\infty[ \end{cases}$$

dove  $-\infty \leq a \leq 0 \leq b \leq +\infty$

*Soluzione.* Vedere [Esempio 22.6 \(Il Baffo/Pennello di Peano\)](#) con  $x_0 = 0$  e  $t_0 = 0$  ■

**Osservazione 21.16**

Negli esempi precedenti è stata sfruttata la mancanza di regolarità nella dipendenza di  $f$  da  $x$ .

Viceversa, nella [nota alla definizione di equazione di Volterra](#), si era notato come la dipendenza di  $f$  da  $t$  sia molto meno critica.

**Esercizio 21.17**

Sia  $s: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  data da

$$s(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t \geq 0 \\ 0 & \text{se } t < 0 \end{cases}$$

Risolvere i seguenti Problemi di Cauchy, al variare di  $t_0$  (si supponga  $t_0 \neq 0, 1$ ):

$$\begin{cases} x' = s(t) \\ x(t_0) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x' = s(t) \cdot s(1-t) \\ x(t_0) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x' + x = s(t) \\ x(t_0) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x' - x = s(t) \cdot s(1-t) \\ x(t_0) = 1 \end{cases}$$

**Esempio 21.18** (Un Problema non di Cauchy)

Il seguente è un **Problema ai Valori al Contorno**.

$$\begin{cases} x'' + x = 0 \\ x(0) = 0 \\ x(\pi) = 0 \end{cases} \quad (21.18.1)$$

Questo problema ammette le infinite soluzioni  $x(t) = \alpha \cdot \sin t$ , al variare di  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

Sostituendo le condizioni  $x(0) = x(\frac{\pi}{2}) = 1$  a quelle nella Eq. (21.18.1), si ottiene l'unica soluzione  $x(t) = \sin t + \cos t$ . Con  $x(0) = x(\pi) = 1$  non ci sono soluzioni.

**Osservazione 21.19** (Problema ben posto nel senso di Hadamard)

in generale un problema si dice **ben posto** o **ben posto nel senso di Hadamard** ogniqualvolta la soluzione:

1. esiste
2. è unica
3. dipende con continuità dai dati

## 22 Teoria Locale

**Definizione 22.1** (Funzione Localmente Lipschitziana)

Una funzione  $f : I \times A \rightarrow \mathbb{R}^n$ , con  $I$  intervallo in  $\mathbb{R}$  e  $A$  aperto in  $\mathbb{R}^n$ , si dice **Localmente lipschitziana** in  $x \in A$  **uniformemente** rispetto a  $t \in I$  se

$$\forall x_0 \in A, \exists r > 0 \exists L > 0 : \forall x_1, x_2 \in (B(x_0, r) \cap A), \forall t \in I$$

vale che

$$\|f(t, x_2) - f(t, x_1)\| \leq L \cdot \|x_2 - x_1\| \quad o, ugualmente \quad \frac{\|f(t, x_2) - f(t, x_1)\|}{\|x_2 - x_1\|} \leq L$$

Una funzione è uniformemente lipschitziana (**unif. lips.**) in un intervallo  $I$  se, in parole povere, è possibile individuare per ogni punto di  $I$  una sfera  $B$  di raggio  $r$  in cui la funzione è lipschitziana.

**Nota.** I termini *localmente* e *uniformemente* sono giustificati dal fatto che:


- La località è data dalla limitazione di  $x_1, x_2$  all'interno di  $(B(x_0, r) \cap A)$
- L'uniformità è data da  $\forall t \in I$

Quindi la  $f$  rimane lips. indipendentemente dalla variazione di  $t$  (quindi  $\forall t \in I$ ), ma solo per  $x_1, x_2 \in (B(x_0, r) \cap A)$  **non**  $\forall x \in A$ .

**Nota.** Se  $f$  **lips** su  $A \implies f$  **loc. lips.** su  $A$ .

Concettualmente ci si porta nel caso della sfera  $B$  con  $r$  pari al raggio di  $I \times A$  su cui è definita  $f$

### Esempio 22.2



### Esempio 22.3

La funzione  $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  data da  $f(x) = x^2$  è **loc. lips.** su  $\mathbb{R}$  ma non è **globalmente lips.** su  $\mathbb{R}$ . Vedasi [Definizione 3.31 \(Funzione Lipschitziana\)](#) e grafico della  $f$  in [Esempio 22.2](#)

### Proposizione 22.4

Siano  $I \subseteq \mathbb{R}$  un intervallo aperto e  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  un aperto. Ogni funzione  $f \in \mathbf{C}^1(I \times A; \mathbb{R}^n)$  è loc. lips. in  $x \in A$  uniformemente rispetto a  $t \in I$

*Dimostrazione.* Il prodotto cartesiano  $I \times A$ , essendo prodotto cartesiano di aperti in  $\mathbb{R}^n$  con metrica euclidea (si suppone sia in uso questa metrica), è a sua volta un aperto. Questo risultato è dovuto alla definizione stessa del prodotto cartesiano di  $\mathbb{R}$  con metrica euclidea.

Chiamiamo ora  $S = I \times A$  l'insieme di partenza della  $f$ . Grazie alla [Proposizione 2.31 \(Poligonale Congiungente due Punti\)](#) sappiamo che esiste una poligonale interamente contenuta in  $S$  congiungente due qualunque punti dell'aperto  $S$ .

È ora possibile applicare il [Teorema 8.38 \(degli Accrescimenti Finiti\)](#) ad uno qualunque dei segmenti formanti la poligonale appena individuata. Vale quindi la

$$\|f(x_1) - f(x_0)\| \leq \sup_{x \in S} \|Df(x)\| \|x_1 - x_0\|$$

che è direttamente comparabile alla [Definizione 22.1 \(Funzione Localmente Lipschitziana\)](#) della funzione in ciascuno dei segmenti della poligonale, da cui la tesi.  $\square$

## 22.1 Esistenza e Unicità

### Proposizione 22.5 (Teorema di Peano)

Si consideri il seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

con  $f : I \times A \subseteq \mathbb{R}^n$  soddisfacente alle ipotesi:

1.  $t_0 \in \overset{\circ}{I}, x_0 \in \overset{\circ}{A}$
2.  $f \in \mathbf{C}^0(I \times A; \mathbb{R}^n)$

inoltre  $I \subseteq \mathbb{R}$  intervallo e  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ , per [Definizione 21.8 \(Problema di Cauchy del Primo Ordine\)](#).

**Allora** esiste un  $\delta > 0$  tale che esiste soluzione  $x : J \mapsto A$  del problema di Cauchy con  $J = [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ .

**Nota.**  $\delta$  è un valore arbitrario che serve solo ad identificare l'intervallo  $J$  a cui appartiene  $t_0$ , non è dato modo per identificare quel  $\delta$

Inoltre:

- $J \subseteq I$  da [nota definizione 47](#), dunque  $\varphi(J) \subseteq A$
- $\varphi(t_0) = x_0$
- $\varphi$  derivabile e  $\varphi'(t) = f(t, \varphi(t))$


*Dimostrazione.* Non richiesta □

### Esempio 22.6 (Il Baffo/Pennello di Peano)

Trovare le soluzioni del Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = \sqrt{|x|} \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

*Soluzione.*



**Nota.** Con  $t_0 = 0$  l'equazione non dipende da  $t$ , cioè il sistema è **Autonomo**. Vedere [Definizione 24.1 \(Equazione Autonoma\)](#) per le implicazioni nelle note.

**Nota.** Con  $x_0 = 0$  si ha  $x(t) = 0$ , che è soluzione  $\forall t$ , si procede però nel cercare altre soluzioni.

$f$  è continua  $\forall x \in \mathbb{R}$ , dunque per [Proposizione 22.5 \(Teorema di Peano\)](#) esiste una soluzione del Problema. Essendo  $x' = \sqrt{|x|}$  un'equazione a variabili separabili, si ottiene (considerando  $x \geq 0$ , quindi  $|x| = x$ ):

$$\begin{aligned}\frac{x'}{\sqrt{x}} &= 1 \\ \int_{t_0}^t \frac{x'(\tau)}{\sqrt{x(\tau)}} d\tau &= \int_{t_0}^t 1 d\tau \\ 2(\sqrt{x(t)} - \sqrt{x(t_0)}) + c_1 &= t - t_0 + c_2\end{aligned}$$

Riunendo  $c_1$  e  $c_2$  in un'unica costante  $b$


$$\begin{aligned}2(\sqrt{x(t)} - \sqrt{x(t_0)}) + b &= t - t_0 \\ 2(\sqrt{x(t)} - \sqrt{x(t_0)}) &= t - t_0 - b \\ x_a(t) &= \left( \sqrt{x_0} + \frac{1}{2}(t - t_0 - b) \right)^2 \\ x_a(t) &= x_0 + \frac{1}{4}(t - t_0 - b)^2\end{aligned}$$

Aggiungendo anche la soluzione per  $x < 0$  (con la costante  $a$ , stavolta), si ottiene


$$x_{a,b}(t) = \begin{cases} x_0 - \frac{1}{4}(t - t_0 - a)^2 & \text{se } t \in ]-\infty, a] \\ x_0 & \text{se } t \in [a, b] \\ x_0 + \frac{1}{4}(t - t_0 - b)^2 & \text{se } t \in [b, +\infty[ \end{cases}$$

Abbiamo quindi trovato infinite soluzioni, ciò evidenzia come il teorema di Peano non garantisca affatto unicità.

I seguenti grafici son tracciati con  $x_0 = 0$  e  $t_0 = 0$



(a) Differenti valori di  $a$  e  $b$



(b) Il comportamento "a pennello" con molteplici  $a$  e  $b$

### Teorema 22.7 (di Cauchy Locale - Prima Parte)

Si consideri il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

con  $f : I \times A \rightarrow \mathbb{R}^n$  soddisfacente le ipotesi:

1.  $t_0 \in \overset{\circ}{I}$ ,  $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ . Inoltre da [Definizione 21.1 \(Equazione Differenziale Ordinaria\)](#) e note successive:  $I$  intervallo e  $I \subseteq \mathbb{R}^n$ , inoltre  $A \subseteq \mathbb{R}^n$
2.  $f \in \mathbf{C}^0(I \times A; \mathbb{R}^n)$
3.  $f$  è localmente Lipschitziana in  $x \in A$  uniformemente rispetto a  $t \in I$

**Nota.** Le prime due ipotesi garantiscono l'esistenza, grazie al [Proposizione 22.5 \(Teorema di Peano\)](#). La terza ipotesi rende il teorema più restrittivo, ma permette anche di giungere ad una conclusione più forte (ed utile).

**Nota.** Per verificare l'ultima ipotesi si ricordino [Proposizione 22.4](#) e se  $f$  lips.  $\implies f$  loc. lips.

Allora ho i seguenti risultati:

**1. Esistenza:**

da [Proposizione 22.5 \(Teorema di Peano\)](#)  $\exists \delta > 0$ , con cui si identifica un  $J = [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ . Inoltre  $\exists \varphi : J \rightarrow \mathbb{R}^n$  è soluzione con le proprietà date da Peano:

- $J \subseteq I$  da [nota definizione 47](#), dunque  $\varphi(J) \subseteq A$
- $\varphi(t_0) = x_0$
- $\varphi$  derivabile e  $\varphi'(t) = f(t, \varphi(t))$

**2. Unicità**

Se  $\exists J_1, J_2$  intervalli con  $J_1 \subseteq I, J_2 \subseteq I$  e  $\exists \varphi_1 : J_1 \rightarrow \mathbb{R}^n, \varphi_2 : J_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$  soluzioni con le seguenti proprietà

- $J_1 \subseteq I, J_2 \subseteq I$  da [nota definizione 47](#), dunque  $\varphi_1(J_1) \subseteq A$  e  $\varphi_2(J_2) \subseteq A$

**Nota.** Si può osservare che, sicuramente,  $J_1 \cap J_2 \neq \emptyset$ , poiché entrambi gli insiemi contengono almeno  $t_0$  nella loro parte interna.

- $\varphi_1(t_0) = x_0, \varphi_2(t_0) = x_0$
- $\varphi_1, \varphi_2$  derivabili e  $\begin{cases} \varphi_1'(t) = f(t, \varphi_1(t)) \forall t \in J_1 \\ \varphi_2'(t) = f(t, \varphi_2(t)) \forall t \in J_2 \end{cases}$

Allora  $\varphi_1(t) = \varphi_2(t) \quad \forall t \in (J_1 \cap J_2)$

Cioè, se esistono due soluzioni, allora esse coincidono ovunque siano entrambe definite.

**3. Dipendenza continua dai dati**

Questa tesi verrà esposta successivamente in [Teorema 22.13 \(di Cauchy Locale - Seconda Parte\)](#)

*Dimostrazione.* (**Tesi 2**)

**Nota.** L'idea alla base della dimostrazione è che vogliamo riuscire a trasformare il problema di Cauchy in un problema di punto fisso mediante una funzione avente come parametro  $x$  stesso.

Da [Definizione 21.13 \(Equazione di Volterra\)](#) sappiamo che la prima equazione del problema in ipotesi corrisponde all'integrale

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t (f(\tau, x(\tau))) \, d\tau$$

Definiamo quindi  $T$ , funzione del tipo

$$\begin{aligned} T : X &\rightarrow X \\ (T(x))(t) &\mapsto x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, x(\tau)) \, d\tau \end{aligned} \tag{22.7.1}$$

Abbiamo così ottenuto un problema di punto fisso ( $x = T(x)$ ). Ora bisogna determinare l'insieme di partenza e l'insieme di arrivo in maniera utile per la dimostrazione. Per poter applicare il [Teorema 4.6 \(delle Contrazioni\)](#) serve che lo spazio di partenza e di arrivo corrispondano.

Prendiamo:

- $\delta_1 > 0$  tale che  $[t_0 - \delta_1, t_0 + \delta_1] \subseteq I$



- $\rho > 0$  tale che  $\overline{B(x_0, \rho)} \subseteq A$
- $L$  costante di Lipshitz di  $f$  in  $[t_0 - \delta_1, t_0 + \delta_1] \times \overline{B(x_0, \rho)}$ . È possibile individuare  $L$  in quanto  $f$  loc. lips. per ipotesi in  $I \times A$ , e dunque **loc. lips. in sottointervalli/insiemi**

Sia ora

$$V = \sup \left\{ \|f(t, x)\| : t \in [t_0 - \delta_1, t_0 + \delta_1], x \in \overline{B(x_0, \rho)} \right\}$$

**Nota.**  $V$  è il maggiore tra i valori assunti dalla derivata prima ( $x' = f(t, x)$ ) di una qualsiasi delle soluzioni  $x$  contenute nella sfera  $\overline{B(x_0, \rho)}$ . È massimo di funzione continua (per ipotesi 2) in un compatto (per ipotesi 1, essendo in  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$  e per [Proposizione 2.34](#)).

Definiamo dunque un generico  $\delta > 0$

$$\delta < \min \left\{ \delta_1, \frac{\rho}{V}, \frac{1}{L} \right\} \quad (22.7.2)$$

**Nota.**  $\delta$  è strettamente minore del min perché poi servirà a trovare una contrazione, dunque dovrò avere sicuramente  $\delta L < 1$

- $\delta_1$  è raggio di un generico intervallo incluso in  $I$  di partenza.  $\delta$  deve essere minore di  $\delta_1$  in quanto non è possibile uscire dall'intervallo  $I$
- $\frac{\rho}{V}$  è rapporto tra il raggio di  $\overline{B(x_0, \rho)}$ , sfera interamente contenuta in  $A$ , e  $V$ , valore massimo di  $f$  ridotta all'intervallo di cui sopra e alla sfera  $\overline{B}$ .  
Considerando il reciproco  $\frac{V}{\rho}$ , possiamo vederlo come una sorta di nuova costante di lips., riportata ad un intervallo più piccolo, non dipendente però da  $\Delta f(x)$ , ma dal valore di  $f(x)$  stessa.
- $1/L = \frac{\|x_2 - x_1\|}{\|f(t, x_2) - f(t, x_1)\|}$  dalla [Definizione 22.1 \(Funzione Localmente Lipschitziana\)](#), perché  $f$  loc. lips. per ipotesi. Dà un'idea di quanto vari la  $x$  rispetto alla variazione della  $f(x)$

Questo  $\delta$ , dunque, rappresenta, dal punto di vista concettuale, quale sia la più restrittiva (min) tra tutte le possibili variazioni della  $f(x)$  rispetto alla  $x$ .

A questo punto, usando  $\delta$ , definiamo lo spazio  $X$ , generato da tutte le funzioni continue sul nuovo intervallo a valori entro una sfera centrata in  $x_0$  con lo stesso raggio di  $\overline{B}$

$$X = \{g \in \mathbf{C}^0([t_0 - \delta, t_0 + \delta]; \mathbb{R}^n) : \forall t \|g(t) - x_0\| \leq \rho\}$$

**Nota.** Si scelgono le funzioni continue ( $\in \mathbf{C}^0$ ) perché serve  $x$  continua per rendere valida l'equivalenza della funzione di Volterra con il problema di Cauchy. Stando alla [nota alla definizione di equazione di Volterra](#) sarebbe possibile sceglierla non continua, ma non si considera il caso.

Possiamo passare al punto chiave della dimostrazione, verifichiamo le ipotesi del [Teorema 4.6 \(delle Contrazioni\)](#):

- $(X, d)$  è **spazio metrico completo**  
 $(X, d_X)$  è spazio metrico completo se considerato con la distanza della convergenza uniforme  $d_X = d_{\mathbf{C}^0}$  per il [Corollario 19.34](#).  $\square$
- $T$  è **definita** (è possibile calcolarla)  
L'abbiamo definita all'inizio dall'equazione di Volterra  $\square$
- $T$  è  **$X \mapsto X$**   
L'insieme di partenza è valido in quanto sottoinsieme dell'insieme su cui  $f(t, xt)$  era definita.  
Per verificare che  $y = T(x)$ , bisogna verificare che  $y \in \mathbf{C}^0([t_0 - \delta, t_0 + \delta]; \mathbb{R}^n)$  e che  $y(t) \in \overline{B(x_0, \rho)} \quad \forall t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$

*Dimostrazione.*  $y \in \mathbf{C}^0$  nell'intervallo specificato per il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale. La seconda condizione si verifica prendendo la Eq. (22.7.1) e calcolando la norma di entrambi i termini

$$\|y(t) - x_0\| = \left\| \int_{t_0}^t f(\tau, x(\tau)) \, d\tau \right\|$$

posso ora minorare con il valore assoluto della norma dell'argomento (spiegazione in [Esercizio 22.8](#))

$$\leq \left| \int_{t_0}^t \|f(\tau, x(\tau))\| \, d\tau \right| \quad (22.7.3)$$

$\|f(\tau, x(\tau))\|$  è sicuramente minorato da  $V$  per definizione di quest'ultimo, dunque si ha integrale di costante

$$\leq V \cdot |t - t_0|$$

$|t - t_0| \leq \delta$  per definizione di  $\delta$

$$\leq V \cdot \delta$$

nel caso in cui  $\min \left\{ \delta_1, \frac{\rho}{V}, \frac{1}{L} \right\} = \frac{\rho}{V}$ , allora minorato strettamente da  $\rho$  per definizione di  $\delta$ , altrimenti sicuramente minore per  $\min$

$$< \rho$$

□

- **$T$  è contrazione**

Occorre verificare la Eq. (4.1.1)

*Dimostrazione.* Per definizione della  $T$  e per la proprietà additiva degli integrali

$$(T(x_2))(t) - (T(x_1))(t) = \int_{t_0}^t (f(\tau, x_2(\tau)) - f(\tau, x_1(\tau))) \, d\tau$$

Dunque, passando alla norma di quanto calcolato sopra ed applicando la minorazione spiegata in [Esercizio 22.8](#)

$$\|(T(x_2))(t) - (T(x_1))(t)\| \leq \left| \int_{t_0}^t \|f(\tau, x_2(\tau)) - f(\tau, x_1(\tau))\| \, d\tau \right| \quad (22.7.4)$$

Per [Definizione 22.1 \(Funzione Localmente Lipschitziana\)](#) passo alle funzioni incognite  $x_i$  di  $f$  (che son le soluzioni dell'equazione differenziale), minorando

$$\leq \left| \int_{t_0}^t L \cdot \|x_2(\tau) - x_1(\tau)\| \, d\tau \right|$$

Dalla [Osservazione 19.19](#),  $\|f - g\|_{\mathbf{C}^0} = \sup_A |f - g| = d_{\mathbf{C}^0}(f, g)$

$$\begin{aligned} &= \left| \int_{t_0}^t L \cdot d_X(x_2, x_1) \, d\tau \right| \\ &= L \cdot |t - t_0| \cdot d_X(x_2, x_1) \end{aligned} \quad (22.7.5)$$

Quindi, concludendo, possiamo passare dal primo membro della Eq. (22.7.4) alla distanza  $d_X$ , semplicemente per definizione della distanza, cioè

$$\|(T(x_2))(t) - (T(x_1))(t)\| = d_X(T(x_2), T(x_1))$$

Minoriamo questa distanza con la forma appena trovata Eq. (22.7.5). Per quanto riguarda  $|t - t_0|$ , passiamo al sup di  $t$  nell'intervallo  $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ , cioè  $\delta$  stesso

$$d_X(T(x_2), T(x_1)) \leq (\delta \cdot L) \cdot d_X(x_2, x_1)$$

Essendo, per definizione,  $\delta$  al più pari ad  $\frac{1}{L} \implies \delta \cdot L < 1 \implies T$  è contrazione per [Definizione 4.1 \(Contrazione\)](#). □

È ora possibile applicare il [Teorema 4.6 \(delle Contrazioni\)](#) che garantisce l'**unicità** del punto fisso  $x_* \in X$  per la  $x = T(x)$ , questo implica ovviamente che  $T(x)$  abbia un'unica soluzione. Si ha dunque l'unicità della soluzione  $x$  del problema di Cauchy in ipotesi sull'intervallo  $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ , al quale  $T$  è equivalente per definizione in quanto  $T$  è [Definizione 21.13 \(Equazione di Volterra\)](#).

Tornando ai  $J_1, J_2$  della Tesi 2:

- Se  $(J_1 \cap J_2) \subseteq [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ , allora  $x_1 = x_2$  in quanto esiste unico punto fisso, come dimostrato sopra.
- Se  $(J_1 \cap J_2) \supset [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ , allora poniamo

$$t_M = \sup \{t \in (J_1 \cap J_2) : \forall \tau \in [t_0, t], x_1(\tau) = x_2(\tau)\} \quad (22.7.6)$$

$$x_M = x_1(t_M) = x_2(t_M)$$

Quindi  $t_M$  è l'*ultimo istante* in cui  $x_1$  e  $x_2$  coincidono.

Essendo

- $t_M \in \overset{\circ}{J}_1, t_M \in \overset{\circ}{J}_2 \implies t_M \in \overset{\circ}{I}$  da [nota definizione 47](#)
- $x_M \in \overset{\circ}{A}$  per [nota definizione equazione differenziale](#)

ci ritroviamo nelle ipotesi di quanto appena dimostrato, solo che con dei nuovi  $t$  ed  $x$ . Possiamo dunque giungere alla conclusione che il problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_M) = x_M \end{cases}$$

ammetta unica soluzione definita in un intorno di  $t_M$  del tipo  $[t_M - \delta, t_M + \delta]$ , cioè  $x_1$  e  $x_2$  coincidono in un intorno di  $t_M$ . Il fatto che esista un'unica soluzione oltre  $t_M$  (vedere parte in grassetto dell'intorno sopra) contraddice la Eq. (22.7.6), perché non dovrebbe essere possibile trovare una soluzione in comune *oltre*  $t_M$  per come è definito. Ripetendo iterativamente questo procedimento si può semplificare la definizione di  $t_M$  a

$$t_M = \min \{\sup J_1, \sup J_2\}$$

Ripetendo quanto fatto con il *primo istante*  $t_m$  in cui  $x_1$  e  $x_2$  coincidono, si ottiene

$$t_m = \max \{\inf J_1, \inf J_2\}$$

Quindi, prendendo  $[t_m, t_M]$ , abbiamo identificato  $J_1 \cap J_2$  stessa.


Dunque  $x_1$  e  $x_2$  coincidono in  $J_1 \cap J_2$ , indipendente dalla relazione tra intersezione e intervallo. □

**Nota.** La scelta di  $\delta$  in Eq. (22.7.2) potrebbe essere migliorata utilizzando il [Teorema 4.20 \(dell'Iterata Contrazione\)](#) e scegliendo  $\delta < \min \{\delta_1, \frac{\rho}{L}\}$ , indipendentemente dalla costante di lips. della  $f$

### Esercizio 22.8

È necessario il modulo in Eq. (22.7.3)?

*Soluzione.* Consideriamo, ad esempio, le seguenti due funzioni



I cui integrali (le aree sottese) assumono questi valori

$$f(x) = \left\| \int_0^6 10 \cdot \frac{\sin x}{1+x} dx \right\| = 4,9413 \qquad g(x) = \left| \int_0^6 \left\| 10 \cdot \frac{\sin x}{1+x} \right\| dx \right| = 11,935$$

Nella  $f$ , viene calcolata la norma del risultato dell'integrazione definita.

Nella  $g$  si ha invece la norma della funzione, cioè la parte "sotto l'asse  $x$ " della funzione viene ribaltata sopra l'asse dall'operatore norma, come si può vedere dal grafico. Questo implica che, sicuramente,  $g \geq f$ , in quanto  $\int g$  è somma di soli infinitesimi positivi.

Infine, il valore assoluto nella Eq. (22.7.3) è necessario per evitare che, scambiando gli estremi d'integrazione, si ottenga un valore negativo, che non potrebbe mai essere risultato del primo integrale ■

### Esercizio 22.9

Perché il Teorema 22.7 (di Cauchy Locale - Prima Parte) è chiamato Teorema di Cauchy **locale**?

*Soluzione.* È dovuto al fatto che il teorema fornisce informazioni solo in un intorno della condizione iniziale  $t_0$ , non è assicurata l'esistenza di un'unica funzione risolvete in un intervallo arbitrario. ■

### Esercizio 22.10

Confrontare l'**unicità** della soluzione di un'equazione differenziale (Teorema 22.7 (di Cauchy Locale - Prima Parte)) con l'**unicità** della funzione implicita (Teorema 10.10 (della Funzione Implicita))

## 22.2 Dipendenza Continua

Nelle applicazioni fisiche, il ruolo della condizione iniziale di un problema di Cauchy è quello del valore assunto da una determinata grandezza fisica, diciamo  $u_0$ , misurata al tempo  $t = t_0$ . Poiché la misura di una grandezza fisica comporta inevitabilmente un errore di rilevazione (per quanto piccolo), è importante caratterizzare quei problemi di Cauchy tali che a fronte di piccole discrepanze  $u_0 \neq v_0$  producano soluzioni  $(I, u)$   $(J, v)$  che differiscano "poco" in  $I \cap J$ .

### Lemma 22.11 (Lemma di Gronwall)

Dati  $a, b \in \mathbb{R}$  con  $a < b$ , siano:

- $\delta_0 \in [0, +\infty[$
  - $k, \delta : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$
  - $k(t) \geq 0, \delta(t) \geq 0$  funzioni continue  $\forall t \in [a, b]$
- } cioè  $k, \delta \in \mathbf{C}^0([a, b], \mathbb{R}^+)$

con:

$$\delta(t) \leq \delta_0 + \int_a^t k(\tau) \delta(\tau) d\tau$$

Allora

$$\delta(t) \leq \delta_0 e^{\int_a^t k(\tau) d\tau} \quad \forall t \in [a, b]$$

Questo lemma permette di limitare una funzione che soddisfa una disuguaglianza integrale con la soluzione della corrispondente equazione. Ci si porta da una stima implicita di  $\delta$  (sotto il segno di integrale) ad una stima esplicita.

*Dimostrazione.* Dividiamo in due casi

- Se  $\delta_0 > 0$   
Sia  $\Delta(t) = \delta_0 + \int_a^t k(\tau)\delta(\tau) d\tau$ . Prendiamo ora il logaritmo di  $\Delta(t)$ , cioè  $\ln(\Delta(t))$ , e deriviamolo con le regole classiche

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \ln(\Delta(t)) &= \frac{\Delta'(t)}{\Delta(t)} \\ &= \frac{\frac{d}{dt}\delta_0 + \frac{d}{dt} \int_a^t k(\tau)\delta(\tau) d\tau}{\Delta(t)} \end{aligned}$$

Il primo addendo è derivata di costante, il secondo corrisponde all'argomento dell'integrale per teorema fondamentale del calcolo integrale

$$= \frac{0 + k(t)\delta(t)}{\Delta(t)} = k(t) \frac{\delta(t)}{\Delta(t)}$$

Essendo poi, per ipotesi,  $\delta(t) \leq \Delta(t) \implies \frac{\delta(t)}{\Delta(t)} \leq 1$

$$\leq k(t)$$

Integrando il primo e l'ultimo termine

$$\begin{aligned} \int_a^t \left( \frac{d}{d\tau} \ln(\Delta(\tau)) \right) d\tau &\leq \int_a^t k(\tau) d\tau \\ \ln(\Delta(t)) - \ln(\Delta(a)) &\leq \int_a^t k(\tau) d\tau \end{aligned}$$

da definizione di  $\Delta(t)$ ,  $\Delta(a) = \delta_0$

$$\ln(\Delta(t)) \leq \ln(\delta_0) + \int_a^t k(\tau) d\tau$$

Passando all'esponenziale

$$\begin{aligned} e^{\ln(\Delta(t))} &\leq e^{(\ln(\delta_0) + \int_a^t k(\tau) d\tau)} \\ \Delta(t) &\leq e^{\ln(\delta_0)} \cdot e^{\int_a^t k(\tau) d\tau} \\ \Delta(t) &\leq \delta_0 e^{\int_a^t k(\tau) d\tau} \end{aligned}$$

Da cui la tesi

- Se  $\delta_0 = 0$   
Minoriamo, poiché  $\delta_0 = 0$ , con un  $\epsilon > 0$

$$\delta(t) \leq 0 + \int_a^t k(\tau)\delta(\tau) d\tau \leq \epsilon + \int_a^t k(\tau)\delta(\tau) d\tau \quad \forall \epsilon > 0$$

Essendo  $\epsilon > 0$ , mi trovo con una forma analoga al caso precedente, dunque

$$\delta(t) \leq \epsilon \cdot e^{\int_a^t k(\tau) d\tau} \quad \forall \epsilon > 0$$

Dovendo essere  $\delta(t) \leq \epsilon \quad \forall \epsilon > 0$ , posso concludere che

$$\delta(t) \leq 0$$

Ma, per ipotesi,  $\delta(t) \geq 0 \implies \delta(t) = 0$

□

### Esercizio 22.12

Verificare che la funzione  $\Delta$  nella dimostrazione del [Lemma 22.11 \(Lemma di Gronwall\)](#) è derivabile

*Soluzione.* È possibile derivare la  $\Delta$  perché, da [Esercizio 7.6](#), la somma di funzioni derivabili resta derivabile ed il secondo addendo è derivabile per [Proposizione 14.1 \(Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale\)](#) ■

### Teorema 22.13 (di Cauchy Locale - Seconda Parte)

Si considerino i seguenti problemi di Cauchy con condizione iniziale individuata nello stesso istante:

$$(1) \begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} y' = g(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (22.13.1)$$

con  $f, g : I \times A \rightarrow \mathbb{R}^n$  e soddisfacenti le ipotesi di [Teorema 22.7 \(di Cauchy Locale - Prima Parte\)](#), cioè:

1.  $t_0 \in \overset{\circ}{I}$ ,  $x_0, y_0 \in \overset{\circ}{A}$ . Inoltre da [Definizione 21.1 \(Equazione Differenziale Ordinaria\)](#) e note successive:  $I$  intervallo e  $I \subseteq \mathbb{R}^n$ , inoltre  $A \subseteq \mathbb{R}^n$
2.  $f, g \in \mathbf{C}^0(I \times A; \mathbb{R}^n)$
3.  $f, g$  sono localmente Lipschitziane in  $x \in A$  uniformemente rispetto a  $t \in I$

Allora esiste un  $\delta > 0$  tale che sull'intervallo  $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$  sono definite una soluzione  $\varphi$  di (1) ed una soluzione  $\psi$  di (2). Inoltre esiste  $L > 0$  t.c.  $\forall t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$  vale:

$$\|\varphi(t) - \psi(t)\| \leq (\|x_0 - y_0\| + \delta \|f - g\|_{\mathbf{C}^0}) e^{L|t-t_0|}$$

dove  $\|f - g\|_{\mathbf{C}^0} = \sup_{I \times A} \|f(t, x) - g(t, x)\|$

**Nota.** Questo significa che, con problemi diversi tra loro, se  $(x_0$  e  $y_0)$ ,  $(f$  e  $g)$  sono vicine tra loro ("a coppie"), allora sono vicine anche le soluzioni, ma per  $t$  vicine. Pensando  $t$  come tempo, cioè una delle applicazioni più classiche, questo implica che non si possano fare previsioni a lungo termine con sistemi diversi.

*Dimostrazione.* Sia  $f$  che  $g$  soddisfano le ipotesi del [Teorema 22.7 \(di Cauchy Locale - Prima Parte\)](#), quindi esistono due soluzioni:

- $\varphi : [t_0 - \delta_f, t_0 + \delta_f] \mapsto \mathbb{R}$  del problema (1)
- $\psi : [t_0 - \delta_g, t_0 + \delta_g] \mapsto \mathbb{R}$  del problema (2)

Sia dunque  $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$ , da cui  $J = [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$  e, d'ora in poi,  $t \in J$ .

Gli insiemi  $\varphi(J)$  e  $\psi(J)$  sono compatti perché per [Teorema 3.15 \(Generale di Weierstrass\)](#), essendo  $J$  compatto. La loro unione è dunque un compatto, come da [Esercizio 2.40](#).

Utilizzando [Definizione 21.13 \(Equazione di Volterra\)](#), passiamo alle equazioni integrali delle Eq. (22.13.1)

$$(1) \varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t (f(\tau, \varphi(\tau))) d\tau \quad (2) \psi(t) = y_0 + \int_{t_0}^t (g(\tau, \psi(\tau))) d\tau \quad (22.13.2)$$

Sottraiamo ora la (1) alla (2) (in norma)

$$\begin{aligned} \|\varphi(t) - \psi(t)\| &= \left\| x_0 - y_0 + \int_{t_0}^t (f(\tau, \varphi(\tau))) d\tau - \int_{t_0}^t (g(\tau, \psi(\tau))) d\tau \right\| \\ &= \left\| x_0 - y_0 + \int_{t_0}^t (f(\tau, \varphi(\tau)) - g(\tau, \psi(\tau))) d\tau \right\| \end{aligned} \quad (22.13.3)$$

Minoriamo ora con la proprietà 3 da [Definizione 1.8 \(Norma\)](#)

$$\leq \|x_0 - y_0\| + \left\| \int_{t_0}^t (f(\tau, \varphi(\tau)) - g(\tau, \psi(\tau))) \, d\tau \right\|$$

Minoriamo ulteriormente come da [Esercizio 22.8](#)

$$\leq \|x_0 - y_0\| + \left| \int_{t_0}^t \|f(\tau, \varphi(\tau)) - g(\tau, \psi(\tau))\| \, d\tau \right|$$

Sommo e sottraggo nell'integrale la quantità  $f(\tau, \psi(\tau))$  (Si sarebbe potuto fare lo stesso con  $g$ )

$$\begin{aligned} &= \|x_0 - y_0\| + \left| \int_{t_0}^t \|f(\tau, \varphi(\tau)) + f(\tau, \psi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau)) - g(\tau, \psi(\tau))\| \, d\tau \right| \\ &\leq \|x_0 - y_0\| + \left| \int_{t_0}^t \|f(\tau, \varphi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau))\| \, d\tau \right| + \left| \int_{t_0}^t \|f(\tau, \psi(\tau)) - g(\tau, \psi(\tau))\| \, d\tau \right| \end{aligned}$$

Possiamo minorare l'argomento del secondo integrale con il  $\sup_{I \times A} \|f(t, x) - g(t, x)\|$ , dunque può anche essere estratto in quanto  $\sup$  è costante

$$\begin{aligned} &\leq \|x_0 - y_0\| + \left| \int_{t_0}^t \|f(\tau, \varphi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau))\| \, d\tau \right| + \left| \sup_{I \times A} \|f(t, \psi(\tau)) - g(t, \psi(\tau))\| \int_{t_0}^t d\tau \right| \\ &= \|x_0 - y_0\| + \left| \int_{t_0}^t \|f(\tau, \varphi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau))\| \, d\tau \right| + \left| \sup_{I \times A} \|f(t, \psi(\tau)) - g(t, \psi(\tau))\| (t - t_0) \right| \end{aligned}$$

Essendo sicuramente  $t - t_0 \leq \delta$  per definizione di quest'ultimo, minoriamo ulteriormente

$$\leq \|x_0 - y_0\| + \left| \int_{t_0}^t \|f(\tau, \varphi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau))\| \, d\tau \right| + \left| \sup_{I \times A} \|f(t, \psi(\tau)) - g(t, \psi(\tau))\| \delta \right|$$

Ricordando la [Osservazione 19.19](#), sappiamo che  $\|f - g\|_{\mathbf{C}^0} = \sup_{I \times A} \|f(t, x) - g(t, x)\|$ , dunque passiamo alla distanza su  $\mathbf{C}^0$  e togliamo il valore assoluto, in quanto tutti i valori in esso contenuti sono positivi per definizione

$$\begin{aligned} &= \|x_0 - y_0\| + \left| \int_{t_0}^t \|f(\tau, \varphi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau))\| \, d\tau \right| + \delta \|f - g\|_{\mathbf{C}^0} \end{aligned}$$

Sia quindi  $L$  costante di Lipshitz di  $f$  su  $J \times (\varphi(J) \cup \psi(J))$ , possiamo minorare con

$$\leq \|x_0 - y_0\| + \left| \int_{t_0}^t L \|\varphi(\tau) - \psi(\tau)\| \, d\tau \right| + \delta \|f - g\|_{\mathbf{C}^0}$$

Riordinando

$$= \|x_0 - y_0\| + \delta \|f - g\|_{\mathbf{C}^0} + \left| \int_{t_0}^t L \|\varphi(\tau) - \psi(\tau)\| \, d\tau \right|$$

Applichiamo alla forma ottenuta il [Lemma 22.11 \(Lemma di Gronwall\)](#). Per ipotesi del Lemma è necessario avere  $t \in [a, b]$  con  $a < b$ . Nell'ultimo integrale rimasto abbiamo  $a = t_0$ , dunque imponiamo  $t \geq t_0$  e procediamo.

**Nota.** Il procedimento è analogo nel caso opposto e verrà integrato sotto.

Applichiamo le seguenti sostituzioni nella formula del [Lemma 22.11](#) ([Lemma di Gronwall](#)):

- $k(\tau) = L$
- $\delta(\tau) = \|\varphi(\tau) - \psi(\tau)\|$
- $\delta_0 = \|x_0 - y_0\| + \delta \|f - g\|_{\mathbf{C}^0}$  (tutti gli altri addendi)

Possiamo dunque minorare ulteriormente la formula precedente con

$$\begin{aligned} &\leq (\|x_0 - y_0\| + \delta \|f - g\|_{\mathbf{C}^0}) e^{\int_{t_0}^t L \, d\tau} \\ &= (\|x_0 - y_0\| + \delta \|f - g\|_{\mathbf{C}^0}) e^{L(t-t_0)} \end{aligned}$$

Riprendendo il primo elemento del treno di disuguaglianze Eq. [\(22.13.3\)](#), si ottiene infine

$$\|\varphi(t) - \psi(t)\| \leq (\|x_0 - y_0\| + \delta \|f - g\|_{\mathbf{C}^0}) e^{L(t-t_0)}$$

Inseriamo ora il valore assoluto all'esponente per tener in considerazione anche il caso in cui  $t \leq t_0$

$$\|\varphi(t) - \psi(t)\| \leq (\|x_0 - y_0\| + \delta \|f - g\|_{\mathbf{C}^0}) e^{L|t-t_0|}$$

□

**Nota.** Con il [Teorema 22.7](#) (di [Cauchy Locale - Prima Parte](#)) ed il [Teorema 22.13](#) (di [Cauchy Locale - Seconda Parte](#)) si verifica se un Problema di Cauchy rispetta la [Osservazione 21.19](#) ([Problema ben posto nel senso di Hadamard](#)).

#### Esercizio 22.14

Esibire una dimostrazione dell'unicità della soluzione di un Problema di Cauchy alternativa al [Teorema 22.7](#) (di [Cauchy Locale - Prima Parte](#)) e basata sul [Teorema 22.13](#) (di [Cauchy Locale - Seconda Parte](#)).

#### Esercizio 22.15

Enunciare il [Teorema 22.13](#) (di [Cauchy Locale - Seconda Parte](#)) come risultato sulla continuità dell'**operatore di soluzione** di un Problema di Cauchy.

#### Esempio 22.16

Al variare di  $p \in \mathbb{R}$ , il Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = x \\ x(0) = p \end{cases}$$

ha soluzione  $x_p(t) = p \cdot e^t$ .

- Se  $t \rightarrow T \in \mathbb{R}$ :

$$\lim_{p \rightarrow 0} \left( \lim_{t \rightarrow T} (p \cdot e^t) \right) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow T} \left( \lim_{p \rightarrow 0} (p \cdot e^t) \right) = 0$$

I risultati coincidono, quindi c'è continuità nel parametro.

- Se  $T \rightarrow +\infty$ :

$$\lim_{p \rightarrow 0} \left( \lim_{t \rightarrow +\infty} (p \cdot e^t) \right) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \left( \lim_{p \rightarrow 0} (p \cdot e^t) \right) = 0$$

I risultati son differenti, ma non solo, infatti stimando con parametri diversi mi troverei in questa situazione:

$$|x_{p_1}(t) - x_{p_2}(t)| = |p_1 - p_2| e^t \tag{22.16.1}$$

Cioè una distanza "esponenziale" tra le due soluzioni.

**Nota.** In questo esempio abbiamo  $f(t, x) = x$ , quindi  $L = 1$ , infatti  $L$  stessa non appare nella Eq. [\(22.16.1\)](#).



**Esempio 22.17**

Al variare di  $p \in \mathbb{R}$ , il Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = p \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

ha soluzione  $x_p(t) = p \cdot t$ , cioè parametri  $p$  diversi danno rette con inclinazioni diverse.

- Se  $t \rightarrow T \in \mathbb{R}$ :

$$\lim_{p \rightarrow 0} \left( \lim_{t \rightarrow T} x_p(t) \right) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow T} \left( \lim_{p \rightarrow 0} x_p(t) \right) = 0$$

I risultati coincidono, quindi c'è continuità nel parametro.

- Se  $T \rightarrow +\infty$ :

$$\lim_{p \rightarrow 0} \left( \lim_{t \rightarrow +\infty} x_p(t) \right) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \left( \lim_{p \rightarrow 0} x_p(t) \right) = 0$$

Essendo diversi, non c'è continuità.

**Nota.** Questo esempio evidenzia come la dipendenza continua sussista solo su intervalli finiti.

## 23 Teoria Globale

**Esempio 23.1** (Un Problema di Cauchy senza soluzione globale)

Si trovi la soluzione del Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = x^2 \\ x(0) = 1 \end{cases} \quad (23.1.1)$$


Essendo a variabili separabili, procediamo

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= x^2(t) \\ \frac{dx}{x^2(t)} &= dt \\ \int_0^t \frac{dx}{x^2(\tau)} d\tau &= \int_0^t d\tau \end{aligned}$$

Applicando al primo membro le normali regole d'integrazione delle funzioni composte otteniamo

$$-\frac{1}{x(t)} + 1 = t$$

Da cui si ricava  $x(t) = \frac{1}{1-t}$ , che è unica soluzione del Problema di Cauchy ed ha asintoto verticale in  $t = 1$ .



Per via dell'asintoto, nonostante la  $x(t)$  abbia come dominio  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ , la soluzione del Problema di Cauchy così definito si ferma a  $t = 1$ . Ciò perché la condizione iniziale del Problema è  $t = 0 \in ]-\infty, 1]$  e non avrebbe dunque senso considerare la situazione altrove. In questo intervallo di validità potrò applicare localmente il Teorema di Cauchy, ma non è possibile applicarlo globalmente.

**Nota.** L'argomento di questo capitolo sarà quindi capire quando un modello sia valido globalmente.

**Esempio 23.2** (Un Problema di Cauchy con soluzione globale)

Il Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = \sin(x^2) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad (23.2.1)$$

ammette soluzione globale  $\forall x_0 \in \mathbb{R}$ , pur non soddisfacendo alle ipotesi del [Teorema 23.4](#) (di Cauchy Globale per Lipschitziane)

**Esempio 23.3**

Il Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = x^2 - 1 \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad (23.3.1)$$

ammette soluzione globale per  $x \in [-1, 1]$ , ma non per  $x \in \mathbb{R} \setminus [-1, 1]$

**23.1 Il Caso Lipschitziano**

**Teorema 23.4** (di Cauchy Globale per Lipschitziane)

Data la funzione  $f : I \times \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ , se:

- $I \subset \mathbb{R}$  è **intervallo compatto**
- $f$  è **continua** su  $I \times \mathbb{R}^n$
- $f$  è (globalmente) **Lipschitziana** in  $x \in \mathbb{R}^n$  **uniformemente** rispetto a  $t \in I$

Allora il Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = f(x, t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (23.4.1)$$

ammette un'unica soluzione definita in tutto l'intervallo  $I$

*Dimostrazione.* Analogamente a quanto fatto nel **Teorema 22.7 (di Cauchy Locale - Prima Parte)**, siano:

- $X = \mathbf{C}^0(I, \mathbb{R}^n)$
- $T$  definita come la Eq. (22.7.1), cioè

$$\begin{aligned} T : X &\rightarrow X \\ (T(x))(t) &\mapsto x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, x(\tau)) \, d\tau \end{aligned}$$

I punti fissi di  $T$  sono tutte e sole le soluzioni di Eq. (23.4.1). Grazie al **Teorema 4.20 (dell'Iterata Contrazione)**, per dimostrare l'esistenza di un unico punto fisso, basta dimostrare che un'iterata di  $T$  (**Definizione 4.19 (Funzione Iterata)**) è contrazione.

Nel dettaglio andremo a dimostrare per induzione la seguente forma:

$$\|(T^m(x_2))(t) - (T^m(x_1))(t)\| \leq \frac{(L \cdot |t - t_0|)^m}{m!} \cdot d_X(x_2, x_1)$$

Dove  $L$  è costante di Lipschitzianità di  $f$

- $m = 1$ : Come in dalla Eq. (22.7.5), sappiamo che

$$\|(T(x_2))(t) - (T(x_1))(t)\| \leq (L \cdot |t - t_0|) \cdot d_X(x_2, x_1)$$

- $m > 1$ : Con un procedimento analogo a quello usato per giungere alla Eq. (22.7.5), possiamo ottenere

**Nota.** Le spiegazioni dei passaggi invariati possono essere viste dal **Teorema 22.7 (di Cauchy Locale - Prima Parte)**

$$\|(T^{m+1}(x_2))(t) - (T^{m+1}(x_1))(t)\| =$$

Per **Definizione 21.13 (Equazione di Volterra)**

$$\begin{aligned} &= \left\| \int_{t_0}^t \left( f\left(\tau, (T^m(x_2))(\tau)\right) - f\left(\tau, (T^m(x_1))(\tau)\right) \right) d\tau \right\| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t \left\| f\left(\tau, (T^m(x_2))(\tau)\right) - f\left(\tau, (T^m(x_1))(\tau)\right) \right\| d\tau \right| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t L \cdot \|(T^m(x_2))(\tau) - (T^m(x_1))(\tau)\| d\tau \right| \end{aligned}$$

Grazie alla Lips. di  $f$ , dalla [Definizione 22.1 \(Funzione Localmente Lipschitziana\)](#),

$\|(T(x_2))(\tau) - (T(x_1))(\tau)\| \leq L \cdot d_X(x_2, x_1)$ , dunque essendo  $T^m$  iterata di  $T$ , si moltiplica  $L$  per sé stesso  $m$  volte, da cui  $L^m$ .

In modo analogo (penso) si ottiene  $\frac{|\tau - t_0|^m}{m!}$ . Non lo so...

$$= \left| \int_{t_0}^t L \cdot \frac{(L \cdot |\tau - t_0|)^m}{m!} \cdot d_X(x_2, x_1) d\tau \right|$$

Riordinando i termini

$$= \left| \int_{t_0}^t \frac{L^{m+1}}{m!} \cdot d_X(x_2, x_1) \cdot |\tau - t_0|^m d\tau \right|$$

Essendo però i primi due fattori costanti moltiplicative non legate a  $\tau$

$$\begin{aligned} &= \frac{L^{m+1}}{m!} \cdot d_X(x_2, x_1) \cdot \left| \int_{t_0}^t |\tau - t_0|^m d\tau \right| \\ &= \frac{L^{m+1}}{m!} \cdot d_X(x_2, x_1) \cdot \frac{1}{m+1} \cdot \left| \left[ |\tau - t_0|^{m+1} \right]_{t_0}^t \right| \\ &= \frac{L^{m+1}}{m!} \cdot d_X(x_2, x_1) \cdot \frac{1}{m+1} \cdot \left| |t - t_0|^{m+1} - |t_0 - t_0|^{m+1} \right| \\ &= \frac{L^{m+1}}{m!} \cdot d_X(x_2, x_1) \cdot \frac{1}{m+1} \cdot |t - t_0|^{m+1} \\ &= \frac{(L \cdot |t - t_0|)^{m+1}}{m!} \cdot \frac{1}{m+1} \cdot d_X(x_2, x_1) \\ &= \frac{(L \cdot |t - t_0|)^{m+1}}{(m+1)!} \cdot d_X(x_2, x_1) \end{aligned}$$

Avendo dimostrato che la minorazione vale per  $m$  e per  $m+1$ , la dimostrazione per induzione è conclusa.  $\square$


## 23.2 Il Caso Sublineare

**Definizione 23.5** (Funzione Sublineare)

Una funzione  $f : I \times \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$  con  $I$  intervallo in  $\mathbb{R}$ , si dice **sublineare** se esistono due costanti  $A, B : \forall t \in I, \forall x \in \mathbb{R}^n$  vale:

$$\|f(t, x)\| \leq A + B \|x\|$$

**Nota.** In sostanza una funzione è sublineare se esiste una retta tale per cui il grafico della funzione è tutto nella regione di piano delimitata da questa retta, cioè il suo grafico "non si impenna".



**Esempio 23.6**

Le seguenti funzioni sono:

- $x \cdot \sin(x)$ : Sublineare
- $\sin(x^2)$ : Sublineare
- $\frac{\arctan x^{12}}{x}$ : Sublineare
- $x^2 \cdot \sin(x)$ : Non sublineare
- $x^2$ : Non sublineare
- $e^x$ : Non sublineare

**Esercizio 23.7**

Dimostrare che se una funzione  $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$  è **(globalmente) Lipschitziana**, allora è **sublineare**

*Soluzione.*

$$\begin{aligned} \|f(x)\| &= \\ &= \|f(0) + f(x) - f(0)\| \\ &\leq \|f(0)\| + \|f(x) - f(0)\| \end{aligned}$$

Per [Definizione 3.31 \(Funzione Lipschitziana\)](#) minoriamo

$$\leq \|f(0)\| + L \|x\|$$

Ponendo ora  $A = \|f(0)\|$  e  $B = L$ , si ottiene

$$= A + B \|x\|$$

■

**Esercizio 23.8**

Esibire un esempio di [Definizione 22.1 \(Funzione Localmente Lipschitziana\)](#), ma non **sublineare**

*Soluzione.*  $f(x) = x^2$  è loc. lips. ma non sublineare.

■

**Teorema 23.9** (di Cauchy Globale per Sublineari)

Data la funzione  $f : I \times \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ , se

1.  $I \subseteq \mathbb{R}$  è un **intervallo**
2.  $f$  è **continua** su  $I \times \mathbb{R}^n$
3.  $f$  è **loc. lips.** in  $x \in \mathbb{R}^n$  **uniformemente** rispetto a  $t \in I$
4.  $f$  è **sublineare**

Allora il Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (23.9.1)$$

Ammette un'unica soluzione definita in tutto l'intervallo  $I$

**Nota.** Non è necessario dimostrare l'unicità in quanto la soluzione sarà localmente unica in ogni intorno di un punto e quindi si può espandere ad ogni intorno di ogni punto della soluzione.

È inoltre garantita anche la dipendenza continua, dunque è possibile scegliere un  $\delta$  (dalla [Teorema 22.13 \(di Cauchy Locale - Seconda Parte\)](#)) grande a piacere

*Dimostrazione.* Il [Teorema 22.7 \(di Cauchy Locale - Prima Parte\)](#) assicura esistenza ed unicità della soluzione su un intervallo centrato nell'istante iniziale. È necessario dimostrare che la soluzione può essere estesa a tutto l'intervallo  $I$  in questione. Come già parzialmente anticipato in [Esempio 23.1 \(Un Problema di Cauchy senza soluzione globale\)](#), questo non è possibile in due casi:

1. La soluzione ha asintoto verticale
2. La soluzione oscilla intorno ad un punto e non continua oltre

Quindi i casi in cui la soluzione non si può estendere su tutto l'intervallo sono quelli in cui non esiste il limite della soluzione. Si devono dunque evitare tali comportamenti.

Sia  $\varphi : J \mapsto \mathbb{R}^n$  la soluzione di Eq. (23.9.1) e sia

$$T_M = \sup \{ \overline{t_M} \in I : \varphi \text{ risolve Eq. (23.9.1) su } [t_0, \overline{t_M}[ \} \quad (23.9.2)$$

**Nota.**  $T_M$  è, dunque, l'ultimo tempo fino a cui posso definire una soluzione e la  $t$  utilizzata in seguito è  $t \in [t_0, \overline{t_M}[$

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi(\tau)) \, d\tau$$

Da cui, passando alle norme e minorando per proprietà 3 della [Definizione 1.8 \(Norma\)](#)

$$\|\varphi(t)\| \leq \|x_0\| + \left\| \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi(\tau)) \, d\tau \right\|$$

Grazie all'[Esercizio 22.8](#)

$$\leq \|x_0\| + \left| \int_{t_0}^t \|f(\tau, \varphi(\tau))\| \, d\tau \right|$$

Si può poi togliere il valore assoluto, in quanto sicuramente  $t \geq t_0$  per definizione e, utilizzando la [Definizione 23.5 \(Funzione Sublineare\)](#)

$$\leq \|x_0\| + \int_{t_0}^t (A + B \|\varphi(\tau)\|) \, d\tau$$

Separando l'integrale ed essendo il primo addendo indipendente dalla variabile d'integrazione  $\tau$

$$\leq \|x_0\| + A(t - t_0) + \int_{t_0}^t B \|\varphi(\tau)\| \, d\tau$$

Si minora ulteriormente, passando a  $T_M$

$$\leq \|x_0\| + A(T_M - t_0) + \int_{t_0}^t B \|\varphi(\tau)\| \, d\tau$$

Dunque, applicando il [Lemma 22.11 \(Lemma di Gronwall\)](#) con

- $\delta_0 = \|x_0\| + A(T_M - t_0)$
- $\delta(t) = \|\varphi(t)\|$
- $\kappa(t) = B$
- $a = t_0$

$$\|\varphi(t)\| \leq (\|x_0\| + A(T_M - t_0)) e^{\int_{t_0}^t B \, d\tau}$$

Da cui, minorando ulteriormente con  $T_M$

$$\|\varphi(t)\| \leq (\|x_0\| + A(T_M - t_0)) e^{B(T_M - t_0)} \quad (23.9.3)$$

La  $\varphi(t)$  è quindi limitata sull'intervallo  $[t_0, T_M[$ , dunque non è possibile abbia comportamento asintotico come quello di [Esempio 23.1 \(Un Problema di Cauchy senza soluzione globale\)](#). Ricordando che  $\varphi(t)$  è soluzione della Eq. (23.9.1), otteniamo

$$\begin{aligned} \|\varphi'(t)\| &= \|f(t, \varphi(t))\| \\ &\leq \sup_{t \in [t_0, T_M[} \|f(t, x)\| \end{aligned} \quad (23.9.4)$$

Quindi sia  $\varphi(t)$  che  $\varphi'(t)$  sono limitate, dunque la  $\varphi$  è **uniformemente continua** su  $[t_0, T_M]$ , come da [Proposizione 8.28](#). Da [Proposizione 3.22](#), se la  $\varphi(t)$  è uniformemente continua, allora è **continua**, cioè implica che  $\lim_{t \rightarrow T_M} \varphi(t) = \varphi(T_M)$ .

Essendo  $\varphi(T_M) \in \mathbb{R}^n$ , posso usare questo punto come condizione iniziale del seguente Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(T_M) = \varphi(T_M) \end{cases} \quad (23.9.5)$$

Se  $T_M < \sup I$ , Eq. (23.9.5) soddisfa le ipotesi del [Teorema 22.7 \(di Cauchy Locale - Prima Parte\)](#), dunque  $\varphi$  può essere estesa oltre  $T_M$  ad una funzione definita almeno su  $[t_0, T_M + \delta[$  con  $\delta > 0$  scelto opportunamente. Questa possibilità di estendere la  $\varphi$  è però in contraddizione con la definizione di  $T_M$  in Eq. (23.9.2), dunque si deve concludere che

$$T_M = \sup I$$

Procedimento analogo si può svolgere per

$$T_m = \inf \{ \overline{t_m} \in I : \varphi \text{ risolve Eq. (23.9.1) su } ]\overline{t_m}, t_0] \}$$

I passaggi rimangono uguali fino a Eq. (23.9.3) che diventa

$$\|\varphi(t)\| \leq (\|x_0\| + A(T_M - t_0))e^{B(t_0 - T_m)}$$

E, a sua volta, Eq. (23.9.4) diventa

$$\begin{aligned} \|\varphi'(t)\| &= \|f(t, \varphi(t))\| \\ &\geq \min_{t \in ]T_m, t_0]} \|f(t, x)\| \end{aligned}$$

Dunque

$$T_m = \inf I$$

Grazie a come sono definiti  $T_M$  e  $T_m$ , è stata quindi trovata una soluzione sull'intervallo  $I$  che si può dire **globale** per quanto appena dimostrato.  $\square$

**Esempio 23.10** (Esempio critico al [Teorema 23.9 \(di Cauchy Globale per Sublineari\)](#))

Dato il Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = (1 - \cos x)x^2 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

**Esempio 23.11**

Per ogni  $x_0 \in \mathbb{R}$ , il Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = x^2 \cdot \sin x \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

soddisfa le ipotesi 1., 2. e 3. del [Teorema 23.9 \(di Cauchy Globale per Sublineari\)](#), ma  $f(x) = x^2 \cdot \sin x$  non è né **globalmente lipschitziana**, né **sublineare** su  $\mathbb{R}$ . tuttavia, per ogni  $x_0 \in \mathbb{R}$ , questo problema ammette soluzioni globali definite su tutto  $\mathbb{R}$

**Esercizio 23.12**

Sono date le funzioni  $f_n : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ , ciascuna soddisfacente alle ipotesi del [Teorema 23.9 \(di Cauchy Globale per Sublineari\)](#). Per un fissato  $\bar{x}$  in  $\mathbb{R}^n$ , sia  $\varphi_n$  per ogni  $n \in \mathbb{N}$  la soluzione del Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = f_n(x) \\ x(0) = \bar{x} \end{cases}$$

Verificare che se le  $f_n$  convergono uniformemente (ricordando [Definizione 19.18 \(Convergenza Uniforme\)](#)), allora anche le  $\varphi_n$  convergono uniformemente.

## 24 Equazioni Autonome

**Definizione 24.1** (Equazione Autonoma)

Un'equazione differenziale ordinaria si dice **autonoma** se e solo se la variabile indipendente (solitamente il tempo) non vi compare esplicitamente.

*Nota.* L'assenza della variabile indipendente significa, concettualmente, che l'istante iniziale non è importante ai fini dello studio dell'equazione, ma essa dipende solo dalla lunghezza dell'intervallo.

*Nota.* In fisica le equazioni differenziali autonome spesso modellizzano sistemi isolati

**Proposizione 24.2** (Invarianza per Traslazione Temporale)

Se la funzione  $\varphi : [a, b] \mapsto \mathbb{R}^n$  risolve il Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = f(x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Allora, qualunque sia  $T \in \mathbb{R}$ , la funzione  $\psi : [a - T, b - T] \mapsto \mathbb{R}^n$  data da  $\psi(t) = \varphi(t + T)$  è soluzione del Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = f(x) \\ x(t_0 - T) = x_0 \end{cases}$$

*Dimostrazione.* Posta la  $\psi(t) = \varphi(t + T)$

$$\begin{aligned} \psi'(t_0) &= \varphi'(t_0 + T) = f(\varphi(t_0 + T)) = f(\psi(t_0)) \\ \psi(0) &= \varphi(t_0) = x_0 \end{aligned}$$

□

**Proposizione 24.3**

Ogni equazione differenziale ordinaria in forma normale con secondo membro continuo è equivalente ad un'equazione autonoma.

*Dimostrazione.*

$$x' = f(t, x) \quad \text{equivale a} \quad \begin{cases} x' = f(t, x) \\ t' = 1 \end{cases}$$

□

**Proposizione 24.4** (Teorema dell'Energia Cinetica)

Un punto materiale non vincolato  $P$  di massa  $m$ , si muove sotto l'azione di una forza  $F$  che dipende solo dalla posizione di  $P$ .

Allora la variazione di Energia Cinetica di  $P$  è uguale al lavoro compiuto su  $P$  da questa forza.

*Dimostrazione.* Sia  $\mathbf{x} = (x, y, z)$  la terna di coordinate di  $P$ . Per il Secondo Principio della Dinamica e per quanto assunto sulla forza  $F$ , il moto di  $P$  è descritto dalla seguente equazione differenziale ordinaria vettoriale del secondo ordine

$$m\mathbf{x}'' = F(\mathbf{x})$$

Dunque, moltiplicando ambo i membri

$$m\mathbf{x}'' \cdot \mathbf{x}' = F(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{x}'$$

Integrando a sinistra con la  $\int [f(x)]^n f'(x) dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + c$  posto  $f(x) = \mathbf{x}'$

$$\frac{1}{2}m \frac{d}{dt} (\mathbf{x}')^2 = F(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{x}'$$



Applicando ora integrazione definita tra 0 e  $t$

$$\frac{1}{2}m(\mathbf{x}'(t))^2 - \frac{1}{2}m(\mathbf{x}'(0))^2 = \int_0^t F(\mathbf{x}(\tau)) \cdot \mathbf{x}'(\tau) \, d\tau$$

Passando alla soluzione  $x$  ed alla  $\xi$ , traiettoria di  $P$

$$\frac{1}{2}m(\mathbf{x}'(t))^2 - \frac{1}{2}m(\mathbf{x}'(0))^2 = \int_{x(0)}^{x(t)} F(\xi) \, d\xi$$

□

**Esercizio 24.5**

Estendere la dimostrazione della [Proposizione 24.4 \(Teorema dell'Energia Cinetica\)](#) nel caso di  $n$  punti soggetti a forze dipendenti unicamente dalle posizioni dei punti.

**Esercizio 24.6**

Dedurre il Principio di Conservazione dell'Energia nel caso in cui  $F$  ammetta un potenziale

**Esercizio 24.7**

Come viene modificata la [Proposizione 24.4 \(Teorema dell'Energia Cinetica\)](#) se la forza  $F$  dipende anche dalla velocità  $\mathbf{x}'$ ?

**Esercizio 24.8**

È possibile scrivere un'equazione differenziale ordinaria autonoma del primo ordine avente come soluzione la funzione  $x(t) = \sin t$  per  $t \in [0, \pi]$ ?

E la funzione  $x(t) = t^3$  per  $t \in [-1, 1]$ ?

## 25 Equazioni Differenziali Lineari

Di seguito verranno utilizzati l'identificazione ed i risultati della [sezione 15 \(Funzioni a Valori in  \$\mathbb{C}\$ \)](#), in particolare [Esercizio 15.1](#)

**Definizione 25.1** (Equazione Differenziale Ordinaria Lineare)

Sia  $I \subseteq \mathbb{R}$  un intervallo e  $n \in \mathbb{N}$ . Date le  $n + 1$  funzioni  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, f : I \mapsto \mathbb{C}$ , si dice **Equazione Differenziale Ordinaria Lineare di ordine  $n$**  l'equazione differenziale

$$x^{(n)} + a_{n-1}(t) \cdot x^{(n-1)} + \dots + a_1(t) \cdot x' + a_0(t) \cdot x = f(t)$$

Se  $f = 0$  l'equazione si dice **Omogenea**.

**Proposizione 25.2** (Estensione in  $\mathbb{C}$  del Teorema di Cauchy Globale per Lipschitziane)

Sia  $I$  un intervallo compatto tale che  $\mathring{I} \neq \emptyset$ , siano  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, f \in \mathbf{C}^0(I; \mathbb{C})$ .

Allora per ogni  $t_0 \in \mathring{I}$  e  $c_0, c_1, \dots, c_{n-1} \in \mathbb{C}$  il Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x^{(n)} &= -\sum_{k=1}^{n-1} a_k(t) \cdot x^{(k)} + f(t) \\ x(t_0) &= c_0 \\ x'(t_0) &= c_1 \\ &\vdots \\ x^{(n-2)}(t_0) &= c_{n-2} \\ x^{(n-1)}(t_0) &= c_{n-1} \end{cases} \quad (25.2.1)$$

soddisfa alle ipotesi del [Teorema 23.4 \(di Cauchy Globale per Lipschitziane\)](#)

*Dimostrazione.* Introducendo la variable  $X \in \mathbb{C}^n$  ed il dato  $C \in \mathbb{C}^n$  definiti da

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_{n-1} \\ X_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ x' \\ \vdots \\ x^{(n-2)} \\ x^{(n-1)} \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_{n-1} \\ C_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-2} \\ c_{n-1} \end{bmatrix}$$

Come da [Proposizione 21.6](#), un'equazione differenziale lineare di ordine  $n$  può essere trasformata in un sistema di  $n$  equazioni del primo ordine, dunque la prima equazione di Eq. (25.2.1), può diventare

$$\begin{cases} X'_1 = X_2 \\ X'_2 = X_3 \\ \vdots \\ X'_{n-1} = X_n \\ X'_n = -\sum_{k=1}^{n-1} (a_k(t) \cdot X_{k+1}) + f(t) \end{cases} \quad (25.2.2)$$

Passando dalle singole equazioni del nuovo sistema Eq. (25.2.2) alla variabile unica  $X$  in  $n$  coordinate, tutta la Eq. (25.2.1) è

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} X'_1 \\ X'_2 \\ \vdots \\ X'_{n-1} \\ X'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_2 \\ X_3 \\ \vdots \\ X_n \\ -\sum_{k=1}^{n-1} (a_k(t) \cdot X_{k+1}) + f(t) \end{bmatrix} \\ X(t_0) = C \end{cases}$$

Infine la funzione

$$F : I \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$$

$$(t, X) \mapsto \begin{bmatrix} X_2 \\ X_3 \\ \vdots \\ X_n \\ -\sum_{k=1}^{n-1} (a_k(t)x^k) + f(t) \end{bmatrix}$$

è lineare in  $X$  (compaiono solo elementi di grado 1) e globalmente lipschitziana in  $X$  uniformemente in  $t$ , infatti per ogni  $X, Y \in \mathbb{C}^n$

$$\|F(t, X) - F(t, Y)\| \leq \sqrt{1 + \left( \max_k \sup_I \|a_k\| \right)^2} \cdot \|X - Y\|$$

Sono quindi soddisfatte le ipotesi di [Teorema 23.4 \(di Cauchy Globale per Lipschitziane\)](#) e si ha la tesi.  $\square$

La locuzione **Lineare**, attribuita alle equazioni differenziali analizzate in questo capitolo, è giustificata dalla proposizione seguente.

### Proposizione 25.3

Sia  $I \subseteq \mathbb{R}$  un intervallo e  $n \in \mathbb{N}$ . Date le  $n+1$  funzioni  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, f : I \rightarrow \mathbb{C}$ , l'operatore

$$L : \mathbf{C}^n(I; \mathbb{C}) \rightarrow \mathbf{C}^0(I; \mathbb{C})$$

$$x \mapsto x^{(n)} + \sum_{k=1}^{n-1} a_k(t) \cdot x^{(k)}$$

è lineare

*Dimostrazione.* La linearità di  $L$  equivale a:

$$L(x_1 + x_2) = L(x_1) + L(x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbf{C}^n(I; \mathbb{C})$$

$$L(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot L(x) \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}, \forall x \in \mathbf{C}^n(I; \mathbb{C})$$

Entrambe le condizioni seguono dalle regole di derivazione, come da [sezione 15 \(Funzioni a Valori in  \$\mathbb{C}\$ \)](#).  $\square$

### Proposizione 25.4

L'insieme delle soluzioni dell'equazione lineare omogenea

$$x^{(n)} + a_{n-1}(t) \cdot x^{(n-1)} + \dots + a_1(t) \cdot x' + a_0(t) \cdot x = 0 \quad (25.4.1)$$

è un sottospazio vettoriale di  $\mathbf{C}^n(I; \mathbb{C})$  di dimensione  $n$

*Dimostrazione.* Se  $x_1, x_2$  sono soluzioni e se  $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ , allora anche  $\lambda x_1 + \mu x_2$  è soluzione, infatti, per la [Proposizione 25.3](#)

$$L(x_1 + x_2) = L(x_1) + L(x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbf{C}^n(I; \mathbb{C}) = 0$$

Ciò permette, grazie alla [Proposizione 1.6](#), di concludere che l'insieme delle soluzioni è sottospazio di  $\mathbf{C}^n(I; \mathbb{C})$

Fissato  $t_0 \in \overset{\circ}{I}$  e scelta una base  $(E_1, \dots, E_n)$  di  $\mathbb{C}^n$ , sia  $x_k$ , per  $k = 1, \dots, n$  la soluzione del seguente Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x^{(n)} = -\sum_{k=1}^{n-1} a_k(t) \cdot x^{(k)} \\ x(t_0) = (E_k)_1 \\ x'(t_0) = (E_k)_2 \\ \vdots \\ x^{(n-2)}(t_0) = (E_k)_{n-1} \\ x^{(n-1)}(t_0) = (E_k)_n \end{cases}$$

Si può concludere che  $(x_1, \dots, x_n)$  sia una base dello spazio delle soluzioni dell'equazione omogenea Eq. (25.4.1).

Infatti se  $\bar{x}$  è una soluzione della Eq. (25.4.1), allora esistono coefficienti  $a_1, \dots, a_n$  tali che  $\bar{x}(t_0) = \sum_{k=1}^n a_k E_k$ . Quindi  $\bar{x}$  risolve anche il Problema di Cauchy

$$\begin{cases} x^{(n)} = -\sum_{k=1}^{n-1} a_k(t) \cdot x^{(k)} \\ x(t_0) = \sum_{k=1}^n a_k \cdot (E_k)_1 \\ x'(t_0) = \sum_{k=1}^n a_k \cdot (E_k)_2 \\ \vdots \\ x^{(n-2)}(t_0) = \sum_{k=1}^n a_k \cdot (E_k)_{n-2} \\ x^{(n-1)}(t_0) = \sum_{k=1}^n a_k \cdot (E_k)_{n-1} \end{cases}$$

Per costruzione anche la funzione  $\sum_{k=1}^n a_k \cdot x_k$  risolve lo stesso Problema di Cauchy. Quindi, per la [Proposizione 25.2 \(Estensione in  \$\mathbb{C}\$  del Teorema di Cauchy Globale per Lipschitziane\)](#) ed il [Teorema 23.4 \(di Cauchy Globale per Lipschitziane\)](#),  $\bar{x}(t) = \sum_{k=1}^n a_k \cdot x_k(t)$  per ogni  $t \in I$ .

Se per opportuni scalari  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  si ha

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n \lambda_k \cdot x_k = 0 \\ \implies & \sum_{k=1}^n \lambda_k \cdot x_k(t) = 0 \quad \forall t \in I \\ \implies & \sum_{k=1}^n \lambda_k \cdot x_k^{(h)}(t) = 0 \quad \begin{cases} \forall t \in I \\ \forall h = 0, \dots, n-1 \end{cases} \\ \implies & \sum_{k=1}^n \lambda_k \cdot x_k^{(h)}(t) = 0 \quad \forall h = 0, \dots, n-1 \\ \implies & \sum_{k=1}^n \lambda_k \cdot E_k = 0 \\ \implies & \lambda_k = 0 \quad \forall h = 0, \dots, n-1 \end{aligned}$$

□

**Nota.** Utilizzando la notazione tipica dell'Algebra Lineare, l'insieme delle soluzioni è  $\ker L$ , il *nucleo (kernel)* dell'operatore lineare  $L$

**Definizione 25.5** (Sistema Fondamentale di Soluzioni)

Dato  $\ker L$ , lo spazio vettoriale delle soluzioni, una base di  $\ker L$  è **Sistema Fondamentale di Soluzioni** dell'equazione omogenea

$$x^{(n)} + a_{n-1}(t) \cdot x^{(n-1)} + \dots + a_1(t) \cdot x' + a_0(t) \cdot x = 0$$

**Definizione 25.6** (Soluzione Particolare)

**Soluzione Particolare** dell'equazione lineare non omogenea

$$x^{(n)} + a_{n-1}(t) \cdot x^{(n-1)} + \dots + a_1(t) \cdot x' + a_0(t) \cdot x = f(t)$$

è una qualunque soluzione di questa equazione.

**Proposizione 25.7**

Nota una soluzione particolare  $\bar{x}$  dell'equazione non omogenea

$$x^{(n)} + a_{n-1}(t) \cdot x^{(n-1)} + \dots + a_1(t) \cdot x' + a_0(t) \cdot x = f(t)$$

e noto un sistema fondamentale di soluzioni  $(x_1, \dots, x_n)$  dell'equazione omogenea

$$x^{(n)} + a_{n-1}(t) \cdot x^{(n-1)} + \dots + a_1(t) \cdot x' + a_0(t) \cdot x = 0$$

ogni soluzione  $x$  dell'equazione non omogenea può essere scritta come

$$x = \bar{x} + \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$$

per opportune costanti  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$

*Dimostrazione.*

□

### Esercizio 25.8

Risolvere il Problema di Cauchy per una generica equazione lineare del primo ordine

$$\begin{cases} x' + p(t) \cdot x = q(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

con  $p, q \in \mathbf{C}^0(R; R)$ .

*Soluzione.* Suggerimento: moltiplicare ambo i membri dell'equazione per  $e^{\int_{t_0}^t p(\tau) d\tau}$  ed integrare

■

## 26 Equazioni Lineari a Coefficienti Costanti

**Definizione 26.1** (Equazione Differenziale Ordinaria Lineare a Coefficienti Costanti)

Dati i coefficienti  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, b \in \mathbb{C}$  si dice **Equazione Differenziale Ordinaria Lineare di ordine  $n$  a Coefficienti Costanti** l'equazione differenziale

$$x^{(n)} + a_{n-1} \cdot x^{(n-1)} + \dots + a_1 \cdot x' + a_0 \cdot x = b$$

Se  $b = 0$ , l'equazione si dice **omogenea**.

La sua **Equazione Caratteristica** è l'equazione algebrica

$$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 = 0$$

**Osservazione 26.2**

Nella risoluzione di equazioni differenziali lineari la funzione esponenziale  $t \mapsto e^{\lambda t}$  riveste un ruolo molto particolare. Questa funzione è un *autovalore* dell'operatore di derivazione  $D$  relativo all'*autovalore*  $\lambda$ , risolve infatti  $Dx = \lambda \cdot x$ , come da [Proposizione 15.5](#).

**Proposizione 26.3**

Data l'equazione

$$x^{(n)} + a_{n-1} \cdot x^{(n-1)} + \dots + a_1 \cdot x' + a_0 \cdot x = b$$

allora

$$x(t) = e^{\lambda t} \text{ risolve l'equazione omogenea } \iff \lambda \text{ è soluzione dell'equazione caratteristica.}$$

*Dimostrazione.* Sia  $L$  l'operatore definito dal membro sinistro dell'equazione come nella [Proposizione 25.3](#). Allora se  $x(t) = e^{\lambda t}$ , si ha che

$$(L(x))(t) = (\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0)e^{\lambda t}$$

□

**Lemma 26.4**

Sia  $x(t) = t \cdot e^{\lambda t}$ . Allora, per ogni  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 1$  si ha

$$x^{(n)}(t) = (\lambda^n t + n\lambda^{n-1}) e^{\lambda t}$$

*Dimostrazione.* Per induzione su  $n$ .

Se  $n = 0$ , allora  $x^{(0)} = x$ . Supposto vero che

$$x^{(n-1)}(t) = (\lambda^{n-1}t + (n-1)\lambda^{n-2})e^{\lambda t}$$

Da cui, derivando rispetto a  $t$ , si ottiene la tesi.

□

**Proposizione 26.5**

Data l'equazione

$$x^{(n)} + a_{n-1} \cdot x^{(n-1)} + \dots + a_1 \cdot x' + a_0 \cdot x = b$$

allora

$$x(t) = t \cdot e^{\lambda t} \text{ risolve l'equazione omogenea}$$

$$\iff$$

$\lambda$  è soluzione dell'equazione caratteristica con molteplicità almeno 2

*Dimostrazione.* Sia  $P(\lambda) = \lambda^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \lambda^k$ . Sia ha

$$\begin{aligned} (L(x))(t) &= x^{(n)}(t) + \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^{(k)}(t) \\ &= (\lambda^n t + n\lambda^{n-1}) e^{\lambda t} + \left( \sum_{k=1}^{n-1} a_k (\lambda^k t + k\lambda^{k-1}) + a_0 t \right) e^{\lambda t} \\ &= \left( \lambda^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \lambda^k \right) t e^{\lambda t} + \left( n\lambda^{n-1} + \sum_{k=1}^{n-1} a_k k \lambda^{k-1} \right) e^{\lambda t} \\ &= \left( P(\lambda)t + \frac{dP}{d\lambda}(\lambda) \right) e^{\lambda t} \end{aligned}$$

□

### Proposizione 26.6

Sia  $m \in \mathbb{N}$ . Data l'equazione

$$x^{(n)} + a_{n-1} \cdot x^{(n-1)} + \dots + a_1 \cdot x' + a_0 \cdot x = b$$

allora

$$x(t) = t^m \cdot e^{\lambda t} \text{ risolve l'equazione omogenea}$$

$$\Longleftrightarrow$$

$\lambda$  è soluzione dell'equazione caratteristica con molteplicità almeno  $m$

*Dimostrazione.* Omessa

□

### Esempio 26.7

L'equazione lineare del secondo ordine a coefficienti costanti

$$x'' - 2x' + x = 0$$

ha equazione caratteristica

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$

ed integrale generale

$$(x_1(t) = e^t, x_2(t) = te^t)$$

## 27 Esempi

### 27.1 La Legge di Malthus


Una popolazione, dotata di tutto il necessario per vivere e riprodursi, cresce secondo la legge di Malthus: la velocità di crescita della popolazione è proporzionale alla popolazione stessa.

$$x' = k \cdot x$$

dove  $x$  è il numero di membri della popolazione e  $k$  è una costante positiva legata alla prolificità della specie in esame, generalmente calcolata come differenza tra i tassi di natalità e di mortalità.

Il problema di Cauchy è quindi

$$\begin{cases} x' = k \cdot x \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad \text{con } x \in \mathbb{R}, k > 0 \text{ e } x_0 > 0$$



blablabla ....

.....

Limiti di questo modello:

- la variabile  $x$  dovrebbe variare in  $\mathbb{N}$ , poiché una popolazione ha un numero intero di elementi.
- In molte specie è verosimile che il numero di nati al tempo  $t$  dipenda dalla popolazione presente ad un tempo precedente  $x(t - T)$ ,  $T > 0$
- Supporre che una popolazione abbia per sempre a disposizione risorse sufficienti può non essere realistico
- Questo modello va bene quando si considerano intervalli di tempo molto lunghi.



## Capitolo 6

# Calcolo delle Variazioni

## 28 Preliminari

Il calcolo delle variazioni si occupa dell'ottimizzazione di funzioni  $F : X \mapsto \mathbb{R}$ , dove  $X$  è un insieme di funzioni. In questo capitolo verranno considerati univocamente funzionali integrali del tipo

$$\begin{aligned} F : X &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow \int_a^b f(t, x(t), x'(t)) dt \end{aligned}$$

eventualmente soggetti a vincoli sui valori  $x(a)$  e  $x(b)$  o sul valore di un integrale del tipo  $\int_a^b \varphi(x(t)) dt$ .  
Dove:

$$\begin{aligned} f &: [a, b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R} \\ X &= \{x \in \mathbf{C}^1([a, b]); \mathbb{R}^n \text{ t.c.: } x(a) = x_a, x(b) = x_b\}, \text{ con } x_a, x_b \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

### Proposizione 28.1

Sia  $f \in \mathbf{C}^1(A \times \mathbb{R}; \mathbb{R})$  con  $a \subseteq \mathbb{R}^n$

Se  $\begin{array}{ccc} F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times A & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \rightarrow & \int_a^b f(x, t) dt \end{array}$  Allora:

$$\begin{aligned} F &\in \mathbf{C}^1 \\ \partial_\alpha F(\alpha, \beta, x) &= -f(x, \alpha) \\ \partial_\beta F(\alpha, \beta, x) &= f(x, \beta) \\ \nabla_x F(\alpha, \beta, x) &= \int_a^b \nabla_x f(x, t) dt \end{aligned}$$

### Definizione 28.2

????????????? R OPPURE RN

Sia  $I \in \mathbb{R}$  un intervallo. Curva su  $I \mathbb{R} \Rightarrow$  una funzione  $\gamma : I \subseteq \mathbb{R}^n$  che sia continua.

### Osservazione 28.3

$\gamma(I)$  si chiama supporto della curva, ed è certamente connesso. (una funzione continua manda intervalli connessi in connessi)

### Definizione 28.4

Sia  $\gamma : [a, b] \mapsto \mathbb{R}^n$  una curva, lunghezza della curva  $\Rightarrow l(\gamma) = \sup \left\{ \sum_{i=1}^N \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\| : N \in \mathbb{N} N > 1, t_0 = a, t_N = b, t_{i-1} < t_i \right\}$   
cioè prendo una curva e la approssimo con una spezzata, la più lunga di tutte le poligonali è la lunghezza della curva.

DISEGNO

DISEGNO

### Definizione 28.5

Una curva  $\gamma : [a, b] \mapsto \mathbb{R}^n$  si dice rettificabile  $\Rightarrow l(\gamma) < +\infty$

### Osservazione 28.6

$$\sum_{i=1}^N \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\|$$

per il teorema del valore medio differenziale (accrescimenti finiti)

$$\sum_{i=1}^N \|\gamma'(t_i)(t_i - t_{i-1})\| = ??$$

$$\int_a^b \|\gamma'(t)\| dt$$

**Proposizione 28.7**

Se  $\gamma \in \mathbf{C}^1([a, b]; \mathbb{R}^n) \Rightarrow l(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| \, dt$

**Osservazione 28.8**

Se  $\gamma$  è la traiettoria di un punto materiale, allora  $\|\gamma\|$  è la norma della velocità istantanea, e quindi  $l(\gamma)$  è lo spazio che si percorre, cioè l'integrale della velocità valutato tra  $t_i$  e  $t_f$  due istanti di tempo entro i quali si mantiene tale velocità.

**Osservazione 28.9**

Nel caso specifico sarà:

$$X = \{x \in \mathbf{C}^1([a, b]; \mathbb{R}^2) : x(a) = A, x(b) = B\}$$


$$\begin{aligned} F : X &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow \int_a^b \|x'(t)\| \, dt \\ f : [a, b] \times \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (t, x, x') &\rightarrow \|x'(t)\| \end{aligned}$$

## 29 L'Equazione di Eulero

LEMMA:::LEMMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO DELLE VARIAZIONI

Sia  $f \in \mathbf{C}^0([0, 1]; \mathbb{R})$  t.c.:  $\forall v \in \mathbf{C}^0([0, 1]; \mathbb{R})$  con  $v(0) = v(1) = 0$  si abbia  $\int_0^1 f(x)v(x) dx = 0$

Allora  $f(x) \equiv 0 \forall x \in [0, 1]$



*Dimostrazione.*

Per Assurdo, se  $f \not\equiv 0$ , allora  $\exists [0, 1]$  t.c.  $f(x_0) \neq 0$ .

Osservo che se  $x_0 = 0$  allora  $\exists \bar{x}_0 \in ]0, 1[$  t.c.  $f(\bar{x}_0) \neq 0$ .

Osservo che se  $x_0 = 1$  allora  $\exists \bar{x}_0 \in ]0, 1[$  t.c.  $f(\bar{x}_0) \neq 0$

Entrambe le osservazioni per la continuità di  $f$ , significa che se  $x_0$  è un punto in cui la  $f > 0$  allora per la continuità della funzione anche lì vicino si hanno valori maggiori di zero.

Quindi si può pensare  $x_0 \in ]0, 1[$ .

Allora  $\exists a, b \in ]0, 1[$  t.c.  $x_0 \in ]a, b[$  vale che  $|f(x)| \geq |f(x_0)|$  sempre per la continuità di  $f$ .

Pensiamo  $f(x_0) > 0$  in questo modo  $|f(x_0)| = f(x_0)$  e scegliamo la funzione  $v(x)$  come disegnata:  $v(x) =$

$$\begin{cases} 0 & x \leq x_0 - \delta \\ \frac{x}{\delta} - \frac{x_0 - \delta}{\delta} & x_0 - \delta < x < x_0 \\ 1 & x = x_0 \\ -\frac{x}{\delta} + \frac{x_0 + \delta}{\delta} & x_0 < x < x_0 + \delta \\ 0 & x \geq x_0 + \delta \end{cases} \quad \text{POSSIBILIPLAUSIBILIERRORI}$$

Se calcoliamo

$$\int_0^1 f(x)v(x) dx = \int_a^b f(x)v(x) dx \geq \frac{1}{2}f(x_0) \int_a^b v(x) dx = \frac{1}{2}f(x_0) \frac{b-a}{2} > 0$$

Se avessi preso  $f(x_0) < 0$  prendo  $v = -v$  e il resto segue... □

### Osservazione 29.1

Questo lemma è concettualmente analogo al Teorema di Fermat nel capitolo delle derivate.

### Corollario 29.2

LEMMA CASO VETTORIALE.

Sia  $f \in \mathbf{C}^0([a, b]; \mathbb{R}^n)$  tale che  $\forall v \in \mathbf{C}^0([a, b]; \mathbb{R}^n)$  con  $v(0) = v(1) = 0$  si abbia  $\int_0^1 f(x) \bullet v(x) dx = 0$  allora  $f(x) \equiv 0 \forall x \in [0, 1]$ .


*Dimostrazione.* Per questa dimostrazione si osservano componente per componente.

$$\forall i = 1, 2, \dots, n \text{ scelgo } v_j(x) = \begin{cases} 0 & j \neq i \\ v_i(x) & j = i \end{cases}$$

A questo punto applico il lemma fondamentale alla componente  $i$ -esima  $f_i$  di  $f$ . □

### Corollario 29.3

Sia  $f \in \mathbf{C}^0([a, b]; \mathbb{R})$  e  $k \in \mathbb{N}$  tale che  $\forall v \in \mathbf{C}^k([a, b]; \mathbb{R}^n)$  con  $v(0) = v(1) = 0$  si abbia  $\int_0^1 f(x)v(x) dx = 0$  allora  $f(x) \equiv 0 \forall x \in [0, 1]$ .



*Dimostrazione.*

È sempre lo stesso lemma con l'aggiunta che la funzione  $v$  sia di classe  $\mathbf{C}^k$ .  
Se si chiama  $u$  la funzione blu e  $v$  la funzione rossa abbiamo:

$$\int_0^1 f(x)u(x) dx > 0$$

Se  $v$  è un po più regolare, prendiamo  $v = u^{(k+1)}(x)$ . cioè se vogliamo  $v \in \mathbf{C}^k$  prendiamo.....  
 LA DIMOSTRAZIONE È A ME INCOMPRESIBILE. □

**Teorema 29.4**

EQUAZIONE DI EULERO.

Sia  $f \in \mathbf{C}^2([a, b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R})$  con  $a, b \in \mathbb{R}$  e  $a < b$ .

Sia  $X = \{x \in \mathbf{C}^2([a, b]; \mathbb{R}^n) : x(a) = A, x(b) = B\}$  con  $A, B \in \mathbb{R}^n$ .

Sia 
$$F : X \rightarrow \mathbb{R}$$
  

$$x \rightarrow \int_a^b f(t, x(t), x'(t)) dt.$$

Se la funzione  $x_* \in X$  è t.c.  $F(x_*) = \max \{F(x) : x \in X\}$  [o min]

Allora  $\partial_x f(t, x_*(t), x'_*(t)) - \frac{d}{dt} \partial_{x'} f(t, x_*(t), x'_*(t)) = 0$ .

Questa ultima equazione è l'equazione di Eulero-Lagrange del Funzionale  $F$  o a volte detta variazione prima del funzionale  $F$ . è un sistema di  $n$  equazioni differenziali ordinarie del secondo ordine nella funzione incognita  $x_*$ .

*Dimostrazione.* Sia  $\varphi(h) = F(x_* + hv)$ , dove  $x_* \in X$  e  $x_* + hv \in X$ , con  $h$  piccolo.

L'equazione di Eulero-Lagrange in apparenza complicata è analoga ad un'equazione di analisi del tipo  $f' = 0$  oppure in analisi due a  $\nabla f = 0$ . solo che ora sono cavoli amari.

Come si sceglie la variazione  $v$  in modo che  $x_* + hv \in X$ , con  $h$  piccolo.

$X$  è l'insieme delle funzioni di  $\mathbf{C}^2$ , si sa che  $x_* \in \mathbf{C}^2$ , una scelta opportuna di  $v$  è  $v \in \mathbf{C}^2([a, b]; \mathbb{R}^n)$ .

Inoltre deve essere che  $x_*(a) + hv(a) = A$  e  $x_*(b) + hv(b) = B$  per restare dentro l'insieme  $X$ . Quindi  $v(a) = v(b) = 0$ .  $h$  è uno scalare e per ipotesi si sa che  $F(x_*)$  è punto di massimo, quindi si conclude che  $h = 0$  è punto di massimo per la funzione  $\varphi$ .

..... □

e qui finiscono gli appunti almeno per conto mio.



# Capitolo 7

## Temi Esame

### 30 T.E. 2012/2013 scritto n.1

#### Esercizio 30.1

Sia  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  data da  $f(x, y) = e^{-|4 \cdot \arctan(xy^2)|}$

**A** Nessuna delle altre affermazioni è esatta

**B**  $f$  ammette almeno un punto di minimo assoluto

**C**  $\inf_R^2 f = 0$

**D**  $f$  ha infiniti punti di massimo

L'esponente è una funzione monotona crescente quindi la ricerca di massimi a minimi si sposta alla ricerca dei massimi e minimi dell'esponente.

L'esponente assume sempre valori negativi. Inoltre risulta essere una quantità limitata tra  $[0; 4\frac{\pi}{0}[$ , quindi  $\sup_R^2 f = e^0 = 1$  e  $\inf_R^2 f = e^{-2\pi}$

Sono quindi punti di massimo tutti i punti che rendono nullo l'esponente:  $\arctan(xy^2) = 0 \Rightarrow x = 0, \forall y$  o  $y = 0, \forall x$  che sono i due assi. Essendo questi punti del dominio allora si può dire  $\sup_R^2 f = \max_R^2 f = 0$

I punti di minimo si hanno per  $|\arctan(xy^2)| = \frac{\pi}{2}$  quindi per  $x \rightarrow \pm\infty$  o  $y \rightarrow \pm\infty$  essendo questi valori al limite il valore  $e^{-2\pi}$  è  $\inf$  per  $f$

La risposta vera è quindi la D.

#### Esercizio 30.2

Sia  $(X, d)$  uno spazio metrico e siano  $A, B$  sottoinsiemi di  $X$ . Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono certamente vera/e?

**1**  $A \subseteq B \Rightarrow \partial A \subseteq \partial B$

**2**  $A \subseteq B \Rightarrow \overline{A} \subseteq \overline{B}$

**A** Entrambe

**B** Solo la seconda

**C** Nessuna delle affermazioni è esatta

**D** Solo la prima

La prima affermazione è certamente falsa poiché se scelto come spazio metrico  $\mathbb{R}^2$  con distanza quella euclidea. Scelgo  $A = B((0, 0), 2)$ ,  $B = B((0, 0), 1)$  allora si ha che  $\partial A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : d((x, y), (0, 0)) = 2\}$  e  $\partial B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : d((x, y), (0, 0)) = 1\}$  e questi due insiemi sono disgiunti.

la seconda è vera ma devo pensarci un po...





# Appendici



## A Forme Quadratiche

In questa sezione saranno riportati solo i risultati più importanti sulle forme quadratiche, quelli necessari alla ricerca di punti estremanti di funzioni a più variabili. Nel dettaglio, si vedrà come stabilire il segno di una forma quadratica.

Per un'esposizione dettagliata e completa si rimanda ad un libro di Algebra Lineare.

**Definizione A.1** (Forma Quadratica)

**Forma Quadratica** su  $\mathbb{R}^n$  è una funzione del tipo

$$\begin{aligned} q &: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^T Q x \end{aligned}$$

Dove:

- $x^T \in \text{Mat}(1 \times n)$  è vettore riga trasposto del vettore colonna  $x \in \text{Mat}(n \times 1)$
- $Q \in \text{Mat}(n \times n)$

Inoltre, per come è definito il prodotto righe per colonne, la  $q$  può essere riscritta come

$$q(x) = \sum_{i,j=1}^n q_{ij} x_i x_j$$

con  $q_{ij}$  elemento nella riga  $i$  e nella colonna  $j$  della matrice  $Q$ .

**Esercizio A.2**

Dimostrare che  $q$  è una forma quadratica su  $\mathbb{R}^n$  se e solo se  $q(x)$  è un polinomio omogeneo di grado 2 in funzione di  $x$

*Soluzione.* Direttamente dalla [Definizione A.1 \(Forma Quadratica\)](#) in forma di sommatoria, si ha un polinomio di grado 2 nelle variabili  $x_1, \dots, x_n$

$$\sum_{i,j=1}^n q_{ij} x_i x_j = q_{11}x_1^2 + q_{12}x_1x_2 + \dots + q_{nn}x_n^2$$

■

**Proposizione A.3**

Sia  $q$  forma quadratica su  $\mathbb{R}^n$ , allora:

1.  $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^n$  vale  $q(\lambda x) = \lambda^2 q(x)$
2.  $q(0) = 0$
3.  $q$  è **limitata**  $\implies q$  è **identicamente nulla** (cioè  $q(x) = 0 \forall x \in \mathbb{R}^n$ )

*Dimostrazione.*

1.  $q(\lambda x) = (\lambda x)^T Q (\lambda x) = \lambda^2 x^T Q x = \lambda^2 q(x)$
2.  $q(0) = q(0 \cdot 0)$ , prendendo poi dal punto precedente,  $q(0 \cdot 0) = 0^2 q(0) = 0$
3. Si dimostra la contronominale (cioè la negazione dell'implicazione inversa)  
 $q$  non identicamente nulla  $\implies \exists x \in \mathbb{R}^n : q(x) \neq 0 \implies \forall \lambda \in \mathbb{R} \quad q(\lambda x) = \lambda^2 q(x) \implies q$  non limitata

□

**Proposizione A.4**

Data  $q$  forma quadratica su  $\mathbb{R}^n$ , allora esiste una costante  $M$  tale che

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \quad |q(x)| \leq M \|x\|^2$$

*Dimostrazione.* Grazie al punto 1 della [Proposizione A.3](#), si sa che

$$|q(x)| = \left| q \left( \|x\| \frac{x}{\|x\|} \right) \right| = \|x\|^2 \left| q \left( \frac{x}{\|x\|} \right) \right| \quad (\text{A.4.1})$$

$\frac{x}{\|x\|}$  è il **Versore** di  $x$  (il vettore direzione con norma = 1) quindi,  $\forall x \in \mathbb{R}^n$ , si sta lavorando soltanto sui punti appartenenti a  $\partial B(0, 1)$ : la frontiera della sfera di raggio 1.

Sia dunque  $M = \max_{\partial B(0,1)} q(x)$ .  $\partial B(0, 1)$  è un compatto, essendo insieme chiuso e limitato in  $\mathbb{R}^n$  (vedasi [Proposizione 2.34](#)). Grazie alla regolarità di  $q$  ed alla compattezza di  $\partial B(0, 1)$ , si può applicare l'[Esercizio 3.16 \(Teorema di Weierstrass - Analisi 1\)](#) ed avere la certezza dell'esistenza di un  $M$  finito.

Verificata l'esistenza di  $M$ , massimo sulla  $\partial B(0, 1)$ , è sicuramente possibile minorare l'ultimo termine di Eq. (A.4.1) ed ottenere la tesi

$$|q(x)| = \|x\|^2 \left| q \left( \frac{x}{\|x\|} \right) \right| \leq M \|x\|^2$$

□

### Corollario A.5

Data  $q$  forma quadratica su  $\mathbb{R}^n$ , allora:

$$\forall \alpha \in [0, 2[ \quad q(x) = o(\|x\|^\alpha) \text{ per } x \rightarrow 0$$

*Dimostrazione.* Immediata dalla [Proposizione A.4](#) perché si ha già dimostrato che esista un certo  $M$  per cui  $q(x) \leq M \|x\|^2$ . Basta applicare la [Definizione 8.2 \(o piccolo\)](#) a  $x \rightarrow 0$  per arrivare alla tesi. □

### Proposizione A.6

Data  $q$  forma quadratica su  $\mathbb{R}^n$ , allora:

$$|q(x)| = o(\|x\|^2) \text{ per } x \rightarrow 0 \quad \Longleftrightarrow \quad q(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

*Dimostrazione.*

$\implies$  Sia  $x \in \mathbb{R}^n$  con  $\|x\| = 1$  (quindi  $x$  **Versore**). Si applica la [Definizione 8.2 \(o piccolo\)](#)

$$0 = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|q(tx)\|}{\|tx\|^2}$$

Essendo  $q(tx) \in \mathbb{R}$ , la norma corrisponde al valore assoluto

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|q(tx)|}{\|tx\|^2}$$

Utilizzando il punto 1 della [Proposizione A.3](#) e la proprietà 4 da [Definizione 1.8 \(Norma\)](#)

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t^2 q(x)|}{|t|^2 \|x\|^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t^2| |q(x)|}{|t|^2 \|x\|^2} = \frac{|q(x)|}{\|x\|^2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{t^2} = \frac{|q(x)|}{\|x\|^2}$$

Essendo per ipotesi  $\|x\| = 1$

$$= |q(x)|$$

Ma, avendo un valore assoluto = 0, è sicuramente vero che

$$0 = |q(x)| = q(x)$$

Da cui la tesi

$\Leftarrow$  Immediatamente applicando la [Definizione 8.2 \(o piccolo\)](#), in quanto si avrebbe

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\|q(x)\|}{\|x\|^2} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{0}{\|x\|^2} = 0$$

□

**Definizione A.7**

Data  $q$  forma quadratica su  $\mathbb{R}^n$  individuata dalla matrice  $Q$ , allora  $q$  è:

- **Definita Positiva**  $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, x \neq 0 \quad q(x) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad Q > 0$
- **Semidefinita Positiva**  $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} \quad q(x) \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad Q \geq 0$
- **Definita Negativa**  $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, x \neq 0 \quad q(x) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad Q < 0$
- **Semidefinita Negativa**  $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} \quad q(x) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad Q \leq 0$

**Nota.** La definizione più a destra, quella che utilizza i segni  $\geq$ , è sconsigliabile in quanto fuorviante: non esiste relazione d'ordine tra matrici.

**Esercizio A.8**

Esibire un esempio di forma quadratica su  $\mathbb{R}^2$  per ognuno dei tipi sopra definiti.  
Esibire un esempio di forma quadratica su  $\mathbb{R}^2$  non definita.

*Soluzione.*

1. Semidefinita positiva

$$Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad q(x, y) = 2x^2 + 3y^2$$

2. Definita positiva

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad q(x, y) = x^2 - 2xy + 3y^2$$

$$\left(\frac{x}{y}\right)^2 - 2\left(\frac{x}{y}\right) + 3 > 0$$

3. Semidefinita negativa

$$Q = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad q(x, y) = -3x^2$$

4. Definita negativa

$$Q = \begin{bmatrix} -1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & -2 \end{bmatrix} \quad q(x, y) = -x^2 + 2\sqrt{2}xy - 2y^2$$

5. Né definita né semidefinita

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad q(x, y) = x^2 - y^2$$

$$q(1, 0) = 1 \quad q(0, 1) = -1$$

■

**Esercizio A.9**

In  $\text{Mat}(n \times n)$ , sia definita la relazione d'ordine  $>$  da

$$M_1 > M_2 \quad \Leftrightarrow \quad M_1 - M_2 > 0$$

La relazione  $>$  è una relazione di ordine totale?

**Proposizione A.10**

Data  $q$  forma quadratica su  $\mathbb{R}^n$ , allora:

$$q \text{ Definita Positiva} \quad \Longleftrightarrow \quad \exists m > 0 : \forall x \in \mathbb{R}^n \quad q(x) \geq m \|x\|^2$$

*Dimostrazione.*

⇒ Si procede con un procedimento analogo a quello della [Proposizione A.4](#).  
Grazie al punto 1 della [Proposizione A.3](#), si sa che

$$q(x) = q\left(\|x\| \frac{x}{\|x\|}\right) = \|x\|^2 q\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \quad (\text{A.10.1})$$

Per gli stessi motivi dell'altra dimostrazione, si può porre  $m = \min_{\partial B(0,1)} q(x)$  ed avere la certezza che esista finito. Inoltre, sicuramente  $m \geq 0$  perché  $q$  è definita positiva per ipotesi. È dunque sicuramente possibile maggiorare l'ultimo termine di Eq. (A.10.1) ed ottenere la tesi

$$q(x) = \|x\|^2 q\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \geq m \|x\|^2$$

⇐ Immediata. □

### Corollario A.11

Data  $q$  forma quadratica su  $\mathbb{R}^n$ , allora:

$$q \text{ Definita Negativa} \iff \exists m > 0 : \forall x \in \mathbb{R}^n \quad q(x) \leq -m \|x\|^2$$

*Dimostrazione.* Analoga alla precedente □

Grazie alle seguenti proposizioni viene fornito metodo più rapido per verificare la definizione/semidefinizione delle forme quadratiche.

### Proposizione A.12 (Ortogonalizzazione di Gram-Schmidt)

Data  $q$  forma quadratica **definita positiva** o **negativa** su  $\mathbb{R}^n$  con matrice **simmetrica**  $Q$ . Esiste un sistema di coordinate in cui la matrice  $\tilde{Q}$  di  $q$  è diagonale ed ha come coefficienti

$$Q_1 \quad \frac{\det Q_2}{\det Q_1} \quad \frac{\det Q_3}{\det Q_2} \quad \cdots \quad \frac{\det Q_n}{\det Q_{n-1}}$$

dove  $Q_i$  è la matrice costituita dalle prime  $i$  righe ed  $i$  colonne di  $Q$  ("come negli orlati").

**Nota.** Non è necessario conoscere il sistema di coordinate in cui è valida l'uguaglianza, ai fini dello studio di una Forma Quadratica è sufficiente sapere che esso esiste e che l'uguaglianza è valida.

$$\begin{bmatrix} \boxed{Q_1} & & & \\ - & \boxed{Q_2} & & \\ - & - & \ddots & \\ - & - & - & \boxed{Q_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \det Q_1 & & & \\ & \frac{\det Q_2}{\det Q_1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{\det Q_n}{\det Q_{n-1}} \end{bmatrix}$$

*Dimostrazione.* Omessa. □

**Nota.** Questa enunciazione dell'ortogonalizzazione di Gram-Schmidt sembra privilegiare le sottomatrici costituite dalle prime righe e dalle prime colonne. È però possibile enunciare una versione di questa proposizione in cui tutte le sottomatrici quadrate costruite attorno alla diagonale hanno gli stessi *privilegi*.

### Osservazione A.13

Nella [Proposizione A.12 \(Ortogonalizzazione di Gram-Schmidt\)](#), l'ipotesi che  $q$  sia definita assicura che le diverse  $Q_i$  per  $i = 1, \dots, n$  siano non nulle.

Nel caso in cui  $q$  non fosse definita sarebbe ancora possibile diagonalizzare  $q$  ottenendo una matrice diagonale con gli "ultimi" elementi della diagonale nulli.

**Corollario A.14**

Data  $q$  forma quadratica su  $\mathbb{R}^n$  con matrice **simmetrica**  $Q$ .

$$\begin{aligned}
 Q \text{ Definita Positiva} &\iff \begin{cases} q_1 > 0 \\ \det Q_2 > 0 \\ \det Q_3 > 0 \\ \vdots \\ \det Q_n > 0 \end{cases} \\
 Q \text{ Definita Negativa} &\iff \begin{cases} -q_1 > 0 \\ \det Q_2 > 0 \\ -\det Q_3 > 0 \\ \vdots \\ (-1)^n \det Q_n > 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

dove  $Q_i$  è la matrice costituita dalle prime  $i$  righe ed  $i$  colonne di  $Q$  ("come negli orlati").

Cioè se tutte le sottomatrici hanno determinante positivo, allora la  $Q$  è Definita Positiva. Se invece i determinanti hanno segni alternati (partendo da una negativa), allora è Definita Negativa.

*Dimostrazione.* Omessa. □

**Esercizio A.15**

Dimostrare il [Corollario A.14](#). Suggerimento: applicare la [Proposizione A.12 \(Ortogonalizzazione di Gram-Schmidt\)](#).

**Esercizio A.16**

Enunciare il [Corollario A.14](#) nel caso  $n = 2$  e verificarlo con i metodi dell'algebra elementare.

Suggerimento: utilizzare la regola per determinare il segno di un polinomio di secondo grado.

