骨質疏鬆預防

香港女性按年齡階段的行動指南

20–35

35–50

50+

一個無聲嘅病

骨質疏鬆會令骨質密度下降、骨頭嘅微結構變差，骨頭變脆。佢冇痛、冇徵狀 —— 好多人第一次知道自己有，就係骨折嗰日。

1／3

50 歲以上女性，一生中會發生一次骨質疏鬆性骨折

男性為 1 ／ 5

1／4

香港 65 歲或以上女性患有骨質疏鬆

女性患病率明顯高於男性

7,000

香港每年髖骨骨折宗數

最常見：髖部、脊椎、手腕

資料來源：香港骨質疏鬆學會（風險因素、骨質疏鬆的後果，引 Lo SS 2021）

骨頭嘅一生：由高峰骨量到快速流失

- **18 歲**
  女性約九成骨質已經形成 —— 兒童及青少年期係累積「骨本」嘅黃金期。
- **30 多歲**
  骨質達到頂峰，青壯年期維持最高水平。呢個就係你嘅「高峰骨量」。
- **約 40 歲**
  流失開始變得明顯；更年期雌激素下降會加劇流失速度。
- **停經後最初 10 年**
  雌激素大幅減少，部分女性流失多達 25% 骨質。

點解咁重要

骨質係一個「戶口」：35 歲之前你可以存入本金，之後淨係可以減慢支出。

高峰骨量愈高，老年時嘅「本錢」愈多，就算流失速度一樣，都更遲跌入骨質疏鬆嘅範圍。

所以預防唔係 60 歲先開始 —— 係 20 歲開始。

資料來源：衞生署家庭健康服務；美國 Office on Women's Health (HHS)

骨折嘅代價：唔止係痛

17.3%

髖骨骨折後一年內死亡率

同齡人士背景死亡率 1.6%

70%

髖骨骨折患者活動能力不同程度受損

約 23% 需入住安老院

33萬+

2005–2018 年香港因跌倒而住院嘅人次

約三成涉及 60 歲以上人士

再骨折風險

曾經發生脆性骨折嘅人，再骨折風險可增加達 10 倍，以首次骨折後首兩年最高。

數字為何有出入

2019 年立法會書面答覆引述報道指每年約 1 萬宗髖關節骨折新症。學會及資料庫統計約 7,000 宗 —— 統計口徑不同，結論一致：數量龐大，而且可以預防。

資料來源：香港骨質疏鬆學會（引 Lo SS 2021、Leung KS 2017）；立法會十題：骨質疏鬆症（2019-11-20）

風險因素：改唔到嘅，同改得到嘅

改唔到

- 女性、年齡增長
- 家族史（父母曾有髖骨骨折）
- 體重過輕、身形瘦小
- 過早停經（45 歲前）、曾切除卵巢
- 曾經發生脆性骨折

改得到（今日就可以開始）

- 鈣質攝取不足
- 維生素 D 不足、少接觸陽光
- 缺乏負重運動、長期久坐
- 吸煙、酗酒
- 長期使用類固醇等藥物 —— 要同醫生檢視，唔好自己停藥

資料來源：香港骨質疏鬆學會（風險因素）；衞生署家庭健康服務

三個階段，三件唔同嘅事

每個階段嘅目標唔同：年輕時係「存錢」，中年係「止蝕」，年長係「知道自己嘅數字 + 防跌」。

階段 01

20–35

打好基礎

- 儲到最高嘅高峰骨量
- 每日鈣 800–1000 毫克
- 負重運動、戒煙

階段 02

35–50

守住骨本

- 減慢流失速度
- 補足鈣與維生素 D
- 每週 150–300 分鐘運動

階段 03

50+

篩查與防跌

- 做風險評估／DEXA
- 練平衡與肌力
- 執好家居防跌

資料來源：衞生署家庭健康服務、長者健康服務；香港骨質疏鬆學會；美國 USPSTF

階段 01 ／ 20–35

今日嘅骨頭，決定 60 歲嘅你

呢個階段嘅每一分努力，都係存入去一個之後只可以提款嘅戶口。

鈣：800–1000 毫克，喺香港食得到

每日目標	成人 800–1000 毫克；50 歲或以上 800–1300 毫克（食物 + 補充劑總和不應超過 2000 毫克）
奶類及代替品	每日 1–2 份：1 杯牛奶／1 盒加鈣豆奶／1 盒乳酪／2 片芝士（每份約 300 毫克鈣）
高鈣食物	板豆腐（石膏凝固，成分見 E516 / E509 / E578）· 菜心、芥蘭 · 丁香魚乾、蝦米、罐裝連骨沙甸魚 · 芝麻、果仁

要拆解嘅誤解

骨湯唔補鈣。豬骨、魚骨嘅鈣唔會溶入湯水，骨湯含鈣量極低。

薑醋都唔係鈣來源。鈣含量低，而且高脂高糖，唔宜多吃。

唔飲牛奶？用低糖加鈣豆奶代替一樣得。

唔夠鈣未必即刻有感覺 —— 身體會由骨骼「借鈣」出嚟用。

資料來源：衞生署家庭健康服務 — 攝取足夠鈣質、婦女與骨質疏鬆症（建議綜合世衛及中國營養學會）

呢個階段係止蝕，唔係等停經先開始

身體發生緊咩事

- 約 40 歲開始，骨質流失變得明顯
- 更年期雌激素下降，會加劇流失速度
- 雌激素同時影響骨代謝 —— 唔止係「心情同潮熱」咁簡單
- 流失去得比正常快，就會提早跌入骨質疏鬆範圍

呢十年要守住嘅四件事

- 每星期 150–300 分鐘中等強度運動
- 每日約 10 分鐘陽光，補足維生素 D
- 維持每日鈣攝取，唔好靠「飲湯」
- 戒煙、控制飲酒、維持健康體重
- 45 歲前停經或月經紊亂 → 同醫生講

資料來源：衞生署家庭健康服務 — 婦女與骨質疏鬆症；康樂及文化事務署 — 婦女健體指南

維生素 D：最容易被忽略嘅一環

做咩用	幫腸道吸收鈣、確保骨骼正常礦化，並維持肌肉力量 —— 直接關係到跌倒風險
陽光	每日讓臉同手臂接觸溫和陽光約 10 分鐘；膚色較深需要更長時間；避開夏天中午猛烈太陽
劑量參考	國際骨質疏鬆基金會建議 60 歲或以上，每日補充 800–1000 IU

點解香港人特別容易唔夠

食物嘅維生素 D 含量有限，單靠飲食難以滿足身體所需 —— 主要來源始終係皮膚經紫外線合成。

長時間室內工作、出門必搽防曬、怕曬黑，都會令合成量大減。

防曬係要做，但唔等於要完全避開陽光；重點係短時間、溫和嘅接觸。

資料來源：衞生署家庭健康服務 — 婦女與骨質疏鬆症；國際骨質疏鬆基金會（IOF）— Vitamin D

階段 03 ／ 50+

停經後最初十年流失得最快

部分女性停經後最初 10 年流失多達 25% 骨質。呢十年，就係決定你會唔會骨折嘅十年。

篩查：DEXA 同 T-score，香港實況係點

標準檢查	DEXA（雙能量 X 光吸收測量）：一般測腰椎或股關節，程序快捷、輻射量低，用嚟診斷同監察治療效果
唔可以確診	超聲波只可以作骨質密度嘅初步篩驗
邊個要做	65 歲或以上所有女性；65 歲以下停經女性若有一項或以上風險因素，先用評估工具（FRAX®／COSA）計風險
香港指引	香港骨質疏鬆學會 2024 年更新指引：以 FRAX® + DEXA 作風險為本篩查

香港實況

政府認為未有足夠科學實證支持全民普查，所以冇提供全港骨質密度篩查服務。

公立醫院 DEXA 輪候時間可達 1–2 年；私營一般一星期內完成，檢查費用約 125–130 美元。

結論：唔會被邀請去做檢查 —— 有風險因素就要主動同醫生提出。

資料來源：衞生署長者健康服務；美國 USPSTF（2025）；香港骨質疏鬆學會 2024 指引；立法會書面答覆（2019、2022）；IOF 香港報告（2025）

運動處方：負重、阻力、平衡

負重運動

每週 3 次

- 步行、太極、健身操
- 每次 30–60 分鐘
- 負重刺激有助維持骨質、減慢流失

阻力與平衡

每週 2–3 次

- 肌力、步態、平衡及功能訓練
- 持續約 12 個月效果最明顯
- 太極係世衛列出嘅防跌介入

總運動量

150–300 分鐘

- 每週中等強度帶氧運動
- 強化肌肉、改善平衡
- 已確診骨質疏鬆：開始前先問醫生或物理治療師

資料來源：衛生署長者健康服務 — 骨質疏鬆症；美國 USPSTF（2024）；康文署 — 婦女健體指南；世界衛生組織 — Falls

防跌 = 防骨折：今日就可以改嘅八件事

- 浴室、廁所裝扶手，加防滑墊
- 清走鬆地毯、地上嘅電線
- 夜燈、床邊燈；燈掣放喺順手位
- 定期驗眼，眼鏡度數要準
- 鞋要防滑貼腳，唔好著拖鞋周圍走
- 同醫生檢視會影響平衡嘅藥物
- 行樓梯扶實扶手；唔好企凳拎高處物件
- 需要時用拐杖或助行架 —— 唔係「認老」，係防跌

資料來源：世界衛生組織 — Falls；美國 USPSTF（2024）；香港骨質疏鬆學會

幾時要睇醫生，同埋唔好信嘅事

盡快求醫嘅警號

- 身高比 40 歲時減少 3 厘米或以上
- 駝背、突發嚴重背痛
- 輕輕一跌就骨折（脆性骨折）
- 提早停經、長期使用類固醇等藥物

三個常見誤解

- 「飲多啲骨湯、食薑醋就補到鈣」—— 鈣唔會溶入湯水
- 「補鈣就等於治療」—— 確診後需要醫生評估，藥物治療係另一回事
- 「冇痛就冇事」—— 骨質疏鬆冇徵狀，痛嘅時候通常已經骨折

資料來源：香港骨質疏鬆學會（風險因素、了解骨質疏鬆）；衞生署家庭健康服務

三個階段，各做三件事

20–35	每日鈣 800–1000 毫克 · 每星期負重運動 · 唔吸煙
35–50	每週 150–300 分鐘運動 · 每日約 10 分鐘陽光 · 維持鈣與維生素 D
50+	同醫生討論風險評估／DEXA · 練太極或平衡訓練 · 執好家居防跌

求助資源

衞生署家庭健康服務 24 小時資訊熱線 2112 9900 · 中大賽馬會骨質疏鬆預防及治療中心 2252 8833

亦可透過長者健康中心、地區康健中心及長者醫療券（每年 2,000 元）獲取服務

下載 PDF 講義 ↓

記住一句

骨質疏鬆冇痛、冇徵狀，但骨折之後果可以好嚴重 —— 一年內死亡率 17.3%。

你今日食嘅一餐、行嘅一段路、曬嘅十分鐘太陽，都係喺度改變你 60 歲之後嘅骨頭。

本簡報只作健康教育用途，唔可以代替醫生嘅診斷或治療。如有疑問，請諮詢醫生或物理治療師。

主要來源：衞生署家庭健康服務及長者健康服務 · 香港骨質疏鬆學會 · 世界衞生組織 · 美國 USPSTF · 國際骨質疏鬆基金會 · 康文署