

第I部

BdG モデルハミルトニアンについて

1 定義

BdG モデルハミルトニアン \mathcal{H} は以下のように表される。

$$\mathcal{H} = \int \vec{\Psi}^\dagger \tilde{H} \vec{\Psi} dr \quad (1)$$

$$\int dr = \int dx dy \quad (2)$$

$$\vec{\Psi} = \begin{bmatrix} \Psi_\uparrow \\ \Psi_\downarrow \\ \Psi_\uparrow^\dagger \\ \Psi_\downarrow^\dagger \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\tilde{H} = \begin{bmatrix} \hat{h}(r) & \hat{\Delta}(r) \\ -\hat{\Delta}^*(r) & -\hat{h}^*(r) \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\hat{h} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \mu_F \right] \hat{\sigma}_0 \quad (5)$$

$$(\hat{\sigma}_0 : \text{単位行列}) \quad (6)$$

$$\hat{\Delta}(r) = \begin{cases} \Delta_0 (i\hat{\sigma}_2) & \text{s-wave} \\ \Delta_0 \frac{i\partial x}{k_F} \hat{\sigma}_1 & p_x\text{-wave} \\ \Delta_0 \frac{1}{k_f} (\hat{\sigma}_1 + i\hat{\sigma}_2) & p_x + ip_y \end{cases} \quad (7)$$

$$\vec{\Psi} = \frac{1}{\sqrt{L_y}} \sum_{k_y} \vec{\Psi}_{k_y}(x) e^{ik_y y} \quad (8)$$




図1 考える系

2 問題

2.1 ハミルトニアン \mathcal{H} をフーリエ変換せよ

式 (1) に式 (8) を代入して計算していく。

$$\mathcal{H} = \int \int \left(\frac{1}{\sqrt{L_y}} \sum_{k_y} \vec{\Psi}_{k_y}^\dagger(x) e^{-ik_y y} \right) \tilde{H} \left(\frac{1}{\sqrt{L_y}} \sum_{k'_y} \vec{\Psi}_{k'_y}(x) e^{ik'_y y} \right) dx dy \quad (9)$$

ここで

$$\hat{\sigma}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \hat{\sigma}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \hat{\sigma}_2 = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \hat{\sigma}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

より、ハミルトニアン \mathcal{H} は、

$$\mathcal{H} = \begin{bmatrix} -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \mu_F & 0 & 0 & \Delta_0 \\ 0 & -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \mu_F & -\Delta_0 & 0 \\ 0 & -\Delta_0^* & \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \mu_F & 0 \\ \Delta_0^* & 0 & 0 & \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \mu_F \end{bmatrix} \quad (11)$$

これを、式 (9) に代入して計算していく。

このとき、

$$\begin{aligned}
\vec{\Psi}_{k_y}^\dagger(x)e^{-ik_y y}\tilde{H}\vec{\Psi}_{k'_y}(x)e^{ik'_y y} &= e^{-ik_y y}\left[\Psi_\uparrow^*\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2-\mu_F\right)+\Psi_\downarrow^*\Delta_0^*\right]\Psi_\uparrow e^{ik'_y y} \\
&+e^{-ik_y y}\left[\Psi_\downarrow^*\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2-\mu_F\right)-\Psi_\uparrow^*\Delta_0^*\right]\Psi_\downarrow e^{ik'_y y} \\
&+e^{-ik_y y}\left[-\Psi_\downarrow^*\Delta_0+\Psi_\uparrow^*\left(\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+\mu_F\right)\right]\Psi_\uparrow e^{ik'_y y} \\
&+e^{-ik_y y}\left[\Psi_\uparrow^*\Delta_0+\Psi_\downarrow^*\left(\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+\mu_F\right)\right]\Psi_\downarrow e^{ik'_y y}
\end{aligned} \tag{12}$$

また、

$$\begin{aligned}
&\int\left(\sum_{k_y}\sum_{k'_y}\Psi^*(k)e^{-ik_y y}\Psi(k')e^{ik'_y y}\right)dy \\
&= \sum_{k_y}\sum_{k'_y}\Psi^*(k)\Psi(k')\delta(k-k') \\
&= \sum_{k_y}\Psi^*(k)\Psi(k)
\end{aligned} \tag{13}$$

から、式 (9) は、

$$\begin{aligned}
\mathcal{H} &= \frac{1}{L_y}\int dx\sum_{k_y}\left[\Psi_\uparrow^*\left(-\frac{\hbar^2 k_y^2}{2m}-\mu_F\right)\Psi_\uparrow+\Psi_\uparrow^*\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\Psi_\uparrow+\Psi_\downarrow^*\Delta_0^*\Psi_\uparrow\right. \\
&\quad \left.+\Psi_\downarrow^*\left(-\frac{\hbar^2 k_y^2}{2m}-\mu_F\right)\Psi_\downarrow+\Psi_\downarrow^*\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\Psi_\downarrow-\Psi_\uparrow^*\Delta_0^*\Psi_\downarrow\cdots\right]
\end{aligned} \tag{14}$$

2.2 差分近似をしよう

刻み幅を 1 として、差分近似をする。微小変化 h 周りにマクローリン展開を行うと、

$$\Psi(x+h)=\Psi(x)+h\frac{\partial}{\partial x}\Psi(x)+\frac{h^2}{2!}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi(x) \tag{15}$$

$$\Psi(x-h)=\Psi(x)-h\frac{\partial}{\partial x}\Psi(x)+\frac{h^2}{2!}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi(x) \tag{16}$$

よって、差分近似は式 (15), 式 (16) の方程式で求めることができ、刻み幅 $h=1$ とすると、

$$\frac{\partial}{\partial x}\Psi(x)=\frac{\Psi(x+1)-\Psi(x-1)}{2} \tag{17}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi(x)=\Psi(x+1)-2\Psi(x)+\Psi(x-1) \tag{18}$$

2.3 x を離散化せよ

式 (18) を式 (14) に代入して、行列で表す。このとき、離散化した波動関数を以下の式に定義する。

$$\vec{\Psi} = \begin{bmatrix} \Psi_{1\uparrow} \\ \Psi_{1\downarrow} \\ \Psi_{1\uparrow}^\dagger \\ \Psi_{1\downarrow}^\dagger \\ \Psi_{2\uparrow} \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}, \Psi_{n\pm 1\uparrow} = \Psi_{n\uparrow}(x \pm 1) \quad (19)$$

代入した式は、

$$\mathcal{H} = \frac{1}{L_y} \int dx \sum_{k_y} \left[\Psi_{\uparrow}^* \left(-\frac{\hbar^2 k_y^2}{2m} - \mu_F \right) \Psi_{\uparrow} + \Psi_{\uparrow}^* (\Psi(x+1) - 2\Psi(x) + \Psi(x-1)) + \Psi_{\downarrow}^* \Delta_0^* \Psi_{\uparrow} \dots \right] \quad (20)$$