Glasgow Coma skala

Tre parametere vurderes. Apning av øynene, verbal respons og motorisk respons. Verdi gis som sum av delverdier for de tre parametrene. Nedsatt mindre enn 15, kritisk mindre enn 9.

| Glasgow Coma skala (over 2 års alder) | |
|---------------------------------------|--------|
| Äpner øynene: | |
| Spontant | 4 |
| På oppfordring | 3 |
| Ved smerte | 2 |
| lkke | 1 |
| Beste verbale respons | |
| Orientert | 5 |
| Forvirret | 4 |
| Med ord | 3 |
| Med lyder | 2 |
| Ikke | 1 |
| Beste motoriske respons | is III |
| På oppfordring | 6 |
| Målrettet avvergende | 5 |
| Tilbaketrekkende | 4 |
| Bøyebevegelser(se Figur 1)) | 3 |
| Strekkbevegelser (se Figur 2) | 2 |
| Ingen bevegelse | 1 |

| Åpner øynene: | | | |
|--|---|--|--|
| Spontant | 4 | | |
| Ved tiltale | | | |
| Ved smertestimulering | | | |
| Åpner ikke øynene | | | |
| Beste verbale respons | | | |
| Babler | | | |
| Irritabel gråt | | | |
| Skriker ved smertestimulering | | | |
| Ynker ved smertestimulering | | | |
| Ingen verbal respons | | | |
| Beste motoriske respons | | | |
| Normale spontane bevegelser | | | |
| Avverger ved berøring | | | |
| Avverger smertestimulering | | | |
| Reagerer på smertestimuli med fleksjon | | | |
| Reagerer på smertestimuli med ekstensjon | 2 | | |
| Ingen motorisk respons | 1 | | |



Figur 1 Unormal spastisk bøyebevegelse på smertestimuli



Figur 2 Unormal spastisk strekkebevegelse (ekstensjon) på smertestimuli

Normalverdier barn

| Alder | Hjertefrekvens | Systolisk Bt | Respirasjonsfrekvens |
|---------|---|--------------|---|
| < 1 år | 110-160 | 70-90 | 30-40 |
| 1-2 år | 100-150 | 80-95 | 25-35 |
| 2-5 år | 95-140 | 80-100 | 25-30 |
| 5-12 år | 80-120 | 90-110 | 20-25 |
| | Huskeregel hjertefrekvens Det er alltid noe galt hvis hjertefrekvensen er over 160. Bradykardi er alltid livstruende. | p 2 . I . I | Huskeregel respirasjonsfrekvens Det er alltid noe galt hvis frekvensen er over 60. Langsom respirasjon kan være livstruende. |

FAST

| | the manager 1. | Undersøkelse |
|---|-------------------------------------|---|
| F | Facialisparese - ansiktslammelse | Be pasienten smile, vise tenner og rynke pannen. Forskjell på venstre og høyre side? |
| A | Armparese – lammelse i arm | Løft pasientens armer til 45 grader hvis pasienten er sengeliggende, eller 90 grader hvis pasienten sitter. Be pasienten holde armene slik. Slipp taket. Drifter eller faller en av armene ned? (Forskjell venstre og høyre side) |
| S | Språkvansker | Forstår pasienten hva du sier? Leter pasienten etter ord? |
| T | Talevansker | Har pasienten nylig begynt å snakke utydelig? |