

傷寒雜病論¹匯校本

张仲景 述	栾建橋
王叔和撰次	毛 敏
唐弘宇校訂	胡曉帆

2021 年 3 月 13 日

¹唐弘宇按：本論的原名現已不可考，可能本來就沒有名字。至於「张仲景方」、「张仲景辨傷寒」、「仲景全書」、「傷寒卒病論」等名，与「傷寒雜病論」一樣，皆是後人杜撰，沒有優劣之分。我選取「傷寒雜病論」作为書名的原因有二，一是這個名字已被大衆所熟知，二是這個書名概括了本論的兩大部分，即傷寒部分和雜病部分。有很多老師和同學給我提意見，說這個名字不好，應改成XXX。我則認為名字叫什麼不必太過追究，陸淵雷說的好：「其精華，在於諸方之症候用法」。

凡例

- 《傷寒雜病論匯校本》分为三个部分：第一部分，類聚方部分；第二部分，傷寒部分；第三部分，雜病部分。

《類聚方》一書，是日本漢方醫學古方派代表人物吉益東洞的著作，此書分解《傷寒論》、《金匱要略》條文，以方剂为類目，匯集仲景相關論述，着意凸顯其「方証相對」之學術主張。本書的第一部分，即是以吉益東洞《類聚方》的形式，重新排列第二、第三部分的條文。方剂的先後次序基本按照《類聚方》，《類聚方》中缺失的方剂，則按照其在《傷寒雜病論》中出現的次序，排在最後。

第一部分中的所有條文，与第二、第三部分的條文完全相同，但條文的註釋和校改記錄，僅在第二、第三部分有，第一部分不再出現。

第二、第三部分僅有條文，无方剂，所有方剂僅出現在第一部分，所以對方剂的註釋，也僅出現在第一部分。

- 本書傷寒論部分所用的底本，是臺北故宮博物院文獻大樓藏明趙開美翻刻北宋元祐三年小字本《傷寒論》。雜病論部分所用的底本，是明吳遷鈔本《金匱要略方》。本書所用的主校本有《千金翼方》、《金匱玉函經》、《脉經》，參校本有《千金要方》、《外臺祕要》、《聖惠方》、《醫心方》等。不用《康平本》、《康治本》、《桂林古本》。

- 主要參考書目：

- 《影印孫思邈本傷寒論校注考証》
- 《宋本傷寒論文獻史論》學苑出版社2015
- 《影印南朝祕本敦煌祕卷傷寒論校注考証》
- 《影印金匱玉函經校注考証》
- 《校勘元本影印明本金匱要略集》學苑出版社2015
- 《明洪武鈔本金匱要略方》上海科學技術文獻出版社2011

- 古人校訂書籍，不修改原文，只在疑似有錯處出校注，這樣做是為了保存文獻原貌，防止由於自己理解錯誤而妄改原文。這些謹慎的作法，都是因為古代印刷技術、保存手段落後等原因，而採取的無奈之舉。而以現代的保存手段，不太可能再有古籍消失。所以，我在校訂此書時，不考慮保存原貌的問題，直接修改原文，必要時出校記，這樣做是為了使學習、閱讀更加方便。在校勘時，如能確定底本有脫漏者，即據其它校本補。如底本與校本有歧異者，即作理校，據文意來推斷正誤。如遇到義可兩存者，則在註釋中說明。
- 規範字形，將古書中的異體字、通假字，一律改為正字，對某些避諱字，也改正過來。部分字使用簡化字形。請注意，「正字」不是臺灣正體字，「簡化字」也不是現行的大陸簡體字，宋本書籍中已有使用簡化字的先例。
- 《太平聖惠方》卷二論合和曰：「古方藥味，多以銖兩，及用水，皆言升數。年代綿歷浸遠，傳寫轉見乖訛。」(待補充)。大柴胡湯、柴胡桂枝乾薑湯在《傷寒論》和《金匱要略》中重出，其中柴胡的份量，趙本《傷寒論》作「半斤」，吳本《金匱要略》作「八兩」。為盡量統一全書單位，書中所有的「斤」單位，全部依此例轉換為「兩」單位，「一斤」合「十六兩」。
- 相比宋本系統，本書在行文上更簡潔，風格更接近《千金翼方》和《金匱玉函經》。舉一個例子，趙本第282條中的「下焦虛有寒」，《千金翼》作「下焦虛寒」，《聖惠方》作「下焦有虛寒」，它們表達的意思相同，但《千金翼》更簡潔，所以我選取了《千金翼》的說法。
-
-
-

傷寒論序

論曰。余每覽越人入虢之診。望齊侯之色。未嘗不慨然嘆其才秀也。怪当今居世之士。曾不留神醫藥。精究方術。上以療君親之疾。下以救貧賤之厄。中以保身長全。以養其生。但競逐榮勢。企踵權豪。孜孜汲汲。惟名利是務。崇飾其末。忽弃其本。華其外而悴其內。皮之不存。毛將安附焉。卒然遭邪風之氣。嬰非常之疾。患及禍至。而方震慄。降志屈節。欽望巫祝。告窮歸天。束手受敗。齎百年之壽命。持至貴之重器。委付凡醫。恣其所措。咄嗟嗚呼。厥身已斃。神明消滅。變為異物。幽潛重泉。徒為啼泣。痛夫。舉世昏迷。莫能覺悟。不惜其命。若是輕生。彼何榮勢之云哉。而進不能愛人知人。退不能愛身知己。遇災值禍。身居厄地。矇矓昧昧。蠢若游魂。哀乎。趨世之士。馳競浮華。不固根本。忘軀徇物。危若冰谷。至於是也。

余宗族素多。向餘二百。建安紀年以來。猶未十稔。其死亡者。三分有二。傷寒十居其七。感往昔之淪喪。傷橫夭之莫救。乃勤求古訓。博采衆方。¹為傷寒雜病論合十六卷。雖未能盡愈諸病。庶可以見病知源。若能尋余所集。思過半矣。²孔子云。生而知之者上。學則亞之。多聞博識。知之次也。余素尚方術。請事斯語。³

¹趙本此處有「撰用素問九卷八十一難陰陽大論胎臚藥錄并平脉辨証」二十三字。

²趙本此段下有「夫天布五行。以運萬類。人稟五常。以有五臟。經絡府俞。陰陽會通。玄冥幽微。變化難極。自非才高識妙。豈能探其理致哉。上古有神農。黃帝。岐伯。伯高。雷公。少俞。少師。仲文。中世有長桑。扁鵲。漢有公乘陽慶及倉公。下此以往。未之聞也。觀今之醫。不念思求經旨。以演其所知。各承家技。終始順舊。省疾問病。務在口給。相對斯須。便處湯藥。按寸不及尺。握手不及足。人迎。跌陽。三部不參。動數發息。不滿五十。短期未知決診。九候曾無彷彿。明堂闕庭。盡不見察。所謂窺管而已。夫能視死別生。實為難矣。」一段文字。

³楊紹伊說：「仲景序中，『撰用《素問》、《九卷》、《八十一難》、《陰陽大論》、《胎臚藥錄》并《平脉辨証》』五句，與『若能尋余所集，則思過半矣』至『夫欲視死別生，實為難矣』一節，悉出其撰次。知者，以此篇序文，讀其前半，韻雖不高而清，調雖不古而雅，非駢非散，的是建安。『天布五行』與『省疾問病』二段，則筆調句律，節款聲響，均屬晉音。試以《傷寒例》中詞語滴血驗之，即知其是一家骨肉。更証以《千金方》序文中引『当今居世之士，曾不留神醫藥』至『彼何榮勢之云哉』一節稱『張仲景曰』，緒論中引『天布五行，以運萬類』至『夫欲視死別生，實為難矣』一節，不稱『張仲景曰』，即

目录

凡例	ii	12. 桂枝加附子湯	7
傷寒論序	iv	13. 桂枝去芍藥加附子湯	7
第一部分 類聚方	1	14. 桂枝附子湯	8
1. 桂枝湯	2	15. 术附子湯	8
2. 桂枝加桂湯	4	16. 甘草附子湯	8
3. 桂枝加芍藥湯	4	17. 桂枝去桂加茯苓术湯	9
4. 桂枝去芍藥湯	5	18. 桂枝去芍藥加麻黄 細辛附子湯	9
5. 桂枝加葛根湯	5	19. 桂枝去芍藥加皂莢湯	9
6. 栝蒌桂枝湯	5	20. 桂枝加龙骨牡蛎湯 .	9
7. 桂枝加黄耆湯	6	21. 桂枝去芍藥加蜀漆 牡蛎龙骨救逆湯 . . .	10
8. 桂枝加大黄湯	6	22. 桂枝甘草龙骨牡蛎湯	10
9. 桂枝加芍藥生薑人 参湯	6	23. 桂枝二麻黄一湯 . . .	10
10. 桂枝加厚朴杏仁湯 .	7	24. 桂枝二越婢一湯 . . .	11
11. 烏頭桂枝湯	7		

知其語非出自仲景之口。再以文律格之，『勤求古訓，博采采方』在文法中為渾說，『撰用《素問》《九卷》』等五句，在文法中為詳舉。凡渾說者不詳舉，詳舉者不渾說。原文當是『感往昔之淪喪，傷橫天之莫救，乃勤求古訓，博采采方，為《傷寒雜病論》，合十六卷』，此本辭自足，而體且簡。若欲詳舉，則當云『感往昔之淪喪，傷橫天之莫救，乃撰用《素問》、《九卷》、《八十一難》、《陰陽大論》《胎臚藥錄》并《平脉辨証》，為《傷寒雜病論》，合十六卷』，不當渾說后又詳舉也。且仲景為醫中之湯液家，湯液家舉書，不舉《湯液經》而舉《素問》，不數伊尹，而數岐黃，何異家乘中不系祖祢而譜東邻也？至其下之『按寸不及尺，握手不及足，人迎跌陽，三部不參』云云，殊不知三部九候乃針灸家脉法，非湯液家脉法。針家刺在全身，勢不能不遍體考脉；湯液家重在現証，脉則但候其表里寒熱，臟腑虛實，榮衛盛衰，以決其治之可汗不可汗，可下不可下而已矣。故診一部亦已可定，不必遍體摩挲。以湯液家而用針灸家罵湯液家之語罵人，仲景縱亦精於針灸脉法，何至遽憤誓而矛盾若是。」

25. 桂枝麻黄各半湯	11	51. 豬苓散	21
26. 小建中湯	12	52. 牡蛎澤瀉散	21
27. 黄耆建中湯	13	53. 腎气丸	21
28. 黄耆桂枝五物湯	13	54. 栝蒌瞿麥丸	22
29. 黄耆芍藥桂枝苦酒湯	13	55. 麻黄湯	22
30. 桂枝甘草湯	13	56. 麻黄加术湯	23
31. 半夏散及湯	14	57. 甘草麻黄湯	23
32. 桂枝人参湯	14	58. 麻黄附子甘草湯(附 子麻黄湯)	23
33. 理中湯(人参湯)*	14	59. 麻黄細辛附子湯	24
34. 茯苓杏仁甘草湯	15	60. 麻杏甘石湯	24
35. 茯苓戎鹽湯	15	61. 麻杏薏甘湯	24
36. 葵子茯苓散	16	62. 牡蛎湯	25
37. 甘草乾薑茯苓白术湯	16	63. 麻黄淳酒湯	25
38. 苓桂术甘湯	16	64. 半夏麻黄丸	25
39. 苓桂甘棗湯	17	65. 小青龙湯*	25
40. 茯苓桂枝五味子甘 草湯	17	66. 小青龙加石膏湯	26
41. 茯苓桂枝五味子甘 草湯去桂加乾薑細辛	17	67. 大青龙湯	27
42.	18	68. 文蛤湯	27
43.	18	69. 文蛤散	27
44.	18	70. 越婢湯	28
45. 澤瀉湯	18	71. 越婢加术湯	28
46. 茯苓澤瀉湯	18	72. 越婢加半夏湯	28
47. 茯苓甘草湯	19	73. 葛根湯	29
48. 五苓散	19	74. 葛根加半夏湯	29
49. 茵陳五苓散	20	75. 葛根芩連湯	29
50. 豬苓湯	20	76. 小柴胡湯*	30
		77. 柴胡加芒硝湯	32

78. 柴胡加大黄芒硝桑 螵蛸湯	33	104. 土瓜根散	46
79. 小柴胡去半夏加栝 蒌湯	33	105. 甘草湯	47
80. 柴胡桂枝湯	33	106. 桔梗湯	47
81. 柴胡桂枝乾薑湯 . . .	34	107. 排膿湯	47
82. 柴胡加龙骨牡蛎湯 .	34	108. 芍藥甘草湯	47
83. 大柴胡湯	35	109. 芍藥甘草附子湯 . . .	48
84. 白虎湯	35	110. 甘遂半夏湯	48
85. 白虎加人參湯	36	111. 甘草小麥大棗湯 . . .	48
86. 白虎加桂枝湯	36	112. 甘草粉蜜湯	48
87. 小承氣湯	36	113. 生薑甘草湯	49
88. 厚朴三物湯	38	114. 甘草乾薑湯	49
89. 厚朴七物湯	38	115. 乾薑附子湯	49
90. 大承氣湯	38	116. 四逆湯	50
91. 大黃黃連瀉心湯 . .	41	117. 通脈四逆湯*	51
92. 瀉心湯	42	118. 四逆加人參湯	51
93. 附子瀉心湯	42	119. 茯苓四逆湯	52
94. 大黃附子湯	42	120. 通脈四逆加豬膽汁湯	52
95. 大黃甘草湯	43	121. 白通湯	52
96. 調胃承氣湯	43	122. 白通加豬膽汁湯 . . .	52
97. 橘皮大黃朴消湯 . . .	44	123. 玄武湯*	53
98. 桃仁承氣湯	44	124. 附子湯	53
99. 大黃牡丹湯	44	125. 附子粳米湯	54
100. 大黃甘遂湯	45	126. 赤丸	54
101. 下瘀血湯	45	127. 大烏頭煎	54
102. 抵當湯	45	128. 烏頭湯	54
103. 抵當丸	46	129. 薏苡仁附子散	55
		130. 薏苡仁附子敗醬散 .	55
		131. 天雄散	55

132. 蜀漆散	56	159. 乾薑人参半夏丸 . . .	64
133. 梔子豉湯	56	160. 乾薑黄芩黄连人参湯	64
134. 梔子甘草豉湯	57	161. 黄连湯	65
135. 梔子生薑豉湯	57	162. 半夏瀉心湯	65
136. 枳实梔子湯	57	163. 甘草瀉心湯	65
137. 梔子枳实豉大黄湯 .	57	164. 生薑瀉心湯	66
138. 大黄黄蘗梔子硝石湯	58	165. 旋覆代赭湯	66
139. 茵陳蒿湯	58	166. 吴茱萸湯	67
140. 梔子蘗皮湯	58	167. 大建中湯	67
141. 梔子厚朴湯	59	168. 黄连阿膠湯	67
142. 梔子乾薑湯	59	169. 黄芩湯	68
143. 酸棗仁湯	59	170. 黄芩加半夏生薑湯 .	68
144. 大陷胸湯	59	171. 黄芩湯	68
145. 大陷胸丸	60	172. 三物黄芩湯	68
146. 小陷胸湯	60	173. 白頭翁湯	69
147. 枳实薤白桂枝湯 . . .	61	174. 白頭翁加甘草阿膠湯	69
148. 栝蒌薤白白酒湯 . . .	61	175. 木防己湯	69
149. 栝蒌薤白半夏湯 . . .	61	176. 木防己去石膏加茯	
150. 瓜蒂散	61	苓芒硝湯	69
151. 小半夏湯	62	177. 防己茯苓湯	70
152. 小半夏加茯苓湯 . . .	62	178. 防己黄耆湯*	70
153. 大半夏湯	62	179. 枳实术湯	71
154. 生薑半夏湯	63	180. 枳实芍藥散	71
155. 苦酒湯	63	181. 排膿散	71
156. 半夏厚朴湯	63	182. 桂枝生薑枳实湯 . . .	71
157. 半夏乾薑散	64	183. 橘皮枳实生薑湯 . . .	72
158. 厚朴生薑半夏甘草		184. 橘皮湯	72
人参湯	64	185. 橘皮竹茹湯	72

186. 茯苓飲	72	214. 雞屎白散	81
187. 桂枝茯苓丸	73	215. 蜘蛛散	81
188. 膠艾湯	73	216. 当歸芍藥散	81
189. 赤石脂禹餘糧湯 . . .	73	217. 当歸貝母苦參丸 . . .	81
190. 桃花湯	73	218. 狼牙湯	82
191. 蜜煎	74	219. 小兒疳虫蝕齒方 . . .	82
192. 麻子仁丸	74	220. 炙甘草湯	82
193. 防己椒目葶藶大黃丸	75	221. 当歸四逆湯	82
194. 葶藶大棗瀉肺湯 . . .	75	222. 当歸四逆加吳茱萸 生薑湯	83
195. 十棗湯	75	223. 麻黃連軛赤小豆湯 .	83
196. 桔梗白散(三物白散)	76	224. 四逆散*	83
197. 走馬湯	76	225. 射干麻黃湯	84
198. 礬石湯	76	226. 桂枝芍藥知母湯 . . .	84
199. 硝石礬石散	77	227. 内補当歸建中湯* . .	84
200. 礬石丸	77	228. 續命湯	85
201. 蛇床子散	77	229. 烏梅丸	85
202. 竹葉石膏湯	77	230. 大黃廔虫丸	85
203. 麥門冬湯	78	231. 麻黃升麻湯	86
204. 雄黃	78	232. 豬膚湯	86
205. 頭風摩散	78	233. 燒褌散	86
206. 皂莢丸	78	234. 瓜蒂湯	87
207. 葦湯(葦莖湯)	79	235. 百合知母湯	87
208. 当歸生薑羊肉湯 . . .	79	236. 百合滑石代赭湯 . . .	87
209. 蒲灰散	79	237. 百合雞子湯	87
210. 滑石白魚散	80	238. 百合地黄湯	88
211. 豬膏髮煎	80	239. 百合洗方	88
212. 柏葉湯	80	240. 栝蒌牡蛎散	88
213. 黃土湯	80		

241. 百合滑石散	88	269. 禹餘糧丸 _(方闕)	96
242.	89	270. 杏子湯 _(方闕)	97
243. 苦參湯	89	271. 黃連粉 _(方闕)	97
244. 赤小豆當歸散	89	272. 藜蘆甘草湯 _(方闕)	97
245. 升麻鱉甲湯	89	273. 膠薑湯 _(方闕)	97
246. 鱉甲煎丸	90	第二部分 傷寒論	98
247. 侯氏黑散	90	1. 辨太陽病	99
248. 風引湯	90	2. 辨陽明病	118
249. 防己地黃湯	91	3. 辨少陽病	129
250. 三黃湯*	91	4. 辨太陰病	130
251. 薯蕷丸	91	5. 辨少陰病	132
252. 獺肝散	92	6. 辨厥陰病	137
253. 厚朴麻黃湯	92	7. 辨厥利嘔噦	138
254. 澤漆湯	92	8. 辨霍亂	143
255. 奔豚湯	92	9. 辨陰易病已後勞復	145
256. 烏頭赤石脂丸	93	10. 發汗吐下後	146
257. 九痛丸	93	第三部分 雜病論	147
258. 溫經湯	93	11. 臟腑經絡先後	148
259. 旋覆花湯	94	12. 瘧濕喝	150
260. 厚朴大黃湯	94	13. 百合狐惑陰陽毒	153
261. 紫參湯	94	14. 瘡	155
262. 訶梨勒散	95	15. 中風歷節	156
263. 王不留行散	95	16. 血痺虛勞	159
264. 當歸散	95	17. 肺痿肺癰欬嗽上氣	162
265. 白朮散	95	18. 奔豚氣吐膿驚怖火邪	165
266. 竹葉湯*	96	19. 胸痹心痛短氣	167
267. 竹皮大丸*	96	20. 腹滿寒疝宿食	168
268. 紅藍花酒	96	21. 五臟風寒積聚	171

22. 痰飲欬嗽	174	29. 跌蹶手指臂脛轉筋狐疝	
23. 消渴小便不利淋	178	蛔虫	194
24. 水气	180	30. 雜療方	195
25. 黄疸	184	31. 婦人妊娠病	196
26. 驚悸吐衄下血胸滿瘀血	187	32. 婦人產後病	198
27. 嘔吐噦下利	189	33. 婦人雜病	200
28. 瘡癰腸癰浸淫	193	第四部分 衍文	203

第一部分

類聚方

1. 桂枝湯

桂枝三兩去皮 芍藥三兩 甘草二兩炙 生薑三兩切 大棗十二枚擘

右五味。㕮咀三味。以水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫。服一升。服已須臾。歠熱稀粥一升餘。以助藥力。溫覆令一時許。遍身皦皦微似有汗者益佳。不可令如水流漓。病必不除。若一服汗出病差。停後服。不必盡劑。若不汗。更服依前法。又不汗。後服小促其間。半日許令三服盡。若病重者。一日一夜服。周時觀之。服一劑盡。病証猶在者。更作服。若汗不出。乃服至二三劑。禁生冷。粘滑。肉面。五辛。酒酪。臭惡等物。**趙**⁴

太陽中風。脉陽浮而陰弱。陽浮者熱自发。陰弱者汗自出。嗇嗇惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴。乾嘔。桂枝湯主之。12

太陽病。發熱。汗出。此為榮弱衛強。故使汗出。欲救邪風。宜桂枝湯。95

太陽病。頭痛。發熱。汗出。惡風。桂枝湯主之。13

太陽病。下之。其氣上衝者。可與桂枝湯。不衝者。不可與之。15

太陽病三日。已發汗吐下溫針而不解。此為壞病。桂枝湯不復中與也。觀其脉証。知犯何逆。隨証治之。16

桂枝湯本為解肌。若其人脉浮緊。發熱。無汗。不可與也。常須識此。勿令誤也。16

酒客不可與桂枝湯。得之則嘔。以酒客不喜甘故也。17

服桂枝湯吐者。其後必吐膿血。19

太陽病。初服桂枝湯。反煩不解者。當先刺風池風府。卻與桂枝湯即愈。

⁴唐弘宇按：桂枝湯煎服法，趙本、《玉函》、《千金翼》文義基本相同，但行文風格上，《玉函》、《千金翼》行文簡潔，宋本系統明顯比唐代的這兩個版本囉嗦，且能看出有被修改過的痕跡。比如本論其它方劑的服法都作「溫服」，唯獨宋本桂枝湯服法作「適寒溫服」，再比如「酪」這種食物在張仲景時代還未被發明，等等。但由於此段文字各版本差異太大，很難互校，故直接照錄趙本。

24

服桂枝湯。大汗出。脉洪大者。与桂枝湯。若形如瘧。一日再发者。汗出便解。宜桂枝二麻黄一湯。25

太陽病。外証未解。其脉浮弱。当以汗解。宜桂枝湯。42

太陽病。外証未解者。不可下。下之为逆。欲解外者。宜桂枝湯。44

太陽病。先发汗不解而下之。其脉浮者不愈。浮为在外。而反下之。故令不愈。今脉浮。故在外。当解其外則愈。宜桂枝湯。45

病常自汗出者。此为榮气和。衛气不和也。榮行脉中。衛行脉外。復发其汗。衛和則愈。宜桂枝湯。53

病人臟无他病。时发熱。自汗出。而不愈者。此衛气不和也。先其时发汗則愈。宜桂枝湯。54

傷寒。不大便六七日。頭痛。有熱者。与承气湯。其小便清者。此为不在裏。續在表也。当发其汗。頭痛者必衄。宜桂枝湯。56

傷寒。发汗已解。半日許復煩。脉浮數者。可復发汗。宜桂枝湯。57

傷寒。醫下之。續得下利。清穀不止。身体疼痛。急当救裏。後身体疼痛。清便自調。急当救表。救裏宜四逆湯。救表宜桂枝湯。91

傷寒。大下後。復发汗。心下痞。惡寒者。表未解也。不可攻痞。当先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。164

陽明病。脉遲。雖汗出。不惡寒。其身必重。短气。腹滿而喘。有潮熱。如此者。其外为解。可攻其裏。若手足濇然汗出者。此大便已堅。大承气湯主之。若汗多。微发熱。惡寒者。为外未解。桂枝湯主之。其熱不潮。未可与承气湯。若腹大滿。而不大便者。可与小承气湯。微和其胃气。勿令至大下。208

陽明病。脉遲。汗出多。微惡寒者。表未解也。可发汗。宜桂枝湯。234

病者煩熱。汗出即解。復如瘧狀。日晡所发者。屬陽明。脉實者。当下之。脉浮虛者。当发其汗。下之宜大承氣湯。发汗宜桂枝湯。240

太陰病。脉浮者。可发汗。宜桂枝湯。276

下利。腹脹滿。身体疼痛者。先溫其裏。乃攻其表。溫裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。372

吐利止。而身痛不休者。当消息和解其外。宜桂枝湯小和之。387

師曰。脉婦人得平脉。陰脉小弱。其人渴。不能食。无寒熱。名为軀。桂枝湯主之。法六十日当有娠。設有醫治逆者。卻一月。加吐下者。則絕之。

婦人產得風。續之數十日不解。頭微痛。惡寒。时时有熱。心下堅。乾嘔。汗出。雖久。陽旦証續在耳。可与陽旦湯。

2. 桂枝加桂湯

桂枝五兩 芍藥三兩 生薑三兩切 甘草二兩炙 大棗十二枚擘

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今加桂滿五兩。所以加桂者，以能瀉奔豚氣也。

燒針令其汗。針處被寒。核起而赤者。必发奔豚。氣從少腹上衝心者。灸其核上各一壯。与桂枝加桂湯。117

3. 桂枝加芍藥湯

桂枝三兩 芍藥六兩 甘草二兩炙 大棗十二枚擘 生薑三兩切

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。分溫三服。本云桂枝湯。今加芍藥。

本太陽病。醫反下之。因尔腹滿時痛者。屬太陰。桂枝加芍藥湯主之。大實痛者。桂枝加大黃湯主之。279

4. 桂枝去芍藥湯

桂枝_{三兩} 甘草_{二兩炙} 生薑_{三兩切} 大棗_{十二枚擘}

右四味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今去芍藥。

太陽病。下之。脈促。胸滿者。桂枝去芍藥湯主之。若微惡寒者。桂枝去芍藥加附子湯主之。21.22

5. 桂枝加葛根湯

葛根_{四兩} 芍藥_{二兩} 生薑_{三兩切} 甘草_{二兩炙} 大棗_{十二枚擘} 桂枝_{二兩去皮}

右七味。以水一斗。先煮麻黃。葛根。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。不需啜粥。餘如桂枝湯法將息及禁忌。

臣億等謹按。仲景本論。太陽中風自汗用桂枝。傷寒無汗用麻黃。今証云汗出惡風。而方中有麻黃。恐非本意也。第三卷有葛根湯証云無汗惡風。正与此方同是合用麻黃也。此云桂枝加葛根湯。恐是桂枝中但加葛根耳。

太陽病。項背強几几。反汗出。惡風。桂枝加葛根湯主之。14

6. 栝蒌桂枝湯

栝蒌根_{二兩} 桂枝_{三兩去皮} 芍藥_{三兩} 甘草_{二兩炙} 生薑_{三兩切} 大棗_{十二枚擘}

右六味。㕮咀。以水九升。煮取三升。去滓。分溫三服。取微汗。汗不出。食頃。啜熱粥發之。

太陽病。其証備。身體強。几几然。脈反沈遲。此為瘧。栝蒌桂枝湯主之。

7. 桂枝加黃耆湯

桂枝三兩去皮 生薑三兩 芍藥三兩 甘草二兩炙 大棗十二枚擘 黃耆二兩

右六味。㕮咀。以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。須臾。飲熱稀粥一升餘。以助藥力。溫覆取微汗。若不汗者更服。

黃汗之病。兩脛自冷。假令發熱。此屬歷節。食已汗出。又身常暮卧盜汗出者。此勞氣也。若汗出已。反發熱者。久久其身必甲錯。發熱不止者。必生惡瘡。若身重。汗出已輒輕者。久久必身瞶瞶。即胸中痛。又從腰以上必汗出。下无汗。腰髀弛痛。如有物在皮中狀。劇者不能食。身疼重。煩躁。小便不利。此為黃汗。桂枝加黃耆湯主之。

諸病黃家。但利其小便。假令脈浮。當以汗解之。宜桂枝加黃耆湯主之。

8. 桂枝加大黃湯

桂枝三兩去皮 大黃二兩 芍藥六兩 生薑三兩切 甘草二兩炙 大棗十二枚擘

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

本太陽病。醫反下之。因爾腹滿時痛者。屬太陰。桂枝加芍藥湯主之。大實痛者。桂枝加大黃湯主之。279

9. 桂枝加芍藥生薑人參湯

桂枝三兩去皮 芍藥四兩 甘草二兩炙 人參三兩 大棗十二枚擘 生薑四兩切

右六味。以水一斗二升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今加芍藥。生薑。人參。

發汗後。身體疼痛。其脈沈遲。桂枝加芍藥生薑人參湯主之。62

10. 桂枝加厚朴杏仁湯

喘家作桂枝湯。加厚朴杏仁佳。18

太陽病。下之。微喘者。表未解也。桂枝加厚朴杏仁湯主之。43

11. 烏頭桂枝湯

烏頭五枚實者去角

右一味。以蜜二斤。煎減半。去滓。以桂枝湯五合解之。令得一升許。初服二合。不知。即服三合。又不知。復更加至五合。其知者如醉狀。得吐者為中病。

寒疝。腹中痛。逆冷。手足不仁。若身疼痛。灸刺諸藥不能治。烏頭桂枝湯主之。

12. 桂枝加附子湯

桂枝三兩 芍藥三兩 甘草三兩炙 生薑三兩切 大棗十二枚擘 附子一枚炮去皮破八片

右六味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今加附子。

太陽病。發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸。桂枝加附子湯主之。20

13. 桂枝去芍藥加附子湯

桂枝三兩 甘草二兩炙 生薑三兩切 大棗十二枚擘 附子一枚炮去皮破八片

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今去芍藥。加附子。

太陽病。下之。脈促。胸滿者。桂枝去芍藥湯主之。若微惡寒者。桂枝去芍藥加附子湯主之。21.22

14. 桂枝附子湯

桂枝四兩去皮 附子三枚炮去皮破 生薑三兩切 大棗十二枚擘 甘草二兩炙

右五味。以水六升。煮取二升。去滓。分溫三服。

傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔。不渴。脉浮虛而濇者。桂枝附子湯主之。若其人大便堅。小便自利者。朮附子湯主之。174

15. 朮附子湯

附子三枚炮去皮破 白朮四兩 生薑三兩切 甘草二兩炙 大棗十二枚擘

右五味。以水六升。煮取二升。去滓。分溫三服。

初一服。其人身如痹。半日許。復服之。三服都盡。其人如冒狀。勿怪。此以附子朮并走皮內。逐水氣。未得除。故使之耳。法當加桂四兩。此本一方二法。以大便堅。小便自利。故去桂也。以大便不堅。小便不利。當加桂。附子三枚恐多也。虛弱家及產婦宜減服之。

傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔。不渴。脉浮虛而濇者。桂枝附子湯主之。若其人大便堅。小便自利者。朮附子湯主之。174

治風虛。頭重眩。苦極。不知食味。暖肌補中。益精氣。朮附子湯。

16. 甘草附子湯

甘草二兩炙 附子二枚炮 白朮三兩 桂枝四兩

右四味。以水六升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。初服得微汗即止。能食。汗止復煩者。將服五合。恐一升多者。後服六七合愈。

風濕相搏。骨節疼煩。掣痛。不得屈伸。近之則痛劇。汗出。短氣。小便不利。惡風。不欲去衣。或身微腫。甘草附子湯主之。175

17. 桂枝去桂加茯苓术湯

芍藥_{三兩} 甘草_{二兩炙} 生薑_{三兩切} 白术_{三兩} 茯苓_{三兩} 大棗_{十二枚}

右六味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。小便利則愈。本云桂枝湯。今去桂枝。加茯苓。白术。

服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱。無汗。心下滿。微痛。小便不利。桂枝去桂加茯苓术湯主之。28

18. 桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯

桂枝_{三兩去皮} 生薑_{三兩切} 甘草_{二兩炙} 大棗_{十二枚擘} 麻黃_{二兩去節} 細辛_{二兩} 附子_{一枚炮去皮破八片}

右七味。㕮咀。以水七升。先煮麻黃再沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。分溫三服。當汗出。如蟲行皮中即愈。

氣分。心下堅。大如盤。邊如旋杯。水飲所作。桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯主之。

19. 桂枝去芍藥加皂莢湯

桂枝_{三兩去皮} 生薑_{三兩切} 甘草_{二兩炙} 大棗_{十二枚擘} 皂莢_{一枚去皮子炙焦}

右五味。㕮咀。以水七升。微微火煮取三升。去滓。分溫三服。

肺痿。吐涎沫。桂枝去芍藥加皂莢湯主之。

20. 桂枝加龙骨牡蛎湯

桂枝_{三兩去皮} 芍藥_{三兩} 生薑_{三兩切} 甘草_{二兩炙} 大棗_{十二枚擘} 龙骨_{二兩熬} 牡蛎_{二兩熬}

右七味。㕮咀。以水七升。煮取三升。去滓。分溫三服。

夫失精家。少腹弦急。陰頭寒。目眩。髮落。脈極虛芤遲。為清穀。亡血。

失精。脉得諸朮動微緊。男子失精。女子夢交。桂枝加龙骨牡蛎湯主之。天雄散亦主之。

21. 桂枝去芍藥加蜀漆牡蛎龙骨救逆湯

桂枝三兩去皮 甘草二兩炙 生薑三兩切 大棗十二枚擘 牡蛎五兩熬 蜀漆三兩洗去腥 龙骨四兩
右七味。以水一斗二升⁵。先煮蜀漆。減二升。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。本云桂枝湯。今去芍藥。加蜀漆牡蛎龙骨。

傷寒。脉浮。醫以火迫劫之。亡陽。必驚狂。卧起不安。桂枝去芍藥加蜀漆牡蛎龙骨救逆湯主之。112

火邪者。桂枝去芍藥加蜀漆牡蛎龙骨救逆湯主之。

22. 桂枝甘草龙骨牡蛎湯

桂枝一兩去皮 甘草二兩炙 牡蛎二兩熬 龙骨二兩
右四味。以水五升。煮取二升半。去滓。溫服八合。日三服。

火逆。下之。因燒針。煩躁者。桂枝甘草龙骨牡蛎湯主之。118

23. 桂枝二麻黃一湯

桂枝一兩十七銖去皮 芍藥一兩六銖 麻黃十六銖去節 生薑一兩六銖切 杏仁十六個去皮尖 甘草一兩二銖炙 大棗五枚擘

右七味。以水五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。日再服。本云桂枝湯二分。麻黃湯一分。合為二升。分再服。今合為一方。將息如前法。臣億等謹按。桂枝湯方。桂枝芍藥生薑各三兩。甘草二兩。大棗十二枚。麻黃湯方。麻黃三兩。桂枝二兩。甘草一兩。杏仁七十個。今以算法約之。桂枝湯取十二分之五。即得桂枝芍藥生薑各一兩六銖。甘草二十銖。大棗五枚。麻黃湯取九分之二。即得麻黃十六銖。桂枝十株三分銖之二。收之得十一銖。甘草五銖三分銖之一。收之得六銖。杏仁十五个九分枚之四。收之得十六个。二湯所取相合。即共得桂枝一兩十七

⁵吳本作「八升」。

銖。麻黃十六銖。生薑芍藥各一兩六銖。甘草一兩二銖。大棗五枚。杏仁十六個。合方。**趙**

服桂枝湯。大汗出。脈洪大者。與桂枝湯。若形如瘧。一日再發者。汗出便解。宜桂枝二麻黃一湯。25

凡大汗出復後。脈洪大。形如瘧。一日再發。汗出便解。更與桂枝麻黃湯。**心**

24. 桂枝二越婢一湯

桂枝^{十八銖去皮} 芍藥^{十八銖} 麻黃^{十八銖} 甘草^{十八銖炙} 大棗^{四枚擘} 生薑^{一兩二銖切} 石膏^{二十四銖碎棉裹}

右七味。以水五升。煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。本云。當裁為越婢湯桂枝湯。合之飲一升。今合為一方。桂枝湯二分。越婢湯一分。臣億等謹按。桂枝湯方。桂枝芍藥生薑各三兩。甘草二兩。大棗十二枚。越婢湯方。麻黃二兩。生薑三兩。甘草二兩。石膏八兩。大棗十五枚。今以算法約之。桂枝湯取四分之一。即得桂枝芍藥生薑各十八銖。甘草十二銖。大棗三枚。越婢湯取八分之一。即得麻黃十八銖。生薑九銖。甘草六銖。石膏二十四銖。大棗一枚八分之七。棄之。二湯所取相合。即共得桂枝芍藥甘草麻黃各十八銖。生薑一兩三銖。石膏二十四銖。大棗四枚。合方。舊云桂枝三。今取四分之一。即當云桂枝二也。越婢湯方。見仲景雜方中。外臺祕要一云起脾湯。

太陽病。發熱。惡寒。熱多寒少。脈微弱者。此無陽也。不可復發汗。宜桂枝二越婢一湯。27

25. 桂枝麻黃各半湯

桂枝^{一兩十六銖} 芍藥^{一兩} 生薑^{一兩切} 甘草^{一兩炙} 麻黃^{一兩去節} 大棗^{四枚擘} 杏仁^{二十四枚去皮尖兩仁者}

右七味。以水五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取一升八合。去滓。溫服六合。本云桂枝湯三合。麻黃湯三合。並為六合。頓服。將息如上法。臣億等謹按。桂枝湯方。桂枝芍藥生薑各三兩。甘草二兩。大棗十二枚。麻黃湯方。麻黃三兩。桂枝二兩。甘草一兩。杏仁七十個。今以算法約之。二湯各取三分之一。即得桂枝一兩十六銖。芍藥生薑甘草各一兩。大棗四枚。杏仁二十三個零三分枚之一。收之得二十四個。合方。詳此方乃三分之一。非各半也。宜云合半湯。

太陽病。得之八九日。如瘧狀。發熱。惡寒。熱多寒少。其人不嘔。清便續自可。一日再三發。脈微緩者。為欲愈也。脈微而惡寒者。此為陰陽俱虛。不可復吐下發汗也。面反有熱色者。未欲解也。以其不能得汗出。身必癢。宜桂枝麻黃各半湯。²³

26. 小建中湯

桂枝三兩去皮 甘草二兩炙 大棗十二枚擘 芍藥六兩 生薑三兩切 膠飴一升

右六味。㕮咀。以水七升。先煮五味。取三升。去滓。內膠飴。令消⁶。溫服一升。日三服。嘔家不可用建中湯。以甜故也。千金療男女因積冷氣滯。或大病後不復常。苦四肢沈重。骨肉痠疼。吸吸少氣。行動喘乏。胸滿。氣急。腰背強痛。心中虛悸。咽乾。唇燥。面體少色。或飲食無味。脇肋腹脹。頭重不舉。多卧少起。甚者積年。輕者百日。漸致瘦弱。五臟氣竭。則難可復常。六脈俱不足。虛寒乏氣。少腹拘急。羸脊百病。名曰黃耆建中湯。又有人參二兩。

傷寒。陽脈濇。陰脈弦。法當腹中急痛。先与小建中湯。不差者。与小柴胡湯。¹⁰⁰

傷寒二三日。心中悸而煩者。小建中湯主之。¹⁰²

虛勞。裏急。悸。衄。腹中痛。夢失精。四肢痠疼。手足煩熱。咽乾口燥。小建中湯主之。

男子黃。小便自利。當與虛勞小建中湯。

婦人腹中痛。小建中湯主之。

27. 黃耆建中湯

黃耆三兩 桂枝三兩去皮 生薑三兩切 芍藥六兩 甘草二兩炙 大棗十二枚擘 膠飴一升

右七味。㕮咀。以水七升。先煮六味。取三升。去滓。內膠飴。令消。溫服一升。日三服。

⁶「令消」同吳本，宋本作「更上微火消解」。

虛勞。裏急。諸不足。黄耆建中湯主之。

28. 黄耆桂枝五物湯

黄耆_{三兩} 芍藥_{三兩} 桂枝_{三兩去皮} 生薑_{六兩切} 大棗_{十二枚擘}

右五味。㕮咀。以水六升。煮取二升。去滓。溫服七合。日三服。一方有人參。

血痺。陰陽俱微。寸口關上微。尺中小緊。外証身體不仁。如風狀。黄耆桂枝五物湯主之。

29. 黄耆芍藥桂枝苦酒湯

黄耆_{五兩} 芍藥_{二兩} 桂枝_{三兩去皮}

右三味。㕮咀。以苦酒一升。水七升相和。煮取三升。去滓。溫服一升。当心煩。服至六七日乃解。若心煩不止者。以苦酒阻故也。一方用美清醴代苦酒。

問曰。黄汗之为病。身體腫。發熱。汗出而渴。狀如風水。汗沾衣。色正黄如檗汁。脉自沈。何從得之。

師曰。以汗出入水中浴。水從汗孔入得之。

黄汗。黄耆芍藥桂枝苦酒湯主之。

30. 桂枝甘草湯

桂枝_{四兩去皮} 甘草_{二兩炙}

右二味。以水三升。煮取一升。去滓。頓服。

發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。桂枝甘草湯主之。64

31.半夏散及湯

半夏洗 桂枝去皮 甘草炙

右三味。等分。各別擣篩已。合治之。白飲和服方寸匕。日三服。若不能散服者。以水一升。煎七沸。內散兩方寸匕。更煮三沸。下火。令小冷。少少咽之。半夏有毒。不當散服。

少陰病。咽中痛。半夏散及湯主之。313

32.桂枝人參湯

桂枝四兩別切 甘草四兩炙 白朮三兩 人參三兩 乾薑三兩

右五味。以水九升。先煮四味。取五升。內桂。更煮取三升。去滓。溫服一升。日再夜一服。

太陽病。外証未除。而數下之。遂挾熱而利。利下不止。心下痞堅。表裏不解。桂枝人參湯主之。163

33.理中湯(人參湯)*

人參三兩 乾薑三兩 甘草三兩炙 白朮三兩

右四味。擣篩。蜜和為丸。如雞子黃許大。以沸湯數合。和一丸。研碎。溫服之。日三夜二服。腹中未熱。益至三四丸。然不及湯。

湯法。以四物。依兩數切。用水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

若臍上築者。腎氣動也。去朮。加桂四兩。

若吐多者。去朮。加生薑三兩。

若下利多者。復用朮。

若悸者。加茯苓二兩。

若渴欲得水者。加朮至四兩半。

若腹中痛者。加人參至四兩半。

若寒者。加乾薑至四兩半。

若腹滿者。去朮。加附子一枚。

傷寒。服湯藥。下利不止。心下痞堅。服瀉心湯已。復以他藥下之。利不止。醫以理中与之。利益甚。理中者。理中焦。此利在下焦。赤石脂禹餘糧湯主之。復不止者。當利小便。159

霍亂。頭痛。發熱。身疼痛。熱多。欲飲水者。五苓散主之。寒多。不用水者。理中湯主之。386

大病差後。其人喜唾。久不了了者。胃上有寒。當溫之。宜理中丸。396

胸痹。心中痞。留氣結在胸。胸滿。脇下逆搶心。枳實薤白桂枝湯主之。理中湯亦主之。

34. 茯苓杏仁甘草湯

茯苓_{三兩} 杏仁_{五十個去皮尖} 甘草_{一兩炙}

右三味。㕮咀。以水一斗。煮取五升。去滓。溫服一升。日三服。不差。更合服。

胸痹。胸中氣塞。短氣。茯苓杏仁甘草湯主之。橘皮枳實生薑湯亦主之。

35. 茯苓戎鹽湯

茯苓_{八兩} 白朮_{二兩} 戎鹽_{彈丸大一枚}

右三味。㕮咀。以水七升。煮取三升。去滓。分溫三服。

小便不利。蒲灰散主之。滑石白魚散。茯苓戎鹽湯并主之。

36. 葵子茯苓散

葵子一升 茯苓三兩

右二味。杵为散。飲服方寸匕。日三服。小便利則愈。

婦人妊娠。有水气。身重。小便不利。洒淅惡寒。起即頭眩。葵子茯苓散主之。

37. 甘草乾薑茯苓白朮湯

甘草二兩炙 乾薑四兩 茯苓四兩 白朮二兩

右四味。㕮咀。以水五升。煮取三升。去滓。分溫三服。腰中即溫。

腎著之病。其人身体重。腰中冷。如坐水中。形如水狀。反不渴。小便自利。食飲如故。病屬下焦。身勞汗出。衣裏冷濕。久久得之。腰以下冷痛。腹重如帶五千錢。甘草乾薑茯苓白朮湯主之。

38. 苓桂朮甘湯

茯苓四兩 桂枝三兩去皮 白朮二兩⁷ 甘草二兩炙

右四味。以水六升。煮取三升。去滓。分溫三服。

傷寒吐下发汗後。心下逆滿。气上衝胸。起則頭眩。其脉沈緊。发汗則動經。身為振搖。苓桂朮甘湯主之。⁶⁷

心下有痰飲。胸脇支滿。目眩。苓桂朮甘湯主之。

夫短气。有微飲。當從小便去之。苓桂朮甘湯主之。腎气丸亦主之。

⁷「二兩」同趙本，《金匱要略》吳本、鄧本均作「三兩」。

39. 苓桂甘棗湯

茯苓_{八兩} 桂枝_{四兩去皮} 甘草_{二兩炙} 大棗_{十五枚擘}

右四味。以甘爛水一斗。先煮茯苓。減二升。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。作甘爛水法。取水二斗。置大盆內。以杓揚之。水上有珠子五六千顆相逐。取用之。

發汗後。其人臍下悸。欲作奔豚。苓桂甘棗湯主之。65

40. 茯苓桂枝五味子甘草湯

茯苓_{四兩} 桂枝_{四兩去皮} 五味子_{八兩碎} 甘草_{三兩炙}

右四味。㕮咀。以水八升。煮取三升。去滓。分溫三服。

青龙湯下已。多睡。口燥。寸脉沈。尺脉微。手足厥逆。氣從少腹上衝胸咽。手足痹。其人面翕然如醉。因復下流陰股。小便難。時復冒。可與茯苓桂枝五味子甘草湯。治其氣衝。

41. 茯苓桂枝五味子甘草湯去桂加乾薑細辛

茯苓_{四兩} 五味子_{半升碎} 甘草_{一兩炙} 乾薑_{一兩} 細辛_{一兩}

右五味。㕮咀。以水八升。煮取三升。去滓。分溫三服。 吳

茯苓_{四兩} 甘草_{三兩} 乾薑_{三兩} 細辛_{三兩} 五味子_{半升}

右五味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服半升。日三。 鄧

衝氣即低。而反更欬滿者。因茯苓五味子甘草。去桂加乾薑細辛。以治其欬滿。 吳

衝氣即低。而反更欬。胸滿者。用桂苓五味甘草湯。去桂加乾薑細辛。以治其欬滿。 鄧

42.

欬滿則止。而復更渴。衝氣復發者。以細辛乾薑為熱藥也。此法不當逐渴。而渴反止者。為支飲也。支飲法當冒。冒者必嘔。嘔者復內半夏。以去其水。

43.

水去。嘔則止。其人形腫。可內麻黃。以其欲逐痹。故不內麻黃。乃內杏仁也。若逆而內麻黃者。其人必厥。所以然者。以其人血虛。麻黃發其陽故也。

44.

若面熱如醉狀者。此為胃中熱。上熏其面令熱。加大黃湯和之。

45.澤瀉湯

澤瀉_{五兩} 白朮_{二兩}

右二味。咬咀。以水二升。煮取一升。去滓。分溫再服。

心下有支飲。其人苦冒眩。澤瀉湯主之。

46.茯苓澤瀉湯

茯苓_{八兩} 澤瀉_{四兩} 甘草_{二兩炙} 桂枝_{二兩去皮} 白朮_{三兩} 生薑_{四兩切}

右六味。咬咀。以水一斗。煮取三升。內澤瀉。再煮。取二升半。去滓。溫服八合。日三服。

胃反。吐而渴欲飲水者。茯苓澤瀉湯主之。

47. 茯苓甘草湯

茯苓_{二兩} 桂枝_{二兩去皮} 甘草_{一兩炙} 生薑_{三兩切}

右四味。以水四升。煮取二升。去滓。分溫三服。

傷寒。汗出而渴者。五苓散主之。不渴者。茯苓甘草湯主之。73

傷寒。厥而心下悸。宜先治水。當與茯苓甘草湯。卻治其厥。不爾。水漬入胃。必作利也。356

48. 五苓散

豬苓_{十八銖去皮} 澤瀉_{一兩六銖} 白朮_{十八銖} 茯苓_{十八銖} 桂枝_{半兩去皮}

右五味。搗為散。以白飲和服方寸匕。日三服。多飲暖水。汗出愈。如法將息。

太陽病發汗後。大汗出。胃中乾。煩躁不得眠。其人欲飲水。當稍飲之。令胃氣和則愈。若脈浮。小便不利。微熱。消渴者。五苓散主之。71

發汗已。脈浮數。煩渴者。五苓散主之。72

傷寒。汗出而渴者。五苓散主之。不渴者。茯苓甘草湯主之。73

中風。發熱。六七日不解而煩。有表裏証。渴欲飲水。水入則吐。此為水逆。五苓散主之。74

病在陽。當以汗解。反以水瀝之若灌之。其熱被劫不得去。益煩。皮上粟起。意欲飲水。反不渴。宜服文蛤散。若不差。與五苓散。141

本以下之。故心下痞。與瀉心湯。痞不解。其人渴而口燥煩。小便不利。五苓散主之。156

太陽病。寸口緩。關上小浮。尺中弱。其人發熱。汗出。復惡寒。不嘔。但

心下痞者。此为醫下之故也。若不下。其人不惡寒而渴者。此轉屬陽明。小便數者。大便必堅。不更衣十日。无所苦也。渴欲飲水者。少少与之。但以法救之。渴者。宜五苓散。244

霍亂。頭痛。發熱。身疼痛。熱多。欲飲水者。五苓散主之。寒多。不用水者。理中湯主之。386

假令瘦人脐下悸。吐涎沫而癰眩。此水也。五苓散主之。

脉浮。小便不利。微熱。消渴者。宜利小便。發汗。五苓散主之。

49.茵陳五苓散

茵陳蒿末_{五分} 五苓散_{五分}

右二物。和。先食飲服方寸匕。日三服。

黃疸病。茵陳五苓散主之。

50.豬苓湯

豬苓_{一兩去皮} 茯苓_{一兩} 澤瀉_{一兩} 阿膠_{一兩} 滑石_{一兩碎}

右五味。以水四升。先煮四味。取二升。去滓。內阿膠烱消。溫服七合。日三服。

若脉浮。發熱。渴欲飲水。小便不利者。豬苓湯主之。223

陽明病。汗出多而渴者。不可與豬苓湯。以汗多。胃中燥。豬苓湯復利其小便故也。224

少陰病。下利六七日。欬而嘔。渴。心煩不得眠。豬苓湯主之。319

51. 豬苓散

豬苓_{去皮} 茯苓 白朮_{各等分}

右三味。杵為散。飲服方寸匕。日三服。

嘔吐。而病在膈上。後思水者鮮。急與之。思水者。豬苓散主之。

52. 牡蛎澤瀉散

牡蛎_熬 澤瀉_{蜀漆_{煖水洗去腥}} 葶藶子_熬 商陸根_熬 海藻_{洗去鹹} 栝蒌根_{各等分}

右七味。異擣。下篩為散。更於臼中治之。白飲和服方寸匕。日三服。小便利。止後服。

大病差後。從腰以下有水氣者。牡蛎澤瀉散主之。395

53. 腎氣丸

乾地黄_{八兩} 薯蕷_{四兩} 山茱萸_{四兩} 澤瀉_{三兩} 茯苓_{三兩} 牡丹皮_{三兩} 桂枝_{一兩} 附子_{一兩_炮}

右八味。末之。煉蜜和丸梧子大。酒下十五丸。日再服。加至二十五丸。

治腳氣上入。少腹不仁。服八味丸。

虛勞。腰痛。少腹拘急。小便不利者。八味腎氣丸主之。

夫短氣。有微飲。當從小便去之。苓桂朮甘湯主之。腎氣丸亦主之。

男子消渴。小便反多。以飲一斗。小便一斗。腎氣丸主之。

問曰。婦人病。飲食如故。煩熱不得卧。而反倚息者。何也。

師曰。此名轉胞。不得尿也。以胞系了戾。故致此病。但利小便則愈。宜腎氣丸。

54. 栝蒌瞿麥丸

栝蒌根_{二兩} 茯苓_{三兩} 薯蕷_{三兩} 附子_{大者一枚炮去皮} 瞿麥_{一兩}

右五味。末之。煉蜜和为丸梧子大。飲服三丸。日三服。不知。增至七八丸。以小便利。腹中温为知。

小便不利者。有水气。其人若渴。栝蒌瞿麥丸主之。

55. 麻黄湯

麻黄_{三兩去節} 桂枝_{二兩去皮} 甘草_{一兩炙} 杏仁_{七十个去皮尖}

右四味。以水九升。先煮麻黄。減二升。去上沫。内諸藥。煮取二升半。去滓。温服八合。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法將息。

太陽病。頭痛。发熱。身疼。腰痛。骨節疼痛。惡風。无汗而喘。麻黄湯主之。35

太陽与陽明合病。喘而胸滿者。不可下。宜麻黄湯。36

太陽病。十日已去。脉浮細而嗜卧者。外已解也。設胸滿脇痛者。与小柴胡湯。脉但浮者。与麻黄湯。37

太陽病。脉浮緊。无汗。发熱。身疼痛。八九日不解。表証仍在。此当发其汗。服藥已。微除。其人发煩目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽气重故也。麻黄湯主之。46

脉浮者。病在表。可发汗。宜麻黄湯。51

太陽病。脉浮數者。可发汗。宜麻黄湯。52

傷寒。脉浮緊。不发汗。因致衄者。宜麻黄湯。55

寸口脉浮而緊。浮則为風。緊則为寒。風則傷衛。寒則傷榮。榮衛俱病。

骨節煩疼。当发其汗。宜麻黄湯。

陽明中風。脉弦浮大。而短气。腹都滿。脇下及心痛。久按之。气不通。鼻乾。不得汗。嗜卧。一身及目悉黄。小便難。有潮熱。时时噦。耳前後腫。刺之小差。外不解。病過十日。脉續浮者。与小柴胡湯。脉但浮。无餘証者。与麻黄湯。不尿。腹滿加噦者。不治。231.232

陽明病。脉浮。无汗而喘者。发汗則愈。宜麻黄湯。235

56. 麻黄加术湯

麻黄_{三兩去節} 桂枝_{二兩去皮} 甘草_{一兩炙} 杏仁_{七十个去皮尖} 白术_{四兩}

右五味。咬咀。以水九升。先煮麻黄一二沸。去上沫。内諸藥。煮取二升。去滓。温服八合。覆取微似汗。

濕家。身煩疼。可与麻黄加术湯。发其汗为宜。慎不可以火攻之。

57. 甘草麻黄湯

甘草_{二兩炙} 麻黄_{四兩去節}

右二味。咬咀。以水五升。先煮麻黄再沸。去上沫。内甘草。煮取三升。去滓。温服一升。重覆汗出。不汗再服。慎風寒。

裏水。越婢加术湯主之。甘草麻黄湯亦主之。

58. 麻黄附子甘草湯(附子麻黄湯)

麻黄_{二兩去節} 甘草_{二兩炙} 附子_{一枚炮去皮破八片}

右三味。以水七升。先煮麻黄一兩沸。去上沫。内諸藥。煮取三升。去滓。温服一升。日三服。趙

附子_{一枚炮去皮破八片} 麻黄_{二兩去節} 甘草_{二兩炙}

右三味。㕮咀。以水七升。先煮麻黄再沸。去上沫。内諸藥。煮取二升半。去滓。温服八分。日三服。 **吳**

少陰病。得之二三日。麻黄附子甘草湯微发汗。以二三日无裏証。故微发汗。302

水之为病。其脉沈小。屬少陰。浮者为風。无水。虚胀者为气。水。发其汗即已。脉沈者。宜附子麻黄湯。浮者。宜杏子湯。

59.麻黄細辛附子湯

麻黄二兩去節 細辛二兩 附子一枚炮去皮破八片

右三味。以水一斗。先煮麻黄。減二升。去上沫。内諸藥。煮取三升。去滓。温服一升。日三服。

少陰病。始得之。反发熱。脉沈者。麻黄細辛附子湯主之。301

60.麻杏甘石湯

麻黄四兩去節 杏仁五十个去皮尖 甘草二兩炙 石膏八兩碎綿裹

右四味。以水七升。煮麻黄。減二升。去上沫。内諸藥。煮取二升。去滓。温服一升。

发汗後。不可更行桂枝湯。汗出而喘。无大熱者。可与麻杏甘石湯。63

下後。不可更行桂枝湯。汗出而喘。无大熱者。可与麻杏甘石湯。162

61.麻杏薏甘湯

麻黄二兩去節 杏仁三十个去皮尖 薏苡仁一兩 甘草一兩炙

右四味。㕮咀。以水四升。先煮麻黄一二沸。去上沫。内諸藥。煮取二升。去滓。分温再服。 **吳**

病者一身盡疼。發熱。日晡所劇者。此名風濕。此病傷於汗出當風。或久傷取冷所致也。可與麻杏薏甘湯。

62. 牡蛎湯

牡蛎四兩熬 麻黃四兩去節 甘草二兩炙 蜀漆三兩洗去腥

右四味。咬咀。以水八升。先煮蜀漆。麻黃。去上沫。得六升。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。吐則勿更服。見外臺

治牡瘡。牡蛎湯。

63. 麻黃淳酒湯

麻黃三兩去節綿裹

右一味。以美清酒五升。煮取二升半。去滓。頓服盡。冬月用酒。春月用水煮之。

黃疸。麻黃淳酒湯主之。

64. 半夏麻黃丸

半夏洗 麻黃去節 等分

右二味。末之。煉蜜和丸如小豆大。飲服三丸。日三服。

心下悸者。半夏麻黃丸主之。

65. 小青龍湯*

麻黃三兩去節 芍藥三兩 細辛三兩 乾薑三兩 甘草三兩炙 桂枝三兩去皮 五味子半升 半夏

半升洗

右八味。以水一斗。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。

渴者。去半夏。加栝蒌根三兩。

微利者。去麻黃。加薏花。如一雞子。熬令赤色。

噎者。去麻黃。加附子一枚炮。

小便不利。少腹滿者。去麻黃。加茯苓四兩。

喘者。去麻黃。加杏仁半升。去皮尖。

薏花不治利。麻黃主喘。今此語反之。疑非仲景意。臣億等謹按。小青龙湯。大要治水。又按本草。薏花下十二水。若水去。利則止也。又按千金。形腫者應內麻黃。乃內杏仁者。以麻黃發其陽故也。以此証之。豈非仲景意也。

傷寒。表不解。心下有水氣。乾嘔。發熱而欬。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘。小青龙湯主之。40

傷寒。心下有水氣。欬而微喘。發熱。不渴。服湯已而渴者。此寒去。為欲解。小青龙湯主之。41

病溢飲者。當發其汗。大青龙湯主之。小青龙湯亦主之。

欬逆倚息。小青龙湯主之。

婦人吐涎沫。醫反下之。心下即痞。當先治其吐涎沫。宜小青龙湯。涎沫止。乃治痞。宜瀉心湯。

66. 小青龙加石膏湯

麻黃_{三兩去節} 芍藥_{三兩} 桂枝_{三兩} 細辛_{三兩} 甘草_{三兩炙} 乾薑_{三兩} 五味子_{半升} 半夏_{半升洗} 石膏_{二兩碎}

右九味。㕮咀。以水一斗。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。取三升。去滓。強人服一升。羸者減之。日三服。小兒服四合。

肺脹。欬而上氣。煩躁而喘。脈浮者。心下有水。小青龙加石膏湯主之。

欬而上氣。肺脹。其脈浮。心下有水氣。脇下痛引缺盆。小青龙加石膏湯主之。

67.大青龙湯

麻黃六兩去節 桂枝二兩去皮 甘草二兩炙 杏仁四十枚去皮尖 生薑三兩切 大棗十枚擘 石膏如雞子大碎

右七味。以水九升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。取微似汗。汗出多者。溫粉粉之。一服汗者。停後服。若復服。汗多亡陽。遂虛。惡風。煩躁。不得眠也。

太陽中風。脉浮緊。發熱。惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁者。大青龙湯主之。若脉微弱。汗出。惡風者。不可服之。服之則厥。筋惕肉瞤。此為逆也。38

傷寒。脉浮緩。身不疼。但重。乍有輕時。无少陰証者。大青龙湯發之。39

病溢飲者。當發其汗。大青龙湯主之。小青龙湯亦主之。

68.文蛤湯

文蛤五兩 麻黃三兩去節 甘草三兩炙 杏仁五十枚去皮尖 石膏五兩碎 大棗十二枚擘 生薑三兩切

右七味。咬咀。以水六升。煮取二升。去滓。溫服一升。汗出愈。

吐後。渴欲得飲而貪水者。文蛤湯主之。兼主微風。脉緊。頭痛。

69.文蛤散

文蛤五兩

右一味。杵為散。以沸湯五合。和服方寸匕。鄧

文蛤五兩

右一味。為散。以沸湯和一方寸匕服湯。用五合。趙

病在陽。当以汗解。反以水瀝之若灌之。其熱被劫不得去。益煩。皮上粟起。意欲飲水。反不渴。宜服文蛤散。若不差。与五苓散。141

渴欲飲水不止者。文蛤散主之。

70. 越婢湯

麻黃六兩去節 石膏八兩碎 生薑三兩切 大棗十五枚擘 甘草二兩炙

右五味。㕮咀。以水六升。先煮麻黃再沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。分溫三服。惡風者。加附子一枚炮。古今錄驗云。風水加朮四兩。

風水。惡風。一身悉腫。脉浮。不渴。續自汗出。无大熱。越婢湯主之。

71. 越婢加朮湯

麻黃六兩去節 石膏八兩 生薑三兩切 甘草二兩炙 大棗十五枚擘 白朮四兩

右六味。㕮咀。以水六升。先煮麻黃再沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。分溫三服。惡風加附子一枚炮。

裏水者。一身面目自洪腫。其脉沈。小便不利。故令病水。假如小便自利。亡津液。故令渴也。⁸

裏水。越婢加朮湯主之。甘草麻黃湯亦主之。

治肉極。熱則身體津液脫。腠理開。汗大泄。厉風氣。下焦腳弱。越婢加朮湯。

72. 越婢加半夏湯

麻黃六兩去節 石膏八兩碎 生薑三兩切 大棗十五枚擘 甘草二兩炙 半夏半升洗

右六味。㕮咀。以水六升。先煮麻黃再沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。

⁸鄧本本條末有「越婢加朮湯主之」七字，吳本无。

去滓。分溫三服。

欬逆倚息。此为肺脹。其人喘。目如脫狀。脉浮大者。越婢加半夏湯主之。

73. 葛根湯

葛根_{四兩} 麻黃_{三兩去節} 桂枝_{二兩去皮} 生薑_{三兩切} 甘草_{二兩炙} 芍藥_{二兩} 大棗_{十二枚擘}

右七味。以水一斗。先煮麻黃。葛根。減二升。去白沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。餘如桂枝法將息及禁忌。諸湯皆倣此。

太陽病。項背強几几。无汗。惡風。葛根湯主之。31

太陽与陽明合病。而自利者。葛根湯主之。不下利。但嘔者。葛根加半夏湯主之。32.33

太陽病。无汗。而小便反少。气上衝胸。口噤不得語。欲作剛瘕。葛根湯主之。

74. 葛根加半夏湯

葛根_{四兩} 麻黃_{三兩去節} 甘草_{二兩炙} 芍藥_{二兩} 桂枝_{二兩去皮} 生薑_{二兩切} 半夏_{半升洗} 大棗_{十二枚擘}

右八味。以水一斗。先煮葛根。麻黃。減二升。去白沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。

太陽与陽明合病。而自利者。葛根湯主之。不下利。但嘔者。葛根加半夏湯主之。32.33

75. 葛根芩連湯

葛根_{八兩} 甘草_{二兩炙} 黃芩_{三兩} 黃連_{三兩}

右四味。以水八升。先煮葛根。減二升。內諸藥。煮取二升。去滓。分溫

再服。

太陽病。桂枝証。醫反下之。遂利不止。脉促者。表未解也。喘而汗出者。葛根芩連湯主之。34

76. 小柴胡湯*

柴胡_{八兩} 黃芩_{三兩} 人參_{三兩} 甘草_{三兩炙} 生薑_{三兩切} 大棗_{十二枚擘} 半夏_{半升洗}
右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。

若胸中煩而不嘔者。去半夏。人參。加枳實一枚。

若渴者。去半夏。加人參合前成四兩半。枳實根四兩。

若腹中痛者。去黃芩，加芍藥三兩。

若脇下痞堅者。去大棗。加牡蠣六兩。

若心下悸。小便不利者。去黃芩。加茯苓四兩。

若不渴。外有微熱者。去人參。加桂三兩。溫覆。微發其汗。

若欬者。去人參。大棗。生薑。加五味子半升。乾薑二兩。

太陽病。十日已去。脉浮細而嗜卧者。外已解也。設胸滿脇痛者。与小柴胡湯。脉但浮者。与麻黃湯。37

血弱氣盡。腠理開。邪氣因入。与正氣相搏。結於脇下。正邪分爭。往來寒熱。休作有時。默默不欲飲食。臟腑相連。其痛必下。邪高痛下。故使嘔也。小柴胡湯主之。服柴胡湯已。渴者。屬陽明。以法治之。97

傷寒五六日。中風。往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲飲食。心煩。喜嘔。或胸中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脇下痞堅。或心下悸。小便不利。或不渴。外有微熱。或欬。小柴胡湯主之。96

得病六七日。脉遲浮弱。惡風寒。手足溫。醫再三下之。不能食。其人脇下滿痛。面目及身黃。頸項強。小便難。与柴胡湯後必下重。本渴。飲水而嘔。柴胡湯不復中与也。食穀者噦。98

傷寒四五日。身熱。惡風。頸項強。脇下滿。手足溫而渴。小柴胡湯主之。
99

傷寒。陽脉濇。陰脉弦。法當腹中急痛。先与小建中湯。不差者。与小柴胡湯。100

傷寒中風。有柴胡証。但見一証便是。不必悉具。101

凡柴胡湯証而下之。柴胡証不罷者。復与柴胡湯。必蒸蒸而振。卻發熱汗出而解。101

太陽病。過經十餘日。反再三下之。後四五日。柴胡証仍在。先与小柴胡湯。嘔不止。心下急。其人鬱鬱微煩者。為未解。与大柴胡湯下之則愈。
103

傷寒十三日不解。胸脇滿而嘔。日晡所發潮熱。已而微利。此本當柴胡湯下之。不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。非其治也。潮熱者。實也。先宜服小柴胡湯以解其外。後以柴胡加芒硝湯主之。104

婦人中風七八日。續得寒熱。發作有時。經水適斷。此為熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。發作有時。小柴胡湯主之。144

傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便堅。其脉細。此為陽微結。必有表。復有裏。沈亦為病在裏。汗出為陽微。假令純陰結。不得有外証。悉入在裏。此為半在外半在裏。脉雖沈緊。不得為少陰病。所以然者。陰不得有汗。今頭汗出。故知非少陰也。可与小柴胡湯。設不了了者。得屎而解。148

傷寒五六日。嘔而發熱。柴胡湯証具。而以他藥下之。柴胡証仍在者。復与柴胡湯。此雖已下之。不為逆。必蒸蒸而振。卻發熱汗出而解。若心下滿而堅痛者。此為結胸。宜大陷胸湯。若但滿而不痛者。此為痞。柴胡湯不復中与也。宜半夏瀉心湯。149

陽明病。發潮熱。大便溏。小便自可。胸脇滿不去。小柴胡湯主之。229

陽明病。脇下堅滿。不大便而嘔。舌上白胎者。可與小柴胡湯。上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濺然汗出而解。230

陽明中風。脈弦浮大。而短氣。腹都滿。脇下及心痛。久按之。氣不通。鼻乾。不得汗。嗜卧。一身及目悉黃。小便難。有潮熱。時時噦。耳前後腫。刺之小差。外不解。病過十日。脈續浮者。與小柴胡湯。脈但浮。無餘証者。與麻黃湯。不尿。腹滿加噦者。不治。231.232

太陽病不解。轉入少陽。脇下堅滿。乾嘔。不能食。往來寒熱。尚未吐下。其脈沈緊。可與小柴胡湯。266

嘔而發熱者。小柴胡湯主之。379

傷寒差已後。更發熱者。小柴胡湯主之。脈浮者。以汗解之。脈沈實者。以下解之。394

諸黃。腹痛而嘔者。宜柴胡湯。

產婦鬱冒。其脈微弱。不能食。大便反堅。但頭汗出。所以然者。血虛而厥。厥而必冒。冒家欲解。必大汗出。以血虛下厥。孤陽上出。故但頭汗出。所以產婦喜汗出者。亡陰血虛。陽氣獨盛。故當汗出。陰陽乃復。所以便堅者。嘔。不能食也。小柴胡湯主之。病解。能食。七八日。更發熱者。此為胃熱氣實。大承氣湯主之。

婦人多在草蓐得風。四肢苦煩熱。皆自發露所為。頭痛者。與小柴胡湯。頭不痛。但煩者。與三物黃芩湯。

77. 柴胡加芒硝湯

柴胡_{二兩十六銖} 黃芩_{一兩} 人參_{一兩} 甘草_{一兩炙} 生薑_{一兩切} 半夏_{二十銖本云五枚洗} 大棗_{四枚擘} 芒硝_{二兩}

右八味。以水四升。煮取二升。去滓。内芒硝。更煮微沸。分温再服。不解更作。臣億等謹按。金匱玉函方中无芒硝。别一方云。以水七升。下芒硝二合。大黄四兩。桑螵蛸五枚。煮取一升半。服五合。微下即愈。本云。柴胡再服。以解其外。餘二升。加芒硝大黄桑螵蛸也。

傷寒十三日不解。胸脇滿而嘔。日晡所发潮熱。已而微利。此本当柴胡湯下之。不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。非其治也。潮熱者。實也。先宜服小柴胡湯以解其外。後以柴胡加芒硝湯主之。104

78. 柴胡加大黄芒硝桑螵蛸湯

右前七味。以水四升。煮取二升。去滓。下芒硝大黄桑螵蛸。煮取一升半。去滓。温服五合。微下即愈。本方柴胡湯。再服以解其外。餘一服。加芒硝大黄桑螵蛸。函

右以前七味。以水七升。下芒硝三合。大黄四分。桑螵蛸五枚。煮取一升半。去滓。温服五合。微下即愈。本云柴胡湯。再服以解其外。餘二升。加芒硝大黄桑螵蛸也。翼

79. 小柴胡去半夏加栝蒌湯

柴胡八兩 人參三兩 黃芩三兩 甘草三兩炙 栝蒌根四兩 生薑二兩切 大棗十二枚擘

右七味。咬咀。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。温服一升。日三。見外臺經心錄治勞瘡

瘡病发渴者。与小柴胡去半夏加栝蒌湯。

80. 柴胡桂枝湯

桂枝一兩半去皮 黃芩一兩半 人參一兩半 甘草一兩炙 半夏二合半洗 芍藥一兩半 大棗六枚擘 生薑一兩半切 柴胡四兩

右九味。以水七升。煮取三升。去滓。温服一升。本云人參湯。作如桂枝法。加半夏柴胡黃芩。復如柴胡法。今用人參作半劑。

傷寒六七日。發熱。微惡寒。肢節煩疼。微嘔。心下支結。外証未去者。柴胡桂枝湯主之。146

發汗多。亡陽。狂語者。不可下。與柴胡桂枝湯。和其榮衛。以通津液。後自愈。

寒疝。腹中痛者。柴胡桂枝湯主之。

81. 柴胡桂枝乾薑湯

柴胡_{八兩} 桂枝_{三兩去皮} 乾薑_{二兩} 栝蒌根_{四兩} 黃芩_{三兩} 牡蠣_{二兩熬} 甘草_{二兩炙}
右七味。咬咀。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。初服微煩。復服。汗出便愈。

傷寒五六日。已發汗而復下之。胸脇滿。微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩。此為未解。柴胡桂枝乾薑湯主之。147

柴胡桂薑湯。此方治寒多微有熱。或但寒不熱。服一劑如神。故錄之。

82. 柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡_{四兩} 龍骨_{一兩半} 黃芩_{一兩半} 生薑_{一兩半切} 鋁丹_{一兩半} 人參_{一兩半} 桂枝_{一兩半去皮}
茯苓_{一兩半} 半夏_{二合洗} 大黃_{二兩} 牡蠣_{一兩半熬} 大棗_{六枚擘}
右十二味。以水八升。煮取四升。內大黃。切如碁子。更煮一兩沸。去滓。溫服一升。本云柴胡湯。今加龍骨等。

傷寒八九日。下之。胸滿。煩。驚。小便不利。譫語。一身盡重。不可轉側。柴胡加龍骨牡蠣湯主之。107

83.大柴胡湯

柴胡_{八兩} 黃芩_{三兩} 芍藥_{三兩} 半夏_{半升洗} 生薑_{五兩切} 枳實_{四枚炙} 大棗_{十二枚擘} 大黃_{二兩}

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。一方加大黃二兩。若不加恐不名大柴胡也。

太陽病。過經十餘日。反再三下之。後四五日。柴胡証仍在。先与小柴胡湯。嘔不止。心下急。其人鬱鬱微煩者。为未解。与大柴胡湯下之則愈。
103

傷寒十餘日。熱結在裏。復往來寒熱者。与大柴胡湯。但結胸。无大熱者。此为水結在胸脇。但頭微汗出。大陷胸湯主之。136

傷寒。發熱。汗出不解。心中痞堅。嘔吐。下利。大柴胡湯主之。165

病腹中滿痛者。此为實也。当下之。宜大柴胡湯。 **吳**

84.白虎湯

知母_{六兩} 石膏_{十六兩碎綿裹} 甘草_{二兩炙} 粳米_{六合}

右四味。以水一斗。煮米熟。湯成。去滓。溫服一升。日三服。臣億等謹按。前篇云。熱結在裏。表裏俱熱者。白虎湯主之。又云。其表不解。不可与白虎湯。此云脉浮滑。表有熱。裏有寒者。必表裏字差矣。又陽明一証云。脉浮遲。表熱裏寒。四逆湯主之。又少陰一証云。裏寒外熱。通脉四逆湯主之。以此表裏自差明矣。千金翼云白通湯。非也。

傷寒。脉浮滑。此以表有熱。裏有寒。白虎湯主之。176

三陽合病。腹滿。身重。難以轉側。口不仁。面垢。譫語。遺尿。發汗則譫語甚。下之則額上生汗。手足厥冷。自汗。白虎湯主之。219

傷寒。脉滑而厥者。裏有熱也。白虎湯主之。350

85. 白虎加人參湯

知母_{六兩} 石膏_{十六兩}⁹ 碎綿裹 甘草_{二兩}炙 粳米_{六合} 人參_{三兩}

右五味。以水一斗。煮米熟。湯成。去滓。溫服一升。日三服。

服桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脈洪大者。白虎加人參湯主之。26

傷寒若吐若下後。七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升。白虎加人參湯主之。168

傷寒。無大熱。口燥渴。心煩。背微惡寒。白虎加人參湯主之。169

傷寒。脈浮。發熱。無汗。其表不解。不可與白虎湯。渴欲飲水。無表証者。白虎加人參湯主之。170

若渴欲飲水。口乾舌燥者。白虎加人參湯主之。222

太陽中熱者。暍是也。其人汗出。惡寒。身熱而渴。白虎加人參湯主之。

86. 白虎加桂枝湯

知母_{六兩} 甘草_{二兩}炙 石膏_{十六兩}碎綿裹 粳米_{六合} 桂枝_{三兩}去皮

右五味。咬咀以水一斗二升。煮米熟。去滓。煎取三升。溫服一升。日三服。汗出愈。

溫瘧者。其脈如平。身無寒。但熱。骨節疼痛。時嘔。白虎加桂枝湯主之。

87. 小承氣湯

大黃_{四兩} 厚朴_{二兩}炙去皮 枳實_{三枚}大者炙

右三味。以水四升。煮取一升二合。去滓。分溫二服。初服湯。當更衣。

⁹「十六兩」鄧本作「一斤」，編者改為「十六兩」，吳本作「一升」。

不爾者。盡飲之。若更衣者。勿服之。

傷寒。不大便六七日。頭痛。有熱者。与承气湯。其小便清者。此为不在裏。續在表也。当发其汗。頭痛者必衄。宜桂枝湯。56

陽明病。脉遲。雖汗出。不惡寒。其身必重。短气。腹滿而喘。有潮熱。如此者。其外为解。可攻其裏。若手足濇然汗出者。此大便已堅。大承气湯主之。若汗多。微發熱。惡寒者。为外未解。桂枝湯主之。其熱不潮。未可与承气湯。若腹大滿。而不大便者。可与小承气湯。微和其胃气。勿令至大下。208

陽明病。潮熱。大便微堅者。可与大承气湯。不堅者。不可与之。若不大便六七日。恐有燥屎。欲知之法。可少与小承气湯。若腹中轉失气者。此有燥屎也。乃可攻之。若不轉失气者。此但頭堅後澇。不可攻之。攻之必腹滿。不能食也。欲飲水者。与水即噦。其後發熱者。必大便復堅而少也。以小承气湯和之。若不轉失气者。慎不可攻之。209

陽明病。其人多汗。津液外出。胃中燥。大便必堅。堅則譫語。小承气湯主之。若一服譫語止。莫復服。213

陽明病。譫語。發潮熱。脉滑疾者。小承气湯主之。因与承气湯一升。腹中轉失气者。復与一升。若不轉失气者。勿更与之。明日又不大便。脉反微澇者。此为裏虛。为難治。不可復与承气湯。214

太陽病吐下發汗後。微煩。小便數。大便因堅。可与小承气湯。和之則愈。250

得病二三日。脉弱。无太陽柴胡証。煩躁。心下堅。至四日。雖能食。以小承气湯少与。微和之。令小安。至六日。与承气湯一升。若不大便六七日。小便少者。雖不大便。但頭堅後澇。未定成堅。攻之必澇。当須小便利。屎定堅。乃可攻之。宜大承气湯。251

下利。譫語者。有燥屎也。宜小承气湯。374

小承氣湯。治大便不通。噦。數譫語。

88. 厚朴三物湯

厚朴八兩炙 大黃四兩 枳實五枚炙

右藥咬咀。以水一斗二升。先煮二味。取五升。內大黃。煮取三升。去滓。溫服一升。腹中轉動更服。不動勿服。

腹滿。脈數。厚朴三物湯主之。

89. 厚朴七物湯

厚朴八兩炙 甘草三兩炙 大黃三兩 大棗十枚擘 枳實五枚炙 桂枝二兩去皮 生薑五兩切

右藥咬咀。以水一斗。煮取四升。去滓。溫服八合。日三服。嘔者加半夏五合。下利者去大黃。寒冷多者加生薑至八兩。

病腹滿。發熱十日。脈浮而數。飲食如故。厚朴七物湯主之。

90. 大承氣湯

大黃四兩酒洗 厚朴八兩炙去皮 枳實五枚炙 芒硝三合

右四味。以水一斗。先煮二物。取五升。去滓。內大黃。更煮取二升。去滓。內芒硝。更上微火一兩沸。分溫再服。得下。餘勿服。

陽明病。脈遲。雖汗出。不惡寒。其身必重。短氣。腹滿而喘。有潮熱。如此者。其外為解。可攻其裏。若手足濇然汗出者。此大便已堅。大承氣湯主之。若汗多。微發熱。惡寒者。為外未解。桂枝湯主之。其熱不潮。未可與承氣湯。若腹大滿。而不大便者。可與小承氣湯。微和其胃氣。勿令至大下。208

陽明病。潮熱。大便微堅者。可與大承氣湯。不堅者。不可與之。若不大便六七日。恐有燥屎。欲知之法。可少與小承氣湯。若腹中轉失氣者。此

有燥屎也。乃可攻之。若不轉失气者。此但頭堅後溏。不可攻之。攻之必腹滿。不能食也。欲飲水者。与水即噦。其後發熱者。必大便復堅而少也。以小承气湯和之。若不轉失气者。慎不可攻之。209

傷寒。吐下後未解。不大便五六日。至十餘日。其人日晡所發潮熱。不惡寒。獨語。如見鬼神之狀。若劇者。發則不識人。順衣妄撮。怵惕不安。微喘。直視。脉弦者生。濇者死。若微者。但發熱。譫語。大承气湯主之。若一服利。止後服。212

陽明病。譫語。有潮熱。反不能食者。胃中必有燥屎五六枚。若能食者。但堅耳。大承气湯主之。215

汗出。譫語者。以有燥屎在胃中。此風也。須下者。過經乃可下之。下之若早。語言必亂。以表虛裏實故也。下之則愈。宜大承气湯。217

二陽并病。太陽証罷。但發潮熱。手足絜絜汗出。大便難。而譫語者。下之則愈。宜大承气湯。220

陽明病。下之。心中懊憹而煩。胃中有燥屎者。可攻。其人腹微滿。頭堅後溏者。不可攻之。若有燥屎者。宜大承气湯。238

病者煩熱。汗出即解。復如瘧狀。日晡所發者。屬陽明。脉實者。當下之。脉浮虛者。當發其汗。下之宜大承气湯。發汗宜桂枝湯。240

大下後。六七日不大便。煩不解。腹滿痛者。此有燥屎。所以然者。本有宿食故也。宜大承气湯。241

病者小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。怵憚不能卧者。有燥屎故也。宜大承气湯。242

得病二三日。脉弱。无太陽柴胡証。煩躁。心下堅。至四日。雖能食。以小承气湯少與。微和之。令小安。至六日。與承气湯一升。若不大便六七日。小便少者。雖不大便。但頭堅後溏。未定成堅。攻之必溏。當須小便

利。屎定堅。乃可攻之。宜大承氣湯。251

傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏証。大便難。身微熱者。此為實也。急下之。宜大承氣湯。252

陽明病。發熱。汗多者。急下之。宜大承氣湯。253

發汗不解。腹滿痛者。急下之。宜大承氣湯。254

腹滿不減。減不足言。當下之。宜大承氣湯。255

脈滑而數者。有宿食也。當下之。宜大承氣湯。256

少陰病。得之二三日。口燥。咽乾者。急下之。宜大承氣湯。320

少陰病。下利清水。色青者。心下必痛。口乾燥者。急下之。宜大承氣湯。
321

少陰病六七日。腹滿。不大便者。急下之。宜大承氣湯。322

下利。三部脈皆平。按之心下堅者。急下之。宜大承氣湯。

下利。脈遲而滑者。內實也。利未欲止。當下之。宜大承氣湯。

問曰。人病有宿食。何以別之。

師曰。寸口脈浮大。按之反澀。尺中亦微而澀。故知有宿食。當下之。宜大承氣湯。

下利。不欲食者。有宿食也。當下之。宜大承氣湯。

下利已差。至其時復發者。此為病不盡。當復下之。宜大承氣湯。

下利。脈反滑者。當有所去。下乃愈。宜大承氣湯。

病腹中滿痛者。為實。當下之。宜大承氣湯。

脈雙弦而遲。心下堅。脈大而緊者。陽中有陰也。可下之。宜大承氣湯。

剛瘕為病。胸滿。口噤。卧不著席。腳攣急。其人必齮齒。可與大承氣湯。

產婦鬱冒。其脈微弱。不能食。大便反堅。但頭汗出。所以然者。血虛而厥。厥而必冒。冒家欲解。必大汗出。以血虛下厥。孤陽上出。故但頭汗出。所以產婦喜汗出者。亡陰血虛。陽氣獨盛。故當汗出。陰陽乃復。所以便堅者。嘔。不能食也。小柴胡湯主之。病解。能食。七八日。更發熱者。此為胃熱氣實。大承氣湯主之。

婦人產後七八日。無太陽証。少腹堅痛。此惡露不盡。不大便四五日。跌陽脈微實。再倍其人發熱。日晡所煩躁者。不食。食即譫語。利之即愈。宜大承氣湯。熱在裏。結在膀胱也。

91. 大黃黃連瀉心湯¹⁰

大黃^{二兩} 黃連^{一兩}

右二味。以麻沸湯漬之。須臾。絞去滓。分溫再服。臣億等看詳。大黃黃連瀉心湯。諸本皆二味。又後附子瀉心湯用大黃黃連黃芩附子。恐是前方中亦有黃芩。後但加附子也。故後云附子瀉心湯。本云加附子是也。

心下痞。按之濡。其脈關上浮者。大黃黃連瀉心湯主之。154

本以下之。故心下痞。與瀉心湯。痞不解。其人渴而口燥煩。小便不利。五苓散主之。156

傷寒。大下後。復發汗。心下痞。惡寒者。表未解也。不可攻痞。當先解

¹⁰唐弘宇按：「大黃黃連瀉心湯」與「瀉心湯」，可能是一方的不同名稱，也可能是兩個不同方劑。我採取保守處理，即把他們看作兩個方劑：大黃黃連瀉心湯，無黃芩，麻沸湯漬服，瀉熱力量較弱，主治心下熱痞証；瀉心湯，有黃芩，水煎服，瀉熱力量較強，主治血熱妄行吐衄。第156條、第164條、「婦人吐涎沫」條，雖云「瀉心湯」，但其主治是「心下痞」，可知此三條中的「瀉心湯」是大黃黃連瀉心湯的簡稱，故將其歸在大黃黃連瀉心湯下。

表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。164

婦人吐涎沫。醫反下之。心下即痞。當先治其吐涎沫。宜小青龙湯。涎沫止。乃治痞。宜瀉心湯。

92.瀉心湯

大黃二兩 黃連一兩 黃芩一兩

右三味。㕮咀。以水三升。煮取一升。頓服。亦治霍亂。傷寒論以麻沸湯漬服之。見千金。

治心氣不足。吐血。衄血。瀉心湯。

93.附子瀉心湯

大黃二兩 黃連一兩 黃芩一兩 附子一枚炮去皮破別煮取汁

右四味。切三味。以麻沸湯二升漬之。須臾。絞去滓。內附子汁。分溫再服。

心下痞。而復惡寒。汗出者。附子瀉心湯主之。155

94.大黃附子湯

大黃三兩 附子三枚炮去皮破 細辛二兩

右三味。㕮咀。以水五升。煮取二升。去滓。分溫三服。若強人煮取二升半。分三服。服後如人行四五里。進一服。

脇下偏痛。發熱。其脈緊弦。此寒也。以溫藥下之。宜大黃附子湯。

95.大黃甘草湯

大黃_{四兩} 甘草_{一兩炙}

右二味。咬咀。以水三升。煮取一升。去滓。分溫再服。

食已即吐者。大黃甘草湯主之。

96.調胃承氣湯

大黃_{四兩去皮清酒洗} 甘草_{二兩炙} 芒硝_{半升}

右三味。以水三升。煮取一升。去滓。內芒硝。更上火微煮令沸。少少溫服之。

傷寒。脈浮。自汗出。小便數。心煩。微惡寒。腳攣急。反與桂枝湯。欲攻其表。得之便厥。咽乾。煩躁。吐逆者。當作甘草乾薑湯。以復其陽。若厥愈。足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其腳即伸。若胃氣不和。譫語者。少與調胃承氣湯。若重發汗。復加燒針者。四逆湯主之。29

發汗不解。反惡寒者。虛故也。芍藥甘草附子湯主之。不惡寒。但熱者。實也。當和胃氣。宜調胃承氣湯。68.70

太陽病未解。脈陰陽俱微。必先振汗出而解。但陽脈微者。先汗之而解。但陰脈微者。先下之而解。汗之宜桂枝湯。下之宜調胃承氣湯。94

傷寒十三日。過經。譫語者。內有熱也。當以湯下之。小便利者。大便秘堅。而反下利。脈調和者。知醫以丸藥下之。非其治也。自利者。脈當微厥。今反和者。此為內實也。調胃承氣湯主之。105

太陽病。過經十餘日。心下溫溫欲吐。而胸中痛。大便反澹。腹微滿。鬱鬱微煩。先此時自極吐下者。與調胃承氣湯。若不爾者。不可與。但欲嘔。胸中痛。微澹者。此非柴胡湯証。以嘔。故知極吐下也。123

陽明病。不吐不下。心煩者。可與調胃承氣湯。207

太陽病三日。发汗不解。蒸蒸发熱者。屬胃也。調胃承气湯主之。248

傷寒吐後。腹脹滿者。与調胃承气湯。249

97.橘皮大黃朴消湯

橘皮一兩 朴硝一兩 大黃二兩

右三味。切。以水一大升。煮至小升。去滓。頓服即消。

98.桃仁承气湯

桃仁五十枚去皮尖 大黃四兩 桂枝二兩去皮 甘草二兩炙 芒硝二兩

右五味。以水七升。煮取二升半。去滓。內芒硝。更上火。微沸下火。先食溫服五合。日三服。當微利。

太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下之即愈。其外不解者。尚未可攻。當先解其外。宜桂枝湯。外解已。但少腹急結者。乃可攻之。宜桃仁承气湯。106

99.大黃牡丹湯

大黃四兩 牡丹一兩 桃仁五十枚去皮尖 瓜子半升 芒硝三合

右五味。㕮咀。以水六升。煮取一升。去滓。內芒硝。再煎一沸。頓服之。有膿當下。如无。當下血。

腸癰者。少腹腫痞。按之即痛如淋。小便自調。時時發熱。自汗出。復惡寒。脈遲緊者。膿未成。可下之。當有血。脈洪數者。膿已成。不可下也。大黃牡丹湯主之。

100. 大黃甘遂湯

大黃_{四兩} 甘遂_{二兩} 阿膠_{二兩}

右三味。㕮咀。以水三升。煮取一升。去滓。頓服。其血當下。

婦人少腹滿如敦狀。小便微難而不渴。生後者。此為水與血并結在血室也。大黃甘遂湯主之。

101. 下瘀血湯

大黃_{二兩} 桃仁_{三十枚去皮} 蟅蟲_{二十枚熬去足}

右三味。末之。煉蜜和為四丸。以酒一升。煎一丸。取八合。頓服之。新血利下如豚肝。

師曰。產婦腹痛。法當與枳實芍藥散。假令不愈者。此為腹中有乾血著臍下。與下瘀血湯服之。亦主經水不利若瘀血。

102. 抵當湯

水蛭_{三十個熬} 蟅蟲_{三十個去翅足熬} 桃仁_{二十個去皮尖} 大黃_{三兩酒洗}

右四味。以水五升。煮取三升。去滓。溫服一升。不下更服。趙

水蛭_{三十枚熬} 蟅蟲_{三十枚去足翅熬} 桃仁_{二七枚去皮尖熬} 大黃_{三兩}

右四味。㕮咀。以水五升。煮取三升。去滓。溫服一升。當血下。不下再服。

亦治男子膀胱滿急。有瘀血者。吳

水蛭_{三十個熬} 蟅蟲_{三十枚熬去翅足} 桃仁_{廿個去皮尖} 大黃_{三兩酒浸}

右四味。為末。以水五升。煮取三升。去滓。溫服一升。鄧

太陽病六七日。表証仍在。脈微而沈。反不結胸。其人發狂。此熱在下焦。少腹當堅滿。小便自利者。下血乃愈。所以然者。以太陽隨經。瘀熱在裏

故也。抵当湯主之。124

太陽病。身黃。脉沈結。少腹堅。小便不利者。为无血也。小便自利。其人如狂者。血証諦也。抵当湯主之。125

陽明証。其人喜忘者。必有畜血。所以然者。本有久瘀血。故令喜忘。屎雖堅。大便反易。其色必黑。抵当湯主之。237

病人无表裏証。發熱七八日。雖脉浮數。可下之。宜大柴胡湯。假令下已。脉數不解。合熱則消穀善飢。至六七日。不大便者。有瘀血。宜抵当湯。若脉數不解。而下不止。必挾熱。便膿血。257.258

婦人經水不利。抵当湯主之。

103. 抵当丸

水蛭二十个熬 蠭虫二十个去翅足熬 桃仁二十五个去皮尖 大黃三兩

右四味。搗。分四丸。以水一升。煮一丸。取七合服之。晬时当下血。若不下者更服。

傷寒。有熱。少腹滿。應小便不利。今反利者。为有血也。当下之。宜抵当丸。126

104. 土瓜根散

土瓜根三分 芍藥三分 桂枝三分去皮 廔虫三分熬

右四味。杵为散。酒服方寸匕。日三服。陰 顛腫亦主之。

婦人帶下。經水不利。少腹滿痛。經一月再見者。土瓜根散主之。

105. 甘草湯甘草_{二兩}

右一味。以水三升。煮取一升半。去滓。溫服七合。日再服。

少陰病二三日。咽痛者。可與甘草湯。不差者。與桔梗湯。311

106. 桔梗湯桔梗_{一兩} 甘草_{二兩}

右二味。以水三升。煮取一升。去滓。分溫再服。

桔梗_{一兩} 甘草_{二兩}_炙

右二味。咬咀。以水三升。煮取一升。去滓。分溫再服。則吐膿也。亦治喉痹。

吳

少陰病二三日。咽痛者。可與甘草湯。不差者。與桔梗湯。311

欬而胸滿。振寒。脈數。咽乾。不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。為肺癰。桔梗湯主之。

107. 排膿湯甘草_{二兩}_炙 桔梗_{三兩} 生薑_{一兩}_切 大棗_{十枚}_擘

右四味。咬咀。以水三升。煮取一升。去滓。溫服五合。日再服。

108. 芍藥甘草湯芍藥_{四兩} 甘草_{四兩}_炙

右二味。以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

傷寒。脈浮。自汗出。小便數。心煩。微惡寒。腳攣急。反與桂枝湯。欲攻

其表。得之便厥。咽乾。煩躁。吐逆者。当作甘草乾薑湯。以復其陽。若厥愈。足溫者。更作芍藥甘草湯与之。其腳即伸。若胃氣不和。譫語者。少与調胃承氣湯。若重发汗。復加燒針者。四逆湯主之。29

109. 芍藥甘草附子湯

芍藥_{三兩} 甘草_{三兩炙} 附子_{一枚炮去皮破八片}

右三味。以水五升。煮取一升五合。去滓。分溫三服。疑非仲景方。

发汗不解。反惡寒者。虛故也。芍藥甘草附子湯主之。不惡寒。但熱者。實也。当和胃氣。宜調胃承氣湯。68.70

110. 甘遂半夏湯

甘遂_{大者三枚} 半夏_{十二枚洗以水一升煮取半升去滓} 芍藥_{五枚} 甘草_{如指大一枚炙一本无}

右四味。咬咀。以水二升。煮取半升。去滓。以蜜半升。和藥汁。煮取八合。頓服之。

病者脉伏。其人欲自利。利反快。雖利。心下續堅滿。此为留飲欲去故也。甘遂半夏湯主之。

111. 甘草小麥大棗湯

甘草_{三兩炙} 小麥_{一升} 大棗_{十枚擘}

右三味。咬咀。以水六升。煮取三升。去滓。分溫三服。亦補脾氣。

婦人臟躁。喜悲傷。欲哭。象如神靈所作。數欠伸。甘草小麥大棗湯主之。

112. 甘草粉蜜湯

甘草_{二兩炙} 粉_{一兩} 蜜_{四兩}

右三味。咬咀。以水三升。先煮甘草。取二升。去滓。內粉。蜜。攪令和。

煎如薄粥。溫服一升。差即止。

蛔蟲之為病。令人吐涎。心痛。發作有時。毒藥不止。甘草粉蜜湯主之。

113. 生薑甘草湯

生薑五兩切 人參二兩 甘草四兩炙 大棗十五枚擘

右四味。咬咀。以水七升。煮取三升。去滓。分溫三服。

肺痿。欬唾涎沫不止。咽燥而渴。生薑甘草湯主之。

114. 甘草乾薑湯

甘草四兩炙 乾薑二兩

右二味。以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

甘草四兩炙 乾薑二兩

右二味。咬咀。以水四升。煮取一升半。去滓。分溫再服。服湯已。小溫覆之。若渴者。屬消渴。吳

傷寒。脈浮。自汗出。小便數。心煩。微惡寒。腳攣急。反與桂枝湯。欲攻其表。得之便厥。咽乾。煩躁。吐逆者。當作甘草乾薑湯。以復其陽。若厥愈。足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其腳即伸。若胃氣不和。譫語者。少與調胃承氣湯。若重發汗。復加燒針者。四逆湯主之。29

肺痿。吐涎沫。而不能欬者。其人不渴。必遺尿。小便數。所以然者。以上虛不能制下故也。此為肺中冷。必眩。甘草乾薑湯以溫其病。

115. 乾薑附子湯

乾薑一兩 附子一枚生用去皮切八片

右二味。以水三升。煮取一升。去滓。頓服。

下之後。復發汗。晝日煩躁不得眠。夜而安靜。不嘔。不渴。無表証。脉沈微。身無大熱。乾薑附子湯主之。61

116.四逆湯

甘草二兩炙 乾薑一兩半 附子一枚生用去皮破八片

右三味。㕮咀。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。

傷寒。脉浮。自汗出。小便數。心煩。微惡寒。腳攣急。反與桂枝湯。欲攻其表。得之便厥。咽乾。煩躁。吐衄者。當作甘草乾薑湯。以復其陽。若厥愈。足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其腳即伸。若胃氣不和。譫語者。少與調胃承氣湯。若重發汗。復加燒針者。四逆湯主之。29

傷寒。醫下之。續得下利。清穀不止。身體疼痛。急當救裏。後身體疼痛。清便自調。急當救表。救裏宜四逆湯。救表宜桂枝湯。91

病發熱。頭痛。脉反沈。若不差。身體疼痛。當救其裏。宜四逆湯。92

陽明病。脉浮而遲。表熱裏寒。下利清穀者。四逆湯主之。225

自利。不渴者。屬太陰。以其臟有寒故也。當溫之。宜四逆輩。277

少陰病。脉沈者。急溫之。宜四逆湯。323

少陰病。其人飲食入則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。始得之。手足寒。脉弦遲。此胸中實。不可下也。當吐之。若膈上有寒飲。乾嘔者。不可吐。當溫之。宜四逆湯。324

大汗出。熱不去。內拘急。四肢疼。又下利。厥逆而惡寒。四逆湯主之。353

大汗出若大下利。而厥冷者。四逆湯主之。354

下利。腹脹滿。身體疼痛者。先溫其裏。乃攻其表。溫裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。372

嘔而脉弱。小便復利。身有微熱。見厥者。難治。四逆湯主之。377

吐利。汗出。發熱。惡寒。四肢拘急。手足厥冷。四逆湯主之。388

既吐且利。小便復利。而大汗出。下利清穀。裏寒外熱。脉微欲絕。四逆湯主之。388

117. 通脉四逆湯*

甘草二兩炙 附子大者一枚生用去皮破八片 乾薑三兩強人可四兩

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。其脉即出者愈。

若面赤者。加蔥白九莖。

若腹痛者。加芍藥二兩。

若嘔者。加生薑二兩。

若咽痛者。加桔梗一兩。

若利止而脉不出者。加人參二兩。

病皆与方相應者乃服之。¹¹

少陰病。下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脉微欲絕。身反不惡寒。其人面赤。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止而脉不出。通脉四逆湯主之。317

下利清穀。裏寒外熱。汗出而厥。通脉四逆湯主之。370

118. 四逆加人參湯

甘草二兩炙 附子一枚生去皮破八片 乾薑一兩半 人參一兩

右四味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。

¹¹「加芍藥」《玉函》同，其餘諸本均作「去蔥加芍藥」。「加桔梗」前諸本均有「去芍藥」三字，編者刪。「加人參」前諸本均有「去桔梗」三字，編者刪。「病皆」至「服之」十字，《玉函》、成本无。

惡寒。脉微。而復利。利止。亡血也。四逆加人參湯主之。385

119. 茯苓四逆湯

茯苓_{四兩} 人參_{一兩} 附子_{一枚生用去皮破八片} 甘草_{二兩炙} 乾薑_{一兩半}
右五味。以水五升。煮取三升。去滓。溫服七合。日二服。

發汗若下之。病仍不解。煩躁。茯苓四逆湯主之。69

120. 通脉四逆加豬膽汁湯

甘草_{二兩炙} 乾薑_{三兩強人可四兩} 附子_{大者一枚生去皮破八片} 豬膽汁_{半合}
右四味。以水三升。煮取一升二合。去滓。內豬膽汁。分溫再服。其脉即來。无豬膽。以羊膽代之。

吐利已斷。汗出而厥。四肢拘急不解。脉微欲絕。通脉四逆加豬膽汁湯主之。390

121. 白通湯

蔥白_{四莖} 乾薑_{一兩} 附子_{一枚生去皮破八片}
右三味。以水三升。煮取一升。去滓。分溫再服。

少陰病。下利。白通湯主之。314

少陰病。下利。脉微。服白通湯。利不止。厥逆。无脉。乾嘔。煩者。白通加豬膽汁湯主之。服湯脉暴出者死。微微續出者生。315

122. 白通加豬膽汁湯

蔥白_{四莖} 乾薑_{一兩} 附子_{一枚生去皮破八片} 人尿_{五合} 豬膽汁_{一合}
右五味。以水三升。煮取一升。去滓。內膽汁。人尿。和令相得。分溫再

服。若无膽亦可用。

少陰病。下利。脉微。服白通湯。利不止。厥逆。无脉。乾嘔。煩者。白通加豬膽汁湯主之。服湯脉暴出者死。微微續出者生。315

123. 玄武湯*

茯苓_{三兩} 芍藥_{三兩} 生薑_{三兩} 白朮_{二兩} 附子_{一枚}。炮。去皮。破八片
右五味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服七合。日三服。

若欬者。加五味子半升。細辛一兩。乾薑一兩。

若小便自利者。去茯苓。

若不利者。去芍藥。加乾薑二兩。

若嘔者。去附子。加生薑至八兩。

太陽病。發汗。汗出不解。其人仍發熱。心下悸。頭眩。身瞤動。振振欲蹶地。玄武湯主之。82

少陰病。二三日不已。至四五日。腹痛。小便不利。四肢沈重疼痛而利。此為有水氣。其人或欬。或小便自利。或下利。或嘔。玄武湯主之。316

124. 附子湯

附子_{二枚}炮去皮破八片 茯苓_{三兩} 人參_{二兩} 白朮_{四兩} 芍藥_{三兩}
右五味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

少陰病。得之一二日。口中和。其背惡寒者。當灸之。附子湯主之。304

少陰病。身體痛。手足寒。骨節痛。脉沈者。附子湯主之。305

婦人懷娠六七月。脉弦。發熱。其胎愈脹。腹痛。惡寒者。少腹如扇之狀。所以然者。子臟開故也。當以附子湯溫其臟。方未見。

125. 附子粳米湯

附子一枚炮去皮破八片 半夏半升洗 甘草一兩炙 大棗十枚擘 粳米半升

右五味。咬咀。以水八升。煮米熟。湯成去滓。溫服一升。日三服。

腹中寒氣。雷鳴。切痛。胸脇逆滿。嘔吐。附子粳米湯主之。

126. 赤丸

茯苓四兩 半夏四兩洗一方用桂 細辛一兩千金作人參 烏頭二兩炮去皮 附子二兩炮去皮 射罔一枚如棗大

右六味。末之。內真朱為色。煉蜜和丸。如麻子大。先食酒飲服一丸。日再夜一服。不知。二丸為度。

寒氣厥逆。赤丸主之。

127. 大烏頭煎

烏頭十五枚熬黑不咬咀

右一味。以水三升。煮取一升。去滓。內蜜二升。煎。令水氣盡。取二升。強人服七合。弱人服五合。不差。明日更服。慎不可一日再服。

寸口脈弦而緊。弦則衛氣不行。衛氣不行即惡寒。緊則不欲食。弦緊相搏。即為寒疝。寒疝繞臍痛。若發則白汗出。手足厥寒。其脈沈弦者。大烏頭煎主之。

128. 烏頭湯

烏頭五枚咬咀以蜜二升煎取一升即取烏頭 甘草炙 麻黃三兩去節 芍藥三兩 黃耆三兩

右五味。咬咀四味。以水三升。煮取一升。去滓。內蜜煎中。更煎之。服七合。不知。盡服之。¹²

¹²本方吳本甘草麻黃無劑量，鄧本甘草無劑量。

病歷節。疼痛。不可屈伸。烏頭湯主之。

烏頭湯。治腳氣。疼痛。不可屈伸。

烏頭湯。治寒疝。腹中絞痛。賊風入腹。攻五臟。拘急不得轉側。叫呼。发作有时。使人陰縮。手足厥逆。

129. 薏苡仁附子散

薏苡仁_{十五兩} 大附子_{十枚炮}

右二味。杵为散。服方寸匕。日三服。

胸痹緩急者。薏苡仁附子散主之。

130. 薏苡仁附子敗醬散

薏苡仁_{十分} 附子_{二分炮去皮} 敗醬_{五分}

右三味。杵为末。取方寸匕。以水二升。煎取一升。頓服之。小便当下。

腸癰之为病。其身甲錯。腹皮急。按之濡。如腫狀。腹无積聚。身无熱。脉數。此为腸内有癰膿。薏苡仁附子敗醬散主之。

131. 天雄散

天雄_{三兩炮去皮} 白朮_{八兩} 桂枝_{六兩} 龙骨_{三兩}

右四味。杵为散。酒服半錢匕。不知。稍增之。

夫失精家。少腹弦急。陰頭寒。目眩。髮落。脉極虛芤遲。为清穀。亡血。失精。脉得諸芤動微緊。男子失精。女子夢交。桂枝加龙骨牡蛎湯主之。天雄散亦主之。

132. 蜀漆散

蜀漆洗去腥 雲母燒之三日三夜 龙骨等分

右三味。杵为散。未发前以漿水服半錢。温瘧加蜀漆半分。臨发时服一錢匕。一方雲母作雲石。

瘧。多寒者。名曰牡瘧。蜀漆散主之。

133. 梔子豉湯

梔子十四个擘 香豉四合綿裹

右二味。以水四升。先煮梔子。得二升半。内豉。煮取一升半。去滓。分为二服。温進一服。得吐者。止後服。

发汗吐下後。虛煩。不得眠。若劇者。反覆顛倒。心中懊憹。梔子豉湯主之。若少气者。梔子甘草豉湯主之。若嘔者。梔子生薑豉湯主之。76

发汗若下之。煩熱。胸中窒者。梔子豉湯主之。77

傷寒五六日。大下之後。身熱不去。心中結痛者。未欲解也。梔子豉湯主之。78

凡用梔子湯。其人微溏者。不可与服之。81

陽明病。脉浮緊。咽乾。口苦。腹滿而喘。发熱。汗出。不惡寒。反惡熱。身重。若发汗則躁。心憤憤。反譫語。若加温針。必怵惕。煩躁。不得眠。若下之。則胃中空虛。客气動膈。心中懊憹。舌上胎者。梔子豉湯主之。221

陽明病。下之。其外有熱。手足温。不結胸。心中懊憹。飢不能食。但頭汗出。梔子豉湯主之。228

下利後更煩。按之心下濡者。为虛煩也。梔子豉湯主之。375

134. 梔子甘草豉湯

梔子^{十四個擘} 甘草^{二兩炙} 香豉^{四合綿裹}

右三味。以水四升。先煮梔子甘草。取二升半。內豉。煮取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得吐者。止後服。

發汗吐下後。虛煩。不得眠。若劇者。反覆顛倒。心中懊憹。梔子豉湯主之。若少氣者。梔子甘草豉湯主之。若嘔者。梔子生薑豉湯主之。76

135. 梔子生薑豉湯

梔子^{十四個擘} 生薑^{五兩} 香豉^{四合綿裹}

右三味。以水四升。先煮梔子生薑。取二升半。內豉。煮取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得吐者。止後服。

發汗吐下後。虛煩。不得眠。若劇者。反覆顛倒。心中懊憹。梔子豉湯主之。若少氣者。梔子甘草豉湯主之。若嘔者。梔子生薑豉湯主之。76

136. 枳實梔子湯

枳實^{三枚炙} 梔子^{十四個擘} 豉^{一升綿裹}

右三味。以清漿水七升。空煮取四升。內枳實梔子。煮取二升。下豉。更煮五六沸。去滓。溫分再服。覆令微似汗。若有宿食者。內大黃如博碁子五六枚。服之愈。

大病差後勞復者。枳實梔子湯主之。393

137. 梔子枳實豉大黃湯

梔子^{十四枚擘} 枳實^{五枚炙} 豉^{一升綿裹} 大黃^{一兩}

右四味。咬咀。以水六升。煮取二升。去滓。分溫三服。

酒黄疸。心中懊憹。或熱痛。梔子枳實豉大黃湯主之。

138. 大黃黃蘗梔子硝石湯

大黃_{四兩} 黃蘗_{四兩} 梔子_{十五枚擘} 硝石_{四兩}

右四味。㕮咀。以水六升。煮取二升。去滓。內硝。更煮取一升。頓服。

黄疸。腹滿。小便不利而赤。自汗出。此為表和裏實。當下之。宜大黃黃蘗梔子硝石湯。

139. 茵陳蒿湯

茵陳蒿_{六兩} 梔子_{十四枚擘} 大黃_{二兩去皮}

右三味。以水一斗二升。先煮茵陳。減六升。內二味。煮取三升。去滓。分三服。小便當利。尿如皂莢汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

陽明病。發熱。汗出者。此為熱越。不能發黃也。但頭汗出。身無汗。齊頸而還。小便不利。渴引水漿者。此為瘀熱在裏。身必發黃。茵陳蒿湯主之。236

傷寒七八日。身黃如橘。小便不利。腹微滿者。茵陳蒿湯主之。260

穀疸之為病。寒熱不食。食即頭眩。心胸不安。久久發黃。為穀疸。茵陳蒿湯主之。

140. 梔子蘗皮湯

肥梔子_{十五個擘} 甘草_{一兩炙} 黃蘗_{二兩}

右三味。以水四升。煮取一升半。去滓。分溫再服。

傷寒。身黃。發熱。梔子蘗皮湯主之。261

141. 梔子厚朴湯

梔子^{十四个擘} 厚朴^{四兩炙去皮} 枳實^{四枚水浸炙令黃}

右三味。以水三升半。煮取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得吐者。止後服。

傷寒下後。煩而腹滿。卧起不安。梔子厚朴湯主之。79

142. 梔子乾薑湯

梔子^{十四个擘} 乾薑^{二兩}

右二味。以水三升半。煮取一升半。去滓。分二服。一服得吐者。止後服。

傷寒。醫以丸藥大下之。身熱不去。微煩。梔子乾薑湯主之。80

143. 酸棗仁湯

酸棗仁^{二升} 甘草^{一兩炙} 知母^{二兩} 茯苓^{二兩} 芎藭^{二兩}

右五味。咬咀。以水八升。煮酸棗仁。得六升。內諸藥。煮取三升。去滓。分溫三服。深師有生薑二兩。

虛勞。虛煩。不得眠。酸棗仁湯主之。

144. 大陷胸湯

大黃^{六兩去皮酒洗} 芒硝^{一升} 甘遂末^{一錢匕}

右三味。以水六升。煮大黃。取二升。去滓。內芒硝。煮兩沸。內甘遂末。溫服一升。得快利。止後服。

太陽病。脈浮而動數。浮則為風。數則為熱。動則為痛。數則為虛。頭痛。發熱。微盜汗出。而反惡寒。其表未解。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客氣動膈。短氣。躁煩。心中懊憹。陽氣內陷。心下因堅。則

为結胸。大陷胸湯主之。若不結胸。但頭汗出。餘处无汗。齐頸而還。小便不利。身必发黄。134

傷寒六七日。結胸熱實。脉沈緊。心下痛。按之如石堅。大陷胸湯主之。135

傷寒十餘日。熱結在裏。復往來寒熱者。与大柴胡湯。但結胸。无大熱者。此为水結在胸脇。但頭微汗出。大陷胸湯主之。136

太陽病。重发汗而復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。從心下至少腹堅滿而痛不可近。大陷胸湯主之。137

傷寒五六日。嘔而发熱。柴胡湯証具。而以他藥下之。柴胡証仍在者。復与柴胡湯。此雖已下之。不为逆。必蒸蒸而振。卻发熱汗出而解。若心下滿而堅痛者。此为結胸。宜大陷胸湯。若但滿而不痛者。此为痞。柴胡湯不復中与也。宜半夏瀉心湯。149

145. 大陷胸丸

大黃_{八兩} 葶藶子_{半升熬} 芒硝_{半升} 杏仁_{半升去皮尖熬黑}

右四味。擣篩二味。内杏仁芒硝。合研如脂。和散。取如彈丸一枚。別擣甘遂末一錢匕。白蜜二合。水二升。煮取一升。温頓服之。一宿乃下。如不下。更服。取下为效。禁如藥法。

結胸者。項亦强。如柔痙狀。下之則和。宜大陷胸丸。131

146. 小陷胸湯

黃連_{一兩} 半夏_{半升洗} 栝蒌實_{大者一枚}

右三味。以水六升。先煮栝蒌。取三升。去滓。内諸藥。煮取二升。去滓。分温三服。

小結胸者。正在心下。按之則痛。其脉浮滑。小陷胸湯主之。138

147. 枳實薤白桂枝湯

枳實四枚炙 厚朴四兩炙 薤白八兩切 桂枝一兩去皮 栝蒌實一枚搗

右五味。㕮咀。以水五升。先煮枳實。厚朴。取二升。去滓。內諸藥。煮三沸。去滓。分溫三服。

胸痹。心中痞。留氣結在胸。胸滿。脇下逆搶心。枳實薤白桂枝湯主之。理中湯亦主之。

148. 栝蒌薤白白酒湯

栝蒌實一枚搗 薤白半升切 白酒七升

右三味。同煮。取二升。去滓。分溫再服。

胸痹之病。喘息欬唾。胸背痛。短氣。寸口脉沈而遲。關上小緊數。栝蒌薤白白酒湯主之。

149. 栝蒌薤白半夏湯

栝蒌實一枚搗 薤白三兩切 半夏半升洗切 白酒一斗

右四味。同煮。取四升。去滓。溫服一升。日三服。

胸痹。不得卧。心痛徹背者。栝蒌薤白半夏湯主之。

150. 瓜蒂散

瓜蒂一分熬黃 赤小豆一分

右二味。各別搗篩。為散已。合治之。取一錢匕。以香豉一合。用熱湯七合。煮作稀糜。去滓。取汁和散。溫頓服之。不吐者。少少加。得快吐乃止。

病如桂枝証。頭不痛。項不强。寸口脉微浮。胸中痞堅。气上衝咽喉。不得息。此为胸有寒。当吐之。宜瓜蒂散。166

病者手足厥冷。脉乍緊。邪結在胸中。心下滿而煩。飢不能食。病在胸中。当吐之。宜瓜蒂散。355

宿食在上脘。当吐之。宜瓜蒂散。

151. 小半夏湯

半夏一升洗 生薑八兩

右二味。切。以水七升。煮取一升半。去滓。分温再服。

嘔家本渴。渴者为欲解。今反不渴。心下有支飲故也。小半夏湯主之。

黄疸病。小便色不變。欲自利。腹滿而喘。不可除熱。熱除必噦。噦者。小半夏湯主之。

諸嘔吐。穀不得下者。小半夏湯主之。

152. 小半夏加茯苓湯

半夏一升洗 生薑八兩 茯苓三兩一方四兩

右三味。切。以水七升。煮取一升五合。去滓。分温再服。

卒嘔吐。心下痞。膈間有水。眩悸者。小半夏加茯苓湯主之。

先渴卻嘔。为水停心下。此屬飲家。小半夏加茯苓湯主之。

153. 大半夏湯

半夏三升洗完用 人參三兩切 白蜜一升

右三味。以泉水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮藥。取二升半。去滓。温

服一升。餘分再服。

胃反。嘔吐者。大半夏湯主之。

154. 生薑半夏湯

生薑汁一升 半夏半升洗切

右二味。以水三升。煮半夏。取二升。內生薑汁。煮取一升半。去滓。小冷。分四服。日三夜一服。若一服止。停後服。

病人胸中似喘不喘。似嘔不嘔。似噦不噦。徹心中憤憤然无奈者。生薑半夏湯主之。

155. 苦酒湯

半夏洗破如棗核十四枚 雞子一枚去黃內上苦酒著雞子殼中

右二味。內半夏著苦酒中。以雞子殼置刀環中。安火上。令三沸。去滓。少少含嚥之。不差。更作三劑。

少陰病。咽中傷。生瘡。不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。312

156. 半夏厚朴湯

半夏一升洗 厚朴三兩炙 茯苓四兩 生薑五兩切 乾蘇葉二兩

右五味。㕮咀。以水七升。煮取四升。去滓。分溫四服。日三夜一服。一作治胸滿。心下堅。咽中怗怗。如有炙肉。吐之不出。吞之不下。

婦人咽中如有炙臠。半夏厚朴湯主之。

157.半夏乾薑散

半夏洗 乾薑各等分

右二味。杵为散。取方寸匕。漿水一升半。煎取七合。頓服之。

乾嘔。吐哕。吐涎沫。半夏乾薑散主之。

158.厚朴生薑半夏甘草人参湯

厚朴八兩炙去皮 生薑八兩切 半夏半升洗 甘草二兩 人参一兩

右五味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

发汗後。腹脹滿者。厚朴生薑半夏甘草人参湯主之。66

159.乾薑人参半夏丸

乾薑一兩 人参一兩 半夏半兩洗

右三味。末之。以生薑汁和为丸。如梧子大。飲服一丸。日三服。

婦人妊娠。嘔吐不止。乾薑人参半夏丸主之。

160.乾薑黄芩黄連人参湯

乾薑三兩 黄芩三兩 黄連三兩 人参三兩 右四味。以水六升。煮取二升。去滓。分溫再服。

傷寒。本自寒下。醫復吐下之。寒格。更逆吐下。食入即出。乾薑黄芩黄連人参湯主之。359

161. 黃連湯

黃連_{三兩} 甘草_{三兩炙} 乾薑_{三兩} 桂枝_{三兩} 人參_{二兩} 半夏_{半升洗} 大棗_{十二枚擘} 右七味。
以水一斗。煮取六升。去滓。分溫五服。晝三夜二。疑非仲景方。

傷寒。胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐。黃連湯主之。173

162. 半夏瀉心湯

半夏_{半升洗} 黃芩_{三兩} 乾薑_{三兩} 人參_{三兩} 甘草_{三兩炙} 黃連_{一兩} 大棗_{十二枚擘}
右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。

趙

半夏_{半升洗} 黃芩_{二兩} 人參_{二兩} 甘草_{二兩炙} 乾薑_{二兩} 黃連_{一兩} 大棗_{十二枚擘}
右七味。咬咀。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。**吳**

傷寒五六日。嘔而發熱。柴胡湯証具。而以他藥下之。柴胡証仍在者。復與柴胡湯。此雖已下之。不為逆。必蒸蒸而振。卻發熱汗出而解。若心下滿而堅痛者。此為結胸。宜大陷胸湯。若但滿而不痛者。此為痞。柴胡湯不復中與也。宜半夏瀉心湯。149

嘔而腸鳴。心下痞者。半夏瀉心湯主之。

163. 甘草瀉心湯

甘草_{四兩炙} 黃芩_{三兩} 人參_{三兩} 乾薑_{三兩} 黃連_{一兩} 大棗_{十二枚擘} 半夏_{半升洗}
右七味。咬咀。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎。溫服一升。日三服。臣

億等謹按。上生薑瀉心湯法。本云理中參黃芩湯。今詳瀉心以療痞。痞氣因發陰而生。是半夏生薑甘草瀉心三方皆本於理中也。其方必各有人參。今甘草瀉心湯中无者。脫落之也。又按。千金并外臺祕要。治傷寒蠱食用此方。皆

有人參。知脫落無疑。¹³

傷寒中風。醫反下之。其人下利。日數十行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞堅而滿。乾嘔。心煩。不能得安。醫見心下痞。謂病不盡。復下之。其痞益甚。此非結熱。但以胃中虛。客氣上逆。故使之堅。甘草瀉心湯主之。158

狐惑之為病。狀如傷寒。默默欲眠。目不得閉。卧起不安。蝕於喉為惑。蝕於陰為狐。不欲飲食。惡聞食臭。其面目乍赤乍黑乍白。蝕於上部則聲喝。甘草瀉心湯主之。蝕於下部則咽乾。苦參湯洗之。蝕於肛者。雄黃熏之。

164. 生薑瀉心湯

生薑四兩切 甘草三兩炙 人參三兩 乾薑一兩 黃芩三兩 半夏半升洗 黃連一兩 大棗十二枚擘

右八味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。附子瀉心湯。本云加附子。半夏瀉心湯。甘草瀉心湯。同體別名耳。生薑瀉心湯。本云理中人參黃芩湯。去桂枝朮。加黃連。并瀉肝法。

傷寒。汗出。解之後。胃中不和。心下痞堅。乾噎食臭。脇下有水氣。腹中雷鳴而利。生薑瀉心湯主之。157

165. 旋覆代赭湯

旋覆花三兩 人參二兩 生薑五兩 代赭一兩 甘草三兩炙 半夏半升洗 大棗十二枚擘

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。

¹³錢超塵「按：今考《千金要方》卷九甘草瀉心湯方，宋臣小註云「加人參三兩乃是」，又考《千金要方》卷十傷寒不發汗變成狐惑病第四亦載此方，今錄之如下：半夏半升 黃芩 人參 乾薑各三兩 黃連一兩 甘草三兩 大棗十二枚。又考《外臺祕要》卷二傷寒狐惑病方亦載此方，錄之如下：半夏半升 黃芩三兩 人參三兩 乾薑三兩 黃連一兩 甘草四兩炙 大棗十二枚擘。綜觀《千金要方》、《外臺祕要》所載之甘草瀉心湯方，確有人參三兩無疑，林億等所校是也。北宋校正醫書局所校之《傷寒論》每有極精闢處，此即其中之一例也。」

傷寒。發汗若吐若下。解後。心下痞堅。噫氣不除者。旋覆代赭湯主之。
161

166. 吳茱萸湯

吳茱萸一升洗 人參三兩 生薑六兩切 大棗十二枚擘

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服七合。日三服。**趙**¹⁴

食穀欲嘔者。屬陽明。吳茱萸湯主之。得湯反劇者。屬上焦。243

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。309

乾嘔。吐涎沫。頭痛者。吳茱萸湯主之。378

嘔而胸滿者。吳茱萸湯主之。

167. 大建中湯

蜀椒二合汗 乾薑四兩 人參二兩

右三味。㕮咀。以水四升。煮取二升。去滓。內膠飴一升。微火煎取一升半。分溫在服。如一炊頃。可飲粥二升後更服。當一日食糜。溫覆之。

心胸中大寒痛。嘔。不能飲食。腹中寒。上衝皮起。出見有頭足。上下痛而不可觸近。大建中湯主之。

168. 黃連阿膠湯

黃連四兩 黃芩二兩 芍藥二兩 雞子黃二枚 阿膠三兩一云三挺

右五味。以水六升。先煮三物。取二升。去滓。內膠。烱盡。小冷。內雞子黃。攪令相得。溫服七合。日三服。

¹⁴「以水七升」、「煮取二升」同趙本，吳本分別作「以水五升」、「煮取三升」。唐弘宇按：吳本誤。漢代十合為一升，若每服七合，則三服約等於二升。

少陰病。得之二三日以上。心中煩。不得卧。黃連阿膠湯主之。303

169. 黃芩湯

黃芩_{三兩} 芍藥_{二兩} 甘草_{二兩炙} 大棗_{十二枚擘}

右四味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日再夜一服。

太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。與黃芩加半夏生薑湯。

172

170. 黃芩加半夏生薑湯

黃芩_{三兩} 芍藥_{二兩} 甘草_{二兩炙} 大棗_{十二枚擘} 半夏_{半升洗} 生薑_{一兩半一方三兩切}

右六味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日再夜一服。

太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。與黃芩加半夏生薑湯。

172

乾嘔而利者。黃芩加半夏生薑湯主之。

171. 黃芩湯

黃芩_{三兩} 人參_{三兩} 乾薑_{三兩} 桂枝_{二兩去皮} 大棗_{十二枚擘} 半夏_{半升洗}

右六味。咬咀。以水七升。煮取三升。去滓。分溫三服。

乾嘔。下利。黃芩湯主之。玉函經云人參黃芩湯

172. 三物黃芩湯

黃芩_{一兩} 苦參_{二兩} 乾地黄_{四兩}

右藥咬咀。以水八升。煮取二升。去滓。溫服一升。多吐下虫。見千金。

婦人多在草蓐得風。四肢苦煩熱。皆自发露所为。頭痛者。与小柴胡湯。頭不痛。但煩者。与三物黃芩湯。

173. 白頭翁湯

白頭翁_{二兩} 黃蘗_{三兩} 黃連_{三兩} 秦皮_{三兩}

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服一升。不愈。更服一升。

熱利下重者。白頭翁湯主之。371

下利。欲飲水者。为有熱也。白頭翁湯主之。373

174. 白頭翁加甘草阿膠湯

白頭翁_{二兩} 黃連_{三兩} 蘗皮_{三兩} 秦皮_{三兩} 甘草_{二兩炙} 阿膠_{二兩}

右六味。㕮咀。以水七升。煮取二升半。去滓。內膠。令消盡。分溫三服。

婦人產後。下利。虛極。白頭翁加甘草阿膠湯主之。

175. 木防己湯

木防己_{三兩} 桂枝_{二兩去皮} 石膏_{如雞子大十二枚} 人參_{四兩}

右四味。㕮咀。以水六升。煮取二升。去滓。分溫再服。

膈間支飲。其人喘滿。心下痞堅。面色黎黑。其脉沈緊。得之數十日。醫吐下之不愈。木防己湯主之。虛者即愈。實者三日復發。復与不愈者。宜去石膏加茯苓芒硝湯。

176. 木防己去石膏加茯苓芒硝湯

木防己_{二兩} 桂枝_{二兩去皮} 人參_{四兩} 茯苓_{四兩} 芒硝_{三合}

右五味。㕮咀。以水六升。煮取二升。去滓。內芒硝。再微煎。分溫再服。

微利則愈。

膈間支飲。其人喘滿。心下痞堅。面色黎黑。其脉沈緊。得之數十日。醫吐下之不愈。木防己湯主之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜去石膏加茯苓芒硝湯。

177. 防己茯苓湯

防己五兩¹⁵ 黃耆三兩 桂枝三兩去皮 茯苓六兩 甘草二兩炙

右五味。㕮咀。以水六升。煮取二升。去滓。分溫再服。

皮水為病。四肢腫。水氣在皮膚中。四肢聶聶動者。防己茯苓湯主之。

178. 防己黃耆湯*

防己四兩 黃耆五兩 甘草二兩炙 白朮三兩 生薑二兩切 大棗十二枚擘

右六味。㕮咀。以水七升。煮取二升。去滓。分溫三服。喘者加麻黃。胃中不和者加芍藥。氣上衝者加桂。下有陳寒者加細辛。服後當如虫行皮中。從腰以上如冰。後坐被上。又以一被繞腰以溫下。令微汗。差。腰以上。

疑作腰以下。吳

風濕。脉浮。身重。汗出。惡風者。防己黃耆湯主之。

風水。脉浮。身重。汗出。惡風者。防己黃耆湯主之。腹痛者。加芍藥。

夫風水。脉浮為在表。其人或頭汗出。表無他病。病者但下重。故知從腰以上為和。腰以下當腫及陰。難以屈伸。防己黃耆湯主之。

¹⁵「五兩」同吳本，鄧本作「三兩」。

179. 枳实术湯

枳实_{七枚} 白术_{二兩}

右二味。㕮咀。以水五升。煮取三升。去滓。分温三服。腹中軟。即当散也。

心下堅。大如盤。邊如旋盤。水飲所作。枳实术湯主之。

180. 枳实芍藥散

枳实_{燒令黑勿令太過} 芍藥_{等分}

右二味。杵为散。服方寸匕。日三服。并主癰膿。以麥屑粥下之。

婦人產後。腹痛。煩滿。不得卧。枳实芍藥散主之。

師曰。產婦腹痛。法当与枳实芍藥散。假令不愈者。此为腹中有乾血著脐下。与下瘀血湯服之。亦主經水不利若瘀血。

181. 排膿散

枳实_{十六枚炙} 芍藥_{六分} 桔梗_{二分}

右三味。杵为散。取雞子黄一枚。取散与雞黄等揉合令相得。飲和服之。日一服。

182. 桂枝生薑枳实湯

桂枝_{三兩去皮} 枳实_{伍枚炙} 生薑_{三兩切}

右三味。㕮咀。以水六升。煮取三升。去滓。分温三服。

心中痞。諸逆。心懸痛。桂枝生薑枳实湯主之。

183. 橘皮枳實生薑湯

橘皮^{十六兩} 枳實^{二兩炙} 生薑^{八兩切}

右三味。咬咀。以水五升。煮取二升。去滓。分溫再服

胸痹。胸中氣塞。短氣。茯苓杏仁甘草湯主之。橘皮枳實生薑湯亦主之。

184. 橘皮湯

橘皮^{四兩} 生薑^{八兩}

右二味。切。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。下咽即愈。

乾嘔。噦。若手足厥者。橘皮湯主之。

185. 橘皮竹茹湯

橘皮^{二升} 竹茹^{三升} 大棗^{三十枚擘} 生薑^{八兩切} 甘草^{五兩炙} 人參^{一兩}

右六味。咬咀。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服

噦哕者。橘皮竹茹湯主之。

186. 茯苓飲

茯苓^{三兩} 人參^{三兩} 白朮^{三兩} 生薑^{四兩} 枳實^{二兩} 橘皮^{一兩半}

右六味。咬咀。以水六升。煮取一升八合。去滓。分溫三服。如人行八九里進之。

主心胸中有停痰宿水。自吐出水後。心胸間虛。氣滿。不能食。消痰氣。令能食。茯苓飲。

187. 桂枝茯苓丸

桂枝_{去皮} 茯苓 牡丹_{去心} 桃仁_{去皮尖熬} 芍藥_{各等分}

右五味。末之。煉蜜為丸。如兔屎大。每日食前服一丸。不知。加至三丸。

婦人妊娠。經斷三月。而得漏下。下血四十日不止。胎欲動。在於臍上。此為妊娠。六月動者。前三月經水利時。胎也。下血者。後斷三月。衄也。所以下血不止者。其癥不去故也。當下其癥。宜桂枝茯苓丸。

188. 膠艾湯

阿膠_{二兩} 芎藭_{二兩} 甘草_{二兩炙} 艾葉_{三兩} 當歸_{三兩} 芍藥_{四兩} 乾地黄_{四兩}

右七味。㕮咀。以水五升清酒三升合煮。取三升。去滓。內膠。令消盡。溫服一升。日三服。不差更作。

師曰。婦人有漏下者。有半產後因續下血都不絕者。有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛。為胞阻。膠艾湯主之。

189. 赤石脂禹餘糧湯

赤石脂_{十六兩碎} 太一禹餘糧_{十六兩碎}

右二味。以水六升。煮取二升。去滓。分溫三服。

傷寒。服湯藥。下利不止。心下痞堅。服瀉心湯已。復以他藥下之。利不止。醫以理中與之。利益甚。理中者。理中焦。此利在下焦。赤石脂禹餘糧湯主之。復不止者。當利小便。159

190. 桃花湯

赤石脂_{十六兩一半全用一半篩末} 乾薑_{一兩} 粳米_{一升}

右三味。以水七升。煮米令熟。去滓。溫服七合。內赤石脂末方寸匕。日三服。若一服愈。餘勿服。

少陰病。下利。便膿血。桃花湯主之。306

少陰病二三日至四五日。腹痛。小便不利。下利不止。便膿血。桃花湯主之。307

下利。便膿血者。桃花湯主之。

191. 蜜煎

食蜜七合

右一味。於銅器內。微火煎。當需凝如飴狀。攪之勿令焦著。欲可丸。并手撚作挺。令頭銳。大如指。長二寸許。當熱時急作。冷則鞭。以內穀道中。以手急抱。欲大便時乃去之。疑非仲景意。已試甚良。

陽明病。自汗出。若發汗。小便自利者。此為津液內竭。雖堅。不可攻之。當須自欲大便。宜蜜煎。導而通之。若土瓜根及豬膽汁。皆可以導。233

192. 麻子仁丸

麻子仁二升 芍藥八兩 枳實八兩炙 大黃十六兩去皮 厚朴一尺炙去皮 杏仁一升去皮尖熬別作脂
右六味。蜜和丸。如梧桐子大。飲服十丸。日三服。漸加。以知為度。趙

麻子仁一升 芍藥八兩 枳實十六兩炙 大黃十六兩 厚朴一尺炙 杏仁一升去皮尖熬焦
右六味。末之。鍊蜜和丸。如梧子大。飲服十丸。日三服。漸加。以知為度。吳

趺陽脈浮而濇。浮則胃氣強。濇則小便數。浮濇相搏。大便則堅。其脾為約。麻子仁丸主之。247

193. 防己椒目葶藶大黄丸

防己_{一兩} 椒目_{一兩} 葶藶_{一兩熬} 大黄_{一兩}

右四味。末之。蜜和丸如梧桐子大。先食飲服一丸。日三服。稍增。口中有津液止。渴者。加芒硝半兩

腹滿。口舌乾燥。此腸間有水氣。防己椒目葶藶大黄丸主之。

194. 葶藶大棗瀉肺湯

葶藶_{熬令黃色。搗丸如彈丸大} 大棗_{十二枚擘}

右先以水三升煮棗。取二升。去棗。內葶藶。煮取一升。頓服之。

肺癰。喘不得卧。葶藶大棗瀉肺湯主之。

肺癰。胸滿脹。一身面目浮腫。鼻塞。清涕出。不聞香臭酸辛。欬逆上氣。喘鳴迫塞。葶藶大棗瀉肺湯主之。

支飲。不得息。葶藶大棗瀉肺湯主之。

195. 十棗湯

芫花_熬 甘遂 大戟_熬

右三味。搗篩。以水一升五合。煮大棗十枚。煮取八合。去滓。內藥末。強人一錢匕。羸人服半錢。平旦服之。不下者。明日更加半錢。下後。糜粥自養。

太陽中風。下利。嘔哕。表解乃可攻之。其人皦皦汗出。发作有时。頭痛。心下痞堅滿。引脇下痛。乾嘔。短氣。汗出。不惡寒。此為表解裏未和。十棗湯主之。152

病懸飲者。十棗湯主之。

欬家。其脉弦。为有水。可与十棗湯。

夫有支飲家。欬煩。胸中痛者。不卒死。至一百日一歲。与十棗湯。

196. 桔梗白散(三物白散)

桔梗三分 貝母三分 巴豆一分去皮心熬研如脂

右三味为散。强人飲服半錢匕。羸者減之。病在膈上者吐出。在膈下者瀉出。若下多不止。飲冷水一杯則定。

寒实結胸。无熱証者。与三物白散。141

欬而胸滿。振寒。脉數。咽乾。不渴。时出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。为肺癰。桔梗白散主之。

197. 走馬湯

巴豆二枚去皮心熬 杏仁二枚去皮尖

右二味。取綿纏。槌令碎。熱湯二合。捻取白汁飲之。当下。老小量之。通治飛尸鬼疰擊病。并見外臺。

卒疝。走馬湯主之。

198. 礬石湯

礬石二兩 右一味。以漿水一斗五升。煎三五沸。浸腳良。

礬石湯。治腳气衝心。

199. 硝石礬石散

硝石 礬石燒各等分 右二味。為散。以大麥粥汁。和服方寸匕。日三服。病隨大小便去。小便正黃。大便正黑。是候也。

黃家。日晡所發熱。而反惡寒。此為女勞得之。膀胱急。少腹滿。身盡黃。額上黑。足下熱。因作黑疸。其腹脹如水狀。大便必黑。時溇。此女勞之病。非水也。腹滿者難治。硝石礬石散主之。

200. 礬石丸

礬石三分燒 杏仁一分去皮尖熬

右二味。末之。煉蜜和丸。如棗核大。內臟中劇者。再內之。

婦人經水閉不利。臟堅癖不止。中有乾血。下白物。礬石丸主之。

201. 蛇床子散

蛇床子仁

右一味。末之。以白粉少許。和令相得。如棗大。棉裹。內之。自然溫矣。

溫陰中坐藥。蛇床子散。

202. 竹葉石膏湯

竹葉二把 半夏半升洗¹⁶ 麥門冬一升去心 甘草二兩炙 人參二兩¹⁷ 石膏十六兩碎 粳米半升

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。內粳米。煮米熟。湯成。去米。溫服一升。日三服。

¹⁶「半升洗」千金方作「一升洗」。

¹⁷「二兩」《玉函》作「三兩」

傷寒解後。虛羸少氣。氣逆欲吐。竹葉石膏湯主之。397

203. 麥門冬湯

麥門冬七升去心 半夏一升洗 人參二兩 甘草二兩炙 粳米三合 大棗十二枚擘

右六味。㕮咀。以水一斗二升。煮取六升。去滓。溫服一升。日三夜一服。

火逆上氣。咽喉不利。止逆下氣者。麥門冬湯主之。

204. 雄黃

雄黃一味為末。筒瓦二枚合之。燒。向肛熏之。

狐惑之為病。狀如傷寒。默默欲眠。目不得閉。卧起不安。蝕於喉為惑。蝕於陰為狐。不欲飲食。惡聞食臭。其面目乍赤乍黑乍白。蝕於上部則聲喝。甘草瀉心湯主之。蝕於下部則咽乾。苦參湯洗之。蝕於肛者。雄黃熏之。

205. 頭風摩散

大附子一枚炮去皮 鹽等分

右二味。為散。沐了。以方寸匕摩痰上。令藥力行。

頭風摩散方。

206. 皂莢丸

皂莢一挺刮去皮炙焦去子

右一味。末之。蜜丸梧子大。以棗膏和湯服三丸。日三夜一服。 **吳**

皂莢八兩刮去皮用酥炙

右一味。末之。蜜丸梧子大。以棗膏和湯服三丸。日三夜一服。 **鄧**

欬逆。气上衝。唾濁。但坐不得卧。皂莢丸主之。

207. 葦湯(葦莖湯)

葦葉_{二升切} 薏苡仁_{半升} 桃仁_{五十枚去皮尖} 瓜瓣_{半升}

右四味。以水一斗。先煮葦。得五升。去滓。內諸藥。煮取二升。分溫再服。当吐如膿。見千金。 吳

葦莖_{二升} 薏苡仁_{半升} 桃仁_{五十枚} 瓜瓣_{半升}

右四味。以水一斗。先煮葦莖。得五升。去滓。內諸藥。煮取二升。服一升。再服。当吐如膿。 鄧

治肺癰。葦湯。

208. 当歸生薑羊肉湯

当歸_{三兩} 生薑_{五兩切} 羊肉_{十六兩}

右三味。㕮咀。以水八升。煮取三升。去滓。溫服七合。日三服。若寒多者。加生薑成十六兩。痛多而嘔者。加橘皮二兩。朮一兩。加生薑者。亦加水五升。煮取三升二合。服之。

寒疝。腹中痛。及脇痛。裏急者。当歸生薑羊肉湯主之。

婦人產後。腹中疔痛。当歸生薑羊肉湯主之。并治腹中寒疝。虛勞不足。

209. 蒲灰散

蒲灰_{七分} 滑石_{三分}

右二味。杵为散。飲服方寸匕。日三服。

小便不利。蒲灰散主之。滑石白魚散。茯苓戎鹽湯并主之。

厥而皮水者。蒲灰散主之。

210.滑石白魚散

滑石二分 亂髮二分燒 白魚二分

右三味。杵為散。飲服方寸匕。日三服。

小便不利。蒲灰散主之。滑石白魚散。茯苓戎鹽湯并主之。

211.豬膏髮煎

豬膏八兩 亂髮如雞子大三枚

右二味。和膏中煎之。髮消藥成。分再服。病從小便去。

諸黃。豬膏髮煎主之。

胃氣下泄。陰吹而正喧。此穀氣之實也。膏髮煎導之。

212.柏葉湯

柏葉三兩 艾三把 乾薑三兩

右三味。咬咀。以水五升。取馬通汁一升。合煮取一升。去滓。分溫再服。

吐血不止者。柏葉湯主之。

213.黃土湯

甘草三兩炙 乾地黄三兩 白朮三兩 附子三兩炮去皮破八片 阿膠三兩 黃芩三兩 竈中黃土八兩

右七味。咬咀。以水八升。煮取三升。去滓。分溫二服。

下血。先見血。後見便。此近血也。先見便。後見血。此遠血也。遠血。黃

土湯主之。近血。赤小豆当歸散主之。

214. 雞屎白散

雞屎白

右一位。为散。取方寸匕。以水六合和温服。

轉筋之为病。其人臂脚直。脉上下行。微弦。轉筋入腹者。雞屎白散主之。

215. 蜘蛛散

蜘蛛^{十四枚熬焦} 桂枝^{半兩去皮}

右二味。为散。取八分一匕。飲和服。日再服。蜜丸亦得。

陰狐疝气者。偏有大小。时时上下。蜘蛛散主之。

216. 当歸芍藥散

当歸^{四兩} 芍藥^{十六兩} 茯苓^{四兩} 白朮^{四兩} 澤瀉^{八兩} 芎藭^{八兩一作三兩}

右六味。杵为散。取方寸匕。飲和服。酒和。日三服。

婦人懷娠。腹中疝痛。当歸芍藥散主之。

婦人腹中諸疾痛。当歸芍藥散主之。

217. 当歸貝母苦参丸

当歸^{四兩} 貝母^{四兩} 苦参^{四兩}

右三味。末之。煉蜜和丸如小豆大。飲服三丸。加至十丸。男子加滑石半兩。

婦人妊娠。小便難。飲食如故。当歸貝母苦参丸主之。

218. 狼牙湯

狼牙_{三兩}

右一味。咬咀。以水四升。煮取半升。以棉裹筋。大如繭。浸湯。漚陰中。日四遍。

婦人陰中蝕瘡爛。狼牙湯洗之。

219. 小兒疳虫蝕齒方

雄黃 葶藶_{各少許}

右二味。末之。取臘月豬脂合鎔。以槐枝棉裹頭四五枚。點藥烙之。疑非仲景方。

220. 炙甘草湯

甘草_{四兩炙} 生薑_{三兩切} 人參_{二兩} 生地黄_{十六兩} 桂枝_{三兩去皮} 阿膠_{二兩} 麥門冬_{半升去心} 麻仁_{半升} 大棗_{三十枚擘}

右九味。以清酒七升。水八升。先煮八味。取三升。去滓。內膠。烱消盡。溫服一升。日三服。一名復脈湯。

傷寒。脈結代。心動悸。炙甘草湯主之。177

虛勞不足。汗出而悶。脈結。心悸。行動如常。不出百日。危急者。十一日死。炙甘草湯主之。

肺痿。涎唾多。心中溫溫液液者。炙甘草湯主之。

221. 當歸四逆湯

當歸_{三兩} 桂枝_{三兩去皮} 芍藥_{三兩} 細辛_{三兩} 甘草_{二兩炙} 通草_{二兩} 大棗_{二十五枚擘一法十二枚}

右七味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

手足厥寒。脉細欲絕。当歸四逆湯主之。若其人内有久寒。当歸四逆加吳茱萸生薑湯主之。351.352

222. 当歸四逆加吳茱萸生薑湯

当歸_{三兩} 芍藥_{三兩} 甘草_{二兩炙} 通草_{二兩} 桂枝_{三兩去皮} 細辛_{三兩} 生薑_{八兩切} 吳茱萸_{二升} 大棗_{二十五枚擘}

右九味。以水六升清酒六升合。煮取五升。去滓。分溫五服。一方水酒各四升。

手足厥寒。脉細欲絕。当歸四逆湯主之。若其人内有久寒。当歸四逆加吳茱萸生薑湯主之。351.352

223. 麻黃連軀赤小豆湯

傷寒。瘀熱在裏。身必發黃。麻黃連軀赤小豆湯主之。262

224. 四逆散*

甘草_炙 枳實_{破水漬炙乾} 柴胡 芍藥

右四味。各十分。搗篩。白飲和服方寸匕。日三服。

欬者。加五味子乾薑各五分。并主下利。

悸者。加桂枝五分。

小便不利者。加茯苓五分。

腹中痛者。加附子一枚炮令坼。

泄利下重者。先以水五升。煮薤白三升。煮取三升。去滓。以散三方寸匕。

內湯中。煮取一升半。分溫再服。

少陰病。四逆。其人或欬。或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重。四逆散主之。318

225. 射干麻黃湯

射干^{十三枚一法三枚} 麻黃^{四兩去節} 生薑^{四兩切} 細辛^{三兩} 紫菀^{三兩} 款冬花^{三兩} 五味子^{半升} 半夏^{大者八枚洗一法半升} 大棗^{七枚擘}

右九味。㕮咀。以水一斗二升。先煮麻黃兩沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。分溫三服。

欬而上氣。喉中水雞聲。射干麻黃湯主之。

226. 桂枝芍藥知母湯

桂枝^{四兩去皮} 芍藥^{三兩} 甘草^{二兩炙} 麻黃^{二兩去節} 生薑^{五兩切} 白朮^{五兩} 知母^{四兩} 防風^{四兩} 附子^{二兩炮去皮破}

右九味。㕮咀。以水七升。煮取二升。去滓。溫服七合。日三服。

諸肢節疼痛。身體尪羸。腳腫如脫。頭眩短氣。溫溫欲吐。桂枝芍藥知母湯主之。

227. 內補當歸建中湯*

當歸^{四兩} 桂枝^{去皮三兩} 芍藥^{六兩} 生薑^{三兩切} 甘草^{二兩炙} 大棗^{十二枚擘}

右六味。㕮咀。以水八升。煮取二升。去滓。分溫三服。一日令盡。若大虛。加飴糖六兩。湯成內之。於火上煖令飴消。若无生薑。以乾薑代之。若其人去血過多。崩傷內衄不止。加地黃六兩。阿膠二兩。合八種。湯成。去滓。內阿膠。若无當歸。以芎藭代之。

治婦人產後。虛羸不足。腹中刺痛不止。吸吸少氣。或苦少腹拘急攣痛引腰背。不能食飲。產後一月。日得服四五劑為善。令人強壯。內補當歸建中湯。

228. 續命湯

麻黃三兩去節 桂枝三兩去皮 當歸三兩 人參三兩 石膏三兩碎綿裹 乾薑三兩 甘草三兩炙 芎藭一兩 杏仁四十枚去皮尖

右九味。㕮咀。以水一斗。煮取四升。去滓。分溫一服。當小汗。薄覆脊。憑几坐。汗出則愈。不汗更服。无所禁。勿當風。并治但伏不得卧。欬逆上氣。面目洪腫。

續命湯。治中風痲。身體不能自收。口不能言。冒昧不知痛處。或拘急。不得轉側。姚云。與大續命同。兼治婦人產後去血者。及老人小兒。

229. 烏梅丸

烏梅三百枚 細辛六兩 乾薑十兩 黃連十六兩 當歸四兩 附子六枚炮去皮 蜀椒四兩去目及閉口者汗 桂枝六兩去皮 人參六兩 黃蘗六兩

右十一味。各異擣篩。合治之。以苦酒漬烏梅一宿。去核。蒸之五斗米下。飯熟。擣成泥。和藥相得。內臼中。與蜜杵三千下。丸如梧桐子大。先食飲。服十丸。日三服。稍加至二十丸。¹⁸

傷寒。脈微而厥。至七八日。膚冷。其人躁。無暫安時者。此為臟厥。非蛔厥也。蛔厥者。其人當吐蛔。今病者靜。而復時煩。此為臟寒。蛔上入膈。故煩。須臾復止。得食而嘔。又煩者。蛔聞食臭出。其人常自吐蛔。蛔厥者。烏梅丸主之。338

230. 大黃廔虫丸

大黃十分蒸 黃芩二兩 甘草三兩炙 桃仁一升去皮尖熬 杏仁一升同上法 芍藥四兩 乾地黄十兩 乾漆一兩熬 廔虫一升去翅足熬 水蛭一百枚熬 蛭蟥一升熬 廔虫半升熬

右十二味。末之。煉蜜和丸小豆大。酒飲服五丸。日三服。

五勞。虛極。羸瘦。腹滿。不能飲食。食傷。憂傷。飲傷。房室傷。飢傷。

¹⁸「附子六枚」同吳本，趙本作「附子六兩」。「杵三千下」同吳本，趙本作「杵兩千下」。

勞傷。經絡榮衛氣傷。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。緩中補虛。大黃廩虫丸主之。

231. 麻黃升麻湯

麻黃_{二兩半去節} 升麻_{一兩一分} 當歸_{一兩一分} 知母_{十八銖} 黃芩_{十八銖} 萎蕤_{十八銖一作菖蒲} 芍藥_{六銖} 天門冬_{六銖去心} 桂枝_{六銖去皮} 茯苓_{六銖} 甘草_{六銖炙} 石膏_{六銖碎綿裹} 白朮_{六銖} 乾薑_{六銖}

右十四味。以水一斗。先煮麻黃一兩沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。分溫三服。相去如炊三斗米頃令盡。汗出愈。

傷寒六七日。大下後。寸脈沈遲。手足厥逆。下部脈不至。咽喉不利。唾膿血。泄利不止者。為難治。麻黃升麻湯主之。357

232. 豬膚湯

豬膚_{十六兩}

右一味。以水一斗。煮取五升。去滓。內白蜜一升。白粉五合。熬香。和令相得。溫分六服。

少陰病。下利。咽痛。胸滿。心煩。豬膚湯主之。310

233. 燒裊散

婦人中裊近陰處燒灰

右一味。水和服方寸匕。日三。小便即利。陰頭微腫。此為愈。婦人病。取男子裊燒服。

傷寒陰易之為病。其人身体重。少氣。少腹裏急。或引陰中拘攣。熱上衝胸。頭重不欲舉。眼中生眵。眼胞赤。膝脛拘急。燒裊散主之。392

234. 瓜蒂湯

瓜蒂二七枚

右一味。以水一升。煮取五合。去滓。頓服。

太陽中暈。身熱疼重。而脉微弱。此以夏月傷冷水。水行皮膚中所致也。瓜蒂湯主之。

諸黃。瓜蒂湯主之。

235. 百合知母湯

百合七枚擘 知母三兩切

右二味。先以水洗百合。漬一宿。当白沫出。去其水。更以泉水二升。煮取一升。去滓。別以泉水二升煮知母。取一升。去滓。後合和。重煎取一升五合。分温再服。

治百合病。发汗後者。百合知母湯。

236. 百合滑石代赭湯

百合七枚擘 滑石三兩碎綿裹 代赭如彈丸一枚碎綿裹

右三味。先以水洗百合。漬一宿。当白沫出。去其水。更以泉水二升。煮取一升。去滓。別以泉水二升煮滑石。代赭。取一升。去滓。後合和。重煎取一升五合。分温再服。

治百合病。下之後者。百合滑石代赭湯。

237. 百合雞子湯

百合七枚擘 雞子黃一枚

右二味。先以水洗百合。漬一宿。当白沫出。去其水。更以泉水二升。煮

取一升。去滓。内雞子黃。攪令調。分溫再服。

治百合病。吐之後者。百合雞子湯。

238. 百合地黄湯

百合七枚擘 生地黄汁一升

右二味。先以水洗百合。漬一宿。当白沫出。去其水。更以泉水二升。煮取一升。去滓。内地黃汁。煮取一升五合。分溫再服。中病勿更服。大便当如漆。

治百合病。不經吐下发汗。病形如初者。百合地黄湯。

239. 百合洗方

百合一升

右一味。以水一斗。漬之一宿。以洗身。洗已。食煮餅。勿与鹽豉也。

治百合病。一月不解。變成渴者。百合洗方。渴不差者。栝蒌牡蛎散。

240. 栝蒌牡蛎散

栝蒌根 牡蛎熬等分

右二味。杵为散。飲服方寸匕。日三服。

治百合病。一月不解。變成渴者。百合洗方。渴不差者。栝蒌牡蛎散。

241. 百合滑石散

百合一兩炙 滑石三兩

右二味。杵为散。飲服方寸匕。日三服。当微利者止。勿服之。熱則除。

治百合病。變發熱者。百合滑石散。

242.

治百合病。變腹中滿痛者。但取百合根隨多少。熬令黃色。搗篩為散。飲服方寸匕。日三。滿消痛止。

243. 苦參湯

狐惑之為病。狀如傷寒。默默欲眠。目不得閉。卧起不安。蝕於喉為惑。蝕於陰為狐。不欲飲食。惡聞食臭。其面目乍赤乍黑乍白。蝕於上部則聲喝。甘草瀉心湯主之。蝕於下部則咽乾。苦參湯洗之。蝕於肛者。雄黃熏之。

244. 赤小豆當歸散

赤小豆三升浸令芽出曝乾 當歸三兩

右二味。杵為散。漿水服方寸匕。日三服。

病者脈數。無熱。微煩。默默。但欲卧。汗出。初得之三四日。目赤如鳩眼。七八日目四眦黑。若能食者。膿已成也。赤小豆當歸散主之。

下血。先見血。後見便。此近血也。先見便。後見血。此遠血也。遠血。黃土湯主之。近血。赤小豆當歸散主之。

245. 升麻鱉甲湯

升麻二兩 當歸一兩 蜀椒一兩汗 鱉甲如手大一片炙 甘草二兩炙 雄黃半兩研

右六味。咬咀。以水四升。煮取一升。去滓。頓服之。老小再服。取汗。陰毒去雄黃。蜀椒。肘後。千金。陽毒用升麻湯。無鱉甲。有桂。陰毒用甘草湯。無雄黃。

陽毒之為病。面赤斑斑如錦文。喉咽痛。唾膿血。五日可治。七日不可治。

陰毒之为病。面目青。身痛。狀如被打。喉咽痛。死生与陽毒同。升麻鳖甲湯并主之。

246. 鳖甲煎丸

鳖甲十二分炙 烏扇三分燒 黄芩三分 柴胡六分 鼠婦三分熬 乾薑三分 大黄三分 芍藥五分 桂枝三分去皮 葶藶一分熬 石韋三分去毛 厚朴三分 牡丹五分去心 瞿麥二分 紫威三分 半夏一分洗 人參一分 廔虫五分熬 阿膠三分炙 蜂窠四分熬 赤硝十二分 蜣螂六分熬 桃仁二分 去皮尖熬焦

右二十三味。为末。取煨竈下灰一斗。清酒一斛五斗浸灰。俟酒盡一半。着鳖甲於中煮。令泛爛如膠漆。絞取汁。内諸藥煎。为丸如梧桐子大。空心服七丸。日三服。千金用鳖甲十二片。又有海藻三分。大戟一分。廔虫五分。无鼠婦赤硝二味。以鳖甲煎。和諸藥为丸。

問曰。瘡以月一日发。当以十五日愈。設不差。当月盡鮮也。如其不差。当云何。

師曰。此結为癥瘕。名曰瘡母。急治之。宜鳖甲煎丸。

247. 侯氏黑散

菊花四十分 白朮十分 細辛三分 茯苓三分 牡蛎三分熬 桔梗八分 防風十分 人參三分 礬石三分熬 黄芩五分 当歸三分 乾薑三分 芍藥三分 桂枝三分去皮

右十四味。杵为散。酒服方寸匕。日一服。初服二十日。温酒下之。禁一切魚肉大蒜。常宜冷食。六十日止。即藥積在腹中不下也。熱食即下矣。冷食自能助藥力。外臺有鐘乳礬石各三分。无桔梗。

大風。四肢煩重。心中惡寒不足者。侯氏黑散主之。外臺治風癱。

248. 風引湯

大黄四兩 乾薑四兩 龙骨四兩 桂枝三兩去皮 甘草二兩炙 牡蛎二兩熬 凝水石六兩 滑石六兩 赤石脂六兩 白石脂六兩 石膏六兩 紫石英六兩

右十二味。杵粗。篩。以韋囊盛之。取三指撮井華水三升。煮三沸。去滓。溫服一升。深師云。治大人風引。少小驚癇。瘕瘕日數十发。醫所不療。除熱方。巢源。腳氣宜風引湯。

風引湯。除熱。主癰瘡。

249. 防己地黄湯

防己一分 桂枝三分去皮 防風三分 甘草二分炙

右四味。㕮咀。以酒一杯。漬之一宿。絞取汁。取生地黄二斤。㕮咀。蒸之如斗米飯久。以銅器盛其汁。更絞地黄等汁。和分再服。

病如狂狀。妄行。獨語不休。无寒熱。其脉浮。防己地黄湯主之。

250. 三黃湯*

麻黃去節五分 獨活四分 細辛二分 黃耆二分 黃芩三分

右五味。㕮咀。以水六升。煮取二升。去滓。分溫三服。一服小汗。兩服大汗。心熱加大黃二分。腹痛加枳實一枚。氣逆加人參三分。悸加牡蛎三分。渴加栝蒌根三分。先有寒加附子一枚。見千金。

治中風。手足拘急。百節疼痛。煩熱心亂。惡寒。經日不欲飲食。三黃湯。

251. 薯蕷丸

薯蕷十分 當歸十分 桂枝十分去皮 麴十分 乾地黄十分 大豆黃卷十分 甘草二十八分炙
人參七分 芎藭六分 芍藥六分 白朮六分 麥門冬六分去心 杏仁六分去皮尖熬 柴胡五分 桔梗五分 茯苓五分 阿膠七分炙 乾薑三分 白朮二分 防風六分 大棗百枚為膏

右二十一味。末之。煉蜜和丸。如彈子大。空腹。酒服一丸。一百丸為劑。

19

虛勞。諸不足。風氣百疾。薯蕷丸主之。

¹⁹「阿膠七分炙」吳本作「阿膠炙各七分」，鄧本作「阿膠七分」。

252. 獺肝散

獺肝一具。炙乾。末之。水服方寸匕。日三服。見肘後。恐非仲景方。 **吳**

治冷勞。又主鬼疰。一門相染。獺肝散。

253. 厚朴麻黃湯

厚朴五兩炙 麻黃四兩去節 石膏如雞子大碎 杏仁半升去皮尖 乾薑二兩 細辛二兩 小麥一升
五味子半升 半夏半升洗

右九味。㕮咀。以水一斗二升。先煮小麥熟。去滓。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

上氣。脈浮者。厚朴麻黃湯主之。脈沈者。澤漆湯主之。

254. 澤漆湯

澤瀉四十八兩²⁰以東流水五斗煮取一斗五升 半夏半升洗 紫參五兩一作紫菀 生薑五兩切 白前五兩
甘草三兩炙 黃芩三兩 人參三兩 桂枝三兩去皮

右九味。㕮咀。內澤漆汁中煮取五升。去滓。溫服五合。至夜盡。

上氣。脈浮者。厚朴麻黃湯主之。脈沈者。澤漆湯主之。 **吳**

欬而脈浮者。厚朴麻黃湯主之。脈沈者。澤漆湯主之。 **鄧**

255. 奔豚湯

甘草二兩炙 芎藭二兩 當歸二兩 半夏四兩洗 黃芩二兩 生葛五兩 芍藥二兩 生薑四兩切
甘李根白皮一升切

右九味。㕮咀。以水二斗。煮取五升。去滓。溫服一升。日三夜一服。

²⁰「四十八兩」吳本、鄧本均作「三斤」，編者改。

奔豚。气上衝胸。腹痛。往來寒熱。奔豚湯主之。

256. 烏頭赤石脂丸

烏頭一分炮去皮 附子半兩炮去皮一法一分 赤石脂一兩一法二分 乾薑一兩一法二分 蜀椒一兩汗一法二分

右五味。末之。蜜丸如梧子大。先食服一丸。日三服。不知。稍增之。

心痛徹背。背痛徹心。烏頭赤石脂丸主之。

257. 九痛丸

附子三兩炮去皮 巴豆一兩去皮心熬研如脂 生狼牙一兩炙令香 人參一兩 乾薑一兩 吳茱萸一兩

右六味。末之。煉蜜和丸如梧子大。酒下。强人初服三丸。日一服。弱者二丸。兼治卒中惡。腹脹痛。口不能言。又治連年積冷。流注心胸痛。并冷腫上气。落馬。墜車。血疾等。皆主之。禁口如常法。吳

鄧

九痛丸。治九種心痛。一虫心痛。二疰心痛。三風心痛。四悸心痛。五食心痛。六飲心痛。七冷心痛。八熱心痛。九去來心痛。

258. 溫經湯

吳茱萸三兩 當歸二兩 芎藭二兩 芍藥二兩 麥門冬一升去心 人參二兩 桂枝二兩去皮 阿膠二兩 牡丹二兩去心 生薑二兩 甘草二兩炙 半夏²¹半升

右十二味。㕮咀。以水一斗。煮取三升。去滓。分溫三服。

亦主婦人少腹寒。久不作軀。兼主崩中去血。或月水來過多。及過期不來。²²

²¹吳本无半夏。

²²「作軀」同吳本，鄧本作「受胎」。

問曰。婦人年五十所。病下血。數十日不止。暮即發熱。少腹裏急痛。腹滿。手掌煩熱。唇口乾燥。何也。

師曰。此病屬帶下。何以故。曾經半產。瘀血在少腹不去。何以知之。其証唇口乾燥。故知之。當以溫經湯主之。

259. 旋覆花湯

旋覆花三兩 蔥十四莖 新絳少許

右三味。以水三升。煮取一升。去滓。頓服之。

肝著。其人常欲蹈其胸上。先未苦時。但欲飲熱。旋覆花湯主之。

寸口脈弦而大。弦則為減。大則為芤。減則為寒。芤則為虛。寒虛相搏。脈即名為革。婦人則半產漏下。旋覆花湯主之。

260. 厚朴大黃湯

厚朴一尺去皮炙 大黃六兩 枳實四枚炙

右三味。咬咀。以水五升。煮取二升。去滓。分溫再服。

支飲。胸滿者。厚朴大黃湯主之。

261. 紫參湯

紫參八兩 甘草三兩炙

右二味。咬咀。以水五升。先煮紫參。取二升。內甘草。煮取一升半。去滓。分溫三服。疑非仲景方。

下利。肺痛。紫參湯主之。

262. 訶梨勒散

訶梨勒十枚以麵裹糖灰火中煨之令麵熟去核

右一味。細為散。粥飲和。頓服之。疑非仲景方。

氣利。訶梨勒散主之。

263. 王不留行散

王不留行十分八月八日采之 蒴藋細葉十分七月七日采之 桑東南根如指大白皮十分三月三日采

甘草十八分炙 蜀椒三分去目及閉口者汗 黃芩二分 乾薑二分 芍藥二分 厚朴二分炙

右九味。桑東南根以上三味。燒為灰。存性。勿令灰過。各別杵篩。合治之為散。病者與方寸匕服之。小瘡即粉之。中大瘡但服之。產後亦可服。如風寒。桑根勿取之。前三物皆陰乾百日。

病金瘡。王不留行散主之。

264. 當歸散

當歸十六兩 黃芩十六兩 芍藥十六兩 芎藭十六兩 白朮八兩

右五味。杵為散。酒飲服方寸匕。日再服。妊娠常服即易產。胎無苦疾。產後百病悉主之。

婦人妊娠。宜服當歸散。

265. 白朮散

白朮四分 芎藭四分 蜀椒三分汗 牡蠣二分熬

右四味。杵為散。酒服一錢匕。日三夜一服。但苦痛。加芍藥。心下毒痛。倍加芎藭。心煩吐痛。不能食飲。加細辛一兩。半夏錢大二十枚。服之後。更以醋漿水服之。若嘔。亦以醋漿水服之。復不解者。小麥汁服之。已後若渴者。大麥粥服之。病雖愈。盡服之勿置。見外臺出古今錄驗。

妊娠養胎。白朮散主之。

266. 竹葉湯*

竹葉一把 葛根三兩 防風一兩 桔梗一兩 桂枝一兩去皮 人參一兩 甘草一兩炙 附子一枚炮
去皮破八片 大棗十五枚擘 生薑五兩切

右十味。㕮咀。以水一斗。煮取二升半。去滓。分溫三服。溫覆使汗出。頸項強。用大附子一枚。破之如豆大。煎藥。揚去沫。嘔者。加半夏半升洗。

婦人產後。中風。發熱。面正赤。喘而頭痛。竹葉湯主之。

267. 竹皮大丸*

生竹茹二分 石膏二分研 桂枝一分去皮 甘草七分炙 白薇一分

右五味。末之。棗肉和丸如彈丸大。以飲服一丸。日三夜二服。有熱者。倍白薇。煩喘者。加柏實一分。

婦人產中虛。煩亂。嘔哕。安中益氣。竹皮大丸主之。

268. 紅藍花酒

紅藍花一大兩

右一味。以酒一大升。煎強半。頓服。不止再服。疑非仲景方。吳

紅藍花一兩

右一味。以酒一大升。煎減半。頓服一半。未止再服。疑非仲景方。鄧

治婦人六十二種風。兼主腹中血氣刺痛。紅藍花酒。

269. 禹餘糧丸(方闕)

汗家。重發汗。必恍惚心亂。小便已。陰疼。與禹餘糧丸。88

270. 杏子湯_(方闕)

水之为病。其脉沈小。屬少陰。浮者为風。无水。虚胀者为气。水。发其汗即已。脉沈者。宜附子麻黄湯。浮者。宜杏子湯。

271. 黄連粉_(方闕)

浸淫瘡。從口流向四肢者。可治。從四肢流來入口者。不可治。黄連粉主之。方未見。

272. 藜蘆甘草湯_(方闕)

病人常以手指臂脛動。此人身体瞤瞤者。藜蘆甘草湯主之。方未見。

273. 膠薑湯_(方闕)

婦人陷經。漏下黑不鮮。膠薑湯主之。

第二部分

傷寒論

1.辨太陽病

太陽之为病。脉浮。頭項强痛。而惡寒。1¹

太陽病。发熱。汗出。惡風。脉緩者。为中風。2

太陽病。或已发熱。或未发熱。必惡寒。体痛。嘔逆。脉陰陽俱緊者。为傷寒。3

傷寒一日。太陽受之。脉若靜者。为不傳。頗欲吐。若躁煩。脉數急者。乃为傳。4

傷寒二三日。陽明少陽証不見者。为不傳。5²

傷寒三日。陽明脉大者。为欲傳。186

傷寒三日。少陽脉小者。为欲已。271

太陽病。发熱而渴。不惡寒者。为溫病。若发汗已。身灼熱者。为風溫。6

風溫之为病。脉陰陽俱浮。自汗出。身重。多眠睡。鼻息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視。失溲。若被火者。微发黃色。劇則如驚癇。时癇瘖。若火熏之。一逆尚引日。再逆促命期。6³

病有发熱而惡寒者。发於陽也。不熱而惡寒者。发於陰也。发於陽者七日愈。发於陰者六日愈。以陽數七。陰數六故也。7⁴

¹趙本、成本、《聖惠方》有「脉浮」二字，《玉函》、《千金翼》无。

²「陽明少陽証」除趙本外其它版本均作「其二陽証」。

³「癇瘖」同趙本，玉函作「掣縱发作」。

⁴此條为《金匱玉函經》太陽病篇第一條。

太陽病。頭痛。至七日以上自愈者。其經盡故也。若欲作再經者。當針足陽明。使經不傳則愈。^{8 5}

太陽病欲解時。從巳盡未。^{9 6}

風家。表解而不了了者。十二日愈。¹⁰

病人身大熱。反欲得衣者。熱在皮膚。寒在骨髓也。身大寒。反不欲近衣者。寒在皮膚。熱在骨髓也。^{11 7}

太陽中風。脈陽浮而陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者汗自出。嗇嗇惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴。乾嘔。桂枝湯主之。^{12 8}

太陽病。發熱。汗出。此為榮弱衛強。故使汗出。欲救邪風。宜桂枝湯。⁹⁵

太陽病。頭痛。發熱。汗出。惡風。桂枝湯主之。¹³

太陽病。項背強几几。反汗出。惡風。桂枝加葛根湯主之。¹⁴

太陽病。下之。其氣上衝者。可與桂枝湯。不衝者。不可與之。¹⁵

太陽病三日。已發汗吐下溫針而不解。此為壞病。桂枝湯不復中與也。觀其脈証。知犯何逆。隨証治之。¹⁶

桂枝湯本為解肌。若其人脈浮緊。發熱。無汗。不可與也。常須識此。勿

⁵「以上自愈者」同趙本、《千金翼》卷九，《玉函》卷六、《千金翼》卷十作「自當愈」，《玉函》卷二作「有當愈者」。

⁶「從巳盡未」同《千金翼》、《玉函》，趙本、成本作「從巳至未上」。唐弘字按：

⁷此條見趙本、成本、《玉函》卷二，《千金翼》無。關於此條是否為仲景原文，歷來註家聚訟不已，考趙本卷二子目，亦無此條之提示，山田正珍云：「此條不似仲景氏辭氣，疑是古語。」唐弘字按：此條以「皮膚」、「骨髓」劃分人體內外層次，這是扁鵲醫學的特徵，我認為此條可能是作者引用古語，也可能是後人將古語沾益於此。

⁸「脈陽浮而陰弱」《千金翼》卷九、《脈經》卷七第二、《玉函》卷二第三作「陽浮而陰濡弱」，《玉函》卷五第十四作「脈陽浮而陰濡弱」，宋本、成本作「陽浮而陰弱」，《千金方》作「其脈陽浮而陰弱」，《聖惠方》卷八辨太陽病形証作「其脈陽浮而弱」。

令誤也。16

酒客不可与桂枝湯。得之則嘔。以酒客不喜甘故也。17

喘家作桂枝湯。加厚朴杏仁佳。18

服桂枝湯吐者。其後必吐膿血。19

太陽病。发汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸。桂枝加附子湯主之。20

太陽病。下之。脉促。胸滿者。桂枝去芍藥湯主之。若微惡寒者。桂枝去芍藥加附子湯主之。21.22 ⁹

太陽病。得之八九日。如瘧狀。发熱。惡寒。熱多寒少。其人不嘔。清便續自可。一日再三发。脉微緩者。为欲愈也。脉微而惡寒者。此为陰陽俱虛。不可復吐下发汗也。面反有熱色者。未欲解也。以其不能得汗出。身必癢。宜桂枝麻黄各半湯。23 ¹⁰

太陽病。初服桂枝湯。反煩不解者。当先刺風池風府。卻与桂枝湯即愈。24

服桂枝湯。大汗出。脉洪大者。与桂枝湯。若形如瘧。一日再发者。汗出便解。宜桂枝二麻黄一湯。25

服桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脉洪大者。白虎加人參湯主之。26 ¹¹

太陽病。发熱。惡寒。熱多寒少。脉微弱者。此无陽也。不可復发汗。宜

⁹「微惡寒」同《玉函》卷二第三、成本，趙本无「惡」字。趙本第21條末有「促一作縱」小字註釋。

¹⁰「續自可」《玉函》卷二第三作「自調」。「面反有熱色」《聖惠方》作「面色亦有熱」。

¹¹「大汗出後」同趙本、成本、《玉函》卷二第三，《脉經》、《玉函》卷六第十九作「大汗出」，外臺作「大汗後」。「脉洪大者」同趙本、成本、《外臺》，《脉經》、《玉函》卷六第十九作「若脉洪大」，《玉函》卷二第三作「若脉洪大者」。「白虎加人參湯主之」同趙本卷二、成本卷二、《玉函》卷二第三，趙本卷八、《外臺》作「屬白虎加人參湯」，《脉經》作「屬白虎湯」，《玉函》卷六第十九作「屬白虎湯証」，《千金翼》作「与白虎湯」。

桂枝二越婢一湯。27

服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱。無汗。心下滿。微痛。小便不利。桂枝去桂加茯苓白朮湯主之。28¹²

傷寒。脈浮。自汗出。小便數。心煩。微惡寒。腳攣急。反與桂枝湯。欲攻其表。得之便厥。咽乾。煩躁。吐逆者。當作甘草乾薑湯。以復其陽。若厥愈。足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其腳即伸。若胃氣不和。譫語者。少與調胃承氣湯。若重發汗。復加燒針者。四逆湯主之。29

太陽病。項背強几几。無汗。惡風。葛根湯主之。31

太陽與陽明合病。而自利者。葛根湯主之。不下利。但嘔者。葛根加半夏湯主之。32.33¹³

太陽病。桂枝証。醫反下之。遂利不止。脈促者。表未解也。喘而汗出者。葛根芩連湯主之。34

太陽病。頭痛。發熱。身疼。腰痛。骨節疼痛。惡風。無汗而喘。麻黃湯主之。35

太陽與陽明合病。喘而胸滿者。不可下。宜麻黃湯。36

太陽病。十日已去。脈浮細而嗜卧者。外已解也。設胸滿脇痛者。與小柴胡湯。脈但浮者。與麻黃湯。37¹⁴

太陽中風。脈浮緊。發熱。惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁者。大青龍湯主之。若脈微弱。汗出。惡風者。不可服之。服之則厥。筋惕肉瞤。此為逆也。38¹⁵

¹²「白朮」《脈經》作「朮」。

¹³「而自利者」趙本作「者必自下利」，《脈經》作「而自利不嘔者」。唐弘宇按：此二條參照第172條的結構，合為一條。

¹⁴「脈但浮」《脈經》、《玉函》作「脈浮」。

¹⁵「煩躁者」《脈經》卷七第二、《玉函》卷二第三、卷五第十四作「煩躁頭痛」。「惕」同《千金方》、

傷寒。脉浮緩。身不疼。但重。乍有輕時。无少陰証者。大青龙湯发之。
39¹⁶

傷寒。表不解。心下有水气。乾嘔。发热而欬。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘。小青龙湯主之。40

傷寒。心下有水气。欬而微喘。发热。不渴。服湯已而渴者。此寒去。为欲解。小青龙湯主之。41

太陽病。外証未解。其脉浮弱。当以汗解。宜桂枝湯。42

太陽病。下之。微喘者。表未解也。桂枝加厚朴杏仁湯主之。43¹⁷

太陽病。外証未解者。不可下。下之为逆。欲解外者。宜桂枝湯。44

太陽病。先发汗不解而下之。其脉浮者不愈。浮为在外。而反下之。故令不愈。今脉浮。故在外。当解其外則愈。宜桂枝湯。45

太陽病。脉浮紧。无汗。发热。身疼痛。八九日不解。表証仍在。此当发其汗。服藥已。微除。其人发煩目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽气重故也。麻黄湯主之。46

太陽病。脉浮紧。发热。身无汗。自衄者愈。47

二陽并病。太陽初得病時。发其汗。汗先出。復不徹。因轉屬陽明。續自微汗出。不惡寒。若太陽病証不罷者。不可下。下之为逆。如此者可小发汗。設面色緣緣正赤者。陽气怫鬱不得越。当解之熏之。当汗不汗。其人躁煩。不知痛处。乍在腹中。乍在四肢。按之不可得。其人短气。但坐。以汗出不徹故也。更发汗則愈。何以知汗出不徹。以脉濇故知之。48

成本,《千金翼》、《脉經》、趙本作「惕」,《說文》:「惕,敬也。」此處應為「惕」,「惕」與「蕩」同,為動蕩之意,「筋惕」者,謂筋脉跳動也。

¹⁶「乍」《聖惠方》卷八辨太陽病形証作「或」。

¹⁷「桂枝加厚朴杏仁湯」一云「麻黄湯」。

脉浮數者。法当汗出而愈。若下之。身体重。心悸者。不可发汗。当自汗出而解。所以然者。尺中脉微。此裏虚。須表裏实。津液和。即自汗出愈。
49

脉浮而緊。法当身体疼痛。当以汗解之。假令尺中脉遲者。不可发汗。何以知然。以榮气不足。血少故也。50

脉浮者。病在表。可发汗。宜麻黄湯。51¹⁸

太陽病。脉浮數者。可发汗。宜麻黄湯。52¹⁹

病常自汗出者。此为榮气和。衛气不和也。榮行脉中。衛行脉外。復发其汗。衛和則愈。宜桂枝湯。53²⁰

病人臟无他病。时发熱。自汗出。而不愈者。此衛气不和也。先其时发汗則愈。宜桂枝湯。54

傷寒。脉浮緊。不发汗。因致衄者。宜麻黄湯。55

寸口脉浮而緊。浮則为風。緊則为寒。風則傷衛。寒則傷榮。榮衛俱病。骨節煩疼。当发其汗。宜麻黄湯。²¹

傷寒。不大便六七日。頭痛。有熱者。与承气湯。其小便清者。此为不在裏。續在表也。当发其汗。頭痛者必衄。宜桂枝湯。56²²

¹⁸「麻黄湯」一云「桂枝湯」。

¹⁹「麻黄湯」一云「桂枝湯」。

²⁰「此为榮气和衛气不和也」《玉函》作「此为營气与衛气不和也」，《脉經》作「此为榮气和榮气和而外不解此衛不和也」，《千金方》作「此为榮气和榮气和而外不解此为衛不和也」，《千金翼》作「此为榮气和衛气不和故也」，《聖惠方》作「此为榮气和衛气不和」，趙本作「此为榮气和榮气和者外不谐以衛气不共榮气谐和故尔」。

²¹此條趙本六經篇无，見於趙本卷一辨脉法、趙本卷七辨可发汗篇、《脉經》卷七第二、《玉函》卷二第二、《玉函》卷五第十四、《聖惠方》卷八辨傷寒脉候、《聖惠方》卷八辨可发汗形証。

²²「与承气湯」《玉函》卷二第三作「未可与承气湯」、《玉函》卷五第十四作「不可与承气湯」。「其小便清者」《脉經》、《千金翼》卷九作「其大便反青」，玉函作「其小便反清」，外臺作「其人小便反清者」。

傷寒。发汗已解。半日許復煩。脉浮數者。可復发汗。宜桂枝湯。57²³

凡病。若发汗。若吐。若下。若亡血。内无津液而陰陽自和者。必自愈。58

大下後。復发汗。其人小便不利。此亡津液。勿治之。得小便利。必自愈。
59

下之後。復发汗。必振寒。脉微細。所以然者。内外俱虛故也。60

下之後。復发汗。晝日煩躁不得眠。夜而安靜。不嘔。不渴。无表証。脉沈微。身无大熱。乾薑附子湯主之。61

发汗後。身体疼痛。其脉沈遲。桂枝加芍藥生薑人参湯主之。62

发汗後。不可更行桂枝湯。汗出而喘。无大熱者。可与麻杏甘石湯。63²⁴

发汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。桂枝甘草湯主之。64

发汗後。其人脐下悸。欲作奔豚。苓桂甘棗湯主之。65

发汗後。腹胀滿者。厚朴生薑半夏甘草人参湯主之。66

傷寒吐下发汗後。心下逆滿。气上衝胸。起則頭眩。其脉沈緊。发汗則動經。身为振搖。苓桂术甘湯主之。67²⁵

发汗不解。反惡寒者。虛故也。芍藥甘草附子湯主之。不惡寒。但熱者。實也。当和胃气。宜調胃承气湯。68.70²⁶

发汗若下之。病仍不解。煩躁。茯苓四逆湯主之。69

²³「半日許復煩」《聖惠方》卷八辨太陽病形証作「半日後復煩躁」、《千金方》卷九发汗吐下後作「半日許復心煩熱」。

²⁴唐弘宇按：「发汗後」下諸本均有「不可更行桂枝湯」七字，唯獨《醫心方》此條作「治傷寒。发汗出而喘。无大熱」，文意更通順。

²⁵「吐下发汗後」玉函作「若吐若下若发汗後」，宋本作「若吐若下後」。「白术」脉經作「术」。

²⁶「調胃承气湯」除宋本外其它版本均作「小承气湯」。

太陽病发汗後。大汗出。胃中乾。煩躁不得眠。其人欲飲水。当稍飲之。令胃气和則愈。若脉浮。小便不利。微熱。消渴者。五苓散主之。71²⁷

发汗已。脉浮數。煩渴者。五苓散主之。72

傷寒。汗出而渴者。五苓散主之。不渴者。茯苓甘草湯主之。73

中風。发热。六七日不解而煩。有表裏証。渴欲飲水。水入則吐。此为水逆。五苓散主之。74²⁸

未持脉时。病人叉手自冒心。師因教试令欬。而不即欬者。此必兩耳聋无所聞也。所以然者。以重发汗。虛故也。75

发汗後。飲水多者必喘。以水灌之亦喘。75

发汗後。水藥不得入口。为逆。若更发汗。必吐下不止。76

发汗吐下後。虛煩。不得眠。若劇者。反覆顛倒。心中懊憹。梔子豉湯主之。若少气者。梔子甘草豉湯主之。若嘔者。梔子生薑豉湯主之。76

发汗若下之。煩熱。胸中窒者。梔子豉湯主之。77²⁹

傷寒五六日。大下之後。身熱不去。心中結痛者。未欲解也。梔子豉湯主之。78

²⁷「其人欲飲水当稍飲之」趙本作「欲得飲水者少少与飲之」。錢超塵「按：作『稍』是。《說文解字》云：『稍，物出有漸也。』魏晉前『稍』字的意義与現代漢語『逐漸地』相当。『稍飲水』指病人逐漸地飲水，『少少飲水』与『稍飲水』意近而別。『稍飲』的詞義重點指飲水的過程，『少飲』指飲水量少。按：当作『稍』，作『少』誤。」趙本本條末有「即豬苓散是」小字註釋。

²⁸根據宋本子目小註，第74條「下別有三病証」。趙本第75條无方，是为証，第76條有方，是为法，則趙本74條後僅有一証。《玉函》、成本第75條分为兩條，第76條亦分为兩條，則74條後有三証，与子目之說相符，故從。《玉函》部分條文排序優於趙本，於此可見一斑。

²⁹「胸中窒者」同趙本、成本、《玉函》卷二第三，《脉經》卷七第八「窒」作「塞」，《千金方》卷九第九作「胸中窒气逆搶心者」。

傷寒下後。煩而腹滿。卧起不安。梔子厚朴湯主之。79³⁰

傷寒。醫以丸藥大下之。身熱不去。微煩。梔子乾薑湯主之。80

凡用梔子湯。其人微溏者。不可与服之。81³¹

太陽病。发汗。汗出不解。其人仍发热。心下悸。頭眩。身瞤動。振振欲蹶地。玄武湯主之。82³²

咽喉乾燥者。不可发汗。83

淋家不可发汗。发汗必便血。84

瘡家。雖身疼痛。不可发汗。汗出則瘡。85

衄家不可发汗。汗出必額上促急緊。直視不能眴。不得眠。86³³

亡血家不可发汗。汗出則寒慄而振。87

汗家。重发汗。必恍惚心亂。小便已。陰疼。与禹餘糧丸。88³⁴

凡失血者。不可发汗。发汗必恍惚心亂。**淳**88

病者有寒。復发汗。胃中冷。必吐蛔。89³⁵

本发汗。而復下之。为逆。若先发汗。治不为逆。本先下之。而反汗之。为逆。若先下之。治不为逆。90

³⁰「煩而」宋本作「心煩」。

³¹「其人」趙本作「病人舊」。

³²「蹶」趙本作「擗」，編者改。《集韻》：「蹶，仆也」；《龍龕手鑑》：「蹶，倒也」。

³³「額上促急緊」《金匱》吳本同，趙本作「額上陷脉急緊」，《脉經》、《玉函》作「額陷脉上促急而緊」，《千金翼》作「額上促急」。唐弘字按：趙本、《脉經》、《玉函》此條文意不通，從《金匱》吳本。

³⁴趙本本條末有「方本闕」小字註釋。

³⁵趙本「吐蛔」下有「一作嘔」小字註釋。

傷寒。醫下之。續得下利。清穀不止。身體疼痛。急當救裏。後身體疼痛。清便自調。急當救表。救裏宜四逆湯。救表宜桂枝湯。91

病發熱。頭痛。脈反沈。若不差。身體疼痛。當救其裏。宜四逆湯。92

太陽病。先下而不愈。因復發汗。表裏俱虛。其人因冒。冒家當汗出自愈。所以然者。汗出表和故也。裏未和。然後復下之。93³⁶

太陽病未解。脈陰陽俱微。必先振汗出而解。但陽脈微者。先汗之而解。但陰脈微者。先下之而解。汗之宜桂枝湯。下之宜調胃承氣湯。94³⁷

血弱氣盡。腠理開。邪氣因入。與正氣相搏。結於脇下。正邪分爭。往來寒熱。休作有時。默默不欲飲食。臟腑相連。其痛必下。邪高痛下。故使嘔也。小柴胡湯主之。服柴胡湯已。渴者。屬陽明。以法治之。97³⁸

得病六七日。脈遲浮弱。惡風寒。手足溫。醫再三下之。不能食。其人脇下滿痛。面目及身黃。頸項強。小便難。與柴胡湯後必下重。本渴。飲水而嘔。柴胡湯不復中與也。食穀者噦。98

傷寒五六日。中風。往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲飲食。心煩。喜嘔。或胸中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脇下痞堅。或心下悸。小便不利。或不渴。外有微熱。或欬。小柴胡湯主之。96³⁹

傷寒四五日。身熱。惡風。頸項強。脇下滿。手足溫而渴。小柴胡湯主之。

³⁶「裏未和」同趙本卷二辨太陽病脈証并治第五、《玉函》卷三，趙本卷十第二十二作「得表和」，《玉函》卷六、《脈經》卷七第八、《千金翼》卷十作「表和」。

³⁷「陰陽俱微」《千金翼》卷九第一、《脈經》卷七第七、《玉函》卷二第三及卷五第十八、趙本、成本作「陰陽俱停」，《脈經》卷七第七作「陰陽俱沈」。「停」字下林億孫奇等註云「一作微」。唐弘宇按：「脈停」意義不明。程應旂《傷寒後條辨》、錢潢《傷寒溯源集》、《醫宗金鑑》訓為「停止」，成無己訓為「勻停」、「調和」。查《內經》、《難經》、《傷寒論》均無停脈，且後句的「但陽脈微」、「但陰脈微」當是承接前句而來，故依宋臣所校，將此處改為「微」。「調胃承氣湯」一云「大柴胡湯」。

³⁸趙本「故使嘔也」下有「一云臟腑相連其病必下脇膈中痛」小字註釋。

³⁹「傷寒五六日中風往來寒熱」同《千金翼》卷九第四、趙本、成本，《脈經》、《玉函》卷五第十三作「中風往來寒熱傷寒五六日已後」，《玉函》卷二第三作「中風五六日傷寒往來寒熱」。「外有微熱」同《千金翼》、《脈經》、《玉函》，趙本作「身有微熱」。

傷寒。陽脉濇。陰脉弦。法当腹中急痛。先与小建中湯。不差者。与小柴胡湯。100⁴⁰

傷寒中風。有柴胡証。但見一証便是。不必悉具。101⁴¹

凡柴胡湯証而下之。柴胡証不罷者。復与柴胡湯。必蒸蒸而振。卻发热汗出而解。101

傷寒二三日。心中悸而煩者。小建中湯主之。102

太陽病。過經十餘日。反再三下之。後四五日。柴胡証仍在。先与小柴胡湯。嘔不止。心下急。其人鬱鬱微煩者。为未解。与大柴胡湯下之則愈。103⁴²

傷寒十三日不解。胸脇滿而嘔。日晡所发潮熱。已而微利。此本当柴胡湯下之。不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。非其治也。潮熱者。實也。先宜服小柴胡湯以解其外。後以柴胡加芒硝湯主之。104⁴³

柴胡加大黄芒硝桑螵蛸湯。0⁴⁴

傷寒十三日。過經。譫語者。内有熱也。当以湯下之。小便利者。大便当堅。而反下利。脉調和者。知醫以丸藥下之。非其治也。自利者。脉当微厥。今反和者。此为内實也。調胃承氣湯主之。105

太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下之即愈。其外不解者。尚

⁴⁰「小柴胡湯」《聖惠方》作「大柴胡湯」。

⁴¹「有柴胡証」《玉函》作「有小柴胡証」。

⁴²「嘔不止心下急」同趙本、《外臺》卷一、《千金翼》卷九第四、《脉經》卷七第八、《玉函》卷二第三、卷六第十九作「嘔止小安」。

⁴³「已而微利」《外臺》卷一論傷寒日數病源作「畢而微利」。「此本当柴胡湯下之」同《脉經》卷七第八、《千金翼》卷九第四作「此本当柴胡下之」，《玉函》卷六第十九作「此証当柴胡湯下之」，趙本、成本、《外臺》卷一、《玉函》卷二第三作「此本柴胡証」。

⁴⁴趙本无此條，《千金翼》、《玉函》有方无証。

未可攻。当先解其外。宜桂枝湯。外解已。但少腹急結者。乃可攻之。宜桃仁承氣湯。106⁴⁵

傷寒八九日。下之。胸滿。煩。驚。小便不利。譫語。一身盡重。不可轉側。柴胡加龙骨牡蛎湯主之。107⁴⁶

傷寒。腹滿。譫語。寸口脉浮而緊。此为肝乘脾。名曰縱。当刺期門。108

傷寒。發熱。嗇嗇惡寒。其人大渴。欲飲水者。其腹必滿。自汗出。小便利。其病欲解。此为肝乘肺。名曰橫。当刺期門。109⁴⁷

太陽病。当惡寒。發熱。今自汗出。反不惡寒。發熱。關上脉細數。此醫吐之過也。一二日吐之者。腹中飢。口不能食。三四日吐之者。不喜糜粥。欲食冷食。朝食暮吐。此醫吐之所致也。此为小逆。120

太陽病吐之。但太陽病当惡寒。今反不惡寒。不欲近衣。此为吐之内煩也。121

病人脉數。數为熱。当消穀引食。而反吐者。以醫发其汗。令陽气微。膈气虛。脉則为數。數为客熱。不能消穀。胃中虛冷。故吐也。122

太陽病。過經十餘日。心下溫溫欲吐。而胸中痛。大便反溏。腹微滿。鬱鬱微煩。先此時自極吐下者。与調胃承氣湯。若不尔者。不可与。但欲嘔。胸中痛。微溏者。此非柴胡湯証。以嘔。故知極吐下也。123⁴⁸

⁴⁵「下之即愈」同《脉經》卷七第七、《千金翼》卷九第五、《脉經》卷七第二、《玉函》卷二第三、卷五第十四、卷五第八作「下者即愈」，趙本、成本作「下者愈」。趙本「宜桃核承氣湯」下有「後云解外宜桂枝湯」小字註釋。

⁴⁶「一身盡重不可轉側」同《玉函》卷二第三、趙本、成本、《外臺》卷一、《千金翼》卷九第四、《脉經》卷七第八、《玉函》卷六第十九、《聖惠方》卷八作「一身不可轉側」。

⁴⁷唐弘宇按：本條後，第110、111條为衍文，移至衍文部分，第112至119條，其内容不是太陽病，移至《奔豚气吐膿驚怖火邪》篇。

⁴⁸「心下溫溫欲吐」《玉函》「溫溫」作「嘔嘔」。「嘔」讀作[wǎ]。《說文》：「嘔，咽也」，吞咽之意。《漢語大詞典》：「嘔嘔，象聲詞，反胃欲嘔的聲音。」錢超塵說：「欲吐而吐不暢快的樣子曰嘔嘔欲吐」，他認為《玉函》用「嘔」是本字，趙本作「溫」是假借字。唐弘宇按：錢老對「嘔嘔欲吐」的解釋沒有證據支持，我比較認同《漢語大詞典》的解釋。「心下溫溫欲吐」有兩種斷句方式：第一種將「嘔嘔欲吐」

太陽病六七日。表証仍在。脉微而沈。反不結胸。其人发狂。此熱在下焦。少腹当堅滿。小便自利者。下血乃愈。所以然者。以太陽隨經。瘀熱在裏故也。抵当湯主之。124 ⁴⁹

太陽病。身黃。脉沈結。少腹堅。小便不利者。为无血也。小便自利。其人如狂者。血証諦也。抵当湯主之。125

傷寒。有熱。少腹滿。應小便不利。今反利者。为有血也。当下之。宜抵当丸。126 ⁵⁰

太陽病。小便利者。以飲水多。必心下悸。小便少者。必苦裏急也。127

問曰。病有結胸。有臍結。其狀何如。

答曰。按之痛。寸口脉浮。關上自沈。为結胸。128

問曰。何謂臍結。

答曰。如結胸狀。飲食如故。时时下利。寸口脉浮。關上細沈而緊。为臍結。舌上白胎滑者。難治。129

臍結无陽証。不往來寒熱。其人反靜。舌上胎滑者。不可攻也。130 ⁵¹

病发於陽。而反下之。熱入因作結胸。病发於陰。而反下之。因作痞。所以成結胸者。以下之太早故也。131 ⁵²

作一句讀，模擬欲嘔吐時發出的聲音；第二種將「心下溫溫」四字作一句讀，形容一種主觀感覺。若將「溫溫欲吐」作一句讀，則剩下一個孤立的「心下」，這顯然不合理，所以我認為「心下溫溫」四字當作一句讀。我推測「溫溫」應該是一種方言，即使在今天，方言也經常有無法用正字書寫的情況，只能用借字代替，此處的「溫溫」應該就是這樣一種情況。《金匱》肺痿篇：「肺痿。涎唾多。心中溫溫液液者。炙甘草湯主之。」很明顯此條中的「心中溫溫液液」就是一種主觀感覺，「液液」的部首也是水部，可證明我的推測。《金匱》歷節篇：「諸肢節疼痛。身體尪羸。腳腫如脫。頭眩短氣。溫溫欲吐。桂枝芍藥知母湯主之。」此條的「溫溫」或可作「溫溫」。

⁴⁹「瘀熱在裏」《千金翼》保元堂本、《千金翼》世補齋本作「瘀血在裏」。

⁵⁰「当下之」三字下，趙本、成本、《玉函》卷二第三、《千金翼》卷九第七有「不可餘藥」四字，《脉經》、《玉函》卷五第十八、《千金方》、《千金翼》卷十、《聖惠方》、趙本卷九均无。

⁵¹趙本「不往來寒熱」下有「一云寒而不熱」小字註釋。

⁵²趙本「病发於陰而反下之」下有「一云汗出」小字註釋。

結胸者。項亦強。如柔痙狀。下之則和。宜大陷胸丸。131⁵³

結胸証。脉浮大者。不可下。下之則死。132

結胸証悉具。而煩躁者死。133

太陽病。脉浮而動數。浮則為風。數則為熱。動則為痛。數則為虛。頭痛。發熱。微盜汗出。而反惡寒。其表未解。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客氣動膈。短氣。躁煩。心中懊憹。陽氣內陷。心下因堅。則為結胸。大陷胸湯主之。若不結胸。但頭汗出。餘處無汗。齊頸而還。小便利。身必發黃。134⁵⁴

傷寒六七日。結胸熱實。脉沈緊。心下痛。按之如石堅。大陷胸湯主之。135

傷寒十餘日。熱結在裏。復往來寒熱者。與大柴胡湯。但結胸。無大熱者。此為水結在胸脇。但頭微汗出。大陷胸湯主之。136⁵⁵

太陽病。重發汗而復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。從心下至少腹堅滿而痛不可近。大陷胸湯主之。137⁵⁶

小結胸者。正在心下。按之則痛。其脉浮滑。小陷胸湯主之。138

太陽病二三日。不能卧。但欲起。心下必結。脉微弱者。此本寒也。而反下之。利止者。必結胸。未止者。四五日復下之。此挾熱利也。139⁵⁷

⁵³唐弘字按：根據宋本子目小註，第131條「前後有結胸臟結病六証」。趙本第131條之前的第128、129、130條為結胸臟結証，之後的第132、133條為結胸証，前後共五証，非六証。成本第128、129條合為一條，其餘同趙本，共四証，非六証。《玉函》卷三第四第131條分為兩條，則131條前有四証，後有二証，共六証，與子目之說相合。又，第128、129條文義相連，故將其合為一條。

⁵⁴「膈內拒痛」《脉經》卷七第八、《千金翼》卷九第六作「頭痛即眩」，《玉函》卷三第四、卷六第十九作「頭痛則眩」。趙本「膈內拒痛」下有「一云頭痛即眩」小字註釋。

⁵⁵「熱結在裏」《千金翼》卷九第四作「邪氣結在裏」。此條趙本卷九辨可下篇、《外臺》卷二分作兩條。

⁵⁶趙本「日晡所小有潮熱」下有「一云日晡所發心胸大煩」小註。

⁵⁷「此本寒也」同《千金翼》卷九第六、《脉經》卷七第八、《玉函》卷三第四、卷六第十九，趙本、成

太陽病。下之。其脉促。不結胸者。此為欲解。脉浮者。必結胸。脉緊者。必咽痛。脉弦者。必兩脇拘急。脉細數者。頭痛未止。脉沈緊者。必欲嘔。脉沈滑者。挾熱利。脉浮滑者。必下血。140⁵⁸

病在陽。當以汗解。反以水瀝之若灌之。其熱被劫不得去。益煩。皮上粟起。意欲飲水。反不渴。宜服文蛤散。若不差。與五苓散。141⁵⁹

寒實結胸。無熱証者。與三物白散。141⁶⁰

太陽與少陽并病。頭項強痛。或眩冒。時如結胸。心下痞堅。當刺大椎第一間。肺腧。肝腧。慎不可發汗。發汗則譫語。脉弦。譫語五日不止者。當刺期門。142

婦人中風。發熱。惡寒。經水適來。得之七八日。熱除。脉遲。身涼。胸脇下滿。如結胸狀。譫語。此為熱入血室。當刺期門。隨其虛實而取之。143⁶¹

婦人中風七八日。續得寒熱。發作有時。經水適斷。此為熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。發作有時。小柴胡湯主之。144

婦人傷寒。發熱。經水適來。晝日明瞭。暮則譫語。如見鬼狀。此為熱入

本作「此本有寒分也」，《外臺》卷二作「本有久寒也」。

⁵⁸趙本「脉促」下有「一作縱」小字註釋。

⁵⁹「反以水瀝之若灌之」《千金翼》卷九第六、《脉經》卷七第十四作「而反以水瀝之若灌之」，《玉函》卷三第四、卷六第二十七作「而反以水瀝之若灌之」，趙本、成本、《外臺》卷二作「反以冷水瀝之」。《說文》：「瀝，含水噴也。」《古今韻會舉要》：「瀝，噴水也，亦作喂。」《龍龕手鑑》：「喂，俗；𩚑，正也，與瀝同。」唐弘字按：關於此條的「若」字，錢超塵說：「若，選擇連詞，義為或、或者。」我認為錢老師的說法不正確。「其熱被劫不得去」同趙本、成本、《玉函》卷三第四、《脉經》卷七第十四、《玉函》卷六第二十七、《千金翼》卷九第六、《外臺》卷二作「其熱卻不得去」。「益煩」同《千金翼》卷九第六、《脉經》卷七第十四、《玉函》卷三第四、卷六第二十七，趙本、成本、《外臺》卷二作「彌更益煩」。唐弘字按：「彌」、「更」、「益」三字意義重複。

⁶⁰此條趙本、成本、《脉經》、《玉函》均與上條連寫為一條，《千金翼》卷九第六、《外臺》卷二單獨列為一條。「與三物白散」趙本作「與三物小陷胸湯白散亦可服」，下有「一云與三物小白散」小字註釋。

⁶¹「隨其虛實而取之」同《千金翼》卷九第七、《脉經》卷七第十三、《玉函》卷三第四，趙本、《玉函》卷六第二十六作「隨其實而取之」，成本作「隨其實而瀉之」。

血室。无犯胃气及上二焦。必自愈。145⁶²

傷寒六七日。發熱。微惡寒。肢節煩疼。微嘔。心下支結。外証未去者。柴胡桂枝湯主之。146

發汗多。亡陽。狂語者。不可下。与柴胡桂枝湯。和其榮衛。以通津液。後自愈。⁶³

傷寒五六日。已發汗而復下之。胸脇滿。微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩。此为未解。柴胡桂枝乾薑湯主之。147

傷寒六日。已發汗及下之。其人胸脇滿。大腸微結。小腸不利而不嘔。但頭汗出。往來寒熱而煩。此为未解。宜小柴胡桂枝湯。**淳**147

傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便堅。其脉細。此为陽微結。必有表。復有裏。沈亦为病在裏。汗出为陽微。假令純陰結。不得有外証。悉入在裏。此为半在外半在裏。脉雖沈緊。不得为少陰病。所以然者。陰不得有汗。今頭汗出。故知非少陰也。可与小柴胡湯。設不了了者。得屎而解。148

傷寒五六日。嘔而發熱。柴胡湯証具。而以他藥下之。柴胡証仍在者。復与柴胡湯。此雖已下之。不为逆。必蒸蒸而振。卻發熱汗出而解。若心下滿而堅痛者。此为結胸。宜大陷胸湯。若但滿而不痛者。此为痞。柴胡湯不復中与也。宜半夏瀉心湯。149

太陽与少陽并病。而反下之。成結胸。心下堅。下利不止。水漿不下。其人心煩。150

脉浮緊。而反下之。緊反入裏。則作痞。按之自濡。但气痞耳。151

⁶²「明瞭」同趙本、成本、《玉函》卷三第四、《千金翼》卷九第七作「了了」。《玉篇》：「瞭，目明也。」《廣韻》：「瞭，目睛明也。」「二焦」《脉經》卷七作「三焦」。

⁶³此條不見於趙本六經篇，而見於趙本辨發汗後病脉証并治第十七、《脉經》卷七病發汗以後証第三、《千金翼》卷九太陽病用柴胡湯法第四。「狂語」趙本、成本作「譫語」。

太陽中風。下利。嘔哕。表解乃可攻之。其人漐漐汗出。发作有时。頭痛。心下痞堅滿。引脇下痛。乾嘔。短气。汗出。不惡寒。此为表解裏未和。十棗湯主之。152

太陽病。醫发其汗。遂发热。惡寒。復下之。則心下痞。此表裏俱虛。陰陽气并竭。无陽則陰獨。復加燒針。因胸煩。面色青黃。膚瞶者。難治。今色微黃。手足溫者。易愈。153

心下痞。按之濡。其脉關上浮者。大黃黃連瀉心湯主之。154

心下痞。而復惡寒。汗出者。附子瀉心湯主之。155

本以下之。故心下痞。与瀉心湯。痞不解。其人渴而口燥煩。小便不利。五苓散主之。156⁶⁴

傷寒。汗出。解之後。胃中不和。心下痞堅。乾噦食臭。脇下有水气。腹中雷鳴而利。生薑瀉心湯主之。157

傷寒中風。醫反下之。其人下利。日數十行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞堅而滿。乾嘔。心煩。不能得安。醫見心下痞。謂病不盡。復下之。其痞益甚。此非結熱。但以胃中虛。客气上逆。故使之堅。甘草瀉心湯主之。158

傷寒。服湯藥。下利不止。心下痞堅。服瀉心湯已。復以他藥下之。利不止。醫以理中与之。利益甚。理中者。理中焦。此利在下焦。赤石脂禹餘糧湯主之。復不止者。当利小便。159⁶⁵

傷寒。吐下後发汗。虛煩。脉甚微。八九日。心下痞堅。脇下痛。气上衝咽喉。眩冒。經脉動惕者。久而成痿。160

傷寒。发汗若吐若下。解後。心下痞堅。噦气不除者。旋覆代赭湯主之。161

⁶⁴「口燥煩」《脉經》卷七第八无「煩」字。

⁶⁵「理中者理中焦」《千金翼》卷九第六作「理中治中焦」。

下後。不可更行桂枝湯。汗出而喘。无大熱者。可与麻杏甘石湯。162

太陽病。外証未除。而數下之。遂挾熱而利。利下不止。心下痞堅。表裏不解。桂枝人參湯主之。163

傷寒。大下後。復發汗。心下痞。惡寒者。表未解也。不可攻痞。当先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。164

傷寒。發熱。汗出不解。心中痞堅。嘔吐。下利。大柴胡湯主之。165

病如桂枝証。頭不痛。項不强。寸口脉微浮。胸中痞堅。气上衝咽喉。不得息。此为胸有寒。当吐之。宜瓜蒂散。166⁶⁶

諸亡血。虛家。不可与瓜蒂散。⁶⁷

病者脇下素有痞。連在脐傍。痛引少腹。入陰筋者。此为臟結。死。167⁶⁸

傷寒若吐若下後。七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。时时惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升。白虎加人參湯主之。168

傷寒六日不解。熱結在裏。但熱。时时惡風。大渴。舌乾。煩躁。宜白虎湯。**淳**168

凡用白虎湯。立夏後至立秋前得用之。立秋後不可服。

春三月。病常苦裏冷。不可与白虎湯。与之則嘔利而腹痛。

諸亡血。虛家。不可与白虎湯。得之則腹痛而利。但当溫之。

傷寒。无大熱。口燥渴。心煩。背微惡寒。白虎加人參湯主之。169

⁶⁶「寸口脉微浮」同《玉函》卷五第十六，《脉經》卷七第五作「寸口脉微細」，《千金翼》卷九第六作「脉微浮」，趙本、成本、《玉函》卷三第四作「寸脉微浮」。

⁶⁷唐弘宇按：此條諸本均在瓜蒂散煎服法中，未入正文。根據宋本獨有的子目，第166條瓜蒂散証後註云：「下有不可与瓜蒂散証」，也就是說第166條後当有一條不可与瓜蒂散的條文，故編者將此條列为正文。

⁶⁸「入陰筋者」《玉函》作「入陰俠陰筋者」。

傷寒。脉浮。發熱。无汗。其表不解。不可与白虎湯。渴欲飲水。无表証者。白虎加人參湯主之。170

太陽与少陽合病。自下利者。与黄芩湯。若嘔者。与黄芩加半夏生薑湯。172

傷寒。胸中有熱。胃中有邪气。腹中痛。欲嘔吐。黄連湯主之。173

傷寒八九日。風濕相搏。身体疼煩。不能自轉側。不嘔。不渴。脉浮虛而濇者。桂枝附子湯主之。若其人大便堅。小便自利者。术附子湯主之。174

風濕相搏。骨節疼煩。掣痛。不得屈伸。近之則痛劇。汗出。短气。小便不利。惡風。不欲去衣。或身微腫。甘草附子湯主之。175

傷寒。脉浮滑。此以表有熱。裏有寒。白虎湯主之。176

傷寒。脉結代。心動悸。炙甘草湯主之。177⁶⁹

⁶⁹「心動悸」《玉函》卷三第四作「心中驚悸」。唐弘宇按：趙本此條後有第178條。按照北宋校正醫書局子目的撰寫體例，如果第178條存在，則本卷子目177條下當有「下有結代脉一証」小註，而事實是沒有。又查《千金翼》、《玉函》皆无第178條。「脉按之來緩時一止復來者名曰結」見於辨脉篇，其後的結代脉語句見於《脉經》、《千金方》。本條可能是匯集相關內容後，沾益与177條之後，故將其移至衍文部分。

2.辨陽明病

陽明之为病。胃家实是也。180¹

傷寒二日。陽明受病。陽明者。胃中寒是也。宜桂枝湯。淳180

問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。何謂也。

答曰。太陽陽明者。脾約是也。正陽陽明者。胃家实是也。微陽陽明者。发汗。利小便已。胃中燥。大便難是也。179²

問曰。何緣得陽明病。

答曰。太陽病。发汗若下之。亡其津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。不更衣。内实。大便難者。为陽明病也。181

問曰。陽明病外証云何。

答曰。身熱。汗出。而不惡寒。但反惡熱。182

問曰。病有得之一日。不发熱而惡寒者。何。

答曰。然雖一日。惡寒自罷。即汗出。惡熱也。183

問曰。惡寒何故自罷。

答曰。陽明居中。主土。万物所歸。无所復傳。始雖惡寒。二日自止。此为陽明病也。184

本太陽。初得病时。发其汗。汗先出。復不徹。因轉屬陽明。185

¹趙本「实」下有「一作寒」小字註釋。唐弘字按：趙本第179條为陽明病篇第一條，此條列於其後，《玉函》卷三第五、《千金翼》卷九第八此條列於陽明病篇第一條，在第179條之前。按照本論的編寫慣例，六經病的第一條当是本病提綱証，所以本篇第一條当是第180條。

²「少陽」同趙本，《千金翼》卷九陽明病狀第八、《玉函》卷三第五作「微陽」。「发汗利小便已」同趙本。《千金翼》卷九第八、《玉函》卷三第五作「发其汗若利其小便」。趙本「胃中燥」下有「煩实」二字，錢超塵說：「《金匱玉函經》、《千金翼方》均无『煩实』二字，義长。」從。趙本「脾約」下有「一云絡」小字註釋。

太陽病而发汗。汗雖出。復不解。不解者。轉屬陽明也。宜麻黃湯。

淳 185

傷寒。發熱。无汗。嘔不能食。而反汗出濇濇然。是為轉屬陽明。185

傷寒。脉浮而緩。手足自温。是為系在太陰。太陰身当發黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日。大便堅者。為屬陽明。187

傷寒轉系陽明者。其人濇然微汗出也。188

陽明中風。口苦。咽乾。腹滿。微喘。發熱。惡寒。脉浮緊。若下之。則腹滿。小便難也。189

陽明病。能食為中風。不能食為中寒。190

陽明病。中寒。不能食。小便不利。手足濇然汗出。此欲作堅瘕。必大便頭堅後溏。所以然者。胃中冷。水穀不別故也。191

陽明中寒。不能食。小便不利。手足濇然汗出。欲作堅瘕也。所以然者。胃中水穀不化故也。宜桃仁承氣湯。**淳** 191

陽明病。初欲食。小便反不利。大便自調。其人骨節疼。翕翕如有熱狀。奄然發狂。濇然汗出而解。此為水不勝穀氣。與汗共并。脉緊則愈。192³

陽明病欲解時。從申盡戌。193

陽明病。不能食。下之不解。攻其熱必噦。所以然者。胃中虛冷故也。以其人本虛。故攻其熱必噦。194

陽明病。能食。下之不解。其人不能食。攻其熱必噦者。胃中虛冷也。宜半夏湯。**淳** 194

³「小便反不利」同趙本、成本，《千金翼》卷九第八、《玉函》卷三第五作「小便反不數」。

陽明病。脉遲。食難用飽。飽則发煩。頭眩。必小便難。此欲作穀疸。雖下之。腹滿如故。所以然者。脉遲故也。195

陽明病。脉遲。发熱。頭眩。小便難。此欲作穀疸。下之必腹滿。宜柴胡湯。**淳** 195

陽明病当多汗。而反无汗。其身如虫行皮中狀。此以久虛故也。196 ⁴

陽明病。反无汗。但小便利。二三日。嘔而欬。手足厥者。其人頭必痛。若不嘔。不欬。手足不厥者。頭不痛。197 ⁵

陽明病。但頭眩。不惡寒。故能食而欬。其人咽必痛。若不欬者。咽不痛。198 ⁶

陽明病。脉浮緊者。必潮熱。发作有时。脉但浮者。必盜汗出。201 ⁷

陽明病。无汗。小便不利。心中懊懣者。必发黄。199

陽明病。无汗。小便不利。心中熱壅。必发黄也。宜茵陳湯。**淳** 199

陽明病。被火。額上微汗出。小便不利者。必发黄。200

陽明病。被火灸。其額上微有汗出。小便不利者。必发黄也。宜茵陳湯。**淳** 200

陽明病。口燥。但欲漱水。不欲咽者。必衄。202

陽明病。本自汗出。醫復重发汗。病已差。其人微煩不了了者。此必大便堅故也。以亡津液。胃中乾燥。故令其堅。当問其小便日幾行。若本日三

⁴《玉函》卷三第五、《千金翼》卷九第八「陽明病」前有「陽明病久而堅者」八字。

⁵趙本本條末有「一云冬陽明」小字註釋。

⁶趙本本條末有「一云冬陽明」小字註釋。

⁷「脉但浮者」趙本、成本、《玉函》卷三第五、《千金翼》卷九第八均作「但浮者」，《聖惠方》卷八作「其脉浮者」。

四行。今日再行者。知必大便不久出。今为小便數少。津液当還入胃中。故知不久必大便也。203

傷寒。嘔多。雖有陽明証。不可攻之。204

陽明病。心下堅滿者。不可攻之。攻之遂利不止者死。利止者愈。205

陽明病。面合色赤者。不可攻之。攻之必發熱。色黃。小便不利也。206

陽明病。不吐不下。心煩者。可与調胃承氣湯。207

陽明病。脉遲。雖汗出。不惡寒。其身必重。短氣。腹滿而喘。有潮熱。如此者。其外为解。可攻其裏。若手足濇然汗出者。此大便已堅。大承氣湯主之。若汗多。微發熱。惡寒者。为外未解。桂枝湯主之。其熱不潮。未可与承氣湯。若腹大滿。而不大便者。可与小承氣湯。微和其胃氣。勿令至大下。208⁸

陽明病。潮熱。大便微堅者。可与大承氣湯。不堅者。不可与之。若不大便六七日。恐有燥屎。欲知之法。可少与小承氣湯。若腹中轉失氣者。此有燥屎也。乃可攻之。若不轉失氣者。此但頭堅後澹。不可攻之。攻之必腹滿。不能食也。欲飲水者。与水即噦。其後發熱者。必大便復堅而少也。以小承氣湯和之。若不轉失氣者。慎不可攻之。209⁹

陽明病。有潮熱。大便堅。可与承氣湯。若有結燥。乃可徐徐攻之。若无壅滯。不可攻之。攻之者。必腹滿。不能食。欲飲水者即噦。其候發熱。必腹堅脹。宜与小承氣湯。**淳**209

夫實則譫語。虛則鄭聲。鄭聲者。重語也。直視。譫語。喘滿者死。下利

⁸「桂枝湯主之」趙本无。趙本「外未解也」下有「一法与桂枝湯」小字註釋，南宋李杲以北宋校訂本《傷寒論》为底本撰《傷寒要旨藥方》卷二大承氣湯第七十三條有「桂枝湯主之」，趙本卷九辨可下篇、《千金方》卷九宜下亦有「桂枝湯主之」。

⁹「必大便復堅而少也」《脉經》卷七第六、《玉函》卷五第十七、《千金翼》卷九第八作「必復堅」，《玉函》卷三第五作「必復堅而少也」，《聖惠方》作「必腹堅脹」，趙本作「必大便復鞭而少也」，《千金方》卷九宜下作「大便必復堅」。

者亦死。210¹⁰

发汗多。重发汗。此为亡陽。若譫語。脉短者死。脉自和者不死。211

傷寒。吐下後未解。不大便五六日。至十餘日。其人日晡所发潮熱。不惡寒。獨語。如見鬼神之狀。若劇者。发則不識人。順衣妄撮。怵惕不安。微喘。直視。脉弦者生。濇者死。若微者。但发热。譫語。大承气湯主之。若一服利。止後服。212¹¹

陽明病。其人多汗。津液外出。胃中燥。大便必堅。堅則譫語。小承气湯主之。若一服譫語止。莫復服。213¹²

陽明病。譫語。发潮熱。脉滑疾者。小承气湯主之。因与承气湯一升。腹中轉失气者。復与一升。若不轉失气者。勿更与之。明日又不大便。脉反微濇者。此为裏虛。为難治。不可復与承气湯。214¹³

陽明病。譫語。有潮熱。反不能食者。胃中必有燥屎五六枚。若能食者。但堅耳。大承气湯主之。215¹⁴

陽明病。下血。譫語者。此为熱入血室。但頭汗出者。当刺期門。隨其寒而瀉之。濇然汗出則愈。216

汗出。譫語者。以有燥屎在胃中。此風也。須下者。過經乃可下之。下之

¹⁰「鄭聲者重語也」《外臺》卷一千金方六首作「鄭聲重語也」，寫作雙行小字註於「虛則鄭聲」下。錢超塵「按：『鄭聲者重語是也』七字乃注文也，後竄入正文，当依《外臺》正之。」

¹¹「順衣妄撮怵惕不安」趙本作「循衣摸牀惕而不安」，其下有「一云順衣妄撮怵惕不安」小字註釋。「若微者」各本均无「若」字。唐弘宇按：此條「若劇者」与「若微者」为并列的兩種情况，故加「若」字。

¹²「若一服譫語止莫復服」《千金翼》卷九第八、《玉函》卷五第十八、《脉經》卷七第七、趙本卷九辨可下篇无。

¹³「譫語」同趙本、成本、《玉函》卷三第五、《脉經》卷七第七、《千金翼》卷九第八、《玉函》卷五第十八、《聖惠方》卷八辨陽明病形証作「譫語妄言」。

¹⁴「胃中」二字趙本、成本有，《千金翼》卷九第八、《脉經》卷七第七、《玉函》卷三第五、卷五第十八均无。錢超塵「按：宋本、成本之『胃中』二字誤衍，以《脉經》、《玉函》均无此二字可知也。」「大承气湯主之」同《玉函》卷三第五，趙本作「宜大承气湯下之」，《千金翼》卷九第八作「承气湯主之」，《脉經》卷七第七、趙本卷九作「屬承气湯証」，《玉函》卷五第十八作「屬承气湯」。

若早。語言必亂。以表虛裏實故也。下之則愈。宜大承氣湯。217¹⁵

傷寒四五日。脉沈而喘滿。沈為在裏。反發其汗。津液越出。大便秘難。表虛裏實。久則譫語。218

三陽合病。腹滿。身重。難以轉側。口不仁。面垢。譫語。遺尿。發汗則譫語甚。下之則額上生汗。手足厥冷。自汗。白虎湯主之。219¹⁶

二陽并病。太陽証罷。但發潮熱。手足熱汗出。大便秘難。而譫語者。下之則愈。宜大承氣湯。220

陽明病。脉浮緊。咽乾。口苦。腹滿而喘。發熱。汗出。不惡寒。反惡熱。身重。若發汗則躁。心憤憤。反譫語。若加溫針。必怵惕。煩躁。不得眠。若下之。則胃中空虛。客氣動膈。心中懊憹。舌上胎者。梔子豉湯主之。221¹⁷

陽明病。脉浮。咽乾。口苦。腹滿。汗出而喘。不惡寒。反惡熱。心躁。譫語。不得眠。胃虛。客熱。舌燥。宜梔子湯。**淳** 221

若渴欲飲水。口乾舌燥者。白虎加人參湯主之。222

若脉浮。發熱。渴欲飲水。小便不利者。豬苓湯主之。223¹⁸

陽明病。汗出多而渴者。不可與豬苓湯。以汗多。胃中燥。豬苓湯復利其小便故也。224

陽明病。汗出多而渴者。不可與豬苓湯。汗多者。胃中燥也。汗少者。宜與豬苓湯利其小便。**淳** 224

¹⁵ 趙本「汗」字下有「汗一作卧」小字註釋，「大承氣湯」下有「一云大柴胡湯」小字註釋。

¹⁶ 趙本「面垢」下有「又作枯一云向經」小字註釋。「譫語甚」同《脉經》卷三第五，趙本、《玉函》、《千金翼》均無「甚」字。「自汗」同《脉經》卷七第八、《玉函》卷六第十九，趙本、成本、《玉函》卷三第五作「若自汗出者」。

¹⁷ 孫世揚：「舌上胎者」之「胎」當作「落」，《說文解字》：「落，水衣也。」

¹⁸ 《聖惠方》卷八辨陽明病形証本條首有「陽明病」三字。

陽明病。脉浮而遲。表熱裏寒。下利清穀者。四逆湯主之。225

陽明病。若胃中虛冷。不能食者。飲水即噦。226 ¹⁹

脉浮。發熱。口乾。鼻燥。能食者。則衄。227

脉浮。發熱。口鼻中燥。能食者。必衄。宜黃芩湯。**淳** 227

陽明病。下之。其外有熱。手足溫。不結胸。心中懊憹。飢不能食。但頭汗出。梔子豉湯主之。228

陽明病。發潮熱。大便溏。小便自可。胸脇滿不去。小柴胡湯主之。229

陽明病。發潮熱。大便溏。小便自利。胸脇煩滿不止。宜小柴胡湯。**淳** 229

陽明病。脇下堅滿。不大便而嘔。舌上白胎者。可與小柴胡湯。上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濺然汗出而解。230

陽明病。脇下堅滿。大便秘而嘔。口燥。宜柴胡湯。**淳** 230

陽明中風。脉弦浮大。而短氣。腹都滿。脇下及心痛。久按之。氣不通。鼻乾。不得汗。嗜卧。一身及目悉黃。小便難。有潮熱。時時噦。耳前後腫。刺之小差。外不解。病過十日。脉續浮者。與小柴胡湯。脉但浮。無餘証者。與麻黃湯。不尿。腹滿加噦者。不治。231.232 ²⁰

陽明病。中風。其脉浮大。短氣。心痛。鼻乾。嗜卧。不得汗。一身悉黃。小便難。有潮熱而噦。耳前後腫。刺之雖小差。外若不解。宜柴胡湯。**淳** 231.232

陽明病。自汗出。若發汗。小便自利者。此為津液內竭。雖堅。不可攻之。

¹⁹《脉經》卷七第十四、《聖惠方》卷八有「陽明病」三字。

²⁰「腹都滿」諸本均同。錢超塵說：「考趙開美本《傷寒論》詞例，均作『腹滿』，除此例之外，無更作『腹都滿』者。『都』字衍。」

当須自欲大便。宜蜜煎。導而通之。若土瓜根及豬膽汁。皆可以導。233

陽明病。脉遲。汗出多。微惡寒者。表未解也。可发汗。宜桂枝湯。234

陽明病。脉浮。无汗而喘者。发汗則愈。宜麻黄湯。235 ²¹

陽明病。发熱。汗出者。此为熱越。不能发黄也。但頭汗出。身无汗。齐頸而還。小便不利。渴引水漿者。此为瘀熱在裏。身必发黄。茵陳蒿湯主之。236 ²²

陽明病。发熱而汗出。此为熱退。不能发黄也。但頭汗出。身体无汗。小便不利。渴引水漿。此为瘀熱在裏。必发黄也。宜茵陳湯。**淳**

陽明病。但頭汗出。其身无汗。小便不利。渴引水漿。此为瘀熱在裏。身必发黄。宜急下之。**淳**

陽明証。其人喜忘者。必有畜血。所以然者。本有久瘀血。故令喜忘。屎雖堅。大便反易。其色必黑。抵当湯主之。237

陽明病。下之。心中懊憹而煩。胃中有燥屎者。可攻。其人腹微滿。頭堅後溏者。不可攻之。若有燥屎者。宜大承气湯。238 ²³

病者五六日不大便。繞脐痛。煩躁。发作有时。此有燥屎。故使不大便也。239

病者煩熱。汗出則解。復如瘧狀。日晡所发者。屬陽明。脉實者。当下之。脉浮虛者。当发其汗。下之宜大承气湯。发汗宜桂枝湯。240 ²⁴

²¹「而喘者」同趙本、成本，《千金翼》卷九第八、《玉函》卷三第五、卷五第十四、《聖惠方》卷八辨太陽病形証均作「其人必喘」。

²²「熱越」《聖惠方》卷八作「熱退」。

²³「頭堅後溏者」同《千金翼》卷九第八、《脉經》卷七第八、《玉函》卷三第五、卷六第十九，趙本、成本作「初頭鞭後必溏」。

²⁴「日晡所发者」同《千金翼》卷七第八、《脉經》卷七第七，《脉經》卷七第二作「日晡所发熱」，趙本、成本、《玉函》卷三第五、卷五第十四作「日晡所发熱者」，《玉函》卷五第十四作「日晡发熱者」。「大承气湯」一云「大柴胡湯」。錢超塵「按：《聖惠方》此條脫文雖多，但仍可知為240條之殘文

大下後。六七日不大便。煩不解。腹滿痛者。此有燥屎。所以然者。本有宿食故也。宜大承氣湯。241

病者小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。怫鬱不能臥者。有燥屎故也。宜大承氣湯。242 ²⁵

食穀欲嘔者。屬陽明。吳茱萸湯主之。得湯反劇者。屬上焦。243 ²⁶

太陽病。寸口緩。關上小浮。尺中弱。其人發熱。汗出。復惡寒。不嘔。但心下痞者。此為醫下之故也。若不下。其人不惡寒而渴者。此轉屬陽明。小便數者。大便必堅。不更衣十日。无所苦也。渴欲飲水者。少少与之。但以法救之。渴者。宜五苓散。244 ²⁷

脈陽微而汗出少者。為自和。汗出多者。為太過。陽脈實。因發其汗。出多者。亦為太過。太過者。陽絕於內。亡津液。大便因堅。245 ²⁸

脈浮而芤。浮則為陽。芤則為陰。浮芤相搏。胃氣生熱。其陽則絕。246 ²⁹

趺陽脈浮而濇。浮則胃氣強。濇則小便數。浮濇相搏。大便則堅。其脾為約。麻子仁丸主之。247

太陽病三日。發汗不解。蒸蒸发熱者。屬胃也。調胃承氣湯主之。248

傷寒吐後。腹脹滿者。與調胃承氣湯。249

無疑。《聖惠方》此條尚存之文字為：「汗出後則暫解，日晡則復發。脈實者，當宜下之。」雖為殘文，仍可從中窺見《聖惠方》卷八確系南朝醫師祕傳之本。歷來校勘家及研治《傷寒論》者，多不注意此本之價值，以為殘缺甚多，无可多論，其實不然也。其中有多處對研治《傷寒論》之流傳、正其舛誤、補其方劑之未備，啓迪多多，此本於《傷寒論》文獻之研究，有待予以較高評價。」

²⁵「怫鬱」《玉函》卷五第十八、《千金翼》卷九第八作「怫鬱」，《脈經》卷七第七、《玉函》卷三第五、趙本、趙本、成本作「喘冒」，趙本「喘冒」二字下有「一作怫鬱」小字註釋，《醫心方》作「沸胃」。《集韻》：怫鬱，心不安也。唐弘宇按：

²⁶「得湯反劇者屬上焦」八字《千金翼》卷九第八在煎服法中。

²⁷「太陽病」《千金翼》卷九第八作「陽明病」。「但以法救之渴者」同趙本。

²⁸趙本「為自和」下有「一作如」小字註釋。

²⁹唐弘宇按：此條僅為《千金方》一段中的一句。

太陽病吐下发汗後。微煩。小便數。大便因堅。可与小承气湯。和之則愈。
250

得病二三日。脉弱。无太陽柴胡証。煩躁。心下堅。至四日。雖能食。以小承气湯少与。微和之。令小安。至六日。与承气湯一升。若不大便六七日。小便少者。雖不大便。但頭堅後澇。未定成堅。攻之必澇。当須小便利。尿定堅。乃可攻之。宜大承气湯。251³⁰

傷寒六七日。目中不了了。睛不和。无表裏証。大便難。身微熱者。此为実也。急下之。宜大承气湯。252³¹

傷寒六七日。目中瞳子不明。无外証。大便難。微熱者。此为実。宜急下之。**淳**252

陽明病。發熱。汗多者。急下之。宜大承气湯。253³²

發汗不解。腹滿痛者。急下之。宜大承气湯。254³³

腹滿不減。減不足言。当下之。宜大承气湯。255³⁴

陽明与少陽合病而利。脉不負者为順。負者。失也。互相克賊。名为負。
256

脉滑而數者。有宿食也。当下之。宜大承气湯。256³⁵

病人无表裏証。發熱七八日。雖脉浮數。可下之。宜大柴胡湯。假令下已。

³⁰「雖不大便」同《千金翼》卷九第八、《脉經》卷七第六、《玉函》卷五第十七、趙本卷九辨可下篇，趙本辨陽明病篇作「雖不受食」，《玉函》卷五第十八、卷三第五、成本作「雖不能食」。趙本「雖不受食」下有「一云不大便」小字註釋。「但頭堅後澇」同《千金翼》卷九第八、《脉經》卷七第六、《玉函》卷三第五、卷五第十七、卷五第十八，趙本、成本作「但初頭鞭後必澇」。

³¹「无表裏証」《聖惠方》卷八作「无外証」。「大承气湯」一云「大柴胡湯」。

³²趙本「大承气湯」下有「一云大柴胡湯」小字註釋。

³³「大承气湯」一云「大柴胡湯」。

³⁴「大承气湯」一云「大柴胡湯」。

³⁵「大承气湯」一云「大柴胡湯」。

脉數不解。合熱則消穀善飢。至六七日。不大便者。有瘀血。宜抵当湯。若脉數不解。而下不止。必挾熱。便膿血。257.258³⁶

傷寒发汗已。身目为黄。所以然者。寒濕相搏。在裏不解故也。以为非瘀熱。而不可下。当於寒濕中求之。259³⁷

傷寒七八日。身黄如橘。小便不利。腹微滿者。茵陳蒿湯主之。260³⁸

傷寒。身黄。发熱。梔子蘘皮湯主之。261³⁹

傷寒。瘀熱在裏。身必发黄。麻黄連軹赤小豆湯主之。262⁴⁰

³⁶「宜大柴胡湯」同《玉函》卷五第十八、趙本卷九，《脉經》卷七第七作「屬大柴胡湯証」，《千金翼》卷九第八无。「下已」同《千金翼》卷九第八、《玉函》卷三第五、《脉經》卷七第八，趙本、成本、《玉函》卷六第十九作「已下」，錢超塵「按：作『下已』義長。已，止也。」從。

³⁷趙本「寒濕」下有「一作溫」小字註釋。「以为非瘀熱而不可下当於寒濕中求之」同《玉函》卷三第五，趙本、成本作「以为不可下也於寒濕中求之」，《脉經》卷七第三、《千金翼》卷九第八、《玉函》卷六第十九无。

³⁸「腹微滿者」同趙本、成本，《千金翼》卷九第八作「其腹微滿」，《脉經》卷七第七、《玉函》卷三第五作「少腹微滿」，《玉函》卷五第十八作「小腹微滿」，《聖惠方》卷八辨可下形証作「其腹微滿者」。

³⁹「身黄发熱」同《玉函》卷三第五、趙本，《千金翼》卷九第八作「其人发黄」。

⁴⁰「連軹」《千金翼》卷九第八作「連翹」。

3. 辨少陽病

少陽之为病。口苦。咽乾。目眩。263

傷寒三日。少陽受病。口苦乾燥。目眩。宜柴胡湯。淳 263

少陽中風。兩耳无所聞。目赤。胸中滿而煩。不可吐下。吐下則悸而驚。
264

傷寒。脉弦細。頭痛。發熱者。屬少陽。少陽不可發汗。發汗則譫語。此屬胃。胃和則愈。胃不和。煩而悸。265

太陽病不解。轉入少陽。脇下堅滿。乾嘔。不能食。往來寒熱。尚未吐下。其脉沈緊。可与小柴胡湯。266

少陽病。若已吐下發汗溫針。譫語。柴胡湯証罷。此為壞病。知犯何逆。以法治之。267

三陽合病。脉浮大。上閔上。但欲寐。目合則汗。268

傷寒六七日。无大熱。其人躁煩。此為陽去入陰故也。269

傷寒三日。三陽為盡。三陰當受邪。其人反能食。而不嘔。此為三陰不受邪也。270

少陽病欲解時。從寅盡辰。272

4. 辨太陰病

太陰之为病。腹滿而吐。食不下。下之益甚。时腹自痛。胸下堅結。273¹

太陰之为病。腹滿而吐。食不下。自利益甚。时腹自痛。若下之。必胸下結鞭。**趙**273

太陰病。脉浮者。可发汗。宜桂枝湯。276

太陰中風。四肢煩疼。脉陽微陰濇而长者。为欲愈。274

太陰病欲解时。從亥盡丑。275

自利。不渴者。屬太陰。以其臟有寒故也。当溫之。宜四逆輩。277

傷寒。脉浮而緩。手足自溫者。系在太陰。太陰身当发黄。若小便自利者。不能发黄。至七八日。雖暴煩。下利日十餘行。必自止。所以自止者。脾家實。腐穢当去故也。278²

傷寒。脉浮而緩。手足自溫。是为系在太陰。小便不利。其人当发黄。宜茵陳湯。

太陰病不解。雖暴煩。下利十餘行而自止。所以自止者。脾家實。腐穢已去故也。宜橘皮湯。278**淳**

本太陽病。醫反下之。因尔腹滿时痛者。屬太陰。桂枝加芍藥湯主之。大實痛者。桂枝加大黃湯主之。279

¹唐弘宇按：本條《聖惠方》作：「傷寒四日。太陰受病。腹滿。吐食。下之益甚。时时腹痛。心胸堅滿。若脉浮者。可发其汗。沈者宜攻其裏也。发汗者宜桂枝湯。攻裏者宜承氣湯。」《醫心方》作：「凡病。腹滿。吐食。下之益甚。」可見《醫心方》与《聖惠方》條文的一部分完全相同。《醫心方》与《聖惠方》都是非常古老的版本，且都未經過宋臣校正，這兩個版本的文字一致，應該不是巧合。

²「腐穢当去」同《千金翼》卷十第一、《玉函》卷四第七、趙本、成本，《聖惠方》卷八辨太陰病形証作「腐穢已去」。錢超塵「按：作『已』義長。」

太陰为病。脉弱。其人續自便利。設当行大黃芍藥者。宜減之。以其人胃气弱。易動故也。280³

³「太陰为病」《千金翼》卷十第一作「人无陽証」。趙本「易動故也」下有「下利者先煎芍藥三沸」小字註釋。

5.辨少陰病

少陰之为病。脉微細。但欲寐。281

少陰病。欲吐不吐。心煩。但欲寐。五六日。自利而渴者。屬少陰。虛故引水自救。若小便色白者。少陰病形悉具。所以然者。以下焦虛寒。不能制水。故白也。282¹

傷寒五日。少陰受病。其脉微細。但欲寐。其人欲吐而不煩。五日自利而渴者。屬陰虛。故引水以自救。小便白而利者。下焦有虛寒。故不能制水。而小便白也。宜龙骨牡蛎湯。**淳** 281.282

病人脉陰陽俱緊。反汗出者。为亡陽。此屬少陰。法当咽痛。而復吐利。283

少陰病。欬而下利。譫語者。被火气劫故也。小便必難。以强責少陰汗也。284

少陰病。欬而下利。譫語。是为心臟有積熱故也。小便必難。宜服豬苓湯。**淳** 284

少陰病。脉細沈數。病为在裏。不可发汗。285

少陰病。脉微。不可发汗。亡陽故也。陽已虛。尺中弱濇者。復不可下之。286

少陰病。脉緊。至七八日。自下利。脉暴微。手足反温。脉緊反去。此为欲解。雖煩。下利。必自愈。287

¹「欲吐不吐心煩」同《玉函》卷四第八、趙本、成本，《千金翼》卷十第二作「欲吐而不煩」，《聖惠方》卷八作「其人欲吐而不煩」。「所以然者」趙本、成本作「小便白者」。「下焦虛寒」同《千金翼》卷十第二，《聖惠方》作「下焦有虛寒」，《玉函》卷四第八、趙本、成本作「下焦虛有寒」。

少陰病。下利。若利自止。惡寒而踰。手足溫者。可治。288

少陰病。惡寒而踰。時自煩。欲去衣被者。可治。289 ²

少陰中風。脉陽微陰浮者。為欲愈。290

少陰病欲解時。從子盡寅。291

少陰病。吐利。手足不逆冷。反發熱者。不死。脉不至者。灸少陰七壯。
292 ³

少陰病。吐利。手足逆而發熱。脉不足者。灸其少陰。淳

少陰病八九日。一身手足盡熱者。以熱在膀胱。必便血。293

少陰病。但厥。無汗。而強發之。必動其血。未知從何道出。或從口鼻。
或從耳目出。是為下厥上竭。為難治。294

少陰病。惡寒。身踰而利。手足逆冷者。不治。295

少陰病。下利止而頭眩。時時自冒者死。297

少陰病。吐利。躁煩。四逆者死。296

少陰病。四逆。惡寒而踰。脉不至。不煩而躁者死。298 ⁴

少陰病六七日。息高者死。299

少陰病。脉微細沈。但欲卧。汗出。不煩。自欲吐。至五六日。自利。復煩燥。不得卧寐者死。300

²「可治」《千金翼》卷十第二作「不可治」。

³趙本「脉不至者」下有「至一作足」小字註釋。

⁴趙本本條末有「一作吐利而躁逆者死」小字註釋。

少陰病。始得之。反發熱。脈沈者。麻黃細辛附子湯主之。301

少陰病。得之二三日。麻黃附子甘草湯微發汗。以二三日無裏証。故微發汗。302⁵

少陰病。得之二三日以上。心中煩。不得卧。黃連阿膠湯主之。303

少陰病。得之一二日。口中和。其背惡寒者。當灸之。附子湯主之。304

少陰病。身體痛。手足寒。骨節痛。脈沈者。附子湯主之。305

少陰病。下利。便膿血。桃花湯主之。306

少陰病二三日至四五日。腹痛。小便不利。下利不止。便膿血。桃花湯主之。307

少陰病。下利。便膿血者。可刺。308

少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。309

少陰病。下利。咽痛。胸滿。心煩。豬膚湯主之。310

少陰病二三日。咽痛者。可與甘草湯。不差者。與桔梗湯。311

少陰病。咽中傷。生瘡。不能語言。聲不出者。苦酒湯主之。312

少陰病。咽中痛。半夏散及湯主之。313

少陰病。下利。白通湯主之。314

少陰病。下利。脈微。服白通湯。利不止。厥逆。無脈。乾嘔。煩者。白通加豬膽汁湯主之。服湯脈暴出者死。微微續出者生。315⁶

⁵「無裏証」同《玉函》卷四第八、成本，《脈經》卷七第三、《千金翼》卷十第二、趙本作「無証」。

⁶「利不止」《脈經》卷七第十八作「下利止」，《聖惠方》卷八作「止後」。「服湯脈暴出者死微微續

少陰病。下利。服白通湯。止後。厥逆。无脉。煩躁者。宜白通豬苓湯。
其脉暴出者死。微微續出者生。淳³¹⁵

少陰病。二三日不已。至四五日。腹痛。小便不利。四肢沈重疼痛而利。
此为有水气。其人或欬。或小便自利。或下利。或嘔。玄武湯主之。316

少陰病。下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脉微欲絕。身反不惡寒。其人
面赤。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止而脉不出。通脉四逆湯主之。317
7

少陰病。四逆。其人或欬。或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重。
四逆散主之。318

少陰病。下利六七日。欬而嘔。渴。心煩不得眠。豬苓湯主之。319

少陰病。下利。欬而嘔。煩渴。不得眠卧。宜豬苓湯。淳³¹⁹

少陰病。得之二三日。口燥。咽乾者。急下之。宜大承气湯。320

少陰病。下利清水。色青者。心下必痛。口乾燥者。急下之。宜大承气湯。
321⁸

少陰病六七日。腹滿。不大便者。急下之。宜大承气湯。322

少陰病。脉沈者。急温之。宜四逆湯。323

少陰病。其人飲食入則吐。心中温温欲吐。復不能吐。始得之。手足寒。
脉弦遲。此胸中實。不可下也。当吐之。若膈上有寒飲。乾嘔者。不可吐。

出者生」同《聖惠方》卷八，《脉經》卷七第十八作「服湯藥其脉暴出者死微細者生」。

⁷「身反不惡寒」同《玉函》卷四第八、趙本、成本，《千金翼》卷十第二、《聖惠方》卷八作「身反惡寒」。「或利止而脉不出」《聖惠方》卷八作「或时利止而脉不出者」。

⁸「色青者」趙本、《玉函》卷四第八作「色純青」。「急下之」同《玉函》卷四第八、《聖惠方》卷八、《外臺》卷一，《脉經》卷七第七、趙本、《玉函》卷五第十八、《千金翼》卷十第二作「可下之」，《千金翼》卷十宜下作「宜下之」。趙本「大承气湯」下有「一法用大柴胡」小字註釋。

当温之。宜四逆湯。324

少陰病。下利。脉微瀋。嘔而汗出。必數更衣。反少者。当温其上。灸之。
325⁹

⁹「灸之」二字下，趙本、脉經有「一云灸厥陰可五十壯」小字註釋。

6.辨厥陰病¹

厥陰之為病。消渴。氣上撞心。心中疼熱。飢而不欲食。甚者食則吐蛔。下之利不止。326²

厥陰中風。其脈微浮為欲愈。不浮為未愈。327

厥陰病欲解時。從丑盡卯。328

厥陰病。渴欲飲水者。少少與之即愈。329

傷寒六日。渴欲飲水者。宜豬苓湯。**淳** 329

¹趙本此篇篇名下有「厥利嘔噦附合一十九法方一十六首」小字註釋。趙本第326至381條都歸於此篇之內。章太炎說：「近世間流行之《傷寒論》誤將厥利嘔噦列入厥陰篇中，殊失仲景立論之本旨。其實厥陰篇中，僅首條提綱，及條上著有厥陰病三字者，乃為厥陰病之本病，其餘厥利嘔噦諸條，當照《金匱玉函經》，與霍亂、勞復、陰陽易等另列一篇，庶幾無誤。」從。

²「甚者食則吐蛔」同《玉函》卷四第九，《脈經》卷七第六作「甚者則欲吐」，《千金翼》卷十第三作「甚者則欲吐蛔」，趙本、成本作「食則吐蛔」。

7. 辨厥利嘔噦

諸四逆。厥者。不可下之。虛家亦然。330¹

傷寒。先厥後發熱而利者。必自止。見厥復利。331

傷寒。始發熱六日。厥反九日而利。凡厥利者。當不能食。今反能食。恐為除中。食以黍餅。不發熱者。知胃氣尚在。必愈。恐暴熱來出而復去也。後日脈之。其熱續在者。期之旦日夜半愈。所以然者。本發熱六日。厥反九日。復發熱三日。并前六日。亦為九日。與厥相應。故期之旦日夜半愈。後三日脈之而脈數。其熱不罷者。此為熱氣有餘。必發癰膿。332²

傷寒。脈遲六七日。而反與黃芩湯徹其熱。脈遲為寒。而與黃芩湯復除其熱。腹中應冷。當不能食。今反能食。此為除中。必死。333

傷寒。先厥後發熱。下利必自止。而反汗出。咽中痛者。其喉為痺。發熱。無汗。而利必自止。若不止。必便膿血。便膿血者。其喉不痺。334

傷寒一二日至四五日。厥者。必發熱。前熱者後必厥。厥深者熱亦深。厥微者熱亦微。厥應下之。而反發汗者。必口傷爛赤。335³

凡厥者。陰陽氣不相順接。便為厥。厥者。手足逆冷是也。337

傷寒。病厥五日。熱亦五日。設六日當復厥。不厥者自愈。厥終不過五日。

¹「不可下之」同趙本卷六、卷九、成本、《脈經》卷七第六、《千金翼》卷十第三、《玉函》卷四第十、卷五第十七、《聖惠方》卷八辨不可下形証作「不可下也」、《千金翼》卷十忌下第五作「忌下」、趙本卷八辨不可吐篇作「不可吐也」、《脈經》卷七第四病不可吐証、《聖惠方》卷八辨不可吐形証作「不可吐之」。

²趙本「除中」下有「一云消中」小字註釋。

³「前熱者後必厥」同趙本、成本、《玉函》卷四第十、《脈經》卷七第一、《玉函》卷五第十三、《千金翼》卷十第三作「前厥者後必熱」。錢超塵「按：當作『前熱者後必厥』，此論熱厥，熱在前而厥在後，凡『厥』字在前者，皆誤。」從。

以熱五日。故知自愈。336

傷寒。脉微而厥。至七八日。膚冷。其人躁。无暫安時者。此為臟厥。非蛔厥也。蛔厥者。其人當吐蛔。今病者靜。而復時煩。此為臟寒。蛔上入膈。故煩。須臾復止。得食而嘔。又煩者。蛔聞食臭出。其人常自吐蛔。蛔厥者。烏梅丸主之。338

傷寒。熱少。厥微。指頭寒。默默不欲食。煩躁。數日。小便利。色白者。此熱除也。欲得食。其病為愈。若厥而嘔。胸脇煩滿者。其後必便血。339

4

病者手足厥冷。言我不結胸。小腹滿。按之痛。此冷結在膀胱關元也。340

5

傷寒。發熱四日。厥反三日。復發熱四日。厥少熱多。其病當愈。四日至七日。熱不除者。必便膿血。341

傷寒。厥四日。熱反三日。復厥五日。其病為進。寒多熱少。陽氣退。故為進。342

傷寒六七日。脉微。手足厥冷。煩躁。灸其厥陰。厥不還者死。343⁶

傷寒。發熱。下利。厥逆。躁不得卧者死。344⁷

傷寒。發熱。下利至甚。厥不止者死。345

傷寒。六七日不利。忽發熱而利。其人汗出不止者死。有陰无陽故也。346

傷寒。厥逆。六七日不利。便發熱而利者生。其人汗出。利不止者死。

⁴趙本「指」下有「一作稍」小字註釋。

⁵「小腹」《千金翼》卷十第三作「少腹」。

⁶「脉微」同趙本、成本，《脉經》卷七第十一、《玉函》卷四第十、《千金翼》卷十第十一作「其脉微」，《千金翼》卷十第三作「其脉數」，《聖惠方》卷八辨可灸形証作「脉數」。

⁷「發熱」同趙本、成本、《玉函》卷四第十、《脉經》卷七第八、《千金翼》卷十第三无。

但有陰无陽故也。脉 346

傷寒五六日。不結胸。腹濡。脉虛。復厥者。不可下。此为亡血。下之死。
347

傷寒。發熱而厥七日。下利者。为難治。348

傷寒。脉促。手足厥逆。可灸之。349

傷寒。脉滑而厥者。裏有熱也。白虎湯主之。350

手足厥寒。脉細欲絕。当歸四逆湯主之。若其人内有久寒。当歸四逆加吳茱萸生薑湯主之。351.352

大汗出。熱不去。内拘急。四肢疼。又下利。厥逆而惡寒。四逆湯主之。
353⁸

大汗出若大下利。而厥冷者。四逆湯主之。354

病者手足厥冷。脉乍緊。邪結在胸中。心下滿而煩。飢不能食。病在胸中。
当吐之。宜瓜蒂散。355

傷寒。厥而心下悸。宜先治水。当与茯苓甘草湯。卻治其厥。不尔。水漬
入胃。必作利也。356

傷寒六七日。大下後。寸脉沈遲。手足厥逆。下部脉不至。咽喉不利。唾
膿血。泄利不止者。为難治。麻黄升麻湯主之。357

傷寒四五日。腹中痛。若轉气下趨少腹者。为欲自利也。358

傷寒。本自寒下。醫復吐下之。寒格。更逆吐下。食入即出。乾薑黃芩黃
連人參湯主之。359

⁸「又下利」《脉經》作「下利」，《千金翼》作「若下利」。

下利。有微熱而渴。脉弱者自愈。360

下利。脉數。有微熱。汗出者。自愈。設脉復緊。为未解。361⁹

下利。手足厥冷。无脉。当灸其厥陰。灸之不溫而脉不還。反微喘者死。少陰負趺陽者为順。362

下利。寸脉反浮數。尺中自濇者。必清膿血。363

下利清穀。不可攻表。汗出必脹滿。364

下利。脉沈弦者下重。脉大者为未止。脉微弱數者为欲自止。雖發熱。不死。365

下利。脉沈而遲。其人面少赤。身有微熱。下利清穀者。必鬱冒。汗出而解。其人必微厥。所以然者。其面戴陽。下虛故也。366

下利。脉反數而渴者。今自愈。設不差。必清膿血。以有熱故也。367

下利後。脉絕。手足厥冷。晬时脉還。手足溫者生。不還不溫者死。368

傷寒。下利日十餘行。脉反實者死。369

下利清穀。裏寒外熱。汗出而厥。通脉四逆湯主之。370

熱利下重者。白頭翁湯主之。371

下利。欲飲水者。为有熱也。白頭翁湯主之。373

下利。腹脹滿。身体疼痛者。先溫其裏。乃攻其表。溫裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。372

⁹「有微熱汗出者」同《玉函》卷四第十，趙本、成本作「有微熱汗出」，《千金翼》卷十第三作「若微發熱汗出者」。「設脉復緊」同《千金翼》卷十第三，趙本、成本、《玉函》卷四第十作「設復緊」。

下利。譫語者。有燥屎也。宜小承氣湯。374

下利後更煩。按之心下濡者。為虛煩也。梔子豉湯主之。375

嘔家有癰膿。不可治嘔。膿盡自愈。376

嘔而發熱者。小柴胡湯主之。379

嘔而脈弱。小便復利。身有微熱。見厥者。難治。四逆湯主之。377

乾嘔。吐涎沫。頭痛者。吳茱萸湯主之。378 ¹⁰

傷寒。大吐大下之。極虛。復極汗者。其人外氣怫鬱。復与之水。以發其汗。因得噦。所以然者。胃中寒冷故也。380

傷寒。噦而腹滿。視其前後。知何部不利。利之即愈。381

¹⁰「頭痛者」同《趙本》、成本，《玉函》卷四第十、《千金翼》卷十第三作「而復頭痛」。

8. 辨霍亂

問曰。病有霍亂者何。

答曰。嘔吐而利。此名霍亂。382

問曰。病發熱。頭痛。身疼。惡寒。吐利者。此屬何病。

答曰。此名霍亂。霍亂自吐下。又利止。復更發熱也。383 ¹

傷寒。其脈微瀋。本是霍亂。今是傷寒。卻四五日。至陰經上。轉入陰。必利。本嘔。下利者。不治。若其人似欲大便。而反失氣。仍不利者。此屬陽明。便必堅。十三日愈。所以然者。經盡故也。384

下利後當便堅。堅則能食者愈。今反不能食。到後經中。頗能食。復過一經能食。過之一日當愈。若不愈。不屬陽明也。384

惡寒。脈微。而復利。利止。亡血也。四逆加人參湯主之。385 ²

霍亂。頭痛。發熱。身疼痛。熱多。欲飲水者。五苓散主之。寒多。不用水者。理中湯主之。386 ³

吐利止。而身痛不休者。當消息和解其外。宜桂枝湯小和之。387

吐利。汗出。發熱。惡寒。四肢拘急。手足厥冷。四逆湯主之。388

既吐且利。小便復利。而大汗出。下利清穀。裏寒外熱。脈微欲絕。四逆湯主之。388

¹「霍亂自吐下又利止」同趙本，《脈經》卷八第四作「霍亂吐利止」，《千金翼》卷十霍亂病狀第六作「霍亂吐下利止」，《玉函》卷四第十一作「吐下利止」。

²趙本「脈微」下有「一作緩」小字註釋。「利止亡血也」同趙本、成本、《玉函》卷四第十一，《千金翼》卷十霍亂病狀第六作「利止必亡血」。

³「理中湯」同《千金翼》卷十霍亂病狀第六、《玉函》卷四第十一，趙本、成本作「理中丸」。唐弘宇按：霍亂病勢急劇，當用湯劑，故從《千金翼》、《玉函》。

吐利已斷。汗出而厥。四肢拘急不解。脉微欲絕。通脉四逆加豬膽汁湯主之。390⁴

吐利发汗後。其人脉平。小煩者。以新虛不勝穀气故也。391

⁴「吐利已斷」同《千金方》、趙本，《金匱要略》吳本、鄧本均作「吐已下斷」。

9.辨陰易病已後勞復¹

傷寒陰易之為病。其人身体重。少氣。少腹裏急。或引陰中拘攣。熱上衝胸。頭重不欲舉。眼中生眵。眼胞赤。膝脛拘急。燒裨散主之。392²

大病差後勞復者。枳實梔子湯主之。393

傷寒差已後。更發熱者。小柴胡湯主之。脈浮者。以汗解之。脈沈實者。以下解之。394³

大病差後。從腰以下有水氣者。牡蛎澤瀉散主之。395

傷寒解後。虛羸少氣。氣逆欲吐。竹葉石膏湯主之。397

大病差後。其人喜唾。久不了了者。胃上有寒。當溫之。宜理中丸。396⁴

病人脈已解。而日暮微煩者。以病新差。人強與穀。脾胃氣尚弱。不能消穀。故令微煩。損穀即愈。398

¹「陰易」除千金翼外其它版本均作「陰陽易」。

²「眼中生眵」同《千金方》卷十第三，趙本、成本、《玉函》卷四第十二作「眼中生花」，《外臺》卷二作「眼中生瞤」。趙本「眼中生花」下有「花一作眵」小字註釋。錢超塵說：「中國所藏五部宋本及日本內閣文庫坊刻本皆誤作「眵」，日本安正本改作「眵」，是。」從。「眼胞赤」同《玉函》卷四第十二，趙本、成本、《千金方》卷十第三、《外臺》卷二均無，《千金翼》卷十第七作「癰胞赤」。

³趙本「脈沈實」下有「一作緊」小字註釋。

⁴「胃上有寒」千金翼作「胸上有寒」。

10. 发汗吐下後

发汗後。身熱。又重发汗。胃中虛冷。必反吐也。0

大下後。口燥者。裏虛故也。0

发汗多。亡陽。狂語者。不可下。与柴胡桂枝湯。和其榮衛。以通津液。後自愈。

夫以为疾病至急。倉卒尋按。要者難得。故重集諸可与不可方治。比之三陰三陽篇中。此易見也。又时有不止是三陽三陰。出在諸可与不可中也。

1

¹錢超塵：『此五十六字叔和語，又見《金匱玉函經》卷五。王叔和《脉經》卷七第一節至第十八節為《傷寒論》條文，皆按可与不可排列，叔和謂之「諸可与不可」，是为叔和第一次整理者。然後又按三陽三陰整理，是为第二次整理。王叔和第三次整理者，見宋本《傷寒論》之辨不可发汗病脉証并治第十五至辨发汗吐下後病脉証并治第二十二。「重集」的原因是這些條文比放在三陰三陽中便於尋按。有些條文為三陰三陽所无，而是「出在諸可与不可中」，即出於《脉經》卷七諸可与不可。這類條文為數不多，故云「时有」。因可見《脉經》卷七諸可与不可基本為仲景《傷寒論》原始結構。換言之，《傷寒論》原始結構非按三陰三陽排列，而是按照「諸可与不可」結構排列，從兩漢文史及醫學文獻考察，辨証治療均按可与不可理法辨治，如《蘇武傳》、《華佗傳》等。王叔和拘於《素問熱論》一日傳一經之說，以为傷寒病亦如此除在《傷寒例》撰文解說外，又按照三陰三陽排列《傷寒論》經文。王叔和理解三陰三陽的意義與後世不同，王氏理解的三陰三陽是日傳一經的概念，這種痕跡在淳化本《傷寒論》和《病源》裏有明顯的反應。叔和又依当时辨証施治習慣，又進行第三次整理，形成諸可与不可諸條。』

第三部分

雜病論

11. 臟腑經絡先後

問曰。病人有氣色見於面部。願聞其說。

師曰。鼻頭色青。腹中痛。苦冷者死。鼻頭色微黑者。有水氣。色黃者。胸上有寒。色白者。亡血也。設微赤。非時者死。其目正圓者。瘡。不治。又色青為痛。色黑為勞。色赤為風。色黃者便難。色鮮明者有留飲。¹

師曰。病人語聲寂寂然。喜驚呼者。骨節間病。語聲喑喑然不徹者。心膈間病。語聲啾啾然細而長者。頭中病。

師曰。息搖肩者。心中堅。息引胸中上氣者。欬。息张口短氣者。肺痿唾沫。

師曰。吸而微數。其病在中焦。實也。當下之即愈。虛者不治。在上焦者。其吸促。在下焦者。其吸遠。此皆難治。呼吸動搖振振者。不治。

師曰。寸口脈動者。因其王時而動。假令肝王色青。四時各隨其色。肝色青而反色白。非其時色脈。皆當病。

問曰。有未至而至。有至而不至。有至而不去。有至而太過。何謂也。

師曰。冬至之後。甲子夜半少陽起。少陽之時陽始生。天得溫和。以未得甲子。天因溫和。此為未至而至也。以得甲子而天未溫和。此為至而不至也。以得甲子而天大寒不解。此為至而不去也。以得甲子而天溫如盛夏五六月時。此為至而太過也。

師曰。病人脈浮者在前。其病在表。浮者在後。其病在裏。腰痛背強不能行。必短氣而極也。

¹鄧本本段前有「問曰上工治未病」一段，吳本在臟腑經絡先後篇之前，未入正文，且此段文字都是無用不實之詞，故移至衍文部分。

問曰。經云。厥陽獨行。何謂也。

師曰。此為有陽無陰。故稱厥陽。

問曰。寸脈沈大而滑。沈則為實。滑則為氣。實氣相搏。血氣入臟即死。入腑即愈。此為卒厥。何謂也。

師曰。唇口青。身冷。為入臟即死。如身和。汗自出。為入腑即愈。

問曰。脈脫。入臟即死。入腑即愈。何謂也。

師曰。非為一病。百病皆然。譬如浸淫瘡。從口起流向四肢者。可治。從四肢流來入口者。不可治。諸病在外者可治。入裏者即死。

問曰。陽病十八。何謂也。

師曰。頭痛。項。腰。脊。臂。腳掣痛。

問曰。陰病十八。何謂也。

師曰。欬。上氣。喘。噦。咽。腸鳴。脹滿。心痛。拘急。五臟病各有十八。合為九十病。人又有六微。微有十八病。合為一百八病。五勞。七傷。六極。婦人三十六病。不在其中。清邪居上。濁邪居下。大邪中表。小邪中裏。穀飣之邪。從口入者。宿食也。五邪中人。各有法度。風中於前。寒中於暮。濕傷於下。霧傷於上。風令脈浮。寒令脈急。霧傷皮腠。濕流關節。食傷脾胃。極寒傷經。極熱傷絡。

問曰。病有急當救裏救表者。何謂也。

師曰。病。醫下之。續得下利。清穀不止。身體疼痛者。急當救裏。後身體疼痛。清便自調者。急當救表也。

夫病痼疾。加以卒病。當先治其卒病。後乃治其痼疾也。

師曰。五臟病各有所得者愈。五臟病各有所惡。各隨其所不喜者為病。病者素不應食。而反暴思之。必發熱也。

夫諸病在臟。欲攻之。當隨其所得而攻之。如渴者。與豬苓湯。餘皆仿此。

12. 痙濕喝¹

太陽病。發熱。無汗。反惡寒者。名曰剛痙。

太陽病。發熱。汗出。不惡寒者。名曰柔痙。

太陽病。發熱。脈沈細者。名曰痙。為難治。

太陽病。發汗太多。因致痙。²

病者身熱足寒。頸項強急。惡寒。時頭熱。面赤。目赤。獨頭動搖。卒口噤。背反張者。痙病也。³

痙病。發其汗者。寒濕相得。其表益虛。即惡寒甚。發其汗已。其脈如蛇。暴腹脹大者。為欲解。脈如故。反伏弦者。痙。⁴

夫風病。下之則痙。復發汗。必拘急。

夫痙脈。按之緊如弦。直上下行。⁵

痙病有灸瘡。難治。

瘡家。雖身疼痛。不可發汗。汗出則痙。85

太陽病。其証備。身體強。几几然。脈反沈遲。此為痙。栝蒌桂枝湯主之。

¹本篇見於《金匱要略》吳本、《金匱要略》鄧本、《玉函》、《千金翼》、《脈經》，對比可見前二者為一個系統的傳本，後三者為另一系統，兩系統差別較大。

²《脈經》、《玉函》、《千金翼》「發汗太多」作「發其汗」。

³「目赤」同《脈經》、《玉函》、《千金翼》、吳本，鄧本作「目赤」。

⁴「痙病」鄧本作「若」。

⁵鄧本此條末有「一作築築而弦脈經云痙家其脈伏堅直上下」十八字雙行小字註釋。

太陽病。无汗。而小便反少。气上衝胸。口噤不得語。欲作剛瘕。葛根湯主之。

剛瘕为病。胸滿。口噤。卧不著席。腳攣急。其人必齮齒。可与大承气湯。

6

太陽病。關節疼痛而煩。脉沈而細者。此名濕痺。濕痺之候。其人小便不利。大便反快。但当利其小便。

濕家之为病。一身盡疼。发热。身色如熏黄。⁷

濕家。其人但頭汗出。背强。欲得被覆向火。若下之早則噦。或胸滿。小便不利。舌上如胎。以丹田有熱。胸上有寒。渴欲得飲而不能飲。則口燥煩也。⁸

濕家下之。額上汗出。微喘。小便利者死。下利不止者亦死。⁹

問曰。風濕相搏。一身盡疼痛。法当汗出而解。值天陰雨不止。醫云此可发汗。汗之病不愈者。何也。

答曰。发其汗。汗大出者。但風气去。濕气仍在。是故不愈也。若治風濕者。发其汗。但微微似欲出汗者。則風濕俱去也。

濕家。病身上疼痛。发热。面黄而喘。頭痛。鼻塞而煩。其脉大。自能飲食。腹中和。无病。病在頭中寒濕。故鼻塞。内藥鼻中則愈。

濕家。身煩疼。可与麻黄加术湯。发其汗为宜。慎不可以火攻之。¹⁰

病者一身盡疼。发热。日晡所劇者。此名風濕。此病傷於汗出当風。或久

⁶「剛瘕」鄧本作「瘕」。

⁷鄧本「一身盡疼」下有「一云疼煩」小字注釋。

⁸「小便不利」同吳本、鄧本、《玉函》卷二第一、趙本卷二辨瘕濕喝，《千金翼》卷九第一、《脉經》卷八第二作「小便利」。

⁹吳本「小便利」下有「一云不利」小字注釋。

¹⁰「麻黄加术湯」同鄧本，吳本作「麻黄湯加术四兩」。

傷取冷所致也。可与麻杏薏甘湯。

風濕。脉浮。身重。汗出。惡風者。防己黃耆湯主之。

傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔。不渴。脉浮虛而澀者。桂枝附子湯主之。若其人大便堅。小便自利者。朮附子湯主之。174

11

風濕相搏。骨節疼煩。掣痛。不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風。不欲去衣。或身微腫者。甘草附子湯主之。

太陽中熱者。喝是也。其人汗出。惡寒。身熱而渴。白虎加人參湯主之。¹²

太陽中喝。身熱疼重。而脉微弱。此以夏月傷冷水。水行皮膚中所致也。瓜蒂湯主之。

太陽中喝。發熱。惡寒。身重而疼痛。其脉弦細芤遲。小便已。洒洒然毛聳。手足逆冷。小有勞。身即熱。口開。前板齒燥。若發其汗。則惡寒甚。加溫針。則發熱甚。數下之。則淋甚。

¹¹「朮附子湯」同吳本，鄧本作「去桂加白朮湯」。

¹²吳本本條末有「一方白虎湯主之」小字註釋。

13. 百合狐惑陰陽毒¹

論曰。百合病者。百脉一宗。悉致其病也。意欲食復不能食。常默默。欲得卧復不能卧。欲出行復不能行。飲食或有美時。或有不用聞食飲臭時。如寒无寒。如熱无熱。口苦。小便赤。諸藥不能治。得藥則劇吐利。如有神靈者。身形如和。其脉微數。每尿時頭痛者。六十日乃愈。若尿時頭不痛。淅然者。四十日愈。若尿快然。但頭眩者。二十日愈。其証或未病而預見。或病四五日而出。或病二十日或一月微見者。各隨証治之。

治百合病。发汗後者。百合知母湯。

治百合病。下之後者。百合滑石代赭湯。

治百合病。吐之後者。百合雞子湯。

治百合病。不經吐下发汗。病形如初者。百合地黄湯。

治百合病。一月不解。變成渴者。百合洗方。渴不差者。栝蒌牡蛎散。²

治百合病。變發熱者。百合滑石散。

治百合病。變腹中滿痛者。但取百合根隨多少。熬令黃色。搗篩為散。飲服方寸匕。日三。滿消痛止。³

¹唐弘宇按：百合病篇与其它篇有一个明顯的不同，那就是其它篇章顯然經過了重新整理，而本篇似乎本來就是一個整體。在較早期的文獻如《千金方》、《醫心方》中，《傷寒雜病論》的其它條文往往是散落在全書各處，而本篇卻是作為一個未被拆分的整體而存在。另外，《醫心方》所載的本篇方劑，都是在條文後直接給出方劑的藥物組成，无方名。據此猜測，本篇方劑的名稱，「百合知母湯」、「百合滑石代赭湯」、「百合雞子湯」、「百合地黄湯」、「栝蒌牡蛎散」、「百合滑石散」，可能都是後來所起。以《醫心方》所載本篇的條文和方劑相結合的結構來看，《傷寒雜病論》前條文後方劑的結構，不適合本篇。

²《千金方》「渴不差者栝蒌牡蛎散主之」為注文。

³此條《金匱要略》吳本、鄧本均无，從《千金方》補入。

百合病。見於陰者。以陽法救之。見於陽者。以陰法救之。見陽攻陰。復發其汗。此為逆。見陰攻陽。乃復下之。此亦為逆。

狐惑之為病。狀如傷寒。默默欲眠。目不得閉。卧起不安。蝕於喉為惑。蝕於陰為狐。不欲飲食。惡聞食臭。其面目乍赤乍黑乍白。蝕於上部則聲喝。甘草瀉心湯主之。蝕於下部則咽乾。苦參湯洗之。蝕於肛者。雄黃熏之。

病者脉數。无熱。微煩。默默。但欲卧。汗出。初得之三四日。目赤如鳩眼。七八日目四眦黑。若能食者。膿已成也。赤小豆當歸散主之。

陽毒之為病。面赤斑斑如錦文。喉咽痛。唾膿血。五日可治。七日不可治。陰毒之為病。面目青。身痛。狀如被打。喉咽痛。死生與陽毒同。升麻鳖甲湯并主之。

14. 瘧

師曰。瘧脉自弦。弦數者多熱。弦遲者多寒。弦小緊者下之差。弦遲者可溫之。弦緊者可發汗針灸也。浮大者可吐之。弦數者風疾也。以飲食消息止之。¹

問曰。瘧以月一日發。當以十五日愈。設不差。當月盡解也。如其不差。當云何。

師曰。此結為癰瘕。名曰瘧母。急治之。宜鱉甲煎丸。

師曰。陰氣孤絕。陽氣獨發。則熱而少氣。煩滿。手足熱而欲嘔。名曰瘧瘧。若但熱不寒者。邪氣內藏於心。外舍分肉之間。令人消鑠脫肉。²

溫瘧者。其脉如平。身無寒。但熱。骨節疼痛。時嘔。白虎加桂枝湯主之。

瘧。多寒者。名曰牡瘧。蜀漆散主之。

附方

治牡瘧。牡蠣湯。

瘧病發渴者。与小柴胡去半夏加栝蒌湯。

柴胡桂薑湯。此方治寒多微有熱。或但寒不熱。服一劑如神。故錄之。

¹「風疾」鄧本作「風發」。

²「煩滿」鄧本作「煩冤」。

15. 中風歷節

夫風之为病。当半身不遂。或但臂不遂者。此为痹。脉微而數。中風使然。

寸口脉浮而緊。緊則为寒。浮則为虛。寒虛相搏。邪在皮膚。浮者血虛。絡脉空虛。賊邪不瀉。或左或右。邪气反緩。正氣即急。正氣引邪。喎僻不遂。邪在於絡。肌膚不仁。邪在於經。即重不勝。邪入於腑。即不識人。邪入於臟。舌即難言。口吐涎。¹

大風。四肢煩重。心中惡寒不足者。侯氏黑散主之。²

寸口脉遲而緩。遲則为寒。緩則为虛。榮緩則为亡血。衛緩則为中風。邪气中經。則身癢而癰疹。心气不足。邪气入中。則胸滿而短气。³

風引湯。除熱。主癰癩。

病如狂狀。妄行。獨語不休。无寒熱。其脉浮。防己地黄湯主之。

頭風摩散。

寸口脉沈而弱。沈即主骨。弱即主筋。沈即为腎。弱即为肝。汗出入水中。如水傷心。歷節黃汗出。故曰歷節。

趺陽脉浮而滑。滑則穀气实。浮則汗自出。

少陰脉浮而弱。浮則为風。弱則血不足。風血相搏。即疼痛如掣。

盛人脉濇小。短气。自汗出。歷節疼。不可屈伸。此皆飲酒。汗出当風所

¹「口吐涎」同鄧本，吳本作「口吐於涎」。

²吳本本條末有「外臺治風癰」小字註釋。

³此條吳本无。

致。

諸肢節疼痛。身體尠羸。腳腫如脫。頭眩短氣。溫溫欲吐。桂枝芍藥知母湯主之。⁴

味酸則傷筋。筋傷則緩。名曰泄。鹹則傷骨。骨傷則痿。名曰枯。枯泄相搏。名曰斷泄。榮氣不通。衛不獨行。榮衛俱微。三焦无所御。四屬斷絕。身體羸瘦。獨足腫大。黃汗出。脛冷。假令發熱。便為歷節也。⁵

病歷節。疼痛。不可屈伸。烏頭湯主之。

烏頭湯。治腳氣。疼痛。不可屈伸。⁶

礬石湯。治腳氣衝心。

附方

續命湯。治中風痲。身體不能自收。口不能言。冒昧不知痛處。或拘急。不得轉側。姚云。與大續命同。兼治婦人產後去血者。及老人小兒。⁷

治中風。手足拘急。百節疼痛。煩熱心亂。惡寒。經日不欲飲食。三黃湯。

治風虛。頭重眩。苦極。不知食味。暖肌補中。益精氣。朮附子湯。⁸

治腳氣上入。少腹不仁。服八味丸。⁹

⁴唐弘字按：「尠羸」二字，諸本寫法不同，吳本作「尠瘵」。陸淵雷說：「尠羸是短小瘦弱之意，此非歷節之主証。趙本作尠羸，不誤，狀關節之腫大也。」從。

⁵此條吳本无。

⁶此條吳本无。

⁷「姚云」至「小兒」二十一字，鄧本作小字註釋，吳本作正文。從鄧本。

⁸吳本本條末有「方見風濕中見近效」小字註釋。《外臺祕要風頭眩方》載：「《近效》朮附子湯，有桂心，无生薑、大棗」，并云：「此本仲景《傷寒論》方。」

⁹《外臺祕要腳氣不隨方》載崔氏方五首，其中第四首云：「若腳氣上入少腹，少腹不仁，即服張仲景八味丸。」此方中用山茱萸五兩，澤瀉四兩，桂心三兩，附子二兩，餘與《金匱》同。推測本方當是仲景方，是崔氏將此方用於腳氣病，後人便命名此方為崔氏八味丸。《金匱玉函要略方論輯義》：「《舊唐書經籍志》云：《崔氏纂要方》十卷，崔知悌撰。《新唐書藝文志》作崔行功撰。所謂崔氏

治肉極。熱則身體津液脫。腠理開。汗大泄。厉風氣。下焦腳弱。越婢加朮湯。¹⁰

其人也，不知者或以为仲景收錄崔氏之方，故詳及之。」

¹⁰唐弘宇按：《千金方》有很长一段文字解釋肉極，此條僅由這段話中不相連的幾句拼接而成。

16. 血痹虛勞

問曰。血痹病從何得之。

師曰。夫尊樂人。骨弱肌膚盛。重因疲勞汗出。卧不時動搖。加被微風。遂得之。但以脉自微澹。在寸口。關上小緊。宜針引陽氣。令脉和緊去則愈。

血痹。陰陽俱微。寸口關上微。尺中小緊。外証身體不仁。如風狀。黃耆桂枝五物湯主之。¹

夫男子平人。脉大為勞。極虛亦為勞。

男子面色薄者。主渴及亡血。卒喘悸。脉浮者。裏虛也。

男子脉虛沈弦。无寒熱。短氣。裏急。小便不利。面色白。時目瞑。兼衄。少腹滿。此為勞使之然。

勞之為病。其脉浮大。手足煩。春夏劇。秋冬差。陰寒精自出。痠削不能行。

男子脉浮弱而澹。为无子。精清冷。²

夫失精家。少腹弦急。陰頭寒。目眩。髮落。脉極虛芤遲。为清穀。亡血。失精。脉得諸芤動微緊。男子失精。女子夢交。桂枝加龙骨牡蛎湯主之。天雄散亦主之。³

¹「如風狀」同吳本，鄧本作「如風痺狀」。

²吳本「精清冷」下有「一作冷」小字註釋。「精清冷」同吳本，鄧本作「精氣清冷」。唐弘宇按：鄧本「精氣清冷」義晦。《漢語大字典》：「冷：水清貌。」《漢語大詞典》：「冷：清涼，冷清。」《玉篇·水部》：「冷，清也。」《改併四聲篇海·水部》引《玉篇》：「冷，水清貌。」吳本「精清冷」義勝。

³吳本「目眩」下有「一作目眶痛」小字註釋。「天雄散亦主之」鄧本作「天雄散」，獨立成一條。

男子平人。脉虛弱細微者。善盜汗也。

人年五六十。其病脉大者。痺俠背行。苦腸鳴。馬刀俠癭者。皆為勞得之。

4

脉沈小遲。名脫氣。其人疾行則喘喝。手足逆寒。腹滿。甚則溏泄。食不消化也。

脉弦而大。弦則為減。大則為芤。減則為寒。芤則為虛。虛寒相搏。此名為革。婦人則半產漏下。男子則亡血失精。⁵

虛勞。裏急。悸。衄。腹中痛。夢失精。四肢痠疼。手足煩熱。咽乾口燥。小建中湯主之。

虛勞。裏急。諸不足。黃耆建中湯主之。

虛勞。腰痛。少腹拘急。小便不利者。八味腎氣丸主之。

虛勞。諸不足。風氣百疾。薯蕷丸主之。

虛勞。虛煩。不得眠。酸棗仁湯主之。

虛勞。煩。悸。不得眠。酸棗湯主之。千

五勞。虛極。羸瘦。腹滿。不能飲食。食傷。憂傷。飲傷。房室傷。飢傷。勞傷。經絡榮衛氣傷。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。緩中補虛。大黃廬虫丸主之。

附方

虛勞不足。汗出而悶。脉結。心悸。行動如常。不出百日。危急者。十一

⁴吳本本條末有「脉經云人年五六十其脉浮大者」小字註釋。

⁵吳遷在本條後有一條校註文字：「右四條。古本并無。鄧氏所編金匱方卻有之。今依補入。并見脉經第八卷虛勞脉証第六。」唐弘字按：此條亦見於驚悸衄吐下血胸滿瘀血篇。

日死。炙甘草湯主之。

治冷勞。又主鬼疰。一門相染。獺肝散。⁶

⁶吳本本條末有「見肘後恐非仲景方」小字註釋。

17. 肺痿肺癰欬嗽上气

問曰。熱在上焦者。因欬為肺痿。肺痿之病。何從得之。

師曰。或從汗出。或從嘔吐。或從消渴。小便利數。又被快藥下利。重亡津液。故得之。¹

問曰。寸口脈數。其人欬。口中反有濁唾涎沫者何。

師曰。此為肺痿之病。若口中辟辟燥。欬即胸中隱隱痛。脈反滑數。此為肺癰。欬唾膿血。脈數虛者為肺痿。數實者為肺癰。

問曰。病欬逆。脈之何以知此為肺癰。當有膿血。吐之則死。其脈何類。

師曰。寸口脈微而數。微則為風。數則為熱。微則汗出。數則惡寒。風中於衛。呼氣不入。熱過於榮。吸而不出。風傷皮毛。熱傷血脈。風舍於肺。其人則欬。口乾。喘滿。咽燥。不渴。時唾濁沫。時振寒。熱之所過。血為凝滯。畜結癰膿。吐如米粥。始萌可救。膿成則死。

上气。面浮腫。肩息。其脈浮大。不治。又加利尤甚。

上气。躁而喘者。屬肺脹。欲作風水。發汗則愈。

肺痿。吐涎沫。而不能欬者。其人不渴。必遺尿。小便數。所以然者。以上虛不能制下故也。此為肺中冷。必眩。甘草乾薑湯以溫其病。²

欬而上气。喉中水雞聲。射干麻黃湯主之。

欬逆。氣上衝。唾濁。但坐不得卧。皂莢丸主之。³

¹鄧本「小便利數」後有「或從便難」四字。

²鄧本「必眩」後有「多涎唾」三字。鄧本本條末有「若服湯已渴者屬消渴」九字，吳本作「服湯已小溫覆之若渴者屬消渴」十三字，且為方後註釋，未入正文，脈經無。

³「氣上衝」鄧本作「上氣時時」。

上气。脉浮者。厚朴麻黄湯主之。脉沈者。澤漆湯主之。⁴

火逆上气。咽喉不利。止逆下气者。麥門冬湯主之。⁵

肺癰。喘不得卧。葶藶大棗瀉肺湯主之。

欬而胸滿。振寒。脉數。咽乾。不渴。时出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。为肺癰。桔梗湯主之。

欬逆倚息。此为肺脹。其人喘。目如脱狀。脉浮大者。越婢加半夏湯主之。

⁶

肺脹。欬而上气。煩躁而喘。脉浮者。心下有水。小青龙加石膏湯主之。

附方

肺痿。涎唾多。心中温温液液者。炙甘草湯主之。⁷

甘草湯。

肺痿。欬唾涎沫不止。咽燥而渴。生薑甘草湯主之。

肺痿。吐涎沫。桂枝去芍藥加皂莢湯主之。

欬而胸滿。振寒。脉數。咽乾。不渴。时出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。为肺癰。桔梗白散主之。

治肺癰。葦湯。⁸

⁴「上气」鄧本作「欬而」。

⁵「火逆」諸本均作「大逆」，編者改。

⁶「欬逆倚息」鄧本作「欬而上气」。

⁷吳本本條末有「方見虛勞門中。見外臺。」小字註釋。

⁸此條吳本与鄧本差別較大，鄧本作「葦莖湯治欬有微熱煩滿胸中甲錯是为肺癰」，方中吳本用葦葉，鄧本用葦莖。

肺癰。胸滿脹。一身面目浮腫。鼻塞。清涕出。不聞香臭酸辛。欬逆上气。喘鳴迫塞。葶藶大棗瀉肺湯主之。

欬而上气。肺脹。其脉浮。心下有水气。脇下痛引缺盆。小青龙加石膏湯主之。

18. 奔豚气吐膿驚怖火邪¹

師曰。病有奔豚。有吐膿。有驚怖。有火邪。此四部病。皆從驚发得之。

師曰。奔豚病者。從少腹起。上衝咽喉。发作欲死。復還止。皆從驚恐得之。

奔豚。气上衝胸。腹痛。往來寒熱。奔豚湯主之。

燒針令其汗。針处被寒。核起而赤者。必发奔豚。气從少腹上衝心者。灸其核上各一壯。与桂枝加桂湯。117²

发汗後。其人脐下悸。欲作奔豚。苓桂甘棗湯主之。65

夫嘔家有癰膿。不可治嘔。膿盡自愈。376³

排膿散。⁴

排膿湯。⁵

寸口脉動而弱。動則为驚。弱則为悸。⁶

火邪者。桂枝去芍藥加蜀漆牡蛎龙骨救逆湯主之。⁷

¹唐弘宇按：本篇的篇名原为「奔豚气病脉証并治」，僅有奔豚气一証。但本篇第一條卻提到奔豚、吐膿、驚怖、火邪四種疾病，(未完)

²鄧本「燒針」上有「發汗後」三字。

³本條原載於《金匱要略》嘔吐篇。

⁴本條原載於《金匱要略》瘡癰篇。

⁵本條原載於《金匱要略》瘡癰篇。

⁶本條原載於《金匱要略》驚悸吐衄下血胸滿瘀血篇。

⁷唐弘宇按：本條原載於《金匱要略》驚悸吐衄下血胸滿瘀血篇，本條實際內容与篇名不符，今移至此。

傷寒。脉浮。醫以火迫劫之。亡陽。必驚狂。卧起不安。桂枝去芍藥加蜀漆牡蛎龙骨救逆湯主之。112⁸

傷寒。其脉不弦緊而弱。弱者必渴。被火必譫語。弱者。發熱。脉浮。解之当汗出愈。113

太陽病。以火熏之。不得汗。其人必躁。到經不解。必清血。114⁹

太陽病。以火蒸之。不得汗者。其人必燥結。若不結。必下清血。其脉躁者。必發黃也。**淳**114

脉浮。熱甚。而反灸之。此為實。實以虛治。因火而動。咽燥。必吐血。115

微數之脉。慎不可灸。因火為邪。則為煩逆。追虛逐實。血散脉中。火氣雖微。內攻有力。焦骨傷筋。血難復也。116

凡微數之脉。不可灸。因熱為邪。必致煩逆。內有損骨傷筋血枯之患。**淳**116

脉浮。当以汗解。而反灸之。邪無從出。因火而盛。病從腰以下必重而痹。此為火逆。若欲自解。当先煩。煩乃有汗。隨汗而解。何以知之。脉浮。故知汗出当解。116

脉当以汗解。反以灸之。邪無所去。因火而盛。病当必重。此為逆治。若欲解者。当發其汗而解也。**淳**116

燒針令其汗。針處被寒。核起而赤者。必發奔豚。氣從少腹上衝心者。灸其核上各一壯。与桂枝加桂湯。117

火逆。下之。因燒針。煩躁者。桂枝甘草龙骨牡蛎湯主之。118

傷寒。加溫針必驚。119

⁸第112至119條原載於《傷寒論》太陽病篇。

⁹趙本「必清血」下有「名為火邪」四字。

19. 胸痹心痛短气

師曰。夫脉当取太過与不及。陽微陰弦。即胸痹而痛。所以然者。責其極虛也。今陽虛。知在上焦。所以胸痹心痛者。以其陰弦故也。

平人无寒熱。短气不足以息者。實也。

胸痹之病。喘息欬唾。胸背痛。短气。寸口脉沈而遲。關上小緊數。栝蒌薤白白酒湯主之。¹

胸痹。不得卧。心痛徹背者。栝蒌薤白半夏湯主之。

胸痹。心中痞。留气結在胸。胸滿。脇下逆搶心。枳實薤白桂枝湯主之。理中湯亦主之。

胸痹。胸中气塞。短气。茯苓杏仁甘草湯主之。橘皮枳實生薑湯亦主之。

胸痹緩急者。薏苡仁附子散主之。

心中痞。諸逆。心懸痛。桂枝生薑枳實湯主之。

心痛徹背。背痛徹心。烏頭赤石脂丸主之。

九痛丸。治九種心痛。一虫心痛。二疰心痛。三風心痛。四悸心痛。五食心痛。六飲心痛。七冷心痛。八熱心痛。九去來心痛。²

¹「胸背痛」同鄧本，吳本作「胸苦痛」。

²從「一虫心痛」至「九去來心痛」三十七字，《金匱要略》諸本均无，劇《千金方》補。

20. 腹滿寒疝宿食

趺陽脉微弦。法当腹滿。不滿者必便難。兩脇疼痛。此虛寒從下上也。当以溫藥服之。

病者腹滿。按之不痛者為虛。痛者為實。可下之。舌黃未下者。下之黃自去。

傷寒。腹滿。按之不痛者為虛。痛者為實。当下之。舌黃未下者。下之黃自去。宜大承氣湯。**函**

腹滿時減。復如故。此為寒。当與溫藥。

病者痿黃。躁而不渴。胸中寒實。而利不止者。死。

寸口脉弦者。即脇下拘急而痛。其人嗇嗇惡寒也。

夫中寒家。喜欠。其人清涕出。發熱。色和者。善噦。

中寒。其人下利。以裏虛也。欲噦不能。此人肚中寒。

夫瘦人繞臍痛。必有風冷。穀氣不行。而反下之。其氣必衝。不衝者。心下則痞。

病腹滿。發熱十日。脉浮而數。飲食如故。厚朴七物湯主之。

厚朴湯。治腹滿。發數十日。脉浮數。食飲如故。**心**¹

腹中寒氣。雷鳴。切痛。胸脇逆滿。嘔吐。附子粳米湯主之。

¹《醫心方》此條中的厚朴湯，其組成與《金匱》厚朴三物湯相同。

腹滿。脉數。厚朴三物湯主之。²

病腹中滿痛者。此为実也。当下之。宜大柴胡湯。³

腹滿不減。減不足言。当下之。宜大承氣湯。255

心胸中大寒痛。嘔。不能飲食。腹中寒。上衝皮起。出見有頭足。上下痛而不可觸近。大建中湯主之。

脇下偏痛。發熱。其脉緊弦。此寒也。以溫藥下之。宜大黃附子湯。⁴

寒氣厥逆。赤丸主之。

寸口脉弦而緊。弦則衛氣不行。衛氣不行即惡寒。緊則不欲食。弦緊相搏。即为寒疝。寒疝繞臍痛。若發則白汗出。手足厥寒。其脉沈弦者。大烏頭煎主之。

寒疝。腹中痛。及脇痛。裏急者。當歸生薑羊肉湯主之。

寒疝。腹中痛。逆冷。手足不仁。若身疼痛。灸刺諸藥不能治。抵當烏頭桂枝湯主之。⁵

附方

烏頭湯。治寒疝。腹中絞痛。賊風入腹。攻五臟。拘急不得轉側。叫呼。發作有時。使人陰縮。手足厥逆。

夫脉浮而緊乃弦。狀如弓弦。按之不移。脉數弦者。当下其寒。脉雙弦而

²此條鄧本作「痛而閉者厚朴三物湯主之」。

³此條鄧本作「按之心下滿痛者此为実也当下之宜大柴胡湯」。唐弘宇按：此篇為腹滿篇，鄧本卻是「心下滿」，誤。

⁴脉經无「發熱」二字。「緊弦」同鄧本，吳本作「弦緊」。唐弘宇按：根據臨床，寒實內結，腹痛便秘証，有時可見發熱症狀，但發熱不一定是全身性的，可以在某一局部出現，故「發熱」亦可與上句連讀為一句。

⁵「若身疼痛」同鄧本，吳本「若」作「者」，與上句連讀。

遲者。必心下堅。脉大而緊者。陽中有陰。可下之。⁶

寒疝。腹中痛者。柴胡桂枝湯主之。⁷

卒疝。走馬湯主之。⁸

問曰。人病有宿食。何以別之。

師曰。寸口脉浮而大。按之反濇。尺中亦微而濇。故知有宿食。大承氣湯主之。

脉緊如轉索無常者。有宿食也。

脉緊。頭痛。風寒。腹中有宿食不化也。⁹

脉數而滑者。實也。此有宿食。下之愈。宜大承氣湯。

下利。不欲食者。有宿食也。當下之。宜大承氣湯。

宿食在上脘。當吐之。宜瓜蒂散。

⁶鄧本此條的位置與吳本不同。「夫脉浮」同吳本，鄧本作「其脉數」。「雙弦」鄧本作「緊大」。

⁷此條鄧本作「柴胡桂枝湯治心腹卒中痛者」。

⁸此條鄧本作「走馬湯治中惡心痛腹脹大便不通」。

⁹吳本本條末有「一云寸口脉緊」小字註釋。

21. 五臟風寒積聚

肺中風者。口燥而喘。身運而重。冒而腫脹。

肺中寒者。吐濁涕。

肺死臟。浮之虛。按之弱如蔥葉。下无根者。死。

肝中風者。頭目瞶。兩脇痛。行常傴。令人嗜甘。

肝中寒者。兩臂不舉。舌本燥。喜太息。胸中痛。不得轉側。食則吐而汗出也。¹

肝死臟。浮之弱。按之如索不來。或曲如蛇行者。死。

肝著。其人常欲蹈其胸上。先未苦時。但欲飲熱。旋覆花湯主之。²

心中風者。翕翕發熱。不能起。心中飢而欲食。食即嘔吐。³

心中寒者。其人苦病心如啖蒜狀。劇者心痛徹背。背痛徹心。譬如蟲注。其脈浮者。自吐乃愈。

心傷者。其人勞倦即頭面赤而下重。心中痛而自煩。發熱。當臍跳。其脈弦。此為心臟傷所致也。

心死臟。浮之實如豆麻。按之益躁疾者。死。

邪哭使魂魄不安者。血氣少也。血氣少者。屬於心。心氣虛者。其人則畏。

¹「兩臂」同鄧本，吳本作「兩脇」。吳本本條末有「脈經千金云時盜汗飲食已吐其汁」小字註釋。

²臣億等校。諸本旋覆花湯方本闕。

³吳本、《千金方》有「而欲食」三字，鄧本无。

合目欲眠。夢遠行。而精神離散。魂魄妄行。陰氣衰者為癲。陽氣衰者為狂。

脾中風者。翕翕發熱。形如醉人。腹中煩重。皮肉瞢瞢而短氣。

脾死臟。浮之大堅。按之如覆杯潔潔。狀如搖者。死。⁴

跌陽脈浮而濇。浮則胃氣強。濇則小便數。浮濇相搏。大便則堅。其脾為約。麻子仁丸主之。

腎著之病。其人身體重。腰中冷。如坐水中。形如水狀。反不渴。小便自利。食飲如故。病屬下焦。身勞汗出。衣裏冷濕。久久得之。腰以下冷痛。腹重如帶五千錢。甘草乾薑茯苓白朮湯主之。⁵

腎死臟。浮之堅。按之亂如轉丸。益下入尺中者。死。

問曰。三焦竭部。上焦竭善噫。何謂也。

師曰。上焦受中焦氣未和。不能消穀。故令噫耳。下焦竭。則遺尿。失便。其氣不和。不能自禁制。不須治。久自愈。

師曰。熱在上焦者。因欬為肺痿。熱在中焦者。則為堅。熱在下焦者。則尿血。亦令淋閉不通。

大腸有寒者。多驚漉。有熱者。便腸垢。

小腸有寒者。其人下重。便血。有熱者。必痔。

問曰。病有積。有聚。有癥氣。何謂也。

師曰。積者。臟病也。終不移。聚者。腑病也。發作有時。展轉痛移。為可治。癥氣者。脇下痛。按之則愈。復發為癥氣。諸積大法。脈來細而附骨者。乃積也。寸口。積在胸中。微出寸口。積在喉中。關上。積在臍傍。

⁴臣億等詳。五臟各有中風中寒。今脾只載中風。腎中風中寒俱不載者。古文簡亂。亡失極多。去古既遠。無文可以補綴也。

⁵吳本「身勞汗出」前有「從」字。

上関上。積在心下。微下関。積在少腹。尺中。積在气衝。脉出左。積在左。脉出右。積在右。脉兩出。積在中央。各以其部処之。

22. 痰飲欬嗽

問曰。夫飲有四。何謂也。

師曰。有痰飲。有懸飲。有溢飲。有支飲。

問曰。四飲何以為異。

師曰。其人素盛今瘦。水走腸間。漑漑有聲。謂之痰飲。飲後水流在脇下。欬唾引痛。謂之懸飲。飲水流行。歸於四肢。當汗出而不汗出。身體疼重。謂之溢飲。其人欬逆。倚息。短氣。不得卧。其形如腫。謂之支飲。¹

水在心。心下堅築築。短氣。惡水。不欲飲。

水在肺。吐涎沫。欲飲水。

水在脾。少氣。身重。

水在肝。脇下支滿。噎而痛。

水在腎。心下悸。

夫心下有留飲。其人背寒冷如手大。

留飲者。脇下痛引缺盆。欬嗽則輒已。

胸中有留飲。其人短氣而渴。四肢歷節痛。脉沈者。有留飲。

膈上之病。滿喘欬唾。發則寒熱。背痛。腰疼。目泣自出。其人振振身瞤劇。必有伏飲。²

夫病人卒飲水多。必暴喘滿。凡食少飲多。水停心下。甚者則悸。微者短

¹「漑漑」諸病源候論引作「漑漑」。

²「膈上之病」鄧本作「膈上病痰」。「欬唾」鄧本作「欬吐」。

气。

脉雙弦者。寒也。皆大下後喜虛。脉偏弦者。飲也。³

肺飲不弦。但苦喘。短气。

支飲。亦喘而不能卧。加短气。其脉平也。

病痰飲者。当以温藥和之。

心下有痰飲。胸脇支滿。目眩。苓桂术甘湯主之。

夫短气。有微飲。当從小便去之。苓桂术甘湯主之。腎气丸亦主之。

病者脉伏。其人欲自利。利反快。雖利。心下續堅滿。此为留飲欲去故也。甘遂半夏湯主之。⁴

脉浮而細滑。傷飲。⁵

脉弦數。有寒飲。冬夏難治。⁶

脉沈而弦者。懸飲内痛。⁷

病懸飲者。十棗湯主之。

病溢飲者。当发其汗。大青龙湯主之。小青龙湯亦主之。⁸

膈間支飲。其人喘滿。心下痞堅。面色黎黑。其脉沈緊。得之數十日。醫吐下之不愈。木防己湯主之。虛者即愈。實者三日復发。復与不愈者。宜

³「喜虛」鄧本无「喜」字。

⁴「利反快」同鄧本，吳本作「利者反快」。

⁵此條吳本无。

⁶此條吳本无。

⁷此條吳本无。

⁸此條吳本作「病溢飲当发其汗宜大青龙湯」、「病溢飲者当发其汗宜小青龙湯」兩條。

去石膏加茯苓芒硝湯。⁹

心下有支飲。其人苦冒眩。澤瀉湯主之。

支飲。胸滿者。厚朴大黃湯主之。

支飲。不得息。葶藶大棗瀉肺湯主之。

嘔家本渴。渴者為欲解。今反不渴。心下有支飲故也。小半夏湯主之。¹⁰

腹滿。口舌乾燥。此腸間有水氣。防己椒目葶藶大黃丸主之。

卒嘔吐。心下痞。膈間有水。眩悸者。小半夏加茯苓湯主之。

假令瘦人臍下悸。吐涎沫而癰眩。此水也。五苓散主之。¹¹

附方

主心胸中有停痰宿水。自吐出水後。心胸間虛。氣滿。不能食。消痰氣。令能食。茯苓飲。

欬家。其脈弦。為有水。可與十棗湯。

夫有支飲家。欬煩。胸中痛者。不卒死。至一百日一歲。與十棗湯。

久欬數歲。其脈弱者可治。實大數者死。其脈虛者必苦冒。其人本有支飲在胸中故也。治屬飲家。

欬逆倚息。小青龍湯主之。¹²

⁹「虛者」至「芒硝湯」二十五字同吳本，此段文字鄧本位於正文，吳本原位於煎服法之後，編者將其移至此。「宜去石膏加茯苓芒硝湯」鄧本作「宜木防己湯去石膏加茯苓芒硝湯主之」。

¹⁰鄧本本條末有「千金云小半夏加茯苓湯」小字註釋。吳本此註釋位於小半夏湯方劑之後。

¹¹「臍下悸」同《脈經》，吳本、鄧本作「臍下有悸」。

¹²鄧本「倚息」後有「不得卧」三字。

青龙湯下已。多唾。口燥。寸脉沈。尺脉微。手足厥逆。气從少腹上衝胸咽。手足痺。其人面翕然如醉。因復下流陰股。小便難。时復冒。可与茯苓桂枝五味子甘草湯。治其气衝。¹³

衝气即低。而反更欬滿者。用茯苓桂枝五味子甘草湯。去桂加乾薑細辛。以治其欬滿。¹⁴

欬滿則止。而復更渴。衝气復发者。以細辛乾薑为熱藥也。此法不当逐渴。而渴反止者。为支飲也。支飲法当冒。冒者必嘔。嘔者復内半夏。以去其水。¹⁵

水去。嘔則止。其人形腫。可内麻黄。以其欲逐痺。故不内麻黄。乃内杏仁也。若逆而内麻黄者。其人必厥。所以然者。以其人血虛。麻黄发其陽故也。¹⁶

若面熱如醉狀者。此为胃中熱。上熏其面令熱。加大黄湯和之。¹⁷

先渴卻嘔。为水停心下。此屬飲家。小半夏加茯苓湯主之。¹⁸

¹³「少腹」鄧本作「小腹」。「其人面翕然如醉」鄧本作「其面翕熱如醉狀」。「可与」鄧本作「者与」。

¹⁴「欬滿」鄧本作「欬胸滿」。「用茯苓桂枝五味子甘草湯」鄧本作「用桂苓五味甘草湯」，吳本作「因茯苓五味子甘草」。

¹⁵「此法不当逐渴」同吳本，鄧本作「服之当遂渴」。

¹⁶此條鄧本与吳本差異較大，鄧本作「水去。嘔止。其人形腫者。加杏仁主之。其証應内麻黄。以其人遂痺。故不内之。若逆而内之者。必厥。所以然者。以其人血虛。麻黄发其陽故也。」

¹⁷此條鄧本与吳本差異較大，鄧本作「若面熱如醉。此为胃熱上衝熏其面。加大黄以利之。」

¹⁸「先渴卻嘔」鄧本作「先渴後嘔」。「小半夏加茯苓湯」鄧本作「小半夏茯苓湯」。

23. 消渴小便不利淋

厥陰之为病。消渴。气上撞心。心中疼熱。飢而不欲食。甚者食則吐蛔。下之利不止。326

寸口脉浮而遲。浮即为虛。遲即为勞。虛則衛气不足。勞則榮气竭。趺陽脉浮而數。浮即为气。數即消穀而大便堅。气盛則洩數。洩數即堅。堅數相搏。即为消渴。¹

男子消渴。小便反多。以飲一斗。小便一斗。腎气丸主之。

脉浮。小便不利。微熱。消渴者。宜利小便。发汗。五苓散主之。

渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。五苓散主之。

渴欲飲水不止者。文蛤散主之。

淋之为病。小便如粟狀。小腹弦急。痛引脐中。

趺陽脉數。胃中有熱。即消穀引食。大便必堅。小便即數。

淋家不可发汗。发汗必便血。84

小便不利者。有水气。其人若渴。栝蒌瞿麥丸主之。²

小便不利。蒲灰散主之。滑石白魚散。茯苓戎鹽湯并主之。

渴欲飲水。口乾舌燥者。白虎加人參湯主之。

¹「大便堅」吳本作「矢堅」，鄧本作「大堅」，「便」字为編者所加。

²「若渴」徐本作「苦渴」。

脉浮。发熱。渴欲飲水。小便不利者。豬苓湯主之。

24. 水气

師曰。病有風水。有皮水。有正水。有石水。有黃汗。風水。其脉自浮。外証骨節疼痛。其人惡風。皮水。其脉亦浮。外証胛腫。按之沒指。不惡風。其腹如鼓。不渴。当发其汗。正水。其脉沈遲。外証自喘。石水。其脉自沈。外証腹滿。不喘。黃汗。其脉沈遲。身体發熱。胸滿。四肢頭面腫。久不愈。必致癰膿。

脉浮而洪。浮則為風。洪則為氣。風氣相擊。身体洪腫。汗出乃愈。惡風則虛。此為風水。不惡風者。小便通利。上焦有寒。其人多涎。此為黃汗。

1

寸口脉沈滑者。中有水氣。面目腫大。有熱。名曰風水。視人之目窠上微攢。如蠶新卧起狀。其頸脉動。时时欬。按其手足上。陷而不起者。風水。

2

太陽病。脉浮而緊。法当骨節疼痛。反不疼。身体反重而痠。其人不渴。汗出即愈。此為風水。惡寒者。此為極虛。发汗得之。渴而不惡寒者。此為皮水。身腫而冷。狀如周痺。胸中窒。不能食。反聚痛。暮躁不眠。此為黃汗。痛在骨節。欬而喘。不渴者。此為脾脹。其狀如腫。发汗即愈。然諸病此者。渴而下利。小便數者。皆不可发汗。

裏水者。一身面目自洪腫。其脉沈。小便不利。故令病水。假如小便自利。亡津液。故令渴也。³

¹「風氣相搏」吳本「搏」作「擊」，據鄧本改。此條鄧本與吳本差別較大，鄧本作「脉浮而洪。浮則為風。洪則為氣。風氣相搏。風強則為癰疹。身体為癢。癢為泄風。久為癰癰。氣強則為水。難以俛仰。風氣相擊。身体洪腫。汗出則愈。惡風則虛。此為風水。不惡風者。小便通利。上焦有寒。其口多涎。此為黃汗。」平脉法篇中此條重出，作「脉浮而大。浮為風虛。大為氣強。風氣相搏。必成癰疹。身体為癢。癢者名泄風。久久為癰癰。」

²吳本無此條。

³鄧本此條與上條合為一條。「自洪腫」同吳本，鄧本作「黃腫」。「此亡津液」吳本無「此」字，據

趺陽脉当伏。今反緊。本自有寒疝瘕。腹中痛。醫反下之。下之即胸滿短气。

趺陽脉当伏。今反數。本自有熱。消穀。小便數。今反不利。此欲作水。

寸口脉浮而遲。浮脉則熱。遲脉則潛。熱潛相搏。名曰沈。趺陽脉浮而數。浮脉則熱。數脉則止。熱止相搏。名曰伏。沈伏相搏。名曰水。沈則絡脉虛。伏則小便難。虛難相搏。水走皮膚。即为水矣。

寸口脉弦而緊。弦則衛气不行。衛气不行即惡寒。水不沾流。走於腸間。

少陰脉緊而沈。緊則为痛。沈則为水。小便即難。脉得諸沈。当責有水。身体腫重。水病脉出者死。

夫水病人。目下有卧蠱。面目鮮澤。脉伏。其人消渴。病水。腹大。小便不利。其脉沈絕者。有水。可下之。

問曰。病下利後。渴飲水。小便不利。腹滿。因腫者。何也。

答曰。此法当病水。若小便自利。及汗出者。自当愈。

心水者。其身重而少气。不得卧。煩而躁。其人陰腫。

肝水者。其腹大。不能自轉則。脇下腹痛。时时津液微生。小便續通。

肺水者。其身腫。小便難。时时鴨溇。

脾水者。其腹大。四肢苦重。津液不生。但苦少气。小便難。

腎水者。其腹大。脐腫。腰痛。不得尿。陰下濕如牛鼻上汗。其足逆冷。面反瘦。

師曰。諸有水者。腰以下腫。当利小便。腰以上腫。当发汗乃愈。

鄧本補。鄧本本條末有「越婢加术湯主之」七字，吳本无。

師曰。寸口脉沈而遲。沈則為水。遲則為寒。寒水相搏。趺陽脉伏。水穀不化。脾氣衰則驚漉。胃氣衰則身腫。少陰脉細。男子則小便不利。婦人則經水不通。經為血。血不利則為水。名曰血分。⁴

問曰。病者苦水。面目身體四肢皆腫。小便不利。脉之不言水。反言胸中痛。氣上衝咽。狀如炙肉。當微欬喘。審如師言。其脉何類。

師曰。寸口脉沈而緊。沈為水。緊為寒。沈緊相搏。結在閔元。始時當微。年盛不覺。陽衰之後。榮衛相干。陽損陰盛。結寒微動。腎氣上衝。喉咽塞噎。脇下急痛。醫以為留飲。而大下之。氣擊不去。其病不除。後重吐之。胃家虛煩。咽燥欲飲水。小便不利。水穀不化。面目手足浮腫。又與葶藶丸下水。當時如小差。食飲過度。腫復如前。胸脇苦痛。象若奔豚。其水揚溢。則浮欬喘逆。當先攻擊衛氣令止。乃治欬。欬止。其喘自差。先治新病。病當在後。

風水。脉浮。身重。汗出。惡風者。防己黃耆湯主之。腹痛者。加芍藥。

風水。惡風。一身悉腫。脉浮。不渴。續自汗出。無大熱。越婢湯主之。

皮水為病。四肢腫。水氣在皮膚中。四肢聶聶動者。防己茯苓湯主之。

裏水。越婢加朮湯主之。甘草麻黃湯亦主之。

水之為病。其脉沈小。屬少陰。浮者為風。無水。虛脹者為氣。水。發其汗即已。脉沈者。宜附子麻黃湯。浮者。宜杏子湯。⁵

厥而皮水者。蒲灰散主之。

問曰。黃汗之為病。身體腫。發熱。汗出而渴。狀如風水。汗沾衣。色正黃如檗汁。脉自沈。

問曰。何從得之。

⁴「少陰脉細」上鄧本有「少陽脉卑」四字。

⁵「附子麻黃湯」同吳本，鄧本作「麻黃附子湯」，本方所用藥物、劑量與趙本《傷寒論》「麻黃附子甘草湯」同。唐弘字按：杏子湯方未見，可能是大青龍湯。方名後小字註釋云：「恐是麻黃杏子甘草石膏湯」。

師曰。以汗出入水中浴。水從汗孔入得之。⁶

黃汗。黃耆芍藥桂枝苦酒湯主之。⁷

黃汗之病。兩脛自冷。假令發熱。此屬歷節。食已汗出。又身常暮卧盜汗出者。此勞氣也。若汗出已。反發熱者。久久其身必甲錯。發熱不止者。必生惡瘡。若身重。汗出已輒輕者。久久必身瞶瞶。即胸中痛。又從腰以上必汗出。下无汗。腰髀弛痛。如有物在皮中狀。劇者不能食。身疼重。煩躁。小便不利。此為黃汗。桂枝加黃耆湯主之。⁸

師曰。寸口脉遲而濇。遲則為寒。濇為血不足。跌陽脉微而遲。微則為氣。遲則為寒。寒氣不足。則手足逆冷。手足逆冷。則榮衛不利。榮衛不利。則腹滿脇鳴相逐。氣轉膀胱。榮衛俱勞。陽氣不通即身冷。陰氣不通即骨疼。陽前通則惡寒。陰前通則痺不仁。陰陽相得。其氣乃行。大氣一轉。其氣乃散。實則失氣。虛則遺尿。名曰氣分。

氣分。心下堅。大如盤。邊如旋杯。水飲所作。桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯主之。

心下堅。大如盤。邊如旋盤。水飲所作。枳實術湯主之。

附方

夫風水。脉浮為在表。其人或頭汗出。表无他病。病者但下重。故知從腰以上為和。腰以下當腫及陰。難以屈伸。防己黃耆湯主之。⁹

⁶「身體腫」《千金方》作「身體洪腫」。「汗出而渴」千金要方作「汗出不渴」。

⁷「黃汗黃耆芍藥桂枝苦酒湯主之」同吳本，鄧本作「宜耆芍桂枝苦酒湯主之」與上條合為一條。

⁸「桂枝加黃耆湯」同鄧本，吳本作「桂枝加黃耆五兩湯」。唐弘宇按：此處可以看出吳本更接近仲景書原本。

⁹吳本此條末有「方見風濕中。見外臺。出深師。」小字註釋。

25. 黄疸

論曰。黃有五種。有黃汗。黃疸。穀疸。酒疸。女勞疸。黃汗者。身體四肢微腫。胸滿。不渴。汗出如黃蘗汁。良由大汗出卒入水中所致。黃疸者。一身面目悉黃如橘。由暴得熱。以冷水洗之。熱因留胃中。食生黃瓜熏上所致。若成黑疸者多死。穀疸者。食畢頭眩。心忪怫鬱不安。而發黃。由失飢大食。胃氣衝熏所致。酒疸者。心中懊痛。足脛滿。小便黃。面發赤斑黃黑。由大醉當風入水所致。女勞疸者。身目皆黃。發熱。惡寒。小腹滿急。小便難。由大勞大熱而交接竟入水所致。但依後方治之。**千**¹

寸口脈浮而緩。浮則為風。緩則為痺。痺非中風。四肢苦煩。脾色必黃。瘀熱以行。

趺陽脈緊而數。數則為熱。熱則消穀。緊則為寒。食即為滿。尺脈浮為傷腎。趺陽脈緊為傷脾。風寒相搏。食穀即眩。穀氣不消。胃中苦濁。濁氣下流。小便不通。陰被其寒。熱流膀胱。身體盡黃。名曰穀疸。額上黑。微汗出。手足中熱。薄暮即發。膀胱急。小便自利。名曰女勞疸。腹如水狀。不治。心中懊懣而熱。不能食。時欲吐。名曰酒疸。

陽明病。脈遲者。食難用飽。飽則發煩。頭眩。必小便難。此欲作穀疸。雖下之。腹滿如故。所以然者。脈遲故也。

夫病酒黃疸。必小便不利。其候心中熱。足下熱。是其証也。

酒黃疸者。或無熱。靖言了了。腹滿欲吐。鼻燥。其脈浮者。先吐之。沈弦者。先下之。

酒疸。心中熱。欲嘔者。吐之愈。

¹此條《金匱要略》無，從《千金方》補入。

酒疸下之。久久为黑疸。目青。面黑。心中如噉蒜虀狀。大便正黑。皮膚爪之不仁。其脉浮弱。雖黑。微黃。故知之。

師曰。病黃疸。發熱。煩喘。胸滿。口燥者。以病發時火劫其汗。兩熱所得。然黃家所得。從濕得之。一身盡發熱而黃。肚熱。熱在裏。當下之。

脉沈。渴欲飲水。小便不利者。皆發黃。²

腹滿。舌痿黃燥。不得睡。屬黃家。

黃疸之病。當以十八日為期。治之十日以上差。反劇。為難治。

疸而渴者。其疸難治。疸而不渴者。其疸可治。發於陰部。其人必嘔。發於陽部。其人振寒而發熱也。

穀疸之為病。寒熱不食。食即頭眩。心胸不安。久久發黃。為穀疸。茵陳蒿湯主之。

黃家。日晡所發熱。而反惡寒。此為女勞得之。膀胱急。少腹滿。身盡黃。額上黑。足下熱。因作黑疸。其腹脹如水狀。大便必黑。時澹。此女勞之病。非水也。腹滿者難治。硝石礬石散主之。

酒黃疸。心中懊惱。或熱痛。梔子枳實豉大黃湯主之。

諸病黃家。但利其小便。假令脉浮。當以汗解之。宜桂枝加黃耆湯主之。

諸黃。豬膏髮煎主之。

黃疸病。茵陳五苓散主之。

黃疸。腹滿。小便不利而赤。自汗出。此為表和裏實。當下之。宜大黃黃蘗梔子硝石湯。

²「脉沈」吳本作「脉浮」。

黄疸病。小便色不變。欲自利。腹滿而喘。不可除熱。熱除必噦。噦者。小半夏湯主之。

諸黃。腹痛而嘔者。宜柴胡湯。

男子黃。小便自利。當與虛勞小建中湯。

附方

諸黃。瓜蒂湯主之。

黃疸。麻黃淳酒湯主之。

26. 驚悸吐衄下血胸滿瘀血

寸口脉動而弱。動則為驚。弱則為悸。

師曰。尺脉浮。目睛暈黃。衄必未止。暈黃去。目睛慧了。知衄今止。

又曰。從春至夏衄者。太陽。從秋至冬衄者。陽明。

衄家不可發汗。汗出必額上促急緊。直視不能眴。不得眠。⁸⁶

病人面無色。無寒熱。脉沈弦者。衄。脉浮弱。手按之絕者。下血。煩欬者。必吐血。

夫吐血。欬逆上氣。其脉數而有熱。不得卧者。死。

夫酒客。欬者。必致吐血。此因極飲過度所致也。

寸口脉弦而大。弦則為減。大則為芤。減則為寒。芤則為虛。寒虛相搏。此名為革。婦人則半產漏下。男子則亡血。¹

亡血不可攻其表。汗出則寒慄而振。⁸⁷

病人胸滿。唇痿。舌青。口燥。其人但欲嗽水。不欲咽。無寒熱。脉微大來遲。腹不滿。其人言我滿。為有瘀血。

病者如熱狀。煩滿。口乾燥而渴。其脉反無熱。此為陰狀。是瘀血也。當下之。²

心下悸者。半夏麻黃丸主之。

¹唐弘字按：此條亦見於血痹虛勞篇。

²本條下原有「火邪者」一條，此條與本章無關，故移至《奔豚氣吐膿驚怖火邪》篇中。

吐血不止者。柏葉湯主之。

下血。先見血。後見便。此近血也。先見便。後見血。此遠血也。遠血。黃土湯主之。近血。赤小豆當歸散主之。

附方

治心氣不足。吐血。衄血。瀉心湯。

27.嘔吐噦下利

夫嘔家有癰膿。不可治嘔。膿盡自愈。376

先嘔卻渴者。此為欲解。先渴卻嘔者。為水停心下。此屬飲家。

嘔家本渴。今反不渴者。以心下有支飲故也。此屬支飲。

問曰。病人脉數。數為熱。當消穀引食。而反吐者。何也。

師曰。以發其汗。令陽微。膈氣虛。脉乃數。數為客熱。不能消穀。胃中虛冷。故吐也。脉弦者虛也。胃氣無餘。朝食暮吐。變為胃反。寒在於上。醫反下之。令脉反弦。故名曰虛。¹

寸口脉微而數。微則無氣。無氣則榮虛。榮虛則血不足。血不足則胸中冷。

趺陽脉浮而濇。浮則為虛。濇則傷脾。脾傷則不磨。朝食暮吐。暮食朝吐。宿穀不化。名曰胃反。脉緊而濇。其病難治。²

病人欲吐者。不可下之。

噦而腹滿。視其前後。知何部不利。利之即愈。

嘔而胸滿者。吳茱萸湯主之。

乾嘔。吐涎沫。頭痛者。吳茱萸湯主之。378

嘔而腸鳴。心下痞者。半夏瀉心湯主之。

¹「令脉」吳本作「今脉」。

²吳本此條與上條合為一條。

乾嘔而利者。黃芩加半夏生薑湯主之。

諸嘔吐。穀不得下者。小半夏湯主之。

嘔吐。而病在膈上。後思水者鮮。急與之。思水者。豬苓散主之。

嘔而脈弱。小便復利。身有微熱。見厥者。難治。四逆湯主之。377

嘔而發熱者。小柴胡湯主之。379

胃反。嘔吐者。大半夏湯主之。

食已即吐者。大黃甘草湯主之。

胃反。吐而渴欲飲水者。茯苓澤瀉湯主之。

吐後。渴欲得飲而貪水者。文蛤湯主之。兼主微風。脈緊。頭痛。

乾嘔。吐啞。吐涎沫。半夏乾薑散主之。

病人胸中似喘不喘。似嘔不嘔。似噦不噦。徹心中憤憤然無奈者。生薑半夏湯主之。

乾嘔。噦。若手足厥冷者。橘皮湯主之。

噦啞者。橘皮竹茹湯主之。

夫六腑氣絕於外者。手足寒。上氣。腳縮。五臟氣絕於內者。利不禁。下甚者。手足不仁。

下利。脈沈弦者。下重。脈大者。為未止。脈微弱數者。為欲自止。雖發熱。不死。

下利。手足厥冷。無脈。當灸其厥陰。灸之不溫而脈不還。反微喘者死。

少陰負趺陽者為順。362

下利。有微熱而渴。脈弱者。今自愈。

下利。脈數。有微熱。汗出者。自愈。設脈復緊。為未解。361

下利。脈數而渴者。今自愈。設不差。必清膿血。以有熱故也。

下利。脈反弦。發熱。身汗者。自愈。

下利氣者。當利其小便。

下利。寸脈反浮數。尺中自濇者。必清膿血。

下利清穀。不可攻其表。汗出必脹滿。

下利。脈沈而遲。其人面少赤。身有微熱。下利清穀者。必鬱冒。汗出而解。其人必微厥。所以然者。其面戴陽。下虛故也。366³

下利後。脈絕。手足厥冷。晷時脈還。手足溫者生。不還不溫者死。368

下利。腹脹滿。身體疼痛者。先溫其裏。乃攻其表。溫裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。372

下利。三部脈皆平。按之心下堅者。急下之。宜大承湯。

下利。脈遲而滑者。實也。利未欲止。急下之。宜大承氣湯。

下利。脈反滑者。當有所去。下乃愈。宜大承氣湯。

下利已差。至其時復發者。此為病不盡。當復下之。宜大承氣湯。

下利。譫語者。有燥屎也。宜小承氣湯。374

³「必微厥」鄧本作「必微熱」。

下利。便膿血者。桃花湯主之。

熱利下重者。白頭翁湯主之。371

下利後更煩。按之心下濡者。為虛煩也。梔子豉湯主之。375

下利清穀。裏寒外熱。汗出而厥。通脈四逆湯主之。370

下利。肺痛。紫參湯主之。

氣利。訶梨勒散主之。

附方

小承氣湯。治大便不通。噦。數譫語。

乾嘔。下利。黃芩湯主之。玉函經云人參黃芩湯

28. 瘡癰腸癰浸淫

諸浮數脉。應當發熱。而反洒淅惡寒。若有痛處。當發其癰。

師曰。諸癰腫。欲知有膿無膿。以手掩腫上。熱者為有膿。不熱者為無膿。

腸癰之為病。其身甲錯。腹皮急。按之濡。如腫狀。腹無積聚。身無熱。脉數。此為腸內有癰膿。薏苡仁附子敗醬散主之。¹

腸癰者。少腹腫痞。按之即痛如淋。小便自調。時時發熱。自汗出。復惡寒。脉遲緊者。膿未成。可下之。當有血。脉洪數者。膿已成。不可下也。大黃牡丹湯主之。

問曰。寸口脉浮微而濇。法當亡血。若汗出。設不汗者云何。

答曰。若身有瘡。被刀器所傷。亡血故也。

病金瘡。王不留行散主之。²

排膿散。

排膿湯。

浸淫瘡。從口流向四肢者。可治。從四肢流來入口者。不可治。黃連粉主之。方未見。³

¹「腸內有癰膿」吳本作「腸內有膿」，鄧本作「腹內有癰膿」。

²吳本此條與上條合為一條。

³「黃連粉主之」鄧本作「浸淫瘡黃連粉主之」單獨列為一條。

29. 跌蹶手指臂脛轉筋狐疝蛔虫

師曰。病者跌蹶。其人但能前。不能卻。刺腓入二寸。此太陽經傷也。

病人常以手指臂脛動。此人身体瞶瞶者。藜蘆甘草湯主之。方未見。¹

轉筋之为病。其人臂腳直。脉上下行。微弦。轉筋入腹者。雞屎白散主之。

陰狐疝气者。偏有小大。时时上下。蜘蛛散主之。

問曰。病腹痛。有虫。其脉何以別之。

師曰。腹中痛。其脉当沈弦。反洪大。故有蛔虫。²

蛔虫之为病。令人吐涎。心痛。发作有时。毒藥不止。甘草粉蜜湯主之。

蛔厥者。其人当吐蛔。今病者靜。而復时煩。此为臟寒。蛔上入膈。故煩。須臾復止。得食而嘔。又煩者。蛔聞食臭出。其人常自吐蛔。蛔厥者。烏梅丸主之。338

¹「臂脛動」鄧本作「臂腫動」。

²「沈弦」吳本、鄧本均作「沈若弦」，編者改。

30. 雜療方¹

¹唐弘字按：觀此章文法，不像仲景原文，本來已經刪除，後來我讀到《諸病源候論》卷六解散病諸候第一寒食散發候引皇甫云：「然寒食藥者。世末知焉。或言華佗。或曰仲景。考之於實。佗之精微。方類單省。而仲景經有侯氏黑散。紫石英方。皆數種相出入。節度略同。然則寒食草石二方。出自仲景。非佗也。且佗之為治。或剝斷腸胃。滌洗五臟。不純任方也。仲景雖精。不及於佗。至於審方物之候。論草石之宜。亦妙絕采醫。」據此段引文可知本章中的「紫石寒食散」是仲景方，所以為了穩妥起見，將本章保留。

31. 婦人妊娠病

師曰。脉婦人得平脉。陰脉小弱。其人渴。不能食。无寒熱。名为軀。桂枝湯主之。法六十日当有娠。設有醫治逆者。卻一月。加吐下者。則絕之。¹

婦人妊娠。經斷三月。而得漏下。下血四十日不止。胎欲動。在於脐上。此为妊娠。六月動者。前三月經水利时。胎也。下血者。後斷三月。衃也。所以下血不止者。其癥不去故也。当下其癥。宜桂枝茯苓丸。²

婦人懷娠六月七月。脉弦。發熱。其胎愈脹。腹痛。惡寒者。少腹如扇之狀。所以然者。子臟開故也。当以附子湯溫其臟。方未見。³

師曰。婦人有漏下者。有半產後因續下血都不絕者。有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛。为胞阻。膠艾湯主之。

婦人懷娠。腹中疔痛。当歸芍藥散主之。

婦人妊娠。嘔吐不止。乾薑人參半夏丸主之。

婦人妊娠。小便難。飲食如故。当歸貝母苦參丸主之。

婦人妊娠。有水氣。身重。小便不利。洒淅惡寒。起即頭眩。葵子茯苓散主之。

¹此條鄧本与吳本差異較大，鄧本作「師曰。婦人得平脉。陰脉小弱。其人渴。不能食。无寒熱。名妊娠。桂枝湯主之。於法六十日当有此証。設有醫治逆者。卻一月。加吐下者。則絕之。」

²此條鄧本与吳本差異較大，鄧本作「婦人宿有癥病。經斷未及三月。而得漏下不止。胎動在脐上者。为癥痼害。妊娠六月動者。前三月經水利时。胎下血者。後斷三月。衃也。所以血不止者。其癥不去故也。当下其癥。桂枝茯苓丸主之。」

³吳本本條末有「方未見」小字註釋。「六月七月」同吳本、《脉經》，鄧本作「六七月」。「愈脹」同鄧本，吳本、《脉經》作「逾腹」。

婦人妊娠。宜服當歸散。⁴

附方

妊娠養胎。白朮散。

婦人傷胎。懷身。腹滿。不得小便。從腰以下重。如有水氣狀。懷身七月。太陰當養不養。此心氣實。當刺瀉勞宮及關元。小便利則愈。⁵

⁴「宜服」鄧本作「宜常服」。

⁵「傷胎」同鄧本，吳本作「傷寒」。「小便利」鄧本作「小便微利」。

32. 婦人產後病

問曰。新產婦人有三病。一者病瘧。二者病鬱冒。三者大便難。何謂也。

師曰。新產血虛。多汗出。喜中風。故令病瘧。

問曰。何故鬱冒。

師曰。亡血復汗。寒多。故令鬱冒。

問曰。何故大便難。

師曰。亡津液。胃燥。故大便難。

產婦鬱冒。其脉微弱。不能食。大便反堅。但頭汗出。所以然者。血虛而厥。厥而必冒。冒家欲解。必大汗出。以血虛下厥。孤陽上出。故但頭汗出。所以產婦喜汗出者。亡陰血虛。陽氣獨盛。故當汗出。陰陽乃復。所以便堅者。嘔。不能食也。小柴胡湯主之。病解。能食。七八日。更發熱者。此為胃熱氣實。大承氣湯主之。¹

婦人產後。腹中疔痛。當歸生薑羊肉湯主之。并治腹中寒疝。虛勞不足。

婦人產後。腹痛。煩滿。不得卧。枳實芍藥散主之。

師曰。產婦腹痛。法當與枳實芍藥散。假令不愈者。此為腹中有乾血著臍下。與下瘀血湯服之。亦主經水不利若瘀血。²

婦人產後七八日。無太陽証。少腹堅痛。此惡露不盡。不大便四五日。跌陽脉微實。再倍其人發熱。日晡所煩躁者。不食。食即譫語。利之即愈。宜大承氣湯。熱在裏。結在膀胱也。³

¹「鬱冒」同鄧本，吳本無「冒」字。「所以便堅者」鄧本作「大便堅」。「不能食也」鄧本無「也」字。從「病解能食」一下，吳本、鄧本均獨立作一條。但根據文意，當與上條合為一條。

²「亦主經水不利若瘀血」吳本作「主經水不利若瘀血」，鄧本作「主經水不利」且為小字註釋。

³此條鄧本與吳本差異較大，鄧本作「產後七八日。無太陽証。少腹堅痛。此惡露不盡。不大便。煩躁。發熱。切脉微實。再倍發熱。日晡時煩躁者。不食。食則譫語。至夜即愈。宜大承氣湯主之。熱在裏。結在膀胱也。」

婦人產得風。續之數十日不解。頭微痛。惡寒。時時有熱。心下堅。乾嘔。汗出。雖久。陽旦証續在耳。可與陽旦湯。⁴

婦人產後。中風。發熱。面正赤。喘而頭痛。竹葉湯主之。

婦人產中虛。煩亂。嘔哕。安中益氣。竹皮大丸主之。⁵

婦人產後。下利。虛極。白頭翁加甘草阿膠湯主之。

附方

婦人多在草蓐得風。四肢苦煩熱。皆自發露所為。頭痛者。與小柴胡湯。頭不痛。但煩者。與三物黃芩湯。⁶

治婦人產後。虛羸不足。腹中刺痛不止。吸吸少氣。或苦少腹拘急攣痛引腰背。不能食飲。產後一月。日得服四五劑為善。令人強壯。內補當歸建中湯。⁷

⁴「婦人產得風」鄧本作「產後風」。「心下堅」鄧本作「心下悶」。

⁵「產中虛」同《脉經》，吳本、鄧本作「乳中虛」。

⁶此條鄧本與吳本差異較大，鄧本作「千金三物黃芩湯。治婦人在草蓐自發露得風。四肢苦煩熱。頭痛者。與小柴胡湯。頭不痛。但煩者。此湯主之。」

⁷此條鄧本與吳本差異較大，鄧本作「千金內補當歸建中湯。治婦人產後。虛羸不足。腹中刺痛不止。吸吸少氣。或苦少腹中急攣痛引腰背。不能食飲。產後一月。日得服四五劑為善。令人強壯。」

33. 婦人雜病

婦人中風七八日。續得寒熱。发作有时。經水適斷。此為熱入血室。其血必結。故使如瘡狀。发作有时。小柴胡湯主之。144

婦人傷寒。發熱。經水適來。晝日明瞭。暮則譫語。如見鬼狀。此為熱入血室。无犯胃氣及上二焦。必自愈。145¹

婦人中風。發熱。惡寒。經水適來。得之七八日。熱除。脉遲。身涼。胸脇下滿。如結胸狀。其人譫語。此為熱入血室。当刺期門。隨其虛實而取之。143²

陽明病。下血。譫語者。此為熱入血室。但頭汗出者。当刺期門。隨其虛實而瀉之。漑然汗出則愈。216

婦人咽中如有炙臠。半夏厚朴湯主之。

婦人臆躁。喜悲傷。欲哭。象如神靈所作。數欠伸。甘草小麥大棗湯主之。
3

婦人吐涎沫。醫反下之。心下即痞。当先治其吐涎沫。宜小青龙湯。涎沫止。乃治痞。宜瀉心湯。⁴

婦人之病。因虛稍入結氣。為諸經水斷絕。至有歷年。血寒積結。胞門寒傷。經絡凝堅。在上嘔吐涎唾。久成肺癰。形体損分。在中盤結。繞臍寒疝。或兩脇疼痛。与臟相連。或結熱在中。痛在閔元。脉數。无瘡。肌若魚鱗。時著男子。非止女身。在下未多。經候不勻。令陰掣痛。少腹惡寒。

¹ 鄧本「无犯」上有「治之」二字。

² 「身涼」同趙本、《千金翼》卷九第七，吳本、鄧本均作「身涼和」。

³ 「臆躁」同鄧本，吳本作「臆燥」。

⁴ 吳本「小青龙湯」下有「方見肺癰中」小字註釋，「瀉心湯」下有「方見驚悸中」小字註釋。

或引腰脊。下根气街。气衝急痛。膝脛疼煩。或奄忽眩冒。狀如厥癰。或有憂慘。悲傷多嗔。此皆帶下。非有鬼神。久則羸瘦。脉虛多寒。三十六病。千變万端。審脉陰陽。虛實緊弦。行其針藥。治危得安。其雖同病。脉各異源。子当辯記。勿謂不然。⁵

問曰。婦人年五十所。病下血。數十日不止。暮即發熱。少腹裏急。腹滿。手掌煩熱。唇口乾燥。何也。

師曰。此病屬帶下。何以故。曾經半產。瘀血在少腹不去。何以知之。其証唇口乾燥。故知之。当以溫經湯主之。⁶

婦人帶下。經水不利。少腹滿痛。經一月再見者。土瓜根散主之。

寸口脉弦而大。弦則為減。大則為芤。減則為寒。芤則為虛。寒虛相搏。脉即名為革。婦人則半產漏下。旋覆花湯主之。

婦人陷經。漏下黑不鮮。膠薑湯主之。⁷

婦人少腹滿如敦狀。小便微難而不渴。生後者。此為水與血并結在血室也。大黃甘遂湯主之。⁸

婦人經水不利。抵當湯主之。⁹

婦人經水閉不利。臍堅癖不止。中有乾血。下白物。礬石丸主之。

治婦人六十二種風。兼主腹中血氣刺痛。紅藍花酒。

婦人腹中諸疾痛。當歸芍藥散主之。

婦人腹中痛。小建中湯主之。

⁵「稍入」同吳本，鄧本作「積冷」。

⁶「病下血」諸本均作「病下利」，編者改。吳本「少腹裏急」下有「痛」字。

⁷臣億等按。諸本无膠薑湯方。恐是前妊娠中膠艾湯也。

⁸「如敦狀」同鄧本，吳本作「如敦敦狀」。吳本「敦」字下有「音堆」小字註釋，鄧本无。

⁹鄧本「經水不利」下有「下」字。

問曰。婦人病。食飲如故。煩熱不得卧。而反倚息者。何也。

師曰。此病轉胞。不得尿也。以胞系了戾。故致此病。但利小便則愈。宜腎氣丸。¹⁰

溫陰中坐藥。蛇床子散。

少陰脉滑而數者。陰中即生瘡。¹¹

婦人陰中蝕瘡爛。狼牙湯洗之。

胃氣下泄。陰吹而正喧。此穀氣之實也。膏髮煎導之。

小兒疳虫蝕齒方。

¹⁰「宜腎氣丸」後，鄧本有「主之」二字，吳本有「以中有茯苓故也」七字。

¹¹吳本此條前有「師曰」二字。

第四部分

衍文

問曰。証象陽旦。按法治之而增劇。厥逆。咽中乾。兩脛拘急而讞語。

師曰。言夜半手足當溫。兩腳當伸。後如師言。何以知此。

答曰。寸口脈浮而大。浮則為風。大則為虛。風則生微熱。虛則兩脛攣。病形象桂枝。因加附子參其間。增桂令汗出。附子溫經。亡陽故也。厥逆。咽中乾。煩燥。陽明內結。讞語。煩亂。更飲甘草乾薑湯。夜半陽氣還。兩足當熱。脛尚微拘急。重與芍藥甘草湯。爾乃脛伸。以承氣湯微瀉。則止其讞語。故知病可愈。30

太陽病二日。反躁。反熨其背。而大汗出。大熱入胃。胃中水竭。躁煩。必發譫語。十餘日。振慄。自下利者。此為欲解也。故其汗從腰以下不得汗。欲小便不得。反嘔。欲失溲。足下惡風。大便鞭。小便當數。而反不數及不多。大便已。頭卓然而痛。其人足心必熱。穀氣下流故也。110¹²

太陽病。中風。以火劫發汗。邪風被火熱。血氣流溢。失其常度。兩陽相熏灼。其身發黃。陽盛則欲衄。陰虛則小便難。陰陽俱虛竭。身體則枯燥。但頭汗出。齊頸而還。腹滿微喘。口乾咽爛。或不大便。久則譫語。甚者至噦。手足躁擾。捻衣摸床。小便利者。其人可治。111

脈按之來緩。時一止復來者。名曰結。又脈來動而中止。更來小數。中有還者反動。名曰結。陰也。脈來動而中止。不能自還。因而復動者。名曰代。陰也。得此脈者。必難治。178

問曰。上工治未病。何也。

師曰。夫治未病者。見肝之病。知肝傳脾。當先實脾。四季脾王不受邪。即勿補之。中工不曉相傳。見肝之病。不解實脾。惟治肝也。

夫肝之病。補用酸。助用焦苦。益用甘味之藥調之。酸入肝。焦苦入心。甘入脾。脾能傷腎。腎氣微弱則水不行。水不行則心火氣盛。心火氣盛則傷肺。肺被傷則金氣不行。金氣不行則肝氣盛。故實脾則肝自愈。此治肝補脾之要妙也。肝虛則用此法。實則不在用之。經曰。虛虛實實。補不足。損有餘。是其義也。餘藏准此。

夫人稟五常。因風氣而生長。風氣雖能生萬物。亦能害萬物。如水能浮

¹²趙本「大熱入胃」下有「一作二日內燒瓦熨背大汗出火氣入胃」小字註釋。

舟。亦能覆舟。若五臟元真通暢。人即安和。客气邪風。中人多死。千般災難。不越三條。一者。經絡受邪。入臟腑。為內所因也。二者。四肢九竅。血脈相傳。壅塞不通。為外皮膚所中也。三者。房室金刃虫獸所傷。以此詳之。病由都盡。若人能養慎。不令邪風干忤經絡。適中經絡。未流傳腑臟。即醫治之。四肢才覺重滯。即導引吐納鍼灸膏摩。勿令九竅閉塞。更能無犯王法。禽獸災傷。房室勿令竭之。服食節其冷熱苦酸辛甘。不遺形體有衰。病則無由入其腠理。腠者。是三焦通會元真之處。為血氣所注。理者。是皮膚臟腑之文理也。

