

# Harle huppé

---

*Mergus serrator*

Le **Harle huppé** (*Mergus serrator*) est une espèce d'oiseaux palmipèdes appartenant à la famille des Anatidae. L'espèce est classée, au niveau mondial, en préoccupation mineure mais menacée au niveau européen.

## Description

---

Le Harle huppé est un canard plongeur. Son bec effilé rouge, sa tête noire avec des reflets verts, son collier blanc et sa huppe lui confèrent un style inimitable. Le mâle est facile à reconnaître avec sa double huppe, son collier blanc et sa poitrine roussâtre tachetée de noir. Par contre, les femelles et les juvéniles ressemblent fortement à ceux du Harle bièvre (*Mergus merganser*). Cependant, l'observateur chevronné fera sans peine la distinction entre les deux espèces. En effet, les Harles bièvres femelles et juvéniles présentent une très nette séparation entre la tête brune et le cou blanc alors que ceux du Harle huppé voient le brun de la tête se fondre sans transition dans le gris du cou. Le harle tient son nom de son habitude à nager le corps submergé (Mergus, de mergere, submerger).

Cet oiseau mesure environ 58 cm de longueur pour une envergure de 70 à 86 cm et un poids de 1 000 à 1 250 g.

## Chant

---

Ordinairement silencieux, le cri dissyllabique assez doux du mâle en parade répond au kokokok rauque et grognant de la femelle.

## Habitat

---

Espèce aquatique, ils préfèrent en général l'eau salée à l'eau douce. Le Harle huppé se retrouve donc plutôt en bordure d'océan et sur le littoral mais aussi parfois sur la rive des grands lacs et des étangs.

## Comportements

---

Dès la fin de la ponte, le mâle déserte discrètement la cellule familiale pour changer son plumage. La plupart du temps, le Harle huppé est muet. Il est migrateur. En hiver, il descend vers le sud à la recherche de climats plus cléments.

## Vol

---

Le vol des Harles huppés est rapide et rectiligne, le plus souvent au ras de l'eau, cou et corps allongés avec l'impression d'avoir les ailes très en arrière du corps.

## Nidification

---

Le nid est posé par terre. Les buissons, les branches basses des arbres, les cavités dans les rochers servent d'abris. La couvée est de huit œufs en moyenne et c'est la femelle qui prend en charge l'incubation qui dure un mois. Les petits sont nidifuges et se mettent à l'eau dès qu'ils sont aptes à se déplacer.

## Régime

---

Il se nourrit principalement de poissons mais son menu habituel comprend également des mollusques, des crustacés, des insectes aquatiques, notamment des libellules. À tous ces éléments d'origine animale, il faut ajouter de la matière végétale en quantité plus ou moins variable selon les ressources disponibles.

## Répartition

---

Le Harle huppé niche dans une grande partie de l'hémisphère nord septentrional : en Europe (Islande, îles britanniques, Fennoscandie, Russie ainsi que des zones disjointes dans le reste de l'Europe, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en Pologne, dans les Pays baltes et dans le sud de l'Ukraine), en Asie (en Sibérie de l'Oural au nord et à l'est du Kazakhstan, en Mandchourie et jusqu'au Kamtchatka ainsi que sur l'île Sakhaline, les îles Kouriles et sur les îles Komandorski) et Amérique du Nord (des aléoutiennes à Terre-Neuve en passant par l'Alaska et une grande partie du Canada, ainsi qu'au Groenland). Il hiverne principalement près des côtes et sur les grands plans d'eau comme le Léman en Europe ou les Grands Lacs en Amérique du Nord.

---

Sur les autres projets Wikimedia :

■ ***Oiseaux.net* : *Mergus serrator***  
(<https://www.oiseaux.net/oiseaux/harle.huppe.html>) (+  
répartition (<https://>



***Harle huppé*** ([https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mergus\\_serrator?](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mergus_serrator?)

[www.oiseaux.net/maps/harle.huppe.html](http://www.oiseaux.net/maps/harle.huppe.html)))

- **(en)** *BioLib* : *Mergus serrator* Linnaeus, 1758 (<https://www.biolib.cz/en/taxon/id8491/>)



*uselang=fr*), sur Wikimedia Commons



*Harle huppé*, sur Wikispecies

- **(en)** *Congrès ornithologique international* : *Mergus serrator* dans l'ordre Anseriformes (<http://www.worldbirdnames.org/bow/waterfowl>) (consulté le 24 avril 2022)
- **(fr+en)** *Avibase* (<http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp>) : *Mergus serrator* (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=8DB64266A42FC19B>) (+ répartition (<http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=8DB64266A42FC19B>)) (consulté le 30 juin 2015)
- **(fr)** *CITES* : taxon *Mergus serrator* (<http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/viewtaxon.do?id=26852>) (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le 30 juin 2015)
- **(fr+en)** *ITIS* : *Mergus serrator* Linnaeus, 1758 ([https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search\\_topic=TSN&search\\_value=175187](https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=175187))
- **(en)** *UICN* : espèce *Mergus serrator* Linnaeus, 1758 (<https://www.iucnredlist.org/details/22680485/0>) (consulté le 24 avril 2022)
- **(fr)** *eBird* : *Mergus serrator* (<https://ebird.org/species/rebmer/>)