

Figures : Analyse épidémiologique moléculaire du virus Ebola : reconstruction bayésienne de sa dynamique de dispersion spatio-temporelle par analyse génomique

Tanguy Vandermergel (530545), Léa Troquet (574543)




Figure 1 : Arbre phylogénétique de séquences d'EBOV estimé avec figtree




Figure 2 : Arbre phylogénétique de séquences d'EBOV estimé avec IQ-TREE. Les extrémités représentent les taxons échantillonnés à différentes dates, et les nœuds internes sont les ancêtres communs hypothétiques.




Figure 3 : Analyse du signal temporel avec TempEst. La régression root-to tip est obtenue après optimisation de la racine (Best-fitting root). La valeur du R^2 est de 0.45. Bien que modérée, cette valeur justifie la poursuite des analyses avec BEAST.




Figure 4 : Analyse des residuals avec TempEst




Figure 5 : Analyse des densités des nœuds dans notre modèle avec TempEst




Figure 6 : Arbre MCC daté et coloré selon la localisation des séquences virales. Visualisé dans FigTree. Les couleurs représentent la localisation des lignées virales selon un gradient numérique.




Figure 7 : Reconstruction phylogéographique continue de la dispersion du virus Ebola. Evolution spatio-temporelle des lignées d'EBOV entre 2023 et 2025, inférée à partir d'arbres datés BEAST et visualisée avec seraphim. Les panneaux montrent la progression de la dispersion, tandis que le panneau cumulatif synthétise les trajectoires inférées. Les points et les lignes indiquent les localisations reconstruites et les mouvements estimés, et les zones colorées les régions de circulation les plus probables (HPD).