

从第一天开始， 学会照顾你的鹦鹉。

重点认识虎皮与小太阳。先做对安全、吃喝和观察，再慢慢学会相处；不懂的词、拿不准的操作，都可以随时回来查。

先读每节的要点，再展开具体步骤。[鸟刚到家？](#) [需要离线版？](#)



AI 创作插画 · 非混养示范

更新于 2026-09-27 [查看官网最新版本](#)

从你养的鸟开始读

两条路线都保留共同的环境、饮食与急症内容。先看专属提醒，再按顺序完成准备。

我养虎皮

1. [认识小体型与空壳误判](#)
2. [验收笼具、栖木与称重工具](#)
3. [确认实际吞咽，记录进食](#)
4. [练习安全回笼](#)

我养小太阳

1. [认识啃咬、钻洞与相处边界](#)
2. [检查门锁、挂扣与用品强度](#)
3. [记录主食与奖励，避免挑食](#)
4. [练习站台与自主回笼](#)

两种鸟都要读：[放飞安全](#) · [急症行动](#) · [每日照护与离线版](#)

展开完整目录 · 无需脚本

- 01 接鸟之前
- 02 重点认识
- 03 鸟笼布置
- 04 每次放飞前
- 05 到家第一周
- 06 每天怎么喂
- 07 日常照护
- 08 读懂拒绝
- 09 健康观察
- 10 急症
- 11 常见问题
- 12 发情与下蛋
- 13 未断奶幼鸟
- 14 出行与寄养
- 15 照护清单
- 16 新手词典

接鸟之前：先把家准备好

还没买鸟时，先确认每天有人照顾、有安全空间，也有能接诊鸟类的医院。不要把亲人、会说话或便宜当成唯一标准。

先记住这几件事

- 新手优先选择已经稳定独立进食的鸟，不买回家练习喂奶。
- 先准备笼舍、原来吃的食物和运输箱，再接鸟；先联系医院，再等急症发生。
- 与家人确认噪音、清洁、开门规则和出差照护；鹦鹉不是短期体验宠物。

从准备到入住：按这个顺序做

01

确认能养

时间、家庭共识、合法来源与医疗条件

02

布置房间

安全笼舍、食水、称重与运输用品

03

核对交接

物种、实际进食、既往记录与原粮

04

平稳入住

安静观察，预约初诊，不急着训练

购买 / 领养前，向对方问清楚什么？

- 确认具体物种、年龄信息是否有记录；不要只看商家的颜色名称。保存来源、交易或领养凭据；适用手续需按所在地规定核实。
- 问清每天实际吃什么、是否仍需人工喂食、近期体重与排便情况。亲眼看到自己啄食还不等于已经吃够并稳定断奶。
- 询问既往疾病、用药、检测、接触过哪些鸟、运输安排；“做过检测”需要看到项目、日期和对应个体。
- 观察静息呼吸、站立、眼鼻分泌物、肛周是否污染以及活动意愿。外观正常也不能替代兽医检查。
- 不接受为了展示温顺而抓住鸟、强迫仰躺、刻意饿鸟或现场剪羽。发现异常先让兽医评估，不自行按卖家的通用药方处理。

必备物品：每一件用来做什么？

- **主笼**：有足够横向活动空间，栏距适合个体，门和食盆口能锁稳。运输笼不能长期代替主笼。
- **运输箱**：通风、牢固、便于固定；准备纸巾或不易勾爪的底垫，提前熟悉而不是急诊时才第一次使用。
- **至少两套食水容器**：一套使用、一套清洗晾干；便于把干粮与鲜食分开放。不要突然换成鸟不会用的饮水器。
- **原粮与合适配方粮**：先保留熟悉的可靠食物，新粮待状态稳定后逐步引入。记录开封日期，保存包装批次。
- **栖木和玩具**：选择可核实材质、适合脚和喙的尺寸；不以“摆满”为目标，保留活动路线。
- **电子秤**：用克为单位，虎皮建议能显示 0.1 克；配稳定小站架。显示精度不等于准确度，使用前核对归零和稳定性。
- **清洁用品**：无香日常清洁剂、专用刷具、笼底白纸、垃圾袋；与厨房用品分开收纳。
- **应急资料**：鸟类门诊与夜间接诊电话、路线、运输安排、备用照护者联系方式；纱布和干净毛巾放在一起。

新手暂时不要买的东西

- 不为“保暖睡觉”购买绒布鸟窝、帐篷或套头布袋；它们可能带来缠绕、啃食和筑巢刺激。
- 不把砂纸栖杠、碎石保健砂、香味垫材当必需品。虎皮与小太阳会剥壳吃种子，不需要靠吞砂帮助磨碎种壳。
- 不囤“预防性抗生素”“万能驱虫药”或人用感冒药；补钙和维生素也不是买鸟后的固定流程。
- 镜子、发声玩具、豪华装饰不能代替同伴式互动、觅食与运动；玩具先看安全，再看好玩。

时间与费用怎么估算，才不漏项？

- 把早晚换水清洁、观察进食、安全活动与互动列入每天日程，不要只计算喂粮的一两分钟。
- 费用分为一次性设备、持续的食品与玩具耗材、初诊和复查、意外急诊及寄养；向附近接诊医院询价，不用鸟的购买价格决定治疗预算。
- 模拟一次出差：谁有钥匙、会不会开门放飞、能否识别不进食、能否带去医院？提前完成交接。
- 若家中有呼吸道过敏、免疫功能低下成员，先向相关医生咨询饲养与清洁安排。

02

重点认识：虎皮与小太阳

本手册中的小太阳指绿颊锥尾鹦鹉（*Pyrrhura molinae*），不是太阳锥尾鹦鹉。颜色变异不等于新的物种，也不能保证某种性格。

先记住这几件事

- 虎皮体型小，但仍需要飞行、社交、均衡营养和鸟类医疗。
- 小太阳活跃、爱啃咬，需要丰富的活动、边界训练与可靠门锁；“相对安静”不等于不扰邻。
- 两种鸟分笼、分开安排活动最稳妥，不让小太阳隔着笼栏咬虎皮的脚。



BUDGERIGAR

虎皮鹦鹉

Melopsittacus undulatus

不要被小身形骗了：它需要的是能活动的空间、熟悉而不强迫的陪伴，以及细致到克的日常观察。

看虎皮专属注意事项 ↓



GREEN-CHEEKED CONURE

小太阳·绿颊锥尾

Pyrrhura molinae

陪伴不只有上手和摸头。啃咬、攀爬、自己找食物，以及能够主动退开，都是它的生活内容。

看小太阳专属注意事项 ↓

虎皮专属：从食盆、体重到互动

- 每天检查食盆里是完整谷粒还是空壳；看上去满满一盆，可能已经没有可吃的食物。不要仅靠加满食盆判断吃够了。
- 不把全种子饮食直接改成全颗粒。虎皮的配方粮与种子安排应结合个体状态制定，保留熟悉食物，逐步确认真正吞咽和体重稳定。
- 栖木、玩具缝隙和挂扣必须适合小脚与小头；为大鹦鹉设计的栏距可能让虎皮钻出或卡住。
- 用小份奖励、缓慢动作和短时间相处建立信任。怕手时先允许隔笼观察，不追着抓，不把不动当成同意。
- 观察体重趋势、脚底、鼻孔周围和喙部外观。结痂、明显增生或进食困难先就诊，不根据照片自行涂油或驱虫。
- 不能只凭单一鼻膜颜色判断所有年龄、色型的性别；也不能凭会不会说话、咬不咬人判断公母。

小太阳专属：啃咬、钻洞与相处边界

- 为啃咬准备安全、可替换的玩具，并检查扣件。对电线、拉链、首饰、手机壳与小零件进行物理隔离，不能只靠口头制止。
- 不要让鸟钻进衣服、被子、沙发缝后无人看管；落座、合被和躺下前先确认鸟的位置，绝不与鸟同床睡。
- 用目标训练、站台和回笼训练建立可预期的沟通。咬人先记录触发情境，突然行为改变要先考虑不适或疼痛。
- 不因为它主动靠近就持续摸背、腹部或翅膀下方。需要触摸时以鸟愿意接受的头颈部为主，并随时允许离开。
- 菠萝、黄边等常见色型名称不能作为更健康、更亲人或更安静的保证；选择时重点看个体和来源。
- 不要套用虎皮的用品强度、奖励份量或称重基线；也不要将高能量种子与坚果无限量放着吃。

如果同时养虎皮和小太阳

不要合笼，不把笼子紧贴，不共用无人看管的活动区。体型与喙力差异可能造成严重伤害；即使以前和平相处，也不代表以后安全。

其他鹦鹉也能照这份指南养吗？

环境安全和尊重互动的原则具有共通性，但饮食、空间和疾病风险不能一概而论。玄凤、爱情鸟、灰鹦鹉、亚马逊、凤头、金刚等需要补充具体物种资料；吸蜜鹦鹉有专门的食物需求，不能照搬这里的饮食安排。

鸟笼布置：让吃、动、睡互不干扰

选笼时看内部可用空间，不只看外部尺寸。装好栖木和玩具后，鸟仍能展开双翼、转身，尾巴不持续擦栏，并有清晰的活动路线。

先记住这几件事

- 横向活动空间优先，栏距不能让头穿过；门锁、食盆门都要逐一检查。
- 栖木有不同直径与纹理；食水不放在常站栖木正下方。
- 白纸铺底、每天更换；不把布窝和满笼玩具当成舒适的必要条件。

笼内分区关系图·不是按比例的尺寸图



重点是空间关系：栖木与食水错开，活动路线连通。虚弱、残障或幼鸟的笼内布置需另行调整。

买笼时按这 7 项逐个验收

1. 测栏距和所有门边缝隙；不要把鸟的头塞进去试尺寸。无法确认就把照片与尺寸发给接诊兽医或可靠用品顾问核对。
2. 看材质说明：表面应牢固、无锐边、无剥落；避免来路不明的镀层、焊点和锈蚀金属。
3. 打开和关闭每个门，模拟鸟从内部推拉；能被轻易顶开的门需要可靠的防开措施，不能留下可吞零件。
4. 把栖木、容器和玩具算入尺寸；鸟伸翅时不碰栏，常站位置不磨尾，不能用“刚好装得下”当长期标准。
5. 托盘能取出且不制造逃逸口；清洗时能彻底接触角落，能冲净和晾干。
6. 底网应安全无断丝；脚部异常的鸟不强行使用普通底网，向兽医询问软底或低位布置。
7. 主笼放稳，避免门后、易碰倒的窄台面；家中儿童与其他动物不能随意打开或伸手接触。

栖木、玩具怎样选和摆？

- 选材质明确、无农药污染的安全木材；未知路边树枝不要直接带回使用。不同粗细让脚有变化，不只用一根光滑圆棍。
- 不使用砂纸套包裹站杠；所谓磨爪用品不能替代脚底检查。发现脚底红肿、破损或持续换脚承重需要检查。
- 挂扣应闭合，避免开口金属圈、长绳圈、松脱线头、小铃舌和可拆小珠。出现啃食纤维或缠绕迹象，立即撤掉该玩具。
- 新玩具先在远处展示，再逐步靠近，不突然塞满笼子。只换一部分，保留熟悉栖木和路线。
- 可把奖励藏在容易打开的干净纸包中；初次难度低并监督，确认能找到食物再增加挑战。不要让觅食游戏替代正常进食。

摆在哪里？温度、空气、日照怎么处理？

- 避开厨房、烟雾、香薰、蚊香和喷雾；通风不等于让空调持续直吹。保持环境稳定，避免突然冷热变化。
- 选择有家庭活动但能休息的位置，不放电视音箱旁或持续有人经过的门口。至少一侧提供遮挡，鸟能退到安心的位置。
- 不要把健康成鸟常规放进高温育雏箱；生病、幼鸟与体温异常时需要个体化安排。温度舒适不代表可以忽略空气污染。
- 自然光照必须能退到阴影处、有水、有人监督。关窗也可能晒得过热；不把室内玻璃后的阳光当成可靠补钙手段。
- 不自行为鸟配置爬宠灯、紫外灯或高功率加热灯；产品适用性、距离与时间需专业指导。

拿着这张验收表，再决定用品是否合适

请商家提供内部长、宽、高，栏杆之间的净间距、门缝尺寸和材质。把测量值记下来；不凭商品名里的“小号 / 中号”判断。下面是验收方法，不是统一尺寸处方。

虎皮与小太阳：用品验收重点


项目	虎皮重点看	小太阳重点看
主笼与缝隙	测量栏距、食盆口与门角；小头和小脚不能卡入危险缝隙。	检查门锁能否从内部推开，栏杆与焊点能否承受日常攀爬啃咬。
内部空间	先规划栖木、盆和玩具的位置，再确认展开双翼、转身与移动不会碰栏或磨尾；纵向高度不能代替横向空间。	
栖木	能稳握而不滑落；不要直接拿大鸟用品代替。	除脚部适配外，定期检查啃坏、劈裂和松动位置。
称重	秤放平、站架稳、归零；用同一设备记录小幅变化。	站架承重与落脚面积合适，站架不能接触秤以外的物体。
玩具与挂扣	重点看小头、小脚可钻入的孔隙及易吞小件。	重点看咬开的挂扣、拆下的零件及破损纤维。

无法判断尺寸时，把**物种 + 笼具内部尺寸 + 栏距实测照片 + 布局草图**一起交给接诊兽医或可靠用品顾问核对。不要拿鸟的头、脚去试卡不卡。

摆放对照：看落粪路径，不只看盆是否放得下

需要调整：食水位于正下方

调整后：横向错开位置



常站位置正下方容易被污染；发现落粪、湿水或踩脏立即更换。

错开后仍需检查其他高位栖木；保留容易取食和移动的路线。

位置关系示意，不表示笼具尺寸。两种鸟都需要按实际布局验收。

每次放飞前：全家一起排查危险

放飞不是开笼门后各忙各的。先控制房间，再开笼；结束后确认鸟已回到安全位置，才能开门、做饭或启动电器。

先记住这几件事

- 关门窗、停风扇、隔离猫狗、盖住水容器；飞行区域始终有人看护。
- 远离烟雾、不粘涂层过热、香薰、喷雾与清洁作业。
- 不在户外无保护放飞，不认为剪羽后就飞不走。

放飞安全关卡·六项全部确认后再开笼

01**门窗**

关闭并告诉家人别开门

02**空气**

没有烹饪烟雾或喷雾

03**转动电器**

风扇关闭并停止转动

04**水与热源**

马桶、桶、热杯与灶台隔离

05**其他动物**

猫狗与活动房间物理隔开

06**落脚与视线**

遮示玻璃、收线、有安全站台

图中是检查类别，不是完整危险物名单。未知材料、植物和液体先隔离，再核实。

门窗、玻璃、风扇：最容易忽略的细节

- 在门外放提醒，快递、访客来之前先回笼；纱窗需要确认牢固，不能把普通纱网视为防啃逃逸装置。
- 让鸟先在较小的安全区域熟悉落脚点。用窗帘或明显视觉标记帮助识别玻璃与镜面，不突然熄灯逼它降落。
- 吊扇、台扇在活动前关闭并停稳；同时检查扫地机器人、可折叠家具、自动门等可能夹伤的位置。
- 不在鸟尚未熟悉环境、持续惊飞或不知回笼路线时放到整套房子里；先建立安全落脚点和回笼练习。

厨房、洗手间、桌面与沙发都要查

- 厨房不作活动区。热锅、开火、热饮、油烟和不粘表面过热都有风险；不要以“人没闻到味道”判断空气安全。
- 盖上马桶、水桶和水槽，清走打开的深水杯；洗澡、煮水、端热食时先把鸟安全安置。
- 收好药片、烟草、酒、清洁剂、化妆品、杀虫剂、胶水、黏虫板与电池；不让鸟啃电线或金属首饰。
- 未知植物不提供啃咬，摆放位置也要隔离；无毒植物仍可能带农药、肥料、霉菌或危险盆土。
- 落座、收沙发、关抽屉、盖被、洗衣或开洗碗机前，先目视确认鸟在哪里。

与孩子、猫狗相处时的底线

- 成年人监督孩子接触，手部动作轻缓，不抓翅膀、不捏身体、不把手伸进笼内追鸟。鸟拒绝时结束互动。
- 猫狗与鸟物理隔离，不拍“亲密相处”挑战视频；围观、扑笼、舔舐都不是安全互动。
- 被猫狗咬抓或含入口中，即使伤口很小也应立即联系急诊，不能只在家消毒观察。
- 避免亲嘴、口对口喂食；接触鸟和清洁笼具后洗手，食盆不与人的餐具混洗混放。

疑似烟雾 / 有毒气体暴露

确保人的安全，立即将鸟转移到空气清新的安全位置并联系鸟类急诊。不要为了找气味来源或等症状出现而延误，也不要自行做雾化、灌水或用药。

到家第一周：先适应，再建立关系

日程是帮助你安排事情，不是要求鸟按天数完成进度。有明显不进食、呼吸或精神异常时，不要用“刚到家害怕”解释并拖延。

先记住这几件事

- 先保留原来可靠的食物，确认喝水与实际进食，不同时换笼、换粮、洗澡和训练。
- 已有鸟的家庭，隔离需要独立空间与用品；两笼放同一房间不等于有效隔离。
- 新鸟尽早预约鸟类体检，隔离解除由兽医根据来源、检查和检测决定。

第一周行动路线 · 以鸟的状态为准

01

当天

安静入住，食水可及，远距离看是否吃喝

02

接下来几天

建立食欲、排便与称重记录，完成就诊安排

03

逐步熟悉

平静说话、短时间陪伴，让鸟自主靠近

04

稳定之后

练站秤和回笼，再渐进换粮与丰富活动

出现急症信号时跳过适应日程，直接联系医院。

接鸟与进家门，具体怎么做？

1. 出发前确认运输箱通风与锁扣，车内固定，避免阳光直晒；不散放在肩上乘车，不把鸟独自留在车内。
2. 家中笼舍提前布置好，关好门窗。让交接和进笼过程安静、短暂，不邀请全家轮流上手。
3. 食物和水放在容易发现的位置，容器形式尽量熟悉。观察实际取食，不能只看鸟站在食盆边。
4. 记录到家时间、运输过程、原粮和观察到的状态。持续拒食、明显粪便减少或精神变差时当天联系医院；伴虚弱、呼吸异常则按急症处理。
5. 第一晚提供安静睡眠，避免完全密封笼罩。发现夜间惊飞时先开柔和的灯并移除眼前风险，不在黑暗中追抓。

家里已有鸟：怎样隔离和介绍？

- 使用独立房间、食盆、刷具和运输用品，尽可能避免共用空气流。先照顾原有鸟，再照顾新鸟，处理后洗手，污染衣物及时更换。
- 常见隔离建议为 30–45 天，但这不是“天数一到就安全”的保证。来源、暴露和检测结果可能要求更长或不同安排，按接诊兽医意见执行。
- 把每只鸟的记录分开。不要因为一次阴性检测就跳过隔离；检测项目、取样与时间窗口需要专业解释。
- 允许解除隔离后先远距离隔笼熟悉，再逐步缩短距离，观察是否躲避、扑咬或护食。任何一只紧张就退回上一步。
- 不强迫成为朋友。虎皮与小太阳按分笼、分开活动安排，不进行直接接触式“试一试”。

到医院前，准备哪些信息？

- 物种、估计年龄与来源、到家时间、既往报告、目前食物照片与包装、用过的药物或补充剂。
- 近期体重、吃喝与排便变化，异常动作的短视频；疑似暴露物的名称和包装，不要带着敞开的毒物去医院。
- 提前问是否需要带新鲜粪便或笼底纸、如何保存；不为收集样本延误就诊，也不自行给鸟禁食，除非接诊兽医明确要求。
- 询问个体饮食方案、称重频率、复查安排、隔离结束条件和夜间异常的联系方式。

每天怎么喂：先确认吃进去，再谈比例

没有一张百分比餐盘能适合所有虎皮和小太阳。配方粮、种子、蔬菜与奖励如何搭配，需要看物种、真实摄入、体况和健康状态；鲜食重量也不能直接当作营养占比。

先记住这几件事

- 不长期只喂谷物、粟子或葵花籽；选择适合物种的可靠食物，讨论个体搭配。
- 虎皮不要直接套用大鹦鹉的全颗粒方案；任何换粮都不能靠挨饿完成。
- 干粮、鲜食分开放，饮水随时可得；湿粮和鲜食及时收走，不隔夜留笼。

饮食的四个角色 · 不是比例处方

01

营养基础

适合物种与个体的配方粮及主食安排

02

新鲜多样

蔬菜轮换，洗净，切成能处理的小份

03

限量奖励

种子、坚果、水果计入全天摄入

04

干净饮水

一直能喝到，弄脏就换，容器每日清洗

虎皮的种子安排与小太阳不同；图中四块面积相同只为分类，不表示各占四分之一。

“颗粒粮”“种子粮”到底有什么区别？

- **配方粮 / 颗粒粮**：通常将多种营养成分加工到颗粒中。看是否适合该物种和生命阶段、厂家使用说明与保存条件，不只看包装写“全营养”。
- **种子粮**：谷物、种子或坚果的混合，鸟会挑食，空壳也会让食盆看起来仍很满。混合品种多不等于营养已经完整。
- **鲜食**：用来增加食物多样性，不能用一盘水果或蔬菜代替足够的主食。
- **虎皮**：先记录实际吃的种子与配方粮，由鸟类兽医结合个体建议搭配；不突然撤掉种子改成纯颗粒。
- **小太阳**：避免把葵花籽、花生和水果作为主要食物；配方粮与蔬菜为饮食重建的重要部分，份量根据体况调整。

新手鲜食清单：从少量、简单、能确认的食物开始

- 可轮换尝试洗净的彩椒、西兰花、胡萝卜和合适叶菜；南瓜或红薯可无调味煮熟后放凉。一次不要引入很多种，便于观察接受度。
- 少量水果可选苹果果肉（去籽和果核）、去核的桃或樱桃果肉、蓝莓等。水果只作搭配，不因为鸟爱吃就无限供应。
- 坚果选择新鲜、无盐、无调味、无霉变的合适小块，作为有限奖励；不要与苹果籽、桃核等混为一类。
- 豆类、谷物等若提供，应确认食材适合并充分煮熟、无调味、放凉；新手不从生豆、自制发芽粮或野采植物开始。
- 不喂发霉、酸败、黏滑、异味、来源不明或过期食物。没列在这里的食材并不自动安全，核实前不尝试。

食物准备、保存和剩食处理，按顺序做

1. 先洗手，使用干净案板和容器；蔬果充分清洗，移除果核等不适合部分，按鸟能处理的尺寸切小。
2. 少量现做、单独放盆，干粮不与大量湿食长时间混放。粪便、洗澡水或脚踩弄脏的食物立即更换。
3. 把鲜食作为有人照看的短时餐次；保守做法是在 1 小时内收走，炎热环境更早。不要把“还没有臭”当作未变质的保证。
4. 需要预备时少量分装，注明制作与开封日期，按食品安全和产品说明冷藏或冷冻；解冻后的剩食不反复放回。
5. 干粮连同批次与有效期信息妥善保存，容器清洁干燥；不要新旧粮不断混装，也不要把粮长期放在闷热潮湿处。
6. 每天刷洗食水盆、彻底冲净，换上干净水；鸟在水里泡粮时更频繁检查。不要只往旧水里续水。

换粮的四道关卡



不能喂的东西：区分已知危险与不合适食品

- **明确避开：**牛油果 / 鳄梨、巧克力 / 可可、咖啡和含咖啡因茶饮、酒精；怀疑误食时尽快联系兽医并保留包装。
- **不要提供：**洋葱、蒜及含它们的调味食品，苹果籽、桃核、樱桃核等；这并不意味着所有鸟粮种子与可食坚果都相同有毒。
- **不作为日常食物：**高盐、高糖、高油、人类饭菜、腌制品和油炸零食。无糖加工品也不等于适合鸟，不把代糖的其他动物结论直接当成所有鸟类的定论。
- **杜绝误食：**人用药、保健品、尼古丁、未知野生植物、霉变食物；不尝试用牛奶、油或其他偏方“解毒”。
- **补充剂：**不任意叠加钙粉、维生素、益生菌或药物到食水中；已有完整配方时仍应由兽医判断是否需要。

食盆满，不等于鸟吃饱

换粮、新到家或生病时，食盆重量、散落物和空壳都会误导判断。结合真正吞咽、体重、粪便数量与精神状态；摄入明显减少时尽快联系兽医，不等待达到某个统一的下降百分比。

把“吃了一点”变成能交接的信息

食盆看起来满：先分清里面还剩什么

有完整谷粒

外形完整不等于已经吃进去；需要继续观察鸟是否取食、剥壳和吞咽。

下一步：把吞咽与撒落分别记录

多数是裂开的空壳

壳片可能仍堆成满盆。检查时与同批未吃过的粮比较，不只从上方远看。

下一步：补上熟悉且确实会吃的食物

这是观察判断图，不是实物鉴定图。颗粒碎屑、撒落物与空壳都不能直接当作吃下的量。

- 1. **提供前**：记录食物名称、时间，干粮与鲜食分盆；新到家的鸟先保留已经吃得懂的可靠食物。
- 2. **观察时**：从不打扰的位置看是否真正吞咽；只啃碎、拨弄或站在盆旁都单独说明。
- 3. **收拾时**：分别看未吃食物、壳片和撒落物，记下鲜食撤走时间，不把“投放重量 - 剩余重量”直接称为摄入量。
- 4. **交接时**：同时提供体重、排便和精神变化；明显摄入减少时联系医院，不等待填满记录表。

一份填写示例：怎么记录，才不误导自己？

记录示例（不是喂食量建议）

早晨：提供原来熟悉的主食，换上干净水。

观察：看到剥壳并吞咽；新粮只咬碎，暂不计作吃进去。

鲜食：单独提供已洗净、切小的彩椒，记录放入和撤走时间。

收拾：盆内有空壳，笼底有撒落，无法仅靠称差计算摄入。

傍晚：记录精神、排便与是否仍正常取食，异常时及时咨询。

虎皮和小太阳的食物搭配分别确认；同一份记录格式可以共用，份量和换粮计划不能照搬。

07

日常照护：把一天拆成可执行的小事

下面是家庭安排示例，不要求每只鸟同一时间训练或洗澡。先确保吃喝、休息和安全，再逐渐增加丰富活动。

先记住这几件事

- 早晚都要看实际吃喝、排便和精神；观察先于互动。
- 连续、安静的夜间休息很重要，通常可从每晚 10–12 小时的规律睡眠机会安排起。
- 清洁、活动、洗澡都以鸟的状态为前提，不用强迫完成任务。

晨起：先看，再动

- 从远处看站姿、呼吸和反应。
- 按固定条件称重并记录；换水、检查主粮，短时提供鲜食。
- 观察隔夜与晨起排便，确认没有只剩空壳。

白天：运动和找食物

- 完成放飞安全检查，安排有人监督的活动。
- 把少量日粮用于容易的觅食游戏；短训练成功几次即可收尾。
- 及时清走湿食和污染饮水。

傍晚：安静回笼

- 用熟悉奖励引导回笼，不追赶。
- 清理笼底并回顾当日摄入、排便、体重与状态。
- 准备次日用品，检查门锁和玩具。

夜间：保护休息

- 保持规律的安静、偏暗环境，减少电视和反复开灯。
- 不密封通风口，不让鸟钻进被窝与人睡。
- 夜惊后开柔和灯查看是否受伤，反复发生需排查。

日常清洁：不是喷点消毒液就算完成

1. 先安全安置鸟、拿走食水，湿润需要清理的污物后去除，尽量减少扬尘，不直接在鸟旁喷清洁剂。
2. 日常容器可用合适的无香清洁方式刷洗，随后充分冲净；表面没有残留、用品干燥后再放回。
3. 笼底纸每日更换，明显污染随时处理；每周按脏污情况清洗笼体、托盘与栖木，不能等到发臭才清洁。
4. 消毒不是越浓越好；特定传染风险应由兽医指定产品、稀释、接触时间与冲洗方法。绝不混合漂白剂与酸性或含氨产品。
5. 清洁工具分鸟 / 分区域使用，结束后洗手；不要在食物准备区域抖落笼底废物。

洗澡：让鸟选择，不用抓住冲水

- 提供浅盘干净水，或鸟愿意接受的轻柔水雾；先远距离引入，退缩就暂停，不向脸和鼻孔猛喷。
- 只用清水，不使用人的沐浴露、香波、精油或羽毛亮泽喷剂。洗澡水不能代替全天饮水。
- 安排在温度舒适、有足够时间自然干燥的白天；不在临睡前把鸟弄得湿透，也不用热吹风机追着吹。
- 生病、虚弱或持续害怕时先不洗澡，咨询兽医。频率依据鸟的意愿和环境，不强行固定成每天一次。

指甲、喙和换羽，新手能自己处理多少？

- 日常看脚趾、脚底、喙和羽毛是否破损、勾挂或影响吃食。第一次修指甲应由有鸟类经验的人操作并示范，不照照片盲剪。
- 喙明显过长、变形或突然变化需要检查原因，不自行磨喙。剪羽不是训练，也不是防走失保证。
- 正常换羽与拔羽、皮肤裸露、带血断羽不是同一回事。新羽管带血、持续出血或明显不适时不要拔扯。
- 不要强行剥开新羽的角质鞘；鸟愿意接受时才轻柔接触头颈，其他身体部位不为“帮它理羽”持续揉摸。

读懂拒绝：先建立信任，再开始训练

亲人不等于必须接受任何触摸。先描述你看见的动作、发生前的事情和之后的结果，比给鸟贴上“坏”“报复”的标签更有用。

先记住这几件事

- 从愿意靠近、接奖励、站台开始，允许退开，不饿鸟、不抓服。
- 身体语言要结合情境和多个信号，不能只凭瞳孔或蓬毛判断情绪。
- 突然咬人、突然安静或活动改变，先排除疼痛与疾病。

互动前的判断流程·不是情绪诊断表

愿意参与

主动靠近、能正常取食、可自由离开

→ 继续一小步，立即奖励

需要距离

后退、僵住、躲闪、前倾张嘴警告

→ 停手退开，降低难度

可能不舒服

异常嗜睡、呼吸费力、不吃、站不稳

→ 停止训练，联系兽医

单个动作可能有不同含义。“一动不动”也可能是害怕，不自动等于放松。

第一课：让它觉得你靠近是安全的

1. 先找到鸟能平静看你的位置，侧身坐下，声音轻缓；它退开、僵住或警告时增大距离。
2. 选择它熟悉的小份奖励，先放进食盆或安全递送，不用手追着嘴。奖励计入日粮，不先饿一顿。
3. 每次只要求一件容易的事：看向你、向前一步或留在站台。做对后马上给奖励，用同一简短声音标记成功。
4. 最初可以一两分钟就结束，在仍愿意参与时收尾；拒绝奖励、注意力散开或后退时暂停。
5. 连续几次顺利后才稍微加难度；家庭成员采用同样规则，不今天轻柔、明天强抓。

目标训练、上手与回笼：如何拆小步骤？

- **目标训练**：用安全目标物在不造成压力的距离呈现，先奖励看向目标，再奖励靠近，最后才是轻触；不拿目标棒戳鸟。
- **上站杠 / 上手**：先用稳固的低位站台，引导主动迈步；不把手压向胸腹、不把它挤到只能跳上手的位置。
- **回笼**：平时就练入笼后获得好事，有时进笼奖励后还能再出来；不要只在活动结束后或惩罚时叫回笼。
- **站秤**：先熟悉秤旁环境，再上独立站架，最后把站架放到秤上；秤稳固且归零，不抓着鸟读数。
- **运输箱**：从靠近、看门、取门口奖励到主动进入逐步练习；之后才短暂关门、提起和模拟出行。
- 优先学会目标、回笼、站秤、运输箱、换站台、短时独处、接受观察和温和检查；花式动作并非必需。

咬人了怎么办？不要靠忍痛或惩罚解决

- 先稳住站台，停止逼近，保护人与鸟；不甩手、不弹嘴、不喷水、不摇笼，也不为了证明不怕咬而持续伸手。
- 记录前因（伸手取碗、摸背、靠近巢洞等）、动作（张嘴、扑咬等）与后果（人退开、被抱走等），找可重复的触发点。
- 下次在警告前就降低要求，改用站台和目标引导；食盆维护可先请鸟移动到另一站台。
- 突然出现或持续加重的咬人先检查健康，必要时找使用正向强化方法的行为顾问；不把一切归结为发情。

一直叫怎么办？先判断是在联络还是求助

- 先看是否被吓到、食水不可及、受伤或出现其他异常；不能把所有叫声都忽略。
- 正常晨昏联络声不可能完全消除。提供规律互动、独立觅食和运动，教一个可以接受的回应方式。
- 在较柔和声音或安静间隙给予关注；避免每次高声尖叫后才立即出现大幅互动。
- 不靠长时间盖笼、剥夺睡眠、吼叫或喷水让鸟闭嘴；邻里无法承受时需要重新评估饲养安排。

回笼练习：每一步都留出退路

自主回笼的进阶路线

1

靠近笼门

先有稳定落脚处。愿意靠近就给小份熟悉奖励。

2

进入门内站位

引导自主迈步，不从后面堵、不推胸腹；退开就降低难度。

3

在里面有好事

进入后立即奖励；练习时不必每一次进去都结束活动。

4

短暂关门再开

先在鸟平静时练，再逐渐配合日常作息。时间按接受程度调整。

这不是一次必须完成的四个动作。持续惊飞、拒绝奖励或出现不适时停止，先处理环境和健康问题。

健康观察：学会发现“和平时不一样”

家庭观察不负责确诊，而是尽早发现变化、向兽医说明情况。不要用网上同种鸟的体重范围，替代自家鸟长期稳定的基线。

先记住这几件事

- 记录体重趋势、真实摄入、排便、呼吸和活动，不能只看羽毛漂亮不漂亮。
- 呼吸费力、站不稳、明显虚弱或持续出血，直接按急症处理。
- 不等到多个症状同时出现，也不为了拍好视频而反复抓鸟。

一份排泄物，分三部分观察



成形粪便

食物残渣部分，颜色可受食物影响。



尿酸盐

常见白色或乳白部分，不是白色的粪便。



尿液

周围透明液体，增加不一定等于腹泻。

色块仅区分观察项目，不是正常粪便照片或诊断标准。要结合食物、数量、体重与精神状态。

如何称重和记录，才有可比性？

1. 使用同一台稳定电子秤、同一站架，先归零，在相近的日常条件下称重，例如晨起首次排便后、早餐前；不为测量故意延长禁食。
2. 健康新到家、换粮期可与兽医约定每日记录；长期频率按个体安排。怕秤先训练，病鸟不为读数反复追抓。
3. 记下日期、时间、克重、是否已经进食，以及精神与排便。用实际连续数据建立基线，不凭一次称重判定肥胖或消瘦。
4. 读数异常先排除未归零、站架接触桌面、秤晃动；确认持续下降或伴吃得少时尽快联系医院。
5. 任何明显不适都不必等体重下降到某个固定百分比；也不要因为体重暂时没变就忽视呼吸异常。

早晚从远处观察这五件事

- **精神**：是否比平时更嗜睡、持续蓬毛、不愿移动或异常容易接近。短暂休息与全天状态改变不同。
- **吃喝**：真正吞咽了吗？喜欢的食物也拒绝吗？粪便数量减少可能提示摄入不足。
- **呼吸**：静息时是否张口、尾巴随呼吸明显上下起伏、伸颈或发出异常声音。
- **动作**：是否能正常站杠、左右抓握、行走和飞行；一侧翅膀下垂、跌落或失衡需要处理。
- **外观**：眼鼻分泌物、伤口、脚底改变、肛周污染、羽毛损伤；不要为了看清而持续压迫胸部。

粪便变化怎么判断行动，而不是猜病名？

- 吃彩色食物后可能变色，水果、水量或紧张可能增加透明液体；记录当餐食物，但不自动认定所有红色都是食物。
- 若精神、食欲正常且变化短暂，可记录并联系门诊咨询；持续变化、明显减少、不成形或同时精神差，需要及时就诊。
- 疑似血液、黑色柏油样排泄物、持续努责、反复呕吐或明显虚弱，按急症联系医院。
- 照片尽量带自然光和比例参照，记录发生时间；样本保存按医院要求，不在家用颜色表套病名开药。

一张可以抄下来的就诊记录模板

日期 / 时间：_____

物种 / 名字：_____ 体重：_____克

实际吃的食物与大致变化：_____

排便数量 / 外观：_____

精神 / 呼吸 / 动作：_____

何时开始，与平时相比：_____

可能接触的食物 / 烟雾 / 金属 / 药物：_____

已采取的措施 / 联系医院时间：_____

可拍照、打印或抄到个人记录本。此页的任务勾选不是连续医疗记录，请另行保存体重与症状记录。

称重：先固定条件，再看变化

四步称重图 · 数字仅表示归零，不是标准体重

1

空站架放稳

秤放平；站架不碰桌面、墙或其他支撑物。

2

按归零 / 去皮

0.0 g

确认站架重量已扣除；按设备实际显示核对。

3

鸟自主站上来

待读数稳定；不要用手扶住鸟或站架读取结果。

4

记下条件

日期、克重、是否进食、排便和精神。比较同一只鸟的连续记录。

还怕秤时先练习接近和站架；生病、喘或虚弱时优先就医，不为得到一条数据追抓。

急症：先联系医院，不等待网络回复

以下出现任一项，都应立即联系能够接诊鸟类的急诊。若常去医院无法接通，寻找最近可提供急诊稳定处理并协调转诊的医院，不无限等待某一家回复。

先记住这几件事

- 静息张口呼吸、明显尾摆、瘫软、抽搐、失衡或无法站杠。
- 持续出血、明显撞伤、猫狗咬抓、疑似烟雾 / 毒物 / 金属 / 药物暴露。
- 反复呕吐、明显拒食伴虚弱、持续努责或疑似卡蛋、幼鸟喂食后喘或鼻孔流食。

急症行动顺序

01

立即联系

说清物种、症状、时间与疑似暴露，确认接诊

02

减少刺激

安静、通风、少抓持；按电话指导准备

03

安全转运

稳固运输箱，弱鸟低位安置，避免跌落

04

交接信息

带记录与包装信息；不为拍照取样延误

电话求助与出行安排可以由两位家人同时进行。网页不能判断你的鸟是否已脱离危险。

转运时怎么放

- 使用安全小运输箱，底部铺干净、不易勾爪的垫料。
- 虚弱鸟撤掉高栖杠，避免跌落；遮住部分视线但不堵通风。
- 减少开箱与抓持，不挤压胸腹。

温度怎么处理

- 不要把所有病鸟都放进高温箱。
- 疑似中暑、张口喘或呼吸困难时，不自行加热。
- 是否保温、热源位置与温度按接诊兽医指导，热源不能直接贴鸟。

可见出血怎么办

- 在不妨碍呼吸的前提下，用干净纱布对可接触的外部出血处持续轻压。
- 不频繁掀开查看，不向眼鼻、深伤口撒粉，不自行拔带血羽。
- 持续出血或状态变差立即急诊。

绝对不要做

不要强灌水、强塞食、催吐、挤嗦囊、按摩腹部拉蛋、自行上药或喂人用药。不要因“先补充点体力”延误转运；虚弱时强喂容易误吸。

医疗边界

本页只帮助识别危险与准备就诊，不提供确诊、家庭药物剂量或侵入性操作。遇到不确定的情况，直接描述观察到的现象给接诊兽医。

常见问题：知道要检查什么，不自行开药

同样的蓬毛、腹泻、咬羽或嗜睡，可以有完全不同的原因。治疗必须建立在个体检查上，“别人家的鸟吃这个好了”不能直接套用。

先记住这几件事

- 新鸟隔离、卫生、营养与定期检查，比无诊断的预防性用药更可靠。
- 啄羽不一定是无聊，饮食异常也不一定只要补一种营养素。
- 药物、驱虫、补钙、检测和复查由接诊兽医决定。

感染与病原

细菌、真菌、寄生虫及不同病毒均可能表现为非特异症状。提供接触史与既往报告，由兽医选择检测，不能一次“全阴性”就终身放心。

营养与代谢

长期不均衡饮食、能量过多或活动不足可能损害健康。评估真实摄入和体况，不能用补品掩盖主食问题。

皮肤、脚与羽毛

啄羽、脚底问题、结痂和喙改变需要找原因。不要自行戴圈、喷苦味剂、抹油或剪磨喙。

繁殖与排泄

反复产蛋、腹胀、努责和泄殖腔问题需及时评估；疑似卡蛋、脱出或呼吸困难是急症。

疾病名字很多，新手先理解这几个词

- **鹦鹉热衣原体**：属于可能影响鸟与人的病原。若鸟被怀疑或确诊，按兽医要求隔离与清洁；人出现不适时告诉医生鸟类接触史。
- **PBFD / 圆环病毒、多瘤病毒、鸟博尔纳病毒**：是不同病原，不能用一个统称或单一症状代替检测诊断。
- **脂肪肝、低钙、维生素不足**：不是只看胖瘦或羽毛就能确认；补充方案取决于检查与完整饮食。
- **啄羽**：描述破坏羽毛的行为，不是已经找到病因；健康、皮肤、营养、环境和行为因素都可能参与。

用药后的家庭配合

- 拿到写清药名、个体剂量、给药途径、频次、疗程与复查时间的处方；不清楚就让医院演示。
- 不能把处方上毫升与毫克混用，也不自行换另一种浓度；不把小太阳剂量直接缩放给虎皮。
- 记录实际是否成功给入、是否吐出和异常反应；漏服或吐药后是否补给，先问医院。
- 没有指导不把药混进一大盆水，摄入量可能无法控制；不因为好转就自行提前停药或把剩药留给另一只鸟。

发情与下蛋：新手不以繁殖为目标

雌鸟没有公鸟也可能下蛋。发情不是做错事，但家庭可以减少过度刺激；反复产蛋需要医疗评估，不是多放钙块就能解决。

先记住这几件事

- 不提供巢箱、帐篷和长期可钻的暗洞；不让鸟把主人当作持续配偶式互动对象。
- 抚摸以鸟愿意接受的头颈为主，不持续摸背、腹部和翅膀下。
- 笼底努责、腹胀、宽脚站立、尾摆或呼吸困难，怀疑卡蛋立即急诊。

每天可以调整的环境与互动

- 阻止进入柜缝、纸箱、沙发底、衣服和被窝；避免形成固定巢穴。啃咬材料仍可用于监督下的丰富活动，不必剥夺所有玩耍。
- 维持规律睡眠，不持续延长夜间照明；不要自行长时间极端遮光，反复产蛋者的光照计划由兽医制定。
- 维持适合体况的饮食，控制高能量奖励；不靠节食或撤掉营养来制止下蛋。
- 鼓励独立觅食、站台和与不同家人平和相处；不口对口喂食，也不奖励持续对人反刍的互动。

已经下蛋、反刍，或者怀疑卡蛋怎么办？

- 记录产蛋日期、次数与状态，向兽医询问如何管理现有蛋；不要一见蛋就反复拿走，也不要自行增加钙药剂量。
- 对特定人或物有节律地返食可能与求偶相关，但甩头、食物沾头脸、反复发生或伴精神差也可能是疾病；不确定就拍短视频给兽医。
- 疑似卡蛋时不要揉腹、拉蛋、向泄殖腔灌油或蒸熏，直接按急症处理。
- 没有系统繁殖准备与医疗支持，不为“体验一窝”配对繁殖。

13

未断奶幼鸟：不是适合新手的捷径

亲人关系可以通过安全互动建立，不需要从零日龄喂起。幼鸟手养涉及误吸、灼伤、感染、营养错误与体温管理，不能靠一张通用温度和喂食量表完成。

先记住这几件事

- 优先接已经稳定独立进食的鸟，不把“更亲人”当成购买未断奶幼鸟的理由。
- 如果已经接到未断奶幼鸟，当天联系鸟类兽医或有医疗支持的合格育雏人员，安排接管或面对面指导。
- 鼻孔流食、喘、无求食反应、嗦囊排空异常或突然虚弱，停止强喂并急诊。

误吸

食物进入气道而不是消化道，可能迅速危及生命；不在没有训练的情况下尝试插管或灌喂。

嗦囊损伤

温度、器具或操作错误可能导致灼伤、穿孔；不靠手腕试温或通用“几毫升”决定方案。

感染与营养错误

专用配方、器具卫生、储存和个体监测都重要；剩奶不反复加热，米糊、牛奶或自配糊不能替代可靠方案。

已经不得不照顾幼鸟，先准备这份交接清单

- 提供具体物种、年龄信息、当前克重、上一次喂食时间、配方与浓度记录、此前喂食方式。
- 记录求食、嗉囊外观与排空情况、粪便、呼吸及环境条件，不挤压嗉囊检验。
- 要求为这只鸟制定书面方案，并当面确认如何观察、如何求助；不要自行从网上拼接多个喂食方案。
- 断奶以自主摄入和健康状态为依据，不通过饿鸟强迫，也不把啄几口固体食物当成断奶完成。

14

出行与寄养：把照护交接写下来

不能只留一盆粮就出门数天。代养者需要知道平时怎样照顾、哪些变化要联系你，以及如何及时送医。

先记住这几件事

- 提前练习运输箱，出行用品固定可靠；不把鸟放肩上出门或散放车内。
- 寄养了解隔离、空气、其他动物、食物与急诊安排，不临时把陌生鸟放一起。
- 留下书面交接，不要求代养者临时换粮、剪指甲或训练新动作。

给代养者的交接清单

- 鸟的照片、名字、物种、个体体重基线、日常行为与不喜欢的动作。
- 每日食物名称、准备方式、份量安排、鲜食撤走规则、换水清洁步骤；把可用食物分装标明。
- 作息、门窗规则、笼门锁法、是否允许放飞；不会安全回笼与监督的人不要临时尝试复杂放飞。
- 需要观察的异常、门诊与急诊电话、地址、交通方式、治疗授权与费用安排、联系不上你时的备用联系人。
- 当前处方与复查要求；在对方能正确执行并明确接手前，不假定口头讲过就足够。

途中与走失预防

- 运输箱先熟悉，门锁双重检查，车内固定；箱体不密封，不放后备箱，不留车内独处。
- 外出不无保护放飞；剪羽的鸟仍可能借风飞走，剪羽不能替代运输箱或安全环境。
- 若走失，先记住方向与位置，保持视线、用熟悉呼唤和食物吸引，并组织安全搜索；不要追赶惊飞或攀爬危险位置。
- 通过小区与合适寻鸟渠道提供清楚照片、时间、地点和联系方式；不要公开不必要的个人住址细节。

照护清单：每天做完，每周回看

清单只保存在当前浏览器或文件的本地存储中，不上传、不跨设备同步。微信清缓存、换浏览器或移动离线文件后，记录可能消失；重要健康记录请另存。

先记住这几件事

- 每日与每周按本机日期区分；应急准备保持长期状态。
- 勾选表示做过，不代表鸟一定健康。异常优先就诊，不为完成清单继续训练或洗澡。
- 离线 HTML 已包含图片与正文；微信若无法下载或运行本地文件，可在系统浏览器打开或用电脑下载。

每日照护

填写日期：_____

☐ 换水并刷洗食水容器，污染后再次更换

☐ 确认实际吃够主食，检查空壳与剩食

☐ 及时撤走鲜食和湿粮，没有隔夜留笼

☐ 观察精神、呼吸、排便，按计划记录体重

☐ 更换笼底纸，检查脚、玩具和门锁

☐ 安全检查后安排有人监督的活动

☐ 提供合适的陪伴、觅食或短训练

☐ 准备安静睡眠，确认鸟回到安全位置

每周回看

本周起始日：_____

- ☐ 按脏污程度清洁笼体、托盘与栖木
- ☐ 移除破损、松线、可吞零件与危险挂扣
- ☐ 回看体重、真实摄入与异常记录
- ☐ 检查粮食有效期、鲜食计划和备用用品
- ☐ 与家人确认照护交接与下周出行安排

长期应急准备

定期确认仍然可用

- ☐ 已保存能接诊鸟类的门诊与夜间急诊信息
- ☐ 已确认路线、交通与备用联系人
- ☐ 运输箱、纱布与干净毛巾随手可取
- ☐ 已按能力练习运输箱与站秤
- ☐ 重要健康记录已另存，不只留在网页里

微信与离线版怎么使用？

- 在线：在微信直接打开网站链接；如果下载按钮被微信拦截，尝试右上角菜单用系统浏览器打开，再下载。不同系统、微信版本与策略可能不一样。
- 离线：把完整 HTML 保存到“文件”或电脑目录，再选择支持本地网页的浏览器打开；图片、目录与正文无需网络。仅收藏在线链接不等于已经保存离线版。
- 手机文件预览器可能只显示静态内容，或不支持脚本与本地存储。这时正文仍可阅读，交互功能需换支持本地 HTML 的浏览器；打印为 PDF 可作静态备份。
- 离线文件不会自动更新。页面底部显示版本日期；网站更新后重新下载完整文件。照片授权链接和线上网站链接需要联网，但不影响离线读正文。

HTML 保留搜索和清单；PDF 适合手机文件查看器，无需运行脚本。PDF 与官网链接需联网下载，保存后可离线阅读。

2026-09-27 更新了什么？

- 补齐术语和图解搜索，异常关键词增加急症入口。
- 修复弹窗打开时打印内容被截断、离线版展开按钮状态错误。
- 加入无脚本目录、虎皮与小太阳阅读路线、用品验收表和操作图。
- 提供完整静态 PDF，方便保存到手机文件中。

[联网查看官网最新版本](#)；离线文件不会自动更新。

新手词典：把术语说成人话

遇到陌生词可以直接用搜索，也可以在这里快速对照。这里解释词义，不据此判断某只鸟的疾病。

先记住这一点

- 看见一个术语，不等于已经有诊断；用具体观察描述给兽医。

异宠 / 鸟类兽医

“异宠”不保证每家医院都能看鸟。预约时明确问是否接诊虎皮或小太阳，以及当班医生与急诊能力。

断奶 / 独立进食

不再依赖人工喂食，能够自行摄入足够食物并保持稳定状态；会啄食不等于已经断奶。

嗦囊

食道的扩张部分，可暂时储存食物；不是靠挤压就能检查或治疗的“食袋”。

配方粮 / 颗粒粮

按营养配方加工的食物类别；仍要看适用物种、生命阶段、真实摄入与产品说明。

基线

这只鸟在稳定、健康条件下平时的体重、进食、排泄和行为，用来和之后的变化比较。

尾摆

尾巴随呼吸明显上下起伏；静息时持续出现并伴费力呼吸需及时处理，不是普通摆尾玩耍。

尿酸盐 / 多尿

尿酸盐常呈白色；多尿指液体部分增多，不能直接与粪便不成形的腹泻画等号。

泄殖腔 / 努责

泄殖腔是消化、泌尿和生殖系统末端共用的开口区域；努责是持续用力排出的样子，不要自行挤压腹部。

正向强化 / 目标训练

做出希望的行为后及时得到有价值的结果；目标训练把靠近或轻触目标物变成易理解的沟通步骤。

丰富化 / 觅食

让生活不只有站着和吃现成食物，例如安全啃咬、探索和寻找少量食物；难度不能妨碍吃够。

隔离

通过独立空间、用品和操作顺序减少病原传播，不只是两只笼子隔几步远。

PTFE / 不粘涂层风险

某些不粘材料在过热时可能释放对鸟危险的气体；没有气味不代表安全，鸟应远离烹饪与相关烟气。

用于日常照护教育与就诊准备，不能替代鸟类兽医检查。医疗、特殊饮食、隔离与育雏方案应按具体物种与个体决定。

真实照片：虎皮 © Аймаина хикари；绿颊锥尾 © Hugo Hulsberg (hhulsberg)。均以 CC0 1.0 提供；仅缩小图像尺寸。[虎皮照片信息](#) · [绿颊照片信息](#)。图解为独立编排的教学示意，不是疾病诊断图。

离线阅读不需要联网；照片信息链接需要联网。任务记录仅留在当前设备。