



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
 FACULTAD DE MATEMÁTICAS
 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
 PROFESOR: PEDRO GASPAR – ESTUDIANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Geometría Diferencial - MAT2860

Tarea I3

26 de junio de 2025

Problema 1

a)

b)

Problema 2

El toro, puede ser parametrizado por $X : (0, 2\pi) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$X(u, v) = ((R + r\cos(u))\cos(v), (R + r\cos(u))\sin(v), r\sin(u))$$

Si intersectamos con el plano $z = 1$, entonces $r\sin(u) = c$ y por lo tanto

$$r\cos(u) = \pm\sqrt{r^2 - c^2} := c'$$

que esta bien definida pues $c \in [-r, r]$. Bajo esta restricción definimos

$$\eta := R + r\cos(u) = R + c' > 0$$

Consideramos la curva $\alpha : (0, 2\pi\eta) \rightarrow \mathbb{R}^3$ parametrizada por el arco dada por

$$\alpha(t) = \left(\eta \cos\left(\frac{t}{\eta}\right), \eta \sin\left(\frac{t}{\eta}\right), c \right)$$

Buscamos calcular su curvatura geodésica, en primer lugar debemos calcular la aplicación de gauss de la superficie, para ello vemos lo siguiente

$$\begin{aligned} X_u(u, v) &= (-r\sin(u)\cos(v), -r\sin(u)\sin(v), r\cos(u)) \\ X_v(u, v) &= (-(R + r\cos(u))\sin(v), (R + r\cos(u))\cos(v), 0) \end{aligned}$$

entonces

$$(X_u \times X_v)(u, v) = (-(R + r\cos(u))r\cos(u)\cos(v), -(R + r\cos(u))r\cos(u)\sin(v), -(R + r\cos(u))r\sin(u))$$

y además $|(X_u \times X_v)(u, v)| = (R + r\cos(u))$. Usando que u es tal que $r\sin(u) = c$, se sigue que

$$N(\alpha(t)) = -\frac{1}{r} \left(c' \cos\left(\frac{t}{\eta}\right), c' \sin\left(\frac{t}{\eta}\right), c \right)$$

Por otro lado vemos que

$$\alpha'(t) = \left(-\sin\left(\frac{t}{\eta}\right), \cos\left(\frac{t}{\eta}\right), 0 \right) \quad \text{y entonces} \quad \alpha''(t) = -\frac{1}{\eta} \left(\cos\left(\frac{t}{\eta}\right), \sin\left(\frac{t}{\eta}\right), 0 \right)$$

Nuestro objetivo ahora es determinar $\nabla_{\alpha'} \alpha'(t)$, para ello observemos que

$$\langle \alpha'', N \circ \alpha \rangle(t) = \frac{c'}{r\eta}$$

de este modo

$$\begin{aligned}\nabla_{\alpha'}\alpha'(t) &= \alpha''(t) - \langle \alpha'', N \circ \alpha \rangle(t)N(\alpha(t)) \\ &= -\frac{1}{\eta} \left(\cos\left(\frac{t}{\eta}\right), \sin\left(\frac{t}{\eta}\right), 0 \right) + \frac{c'}{r^2\eta} \left(c' \cos\left(\frac{t}{\eta}\right), c' \sin\left(\frac{t}{\eta}\right), c \right) \\ &= \left(\frac{-c^2}{r^2\eta} \cos\left(\frac{t}{\eta}\right), \frac{-c^2}{r^2\eta} \sin\left(\frac{t}{\eta}\right), \frac{cc'}{r^2\eta} \right)\end{aligned}$$

donde usamos que

$$\frac{c'^2}{r^2\eta} - \frac{1}{\eta} = \frac{r^2 - c^2 - r^2}{r^2\eta} = \frac{-c^2}{r^2\eta}$$

adicionalmente se tiene que

$$N(\alpha(t)) \times \alpha'(t) = -\frac{c'}{r} \left(-\cos\left(\frac{t}{\eta}\right), \sin\left(\frac{t}{\eta}\right), 1 \right)$$

por último, se tiene que

$$K_g = [\nabla_{\alpha'}\alpha'] = -\frac{c}{r^2\eta} \cdot \frac{-c'}{r} \left(-ccos^2\left(\frac{t}{\eta}\right) + c\sin^2\left(\frac{t}{\eta}\right) - c' \right) = -\frac{cc'}{r^3\eta} \left(c\cos\left(\frac{2t}{\eta}\right) + c' \right)$$

Problema 3

Problema 4

a) Notemos que

$$\begin{aligned}\omega_p(v) &= \left\langle v, \frac{Jp}{|p|^2} \right\rangle = \frac{1}{|p|^2} \left\langle v, \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{1}{|p|^2} (-v_1y + v_2x) \\ &= \frac{1}{|p|^2} (-dx(v)y + dy(v)x) = \frac{-y}{x^2 + y^2} dx(v) + \frac{x}{x^2 + y^2} dy(v)\end{aligned}$$

concluimos que

$$\omega_p = \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

además, para $p \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ las funciones

$$\omega_1 := \frac{-y}{x^2 + y^2} \quad \text{y} \quad \omega_2 := \frac{x}{x^2 + y^2}$$

son diferenciables, y por lo tanto la 1-forma ω_p es diferenciable.

b) Veamos la siguiente expresión

$$\begin{aligned}d\omega &= \left(\frac{\partial\omega_1}{\partial x} dx + \frac{\partial\omega_1}{\partial y} dy \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial\omega_2}{\partial x} dx + \frac{\partial\omega_2}{\partial y} dy \right) \wedge dy = \left(\frac{\partial\omega_2}{\partial x} dx - \frac{\partial\omega_1}{\partial y} dy \right) dx \wedge dy \\ &= \left(\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) dx \wedge dy = 0\end{aligned}$$

c) Para finalizar, tenemos que

$$\begin{aligned}\int_0^1 \omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) dt &= \int_0^1 -\frac{\gamma_2(t)}{\gamma_1^2(t) + \gamma_2^2(t)} \cdot \gamma'_1(t) + \frac{\gamma_1(t)}{\gamma_1^2(t) + \gamma_2^2(t)} \cdot \gamma'_2(t) dt = \int_0^1 F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt \\ &= \int_{\gamma} F(x, y) ds\end{aligned}$$

es decir, la integral corresponde a la integral de línea del campo vectorial $F(x, y) = (\omega_1, \omega_2)(x, y)$ sobre la curva γ .

Problema 5

a) Se tiene lo siguiente

$$\begin{aligned} (\omega_{ij})_p(v) &= \langle DE_i(p)v, E_j(p) \rangle = \left\langle \sum_{k=1}^3 \frac{\partial E_i}{\partial x_k}(p)v_k, E_j(p) \right\rangle = \sum_{k=1}^3 \left\langle \frac{\partial E_i}{\partial x_k}, E_j(p) \right\rangle v_k \\ &= \sum_{k=1}^3 \left\langle \frac{\partial E_i}{\partial x_k}, E_j \right\rangle(p)(dx_k)_p(v) = \left(\sum_{k=1}^3 \left\langle \frac{\partial E_i}{\partial x_k}, E_j \right\rangle(p)(dx_k)_p \right)(v) \end{aligned}$$

es decir,

$$\omega_{ij} = \left\langle \frac{\partial E_i}{\partial x}, E_j \right\rangle dx + \left\langle \frac{\partial E_i}{\partial y}, E_j \right\rangle dy + \left\langle \frac{\partial E_i}{\partial z}, E_j \right\rangle dz$$

como las funciones E_i y el producto interno son diferenciables, concluimos que ω_{ij} es una 1-forma diferenciable.

b) Se sigue que

$$(\omega_i)_p(v) = \langle v, E_i(p) \rangle = \sum_{k=1}^3 (E_i)_k(p)v_k = \sum_{k=1}^3 (E_i)_k(p)(dx_k)_p(v)$$

entonces

$$\omega_i = (E_i)_1 dx + (E_i)_2 dy + (E_i)_3 dz$$

por la misma razón que antes, la 1-forma ω_i es diferenciable. Por otro lado ...

c)