



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
 FACULTAD DE MATEMÁTICAS
 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
 PROFESOR: PEDRO GASPAR – ESTUDIANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Geometría Diferencial - MAT2860

Tarea I3

26 de junio de 2025

Problema 1

Probaremos un resultado previo sobre transporte paralelo y curvas geodesicas en la esfera.

Lema 0.1. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{S}^2$ una curva de la forma $\alpha(t) = u \sin(t) + v \cos(t)$ donde u, v son ortonormales, entonces $P_{\alpha, t_0, t_1}(w) = w + \langle w, \alpha'(t_0) \rangle (\alpha'(t_1) - \alpha'(t_0))$.

Demostración. Empezamos observando que α es una curva geodésica. Notemos que $\langle \alpha'(t), \alpha(t) \rangle = 0$ para todo $t \in I$ y además $\alpha'' = -\alpha$. Sea $w \in T_p \mathbb{S}^2$ donde $p = \alpha(t_0)$ y sea $Y : I \rightarrow \mathbb{S}^2$ el único campo paralelo a lo largo de α tal que $Y(t_0) = w$, como Y en particular es campo tangente se tiene que

$$Y(t) \in T_{\alpha(t)} \mathbb{S}^2 = (\alpha(t))^\perp$$

es decir, $\langle Y(t), \alpha(t) \rangle = 0$ para todo $t \in I$, lo que implica que $\langle Y, \alpha' \rangle = -\langle Y', \alpha \rangle$. Notemos que

$$0 = \nabla_{\alpha'} Y = Y' - \langle Y', \alpha \rangle \alpha$$

tomando producto interno con α' vemos que

$$\langle Y', \alpha' \rangle = \langle Y', \alpha \rangle \langle \alpha, \alpha' \rangle = 0$$

de este modo

$$\frac{d}{dt}(\langle Y, \alpha' \rangle) = \langle Y', \alpha' \rangle + \langle Y, \alpha'' \rangle = -\langle Y, \alpha \rangle = 0$$

luego la función $\langle Y, \alpha' \rangle$ es constante, evaluando en t_0 vemos que $\langle Y', \alpha \rangle = -\langle Y, \alpha' \rangle \equiv -\langle w, \alpha'(t_0) \rangle$. Tenemos que

$$Y'(t) = \langle w, \alpha'(t_0) \rangle \alpha''(t)$$

integrando a ambos lados vemos que

$$Y(t) - Y(t_0) = Y'(t) - Y'(t_0) = \langle w, \alpha'(t_0) \rangle (\alpha'(t) - \alpha'(t_0))$$

lo que concluye la demostración.

a) Notemos que

$$\gamma_1(s) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cos(s) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sin(s) \quad \text{y} \quad \gamma_2(s) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cos(s) + \begin{pmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \\ 0 \end{pmatrix} \sin(s)$$

además, los vectores que describen cada curva son ortonormales. Por otro lado se tiene que

$$\gamma_1'(s) = (\cos(s), 0, \sin(s)) \quad \text{y} \quad \gamma_2'(s) = (\cos(\theta)\cos(s), \sin(\theta)\cos(s), -\sin(s))$$

Dado $w_0 \in T_{\gamma_1(0)}\mathbb{S}^2 = T_{\gamma_2(0)}\mathbb{S}^2$ entonces $w_0 = (x_0, y_0, 0)$, así, por el lema tenemos lo siguiente

$$\begin{aligned} w_1 &= P_{\gamma_1, 0, \pi}(w_0) = w_0 + \langle w_0, \gamma'_1(0) \rangle (\gamma'_1(\pi) - \gamma'_1(0)) \\ &= w_0 + \left\langle w_0, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = w_0 + x_0 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_0 \\ y_0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

por otro lado

$$\begin{aligned} w_2 &= P_{\gamma_2, 0, \pi}(w_0) = w_0 + \langle w_0, \gamma'_2(0) \rangle (\gamma'_2(\pi) - \gamma'_2(0)) \\ &= w_0 + \left\langle w_0, \begin{pmatrix} \cos(\theta) \\ \sen(\theta) \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \left(\begin{pmatrix} -\cos(\theta) \\ -\sen(\theta) \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \cos(\theta) \\ \sen(\theta) \\ 0 \end{pmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} x_0 - 2x_0\cos^2(\theta) + y_0\cos(\theta)\sen(\theta) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

b)

Problema 2

El toro, puede ser parametrizado por $X : (0, 2\pi) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$X(u, v) = ((R + r\cos(u))\cos(v), (R + r\cos(u))\sen(v), r\sen(u))$$

con derivadas parciales

$$\begin{aligned} X_u(u, v) &= (-r\sen(u)\cos(v), -r\sen(u)\sen(v), r\cos(u)) \\ X_v(u, v) &= (-(R + r\cos(u))\sen(v), (R + r\cos(u))\cos(v), 0) \end{aligned}$$

entonces el campo normal definido por la parametrización es

$$(X_u \times X_v)(u, v) = (-(R + r\cos(u))r\cos(u)\cos(v), -(R + r\cos(u))r\cos(u)\sen(v), -(R + r\cos(u))r\sen(v))$$

y además $|X_u \times X_v| = r(R + r\cos(u))$. Sea $u_0 \in [0, 2\pi]$ tal que $r\sen(u_0) = c$, que existe pues $c \in [-r, r]$. Consideramos $\eta := (R + r\cos(u_0))$, definimos la curva p.p.a $\alpha : (0, 2\pi\eta) \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$\alpha(t) := X\left(u_0, \frac{t}{\eta}\right) = \left(\eta\cos\left(\frac{t}{\eta}\right), \eta\sen\left(\frac{t}{\eta}\right), r\sen(u_0)\right)$$

entonces, suponiendo que la parametrización es positiva

$$(N \circ \alpha)(t) = (N^x \circ X^{-1} \circ \alpha)(t) = N^x\left(u_0, \frac{t}{\eta}\right) = \left(\cos(u_0)\cos\left(\frac{t}{\eta}\right), \cos(u_0)\sen\left(\frac{t}{\eta}\right), \sen(u_0)\right)$$

Por otro lado vemos que

$$\alpha' = \left(-\sen\left(\frac{t}{\eta}\right), \cos\left(\frac{t}{\eta}\right), 0\right) \quad \text{y entonces} \quad \alpha''(t) = -\frac{1}{\eta} \left(\cos\left(\frac{t}{\eta}\right), \sen\left(\frac{t}{\eta}\right), 0\right)$$

Nuestro objetivo ahora es determinar $\nabla_{\alpha'}\alpha'(t)$, para ello observemos que

$$\langle \alpha'', N \circ \alpha \rangle = \frac{1}{\eta} \begin{pmatrix} \cos(t/\eta) \\ \sen(t/\eta) \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos(u_0)\cos(t/\eta) \\ \cos(u_0)\sen(t/\eta) \\ \sen(u_0) \end{pmatrix} = \frac{\cos(u_0)}{\eta}$$

de este modo

$$\begin{aligned}\nabla_{\alpha'}\alpha' &= \alpha'' - \langle \alpha'', N \circ \alpha \rangle N \circ \alpha = -\frac{1}{\eta} \begin{pmatrix} \cos(t/\eta) \\ \text{sen}(t/\eta) \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{\cos(u_0)}{\eta} \begin{pmatrix} \cos(u_0)\cos(t/\eta) \\ \cos(u_0)\text{sen}(t/\eta) \\ \text{sen}(u_0) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\eta} \begin{pmatrix} \cos(t/\eta)(\cos^2(u_0) - 1) \\ \text{sen}(t/\eta)(\cos^2(u_0) - 1) \\ \cos(u_0)\text{sen}(u_0) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

adicionalmente se tiene que

$$N \circ \alpha \times \alpha' = \begin{pmatrix} \cos(t/\eta)\text{sen}(u_0) \\ \text{sen}(t/\eta)\text{sen}(u_0) \\ -\cos(u_0) \end{pmatrix}$$

por último, se tiene que

$$\begin{aligned}K_g = [\nabla_{\alpha'}\alpha'] &= \frac{1}{\eta} \begin{pmatrix} \cos(t/\eta)(\cos^2(u_0) - 1) \\ \text{sen}(t/\eta)(\cos^2(u_0) - 1) \\ \cos(u_0)\text{sen}(u_0) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos(t/\eta)\text{sen}(u_0) \\ \text{sen}(t/\eta)\text{sen}(u_0) \\ -\cos(u_0) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\eta} ((\cos^2(u_0) - 1)\text{sen}(u_0) - \cos^2(u_0)\text{sen}(u_0)) = \frac{-\text{sen}(u_0)}{R + r\cos(u_0)}\end{aligned}$$

Problema 3

Problema 4

a) Notemos que

$$\begin{aligned}\omega_p(v) &= \left\langle v, \frac{Jp}{|p|^2} \right\rangle = \frac{1}{|p|^2} \left\langle v, \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{1}{|p|^2} (-v_1y + v_2x) \\ &= \frac{1}{|p|^2} (-dx(v)y + dy(v)x) = \frac{-y}{x^2 + y^2} dx(v) + \frac{x}{x^2 + y^2} dy(v)\end{aligned}$$

concluimos que

$$\omega_p = \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

además, para $p \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ las funciones

$$\omega_1 := \frac{-y}{x^2 + y^2} \quad \text{y} \quad \omega_2 := \frac{x}{x^2 + y^2}$$

son diferenciables, y por lo tanto la 1-forma ω_p es diferenciable.

b) Veamos la siguiente expresión

$$\begin{aligned}d\omega &= \left(\frac{\partial \omega_1}{\partial x} dx + \frac{\partial \omega_1}{\partial y} dy \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial \omega_2}{\partial x} dx + \frac{\partial \omega_2}{\partial y} dy \right) \wedge dy = \left(\frac{\partial \omega_2}{\partial x} dx - \frac{\partial \omega_1}{\partial y} dy \right) dx \wedge dy \\ &= \left(\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) dx \wedge dy = 0\end{aligned}$$

c) Para finalizar, tenemos que

$$\begin{aligned}\int_0^1 \omega_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) dt &= \int_0^1 -\frac{\gamma_2(t)}{\gamma_1^2(t) + \gamma_2^2(t)} \cdot \gamma'_1(t) + \frac{\gamma_1(t)}{\gamma_1^2(t) + \gamma_2^2(t)} \cdot \gamma'_2(t) dt = \int_0^1 F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt \\ &= \int_{\gamma} F(x, y) ds\end{aligned}$$

es decir, la integral corresponde a la integral de línea del campo vectorial $F(x, y) = (\omega_1, \omega_2)(x, y)$ sobre la curva γ .

Problema 5

a) Veamos que ω_{ij} es una 1-forma, sea $p \in W$, sean $u, v \in \mathbb{R}^3$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces

$$\begin{aligned} (\omega_{ij})_p(u + \alpha v) &= \langle DE_i(p)(u + \alpha v), E_j(p) \rangle = \langle DE_i(p)u + \alpha DE_i(p)v, E_j(p) \rangle \\ &= \langle DE_i(p)u, E_j(p) \rangle + \alpha \langle DE_i(p)v, E_j(p) \rangle = (\omega_{ij})_p(u) + \alpha (\omega_{ij})_p(v) \end{aligned}$$

Por otro lado, notemos que

$$\begin{aligned} (\omega_{ij})_p(v) &= \langle DE_i(p)v, E_j(p) \rangle = \left\langle \sum_{k=1}^3 \frac{\partial E_i}{\partial x_k}(p) v_k, E_j(p) \right\rangle = \sum_{k=1}^3 \left\langle \frac{\partial E_i}{\partial x_k}, E_j(p) \right\rangle v_k \\ &= \sum_{k=1}^3 \left\langle \frac{\partial E_i}{\partial x_k}, E_j \right\rangle (p) (dx_k)_p(v) \end{aligned}$$

es decir,

$$\omega_{ij} = \left\langle \frac{\partial E_i}{\partial x}, E_j \right\rangle dx + \left\langle \frac{\partial E_i}{\partial y}, E_j \right\rangle dy + \left\langle \frac{\partial E_i}{\partial z}, E_j \right\rangle dz$$

como las funciones E_i y el producto interno son diferenciables, concluimos que ω_{ij} es una 1-forma diferenciable. Queda chequear que $\omega_{ij} = -\omega_{ji}$, en efecto, sea $p \in W$ y $v \in \mathbb{R}^3$, entonces

$$0 = D \langle E_i, E_j \rangle (p)v = \langle DE_i(p)v, E_j(p) \rangle + \langle E_i, DE_j(p)v \rangle = \omega_{ij} + \omega_{ji}$$

lo que prueba lo pedido.

b) Sea $\{e_j\}_{j=1}^3$ la base canónica de \mathbb{R}^3 . En primer lugar, tenemos que

$$E_i = \sum_{j=1}^3 \beta_{ij} e_j \quad \text{donde } \beta_{ij}(p) = e_j^*(E_i(p))$$

además, se tiene que $D\beta_{ij} = d\beta_{ij}$, en efecto, dado $p \in W$ y $v \in \mathbb{R}^3$

$$(d\beta_{ij})_p(v) = \frac{\partial \beta_{ij}}{\partial x}(p)v_1 + \frac{\partial \beta_{ij}}{\partial y}(p)v_2 + \frac{\partial \beta_{ij}}{\partial z}(p)v_3 = D\beta_{ij}(p)v$$

lo que implica que

$$DE_i = D \left(\sum_{j=1}^3 \beta_{ij} e_j \right) = \sum_{j=1}^3 D\beta_{ij} e_j = \sum_{j=1}^3 d\beta_{ij} e_j$$

Por otro lado, como $(E_j(p))_{j=1}^3$ es base ortonormal de \mathbb{R}^3 , dado $p \in W$ y $v \in \mathbb{R}^3$ se obtiene que

$$DE_i(p)v = \sum_{k=1}^3 \langle DE_i(p)v, E_k(p) \rangle E_k(p) = \sum_{k=1}^3 (\omega_{ik})_p(v) E_k(p) \quad \text{es decir, } DE_i = \sum_{k=1}^3 \omega_{ik} E_k$$

de este modo,

$$DE_i = \sum_{k=1}^3 \omega_{ik} E_k = \sum_{k=1}^3 \omega_{ik} \left(\sum_{j=1}^3 \beta_{kj} e_j \right) = \sum_{j=1}^3 \left(\sum_{k=1}^3 \omega_{ik} \beta_{kj} \right) e_j$$

comparando las dos expresiones para DE_i y usando que $\{e_j\}_{j=1}^3$ es base, concluimos que

$$d\beta_{ij} = \sum_{k=1}^3 \omega_{ik} \beta_{kj}$$

Además, por la expresión para E_i , vemos que

$$\omega_i = \sum_{j=1}^3 \beta_{ij} dx_j$$

derivando se sigue que

$$\begin{aligned} d\omega_i &= d\left(\sum_{j=1}^3 \beta_{ij} dx_j\right) = \sum_{j=1}^3 d\beta_{ij} \wedge dx_j + \beta_{ij} d(dx_j) = \sum_{j=1}^3 d\beta_{ij} \wedge dx_j \\ &= \sum_{j=1}^3 \left(\sum_{k=1}^3 \omega_{ik} \beta_{kj}\right) \wedge dx_j = \sum_{k=1}^3 \omega_{ik} \wedge \left(\sum_{j=1}^3 \beta_{kj} dx_j\right) = \sum_{k=1}^3 \omega_{ik} \wedge \omega_k = \sum_{k=1}^3 \omega_k \wedge \omega_{ki} \end{aligned}$$

c) Notemos lo siguiente

$$0 = d(d\beta_{ij}) = \sum_{k=1}^3 d(\omega_{ik} \beta_{kj}) = \sum_{k=1}^3 d\beta_{kj} \wedge \omega_{ik} + \sum_{k=1}^3 d\omega_{ik} \beta_{kj}$$

entonces

$$\sum_{k=1}^3 d\omega_{ik} \beta_{kj} = \sum_{k=1}^3 \omega_{ik} \wedge d\beta_{kj} = \sum_{k=1}^3 \omega_{ik} \wedge \sum_{s=1}^3 \omega_{ks} \beta_{sj}$$

(entender mejor idea de las matrices)