Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Profesor: Giancarlo Urzúa – Estudiante: Benjamín Mateluna

Geometría Algebraica - MAT2824
Apuntes
06 de Marzo de 2025

Índice

1. Introducción **3**

2. Conjuntos Algebraicos afines **4**

2.1. Preliminares algebraicos 4

2.2. Espacio Afín y Conjuntos Algebraicos 4

2.3. Ideal de un conjunto 5

1. Introducción

Habrán tres evaluaciones (I1, I2, I3) cada una vale un 20 % y un examen (EX) que vale un 40 %. Las fechas son, 9 de abril, 14 de Mayo, 11 de Junio y 1 de Julio respectivamente.

2. Conjuntos Algebraicos afines

2.1. Preliminares algebraicos

Sea R un anillo conmutativo con $+, \cdot$ y con $1 \neq 0$. Si R, R' son anillos, un morfismo de anillos es una función $f : R \to R'$ que respeta $+, \cdot$ y $f(1_R) = 1_{R'}$. Un dominio R es un anillo en donde $xy = xz$ implica que $y = z$ para todo $x \neq 0$.

Ejemplo $\mathbb{Z}$ es dominio, pero $\mathbb{Z}/6$ no lo es.

Un cuerpo es un dominio donde todo $x \neq 0$ tiene un inverso. Dado R dominio, existe el cuerpo de fracciones K tal que $R \subseteq K$. Dado R anillo, sea $R[x]$ el anillo de polinomios con coeficientes en R, sus elementos tienen la forma

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_d x^d \ , \ a_d \neq 0$$

y decimos que f tiene grado d denotado por $gr(f)$. Se define de manera recursiva $R[x_1, \cdots, x_n] = R[x_1, \cdots, x_{n-1}][x_n]$ el anillo de polinomios en n variables. Dado $f = \alpha \cdot x_1^{\lambda_1} \cdots x_n^{\lambda_n}$ su grado se define como $gr(f) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$, para f en general, definimos su grado como $gr(f) := max\{\text{grados de monomios}\}$. Dado $f \in R[x_1, \cdots, x_n]$ y $d = gr(f)$ entonces

$$f = F_0 + F_1 + \cdots + F_d \text{ , con } F_i \text{ homogeneos, esto es, } F_i(\lambda x_{x_1}, \cdots, \lambda x_n) = \lambda^i F(x_1, \cdots, x_n)$$

Si $f \in R[x]$ una raíz (cero) de f es un $r \in R$ tal que $f(r) = 0$.

Teorema 1. *Se tiene que r es cero si y solo si $f(x) = (x - r)g(x)$ para algún $g \in R[x]$.*

Un cero de $f(x_1, \cdots, x_n)$ es un $(a_1, \cdots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ tal que $f(a_1, \cdots, a_n) = 0$.

Decimos que $r \in R$ es irreductible si toda descomposición $r = ab$ con $a, b \in R$ se tiene que a o b es una unidad. Un anillo R se dice dominio de factorización unica si todo elemento no nulo se puede factorizar de manera esencialmente unica en producto de irreductibles.

Lema 1.1. *Si R es dominio de factorización unica entonces $R[x]$ es dominio de factorización unica.*

Lema 1.2. *Si R es un dominio de factorización unica y K su cuerpo de fracciones. Dado $f \in R[x]$ irreductible entonces f es irreductible en $K[x]$.*

Sea R un anillo. Un ideal $I \subset R$ es tal que si $a, b \in I$ entonces $a + b \in I$ y si $r \in R$ entonces $ra \in I$. Consideramos la función $\pi : R \to R/I$ donde R/I es el anillo cociente que es conmutativo. Un ideal es maximal si y solo si R/I es cuerpo.

Teorema 2. *Sea R un dominio euclideano (se cumple algoritmo de la división) y $a, b \in R$, consideremos $mcd(a, b) = d$. Entonces existen $c, e \in R$ tales que $ac + be = d$.*

Teorema 3. *Si F es un polinomio homogeneo de grado d, entonces*

$$dF = x_1 F_{x_1} + \cdots + x_n F_{x_n}$$

donde F_{x_i} es la derivada formal con respecto a x_i.

2.2. Espacio Afín y Conjuntos Algebraicos

Definición 3.1. *Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo. El espacio afín de dim n es $\mathbb{A}^n_{\mathbb{K}} := \mathbb{K}^n$ (generalmente se supondra que $\mathbb{K} = \overline{\mathbb{K}}$).*

Definición 3.2. *Una hipersuperficie de $\mathbb{A}^n_{\mathbb{K}}$ es $V(F) = \{p \in \mathbb{A}^n_{\mathbb{K}} : F(p) = 0\}$ para un $F \in \mathbb{K}[x_1, \cdots, x_n]$.*

Ejemplos:

- Sea $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ consideramos la hipersuperficie $V(y^2 - x^2(x+1)) \subseteq \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ (foto)
  El punto $(0,0)$ se llama nodo.
- Veamos la hipersuperficie $V((x^3 - y^3)(y^3 - 1)(x^3 - 1)) \subseteq \mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$.
- La hipersuperficie $V(x^2 + y^2 - z^2) \subseteq \mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$ es conocida como cono (foto)
  Como en el primer ejemplo, el punto $(0,0)$ se llama nodo
- Consideremos $V(y^2 - x^3) \subseteq \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ (foto)
  En este caso, el punto $(0,0)$ no es un nodo, en este caso se llama cuspide.
- Veamos el caso de una hipersuperficie no parametrizable, esta es $V(y^2 - x(x+1)(x+\lambda))$.

Definición 3.3. *Sea $S \subseteq \mathbb{K}[x_1, \cdots, x_n]$ un conjunto arbitrario, se define*

$$V(S) := \{p \in \mathbb{A}^n_{\mathbb{K}} : F(p) = 0 \quad \forall F \in S\} = \bigcap_{F \in S} V(F)$$

y se dice que es un conjunto algebraico afín.

Propiedades de un conjunto algebraico afín:

a) Sea $I = \langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{n} a_i s_i, a_i \in \mathbb{K} \right\}$, entonces $V(I) = V(S)$.

   Demostración. *Veamos que $V(I) \subseteq V(S)$, si $p \in V(I)$, como $S \subseteq I$ se sigue que $p \in V(S)$. Para $V(S) \subseteq V(I)$ notemos que dado $f \in I$ se tiene que $f = \sum a_i s_i$, luego si $p \in V(S)$ vemos que $f(p) = \sum a_i s_i(p) = 0$.*

b) Sea $\{I_\alpha\}$ una colección de ideales, entonces $V(\bigcup_\alpha I_\alpha) = \bigcap_\alpha V(I_\alpha)$.

c) Si $I \subseteq J$ se sigue que $V(J) \subseteq V(I)$.

d) Sean $F, G \in \mathbb{K}[x_1, \cdots, x_n]$, se tiene que $V(FG) = V(F) \cup V(G)$.

e) Tenemos las siguientes dos identidades $V(1) = \emptyset$ y $V(0) = \mathbb{A}^n_{\mathbb{K}}$.
   observación: Lo anterior es valido si $\mathbb{K}$ es algebraicamente cerrado, de lo contrario, si consideramos $\mathbb{A}^1_{\mathbb{R}}$ vemos que $V(x^2 + 1) = \emptyset$.

2.3. Ideal de un conjunto

Definición 3.4. *Sea $X \subseteq \mathbb{A}^n_{\mathbb{K}}$ un conjunto arbitrario. Se define el ideal de X como*

$$I(X) := \{F \in \mathbb{K}[x_1, \cdots, x_n] : F(p) = 0 \quad \forall p \in X\}$$

observación: Notemos que si $F^m \in I(X)$ entonces $F \in I(X)$. Un ideal con esta propiedad se dice radical.

Propiedades del ideal de un conjunto:

a) Si $X \subseteq Y$ se tiene que $I(Y) \subseteq I(X)$.

b) Se tiene lo siguiente $I(\emptyset) = \mathbb{K}[x_1, \cdots, x_n]$ y $I(\mathbb{A}^n_{\mathbb{K}}) = \{0\}$. Además, si $\mathbb{K}$ es un cuerpo infinito, se tiene que $I(\{a_1, \cdots, a_n\}) = (x_1 - a_1, \cdots, x_n - a_n)$.