

1. 课本 322 页习题 7.10

**7.10** 以下列基本要素计算二元组  $[3, 2]^T$  的扩展系数并写出对应的扩展:

★(a) 以二元实数集合  $\mathbf{R}^2$  为基础的  $\varphi_0 = [1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}]^T$  和  $\varphi_1 = [1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}]^T$ 。

(b) 以  $\mathbf{R}^2$  为基础的  $\varphi_0 = [1, 0]^T$ ,  $\varphi_1 = [1, 1]^T$  和它的对偶,  $\tilde{\varphi}_0 = [1, -1]^T$ ,  $\tilde{\varphi}_1 = [0, 1]^T$ 。

(c) 以  $\mathbf{R}^2$  为基础的  $\varphi_0 = [1, 0]^T$ ,  $\varphi_1 = [-1/2, \sqrt{3}/2]^T$  和  $\varphi_2 = [-1/2, -\sqrt{3}/2]^T$ , 以及

对于  $i = \{0, 1, 2\}$ , 它们的对偶  $\tilde{\varphi}_i = 2\varphi_i/3$ 。

提示: 必须使用向量内积代替 7.2.1 节中的整数内积。

(a) 基正交, 由公式 7.2.5 得到:

$$a_0 = \left[ \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right] \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 5/\sqrt{2}$$

$$a_1 = \left[ \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right] \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 1/\sqrt{2}$$

因此得到:

$$f(x) = \sum_k a_k \varphi_k(x) = \frac{5}{\sqrt{2}} \varphi_0 + \frac{1}{\sqrt{2}} \varphi_1 = \frac{5}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

(b) 基函数以及其对偶双正交, 采用 7.2.3 进行计算:

$$a_0 = \langle \tilde{\varphi}_0(x), f(x) \rangle = [1, -1] \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 1$$

$$a_1 = \langle \tilde{\varphi}_1(x), f(x) \rangle = [0, 1] \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 2$$

因此得到:

$$f(x) = \sum_k a_k \varphi_k(x) = 1\varphi_0 + 2\varphi_1 = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

(c) 首先:

$$||f(x)||^2 = 3^2 + 2^2 = 13$$

$$\sum_k |\langle \varphi_i(x), f(x) \rangle|^2 = 3^2 + \left(-\frac{3}{2} + \sqrt{3}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2} - \sqrt{3}\right)^2 = 19.5$$

则  $A = B = 19.5/13 = 3/2$ , 因此得到:

$$f(x) = \frac{1}{A} \sum_k \langle \varphi_k(x), f(x) \rangle \varphi_k(x)$$

$$= \frac{2}{3} \left\{ 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \left( \frac{2\sqrt{3} - 3}{2} \right) \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} + \left( \frac{-2\sqrt{3} - 3}{2} \right) \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$