


## 2η Εργασία Στο Μάθημα Της Αριθμητικής Ανάλυσης

Ονοματεπώνυμο : Παπαδόπουλος Αναστάσιος

AEM : 3654

Διδάσκων : Τέφας Αναστάσιος

2 Ιανουαρίου 2021



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

## Περιεχόμενα

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Εισαγωγή</b>                        | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Άσκηση 5</b>                        | <b>4</b> |
| 2.1      | Πολυωνυμική Προσέγγιση . . . . .       | 5        |
| 2.2      | Προσέγγιση με Splines . . . . .        | 7        |
| 2.3      | Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων . . . . . | 8        |
| <b>3</b> | <b>Άσκηση 6</b>                        | <b>9</b> |
| <b>4</b> | <b>Άσκηση 7</b>                        | <b>9</b> |

## 1 Εισαγωγή

Η εργασία αυτή αναπτύχθηκε κατά την παρακολούθηση του μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης του 3ου εξαμήνου του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ. Περιλαμβάνει υλοποιήσεις και πειραματισμούς με αλγόριθμους Αριθμητικής Ανάλυσης που αναφέρονται σε θεματικές ενότητες όπως της προσέγγισης συναρτήσεων (**Άσκηση 5 και 7**) για παράδειγμα η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων και της αριθμητικής ολοκλήρωσης (**Άσκηση 6**) για παράδειγμα η μέθοδος της **Simpson**. Οι αλγόριθμοι αυτοί καθώς και οι γραφικές παραστάσεις που περιέχονται στο παρόν έγγραφο έχουν υλοποιηθεί με την γλώσσα προγραμματισμού **Python** με χρήση των βιβλιοθηκών **NumPy** και **Matplotlib**. Στα παραδοτέα περιλαμβάνεται το παρόν **pdf** αρχείο καθώς και το αντίστοιχο **.tex** και για κάθε μία άσκηση υπάρχει ένας υποφάκελος όπου περιέχει τα αντίστοιχα **.py** αρχεία με τον πηγαίο κώδικα.

## 2 Άσκηση 5

Στην 5η άσκηση ζητείται να προγραμματιστεί μία συνάρτηση που να υπολογίζει το ημίτονο μιας οποιασδήποτε γωνίας. Για να δημιουργηθεί αυτή η συνάρτηση θα χρησιμοποιηθούν 10 τιμές του ημιτόνου με πλήρη ακρίβεια που υποστηρίζει το μη-χάνημα που τρέχει ο κώδικας για την ανεξάρτητη μεταβλητή και 10 ψηφία ακρίβεια για την εξαρτημένη μεταβλητή. Η συνάρτηση του ημιτόνου θα προσεγγιστεί με τις παρακάτω μεθόδους :

- Με πολυωνυμική προσέγγιση
- Με την μέθοδο Splines
- Με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων

Τα σημεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα παρακάτω:

| x                  | $\sin x$      |
|--------------------|---------------|
| 0.0                | 0.0           |
| 0.65               | 0.6051864057  |
| 1.3                | 0.9635581854  |
| 1.9500000000000002 | 0.9289597150  |
| 2.6                | 0.5155013718  |
| 3.25               | -0.1081951345 |
| 3.9000000000000004 | -0.6877661591 |
| 4.55               | -0.9868438585 |
| 5.2                | -0.8834546557 |
| 5.8500000000000005 | -0.4197640178 |

Τα σημεία επιλέχθηκαν στο διάστημα  $[0, 2\pi]$  καθώς το ημίτονο είναι περιοδική συνάρτηση με περίοδο  $T = 2\pi$  και σε διάστημα μήκους ίσο με την περίοδο η συνάρτηση περιέχει όλη την πληροφορία που χρειάζεται. Στην συνέχεια γίνεται

σύγκριση των παραπάνω προσεγγίσεων στο διάστημα  $[-\pi, \pi]$  όσον αφορά την ακρίβεια προσέγγισης και προβάλλεται σε διάγραμμα το σφάλμα προσέγγισης για 200 σημεία στο διάστημα  $[-\pi, \pi]$  και αναφέρεται ο αριθμός των ψηφίων ακρίβειας που πετυχαίνονται.

## 2.1 Πολυωνυμική Προσέγγιση

Για την πολυωνυμική προσέγγιση χρησιμοποιείται η μέθοδος Newton. Για  $n$  σημεία εκπαίδευσης η μέθοδος αυτή παράγει ένα πολυώνυμο βαθμού  $n - 1$ , το οποίο μάλιστα είναι και μοναδικό. Αρχικά υποθέτουμε ότι τα σημεία εκπαίδευσης προέρχονται από μία συνάρτηση  $f(x)$ , οπότε στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε τα σημεία  $(x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))$ . Ορίζουμε ως

$$f[x_1 \dots x_n]$$

τον συντελεστή του όρου  $x^{n-1}$  στο πολυώνυμο που προσεγγίζει τα παραπάνω σημεία.

Ορίζοντας λοιπόν τα παραπάνω η μέθοδος Newton ορίζει το ζητούμενο πολυώνυμο ως

$$P(x) = f[x_1] + f[x_1 \ x_2](x - x_1) + f[x_1 \dots x_n](x - x_1)(x - x_{n-1})$$

Όπου τα  $f[x_1 \dots x_n]$  υπολογίζονται αναδρομικά ως εξής

$$f[x_k \ x_{k+1}] = \frac{f[x_{k+1}] - f[x_k]}{x_{k+1} - x_k}$$

Στο αρχείο **polynomial.py** υπάρχουν τρεις συναρτήσεις. Η συνάρτηση *polynomial\_interpolation* δέχεται ως ορίσματα τα σημεία εκπαίδευσης και επιστρέφει τους συντελεστές του πολυωνύμου που προσεγγίζει αυτά τα σημεία. Οι συντελε-

στές του πολυωνύμου υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το λεγόμενο τρίγωνο Newton, το οποίο μοιάζει όπως το Σχήμα 1.

$$\begin{array}{c|cccc}
 -1 & -5 & & & \\
 0 & -1 & 4 & -1 & \\
 2 & 1 & 1 & 3 & 1 \\
 3 & 11 & 10 & & 
 \end{array}$$

Σχήμα 1: Τρίγωνο Newton για 4 σημεία εκπαίδευσης ( Αριστερή στήλη η τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής των σημείων εκπαίδευσης )

Από το οποίο παίρνουμε τα στοιχεία της πρώτης διαγωνίου ως συντελεστές του πολυωνύμου με τον σταθερό όρο του πολυωνύμου να είναι ο πρώτος όρος αυτής της διαγωνίου. Στην συνέχεια, η συνάρτηση *calculate\_polynomial* υπολογίζει και επιστρέφει την τιμή του πολυωνύμου στην τιμή  $x$  που δέχεται ως παράμετρο χρησιμοποιώντας τον βαθμό του πολυωνύμου, τις τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής των σημείων εκπαίδευσης και τους συντελεστές του πολυωνύμου που υπολογίσθηκαν προηγουμένως. Τέλος, η συνάρτηση *custom\_sin* ορίζει αρχικά τα σημεία που αναφέρθηκαν στην παράγραφο της εισαγωγής της Άσκησης 1 και στην συνέχεια χρησιμοποιεί τις άλλες δύο συναρτήσεις για να προσεγγίσει την τιμή του ημιτόνου στο σημείο που δέχεται ως παράμετρο, αφού πρώτα το μεταφέρει στο διάστημα  $[0, 2\pi]$ .

## 2.2 Προσέγγιση με Splines

### 2.3 Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων



### 3 Άσκηση 6

Στην 6η άσκηση μας δίνεται αρχικά η συνάρτηση

### 4 Άσκηση 7

Στην 7η άσκηση μας δίνεται αρχικά η συνάρτηση