



DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

SESSION 2019

MATHÉMATIQUES

SÉRIE GÉNÉRALE

FRANCE

1 JUILLET 2019

Durée de l'épreuve : 2h00

100 points

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.
Il comporte 6 pages numérotées de la page 1 sur 6 à la page 6 sur 6.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

Exercice n° 1	10 points
Exercice n° 2	19 points
Exercice n° 3	17 points
Exercice n° 4	19 points
Exercice n° 5	18 points
Exercice n° 6	17 points

Indications portant sur l'ensemble du sujet.

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche; elle sera prise en compte dans la notation.

EXERCICE n° 1 — Le trésor des pirates

10 points

Le capitaine d'un navire possède un trésor constitué de 69 diamants, 1 150 perles et 4 140 pièces d'or.

1. Décomposer 69, 1 150 et 4 140 en produit de facteurs premiers.
2. Le capitaine partage équitablement le trésor entre les marins.
Combien y-a-t-il de marins sachant que toutes les pièces, perles et diamants ont été distribués?

EXERCICE n° 2 — Le décor de la pièce de théâtre

19 points

Dans cet exercice, on donnera, si nécessaire, une valeur approchée des résultats au centième près.

Pour construire le décor d'une pièce de théâtre (Figure 1), Joanna dispose d'une plaque rectangulaire ABCD de 4 m sur 2 m dans laquelle elle doit découper les trois triangles du décor avant de les superposer. Elle propose un découpage de la plaque (Figure 2).




Figure 1




Figure 2

Le triangle ADM respecte les conditions suivantes :

- Le triangle ADM est rectangle en A;
- $AD = 2\text{ m}$;
- $\widehat{ADM} = 60^\circ$

1. Montrer que $[AM]$ mesure environ 3,46 m.
2. La partie de la plaque non utilisée est représentée sur la Figure 2 par le rectangle MBCN. Calculer une valeur approchée au centième de la proportion de la plaque qui n'est pas utilisée.
3. Pour que la superposition des triangles soit harmonieuse, Joanna veut que les trois triangles AMD, PNM et PDN soient semblables. Démontrer que c'est bien le cas.
4. Joanna aimerait que le coefficient d'agrandissement pour passer du triangle PDN au triangle AMD soit plus petit que 1,5. Est-ce le cas? Justifier votre réponse.


Les questions 1. et 2. sont indépendantes.

Un sablier est composé de :

- Deux cylindres C_1 et C_2 de hauteur $4,2\text{ cm}$ et de diamètre $1,5\text{ cm}$;
- un cylindre C_3 ;
- deux demi-sphères S_1 et S_2 de diamètre $1,5\text{ cm}$.

On rappelle que le volume V d'un cylindre d'aire de base B et de hauteur h :

$$V = B \times h$$



1.a. Au départ, le sable remplit le cylindre C_2 aux deux tiers.

Montrer que le volume du sable est environ $4,95\text{ cm}^3$.

1.b. On retourne le sablier. En supposant que le débit d'écoulement du sable est constant et égal à $1,98\text{ cm}^3/\text{min}$, calculer le temps en minutes et secondes que va mettre le sable à s'écouler dans le cylindre inférieur.

2. En réalité, le débit d'écoulement d'un sablier n'est pas constant.

Dans une usine où on fabrique des sabliers comme celui-ci, on prend un sablier au hasard et on teste plusieurs fois le temps d'écoulement dans ce sablier. Voici les différents temps récapitulés dans le tableau suivant :

Temps mesuré	2 min 22 s	2 min 24 s	2 min 26 s	2 min 27 s	2 min 28 s	2 min 29 s	2 min 30 s
Nombre de tests	1	1	2	6	3	7	6

Temps mesuré	2 min 31 s	2 min 32 s	2 min 33 s	2 min 34 s	2 min 35 s	2 min 38 s
Nombre de tests	3	1	2	3	2	3


2.a. Combien de tests ont été réalisés au total?

2.b. Un sablier est mis en vente s'il vérifie les trois conditions ci-dessous, sinon il est éliminé.



- L'étendue des temps est inférieure à 20 s ;
- la médiane des temps est comprise entre $2\text{ min }29\text{ s}$ et $2\text{ min }31\text{ s}$;
- la moyenne des temps est comprise entre $2\text{ min }28\text{ s}$ et $2\text{ min }32\text{ s}$.

Le sablier testé sera-t-il éliminé?

Préciser les positions de départ et d'arrivée du stylo sur votre figure.



Script 2



2. Attribuer à chaque script la figure dessinée. Justifier votre choix.
3. On exécute le **Script 2**.
- 3.a. Quelle est la probabilité que le premier élément tracé soit un carré?

- 3.b. Quelle est la probabilité que les deux premiers éléments soient des carrés?
4. Dans le **Script 2**, on aimerait que la couleur des différents éléments, tirets ou carrés, soit aléatoire, avec à chaque fois 50 % de chance d'avoir un élément noir et 50 % de chance d'avoir un élément rouge.


Écrire la suite d'instructions qu'il faut alors créer et préciser où l'insérer dans le **Script 2**.

Indications : on pourra utiliser les instructions `mettre la couleur du stylo à rouge` et `mettre la couleur du stylo à noir` pour choisir la couleur du stylo.

EXERCICE n° 5 — Le tableau constitué de quatre rectangles

18 points


Olivia s’est acheté un tableau pour décorer le mur de son salon.
Ce tableau, représenté ci-contre, est constitué de quatre rectangles identiques nommés ①, ②, ③ et ④ dessinés à l’intérieur d’un grand rectangle ABCD d’aire égale à $1,215\text{ m}^2$. Le ratio longueur : largeur est égal à 3 : 2 pour chacun des cinq rectangles.



- Recopier, en les complétant, les phrases suivantes. Aucune justification n’est demandée.
 - Le rectangle l’image du rectangle par la translation qui transforme C en E.
 - Le rectangle ③ est l’image du rectangle par la rotation de centre F et d’angle 90° dans le sens des aiguilles d’une montre.
 - Le rectangle ABCD est l’image du rectangle par l’homothétie de centre et de rapport 3. (Il y a plusieurs réponses possibles, une seule est demandée.)
- Quelle est l’aire d’un petit rectangle?
- Quelles sont la longueur et la largeur du rectangle ABCD?

Programme 1

- Choisir un nombre;
- le multiplier par 3;
- ajouter 1.

Programme 2

1. Vérifier que si on choisit 5 comme nombre de départ,
- le résultat du **Programme 1** vaut 16;
 - le résultat du **Programme 2** vaut 28.

On appelle $A(x)$ le résultat du **Programme 1** en fonction du nombre x choisi au départ.

La fonction $B : x \rightarrow (x - 1)(x + 2)$ donne le résultat du **Programme 2** en fonction du nombre x choisi au départ.

- 2.a. Exprimer $A(x)$ en fonction de x .
- 2.b. Déterminer le nombre que l'on doit choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat du **Programme 1**.
3. Développer et réduire l'expression :

$$B(x) = (x - 1)(x + 2)$$

- 4.a. Montrer que $B(x) - A(x) = (x + 1)(x - 3)$
- 4.b. Quels nombres doit-on choisir au départ pour que le **Programme 1** et le **Programme 2** donnent le même résultat? Expliquer votre démarche.