

Funkce více proměnných

Lokální extrémy funkcí více proměnných

Hledejte lokální extrémy následujících funkcí

1. $x^2 + y^2$; $x^2 - y^2$; $-x^2 - y^2$
2. $x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$
3. $(x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$
4. $(2x^2 - xy + y^2/3 - 5x + 5y/3 + 10/3)e^{x+y}$

5.

$$f(x) = \begin{cases} xy \ln(x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

6. $x + y + 4 \cos x \cos y$
7. $\sin x + \cos y + \cos(x - y)$ na intervalu $(0, \frac{\pi}{2}) \times (0, \frac{\pi}{2})$
8. $x - 2y + \ln(\sqrt{x^2 + y^2}) + 3 \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$, $x \neq 0$
9. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z$
10. $(ax + by + cz)e^{-x^2-y^2-z^2}$.

Implicitní funkce

11. Dokažte, že existuje okolí V bodu $(1, 1)$ takové, že množina

$$\{(x, y); x^3 + y^3 - 2xy = 0\} \cap V$$

je grafem nějaké funkce, která je třídy C^2 na nějakém okolí bodu 1. Spočtěte $f'(1)$ a $f''(1)$.

12. Dokažte, že existuje okolí V bodu $(3, -2, 2)$ takové, že množina

$$\{(x, y, z); z^3 - xz + y = 0\} \cap V$$

je grafem nějaké funkce, která je třídy C^2 na nějakém okolí bodu $(3, -2)$. Spočtete $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}(3, -2)$.

13. Spočtete parciální derivace 2. řádu funkce implicitně zadané vztahem $x + y + z = e^{-(x+y+z)}$.
14. Nalezněte první a druhý diferenciál funkce dané vztahem $z = x + \operatorname{arctg} \frac{y}{z-x}$.
15. Jsou-li $x = f(y, z)$, $y = g(x, z)$, $z = h(x, y)$ implicitně zadány vztahem $F(x, y, z) = 0$, ukažte, že $f_y g_z h_x = -1$.
16. Napište du a dv , je-li $u + v = x + y$, $\frac{\sin u}{\sin v} = \frac{x}{y}$.
17. Hledejte lokální extrémy funkce $z = z(x, y)$, dané implicitně vztahem

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2(x^2 + y^2 - z^2).$$

Stacionární body: $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$

Je ve stacionárním bodě skutečně extrém? $Q(h) = d^2 f(a)(h, h) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j$

$Q(h)$ je kvadratická forma.

Je-li $Q(h)$ pozitivně definitní $\Rightarrow f$ má v a ostré lokální minimum

negativně definitní \Rightarrow " " " " maximum

indefinitní $\Rightarrow f$ nemá v a extrém (je tam sedlový bod)

poz./neg. semidefinitní \Rightarrow nevíme, musíme zkoumat jinak

IMPLICITNÍ FUNKCE

Věta o existenci: Necht' $a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}, F: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}, F(a, b) = 0$.

Necht' existuje okolí (a, b) , kde F je spojitá a $y \mapsto F(x, y)$ je ryze monotonní.

Pak existují okolí $U_\delta(a)$ a $U_\Delta(b)$ t.č. $\forall x \in U_\delta(a) \exists! y(x) \in U_\Delta(b)$ t.č.

$F(x, y(x)) = 0$. Navíc $y(x)$ je spojitá na $U_\delta(a)$.

Věta o derivaci: Je-li navíc $F \in C^k$ a $\frac{\partial F}{\partial y}(a, b) \neq 0$. Pak na $x \in U_\delta(a)$ platí

$$\frac{\partial y(x)}{\partial x_i} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x_i}(x, y(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y(x))}$$

1, $f(x, y) = x^2 + y^2$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= 2x \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= 2y \end{aligned} \right\} = 0 \Leftrightarrow x = y = 0.$$

Jediný stacionární bod je počátek

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2$$

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \dots \text{Hesseova}$$

matice
 $= 2 \cdot I, I$ je jednotková matice

H_f je pozit. definitní \Rightarrow
v počátku je lok. minimum.

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= 2x \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= -2y \end{aligned} \right\} = 0 \Leftrightarrow x = y = 0.$$

Jediný stac. bod je počátek

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2$$

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$\det H_f = -4 < 0$
 $(H_f)_{1,1} = 2 > 0 \Rightarrow H_f$ je indefinitní

V počátku není extrém, je tam sedlový bod.

$$f(x, y) = -x^2 - y^2 = -(x^2 + y^2)$$

\Rightarrow v počátku je lok. maximum.

Ukážeme i přímo: $\frac{\partial f}{\partial x} = -2x, \frac{\partial f}{\partial y} = -2y$

$\Rightarrow x = y = 0$ je jediný stac. bod.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -2, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2$$

$$H_f = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(H_f)_{1,1} = -2 < 0, \det H_f = 4 > 0$$

Podle Sylvestrova kritéria je H_f negativně definitní.

V počátku je lokální maximum.

2) $f(x,y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 2x - 2y = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 - 2x - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow 4x^3 = 4y^3, \text{ tedy } x=y$$

$$4x^3 - 4x = 0 \Rightarrow x(x-1)(x+1) = 0. \text{ Získáváme 3 stacion. body}$$

$a_1 = (0,0), a_2 = (1,1), a_3 = (-1,-1).$

$$H_f = \begin{pmatrix} 12x^2 - 2 & -2 \\ -2 & 12y^2 - 2 \end{pmatrix} \Rightarrow H_f(a_1) = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}, \det H_f(a_1) = 0 \Rightarrow \text{negativně semidef.}$$

$$H_f(a_2) = \begin{pmatrix} 10 & -2 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}, \det H_f(a_2) > 0, (H_f(a_2))_{1,1} > 0 \Rightarrow \text{poz. def.}$$

$$H_f(a_3) = H_f(a_2) \Rightarrow \text{také poz. def.}$$

V počátku může i nemusí být lok. maximum. $f(0,0) = 0$. Jsou na okolí počátku pouze záporné hodnoty? Ne! Vidíme $f(x,y) = x^4 + y^4 - (x+y)^2$. Pro $x=-y$ je $f(x,y) > 0$.
V počátku není extrém. V bodech $a_2 = (1,1)$ a $a_3 = (-1,-1)$ jsou lokální minima

3) $f(x,y) = (x^2 + y^2) e^{-(x^2 + y^2)}$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x e^{-(x^2+y^2)} + (x^2+y^2) \cdot e^{-(x^2+y^2)} \cdot (-2x) = 2e^{-(x^2+y^2)} \cdot (1 - x^2 - y^2) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2y e^{-(x^2+y^2)} + (x^2+y^2) \cdot e^{-(x^2+y^2)} \cdot (-2y) = 2e^{-(x^2+y^2)} \cdot (1 - x^2 - y^2) = 0 \end{cases}$$

Stacionární body jsou všechny body splňující $x^2 + y^2 = 1$ a dále počátek $(0,0)$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -4x e^{-(x^2+y^2)} \cdot x \cdot (1 - x^2 - y^2) + 2e^{-(x^2+y^2)} \cdot (1 - x^2 - y^2) + 2x e^{-(x^2+y^2)} \cdot (-2x)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -4y e^{-(x^2+y^2)} \cdot x \cdot (1 - x^2 - y^2) + 2x e^{-(x^2+y^2)} \cdot (-2y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -4y e^{-(x^2+y^2)} \cdot y \cdot (1 - x^2 - y^2) + 2e^{-(x^2+y^2)} \cdot (1 - x^2 - y^2) + 2y e^{-(x^2+y^2)} \cdot (-2y)$$

$H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ poz. def. \Rightarrow lokální minimum

Pro $x^2 + y^2 = 1$ je $H_f = \begin{pmatrix} -4x^2 e^{-1} & -4xy e^{-1} \\ -4xy e^{-1} & -4y^2 e^{-1} \end{pmatrix} = -4e^{-1} \begin{pmatrix} x^2 & xy \\ xy & y^2 \end{pmatrix}$ a $\det H_f = 0 \Rightarrow$ nemusí být

ostrý extrém. Funkce je zjevně radálně symetrická (při přepisu do polárních souřadnic nezávisí na φ) a $g(r) = r^2 e^{-r^2}$ má v bodě $r=1$ lokální maximum, protože $g'(r) = 2r e^{-r^2} \cdot (1 - r^2)$

Proto v bodech $x^2 + y^2 = 1$ má $f(x,y)$ neostrá lokální maxima.

(3)

$$4) f(x,y) = (2x^2 - xy + \frac{y^2}{3} - 5x + \frac{5y}{3} + \frac{10}{3}) e^{x+y}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= e^{x+y} \cdot \left(4x - y - 5 + 2x^2 - xy + \frac{y^2}{3} - 5x + \frac{5y}{3} + \frac{10}{3} \right) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= e^{x+y} \cdot \left(-x + \frac{2}{3}y + \frac{5}{3} + 2x^2 - xy + \frac{y^2}{3} - 5x + \frac{5y}{3} + \frac{10}{3} \right) = 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} 2x^2 - xy + \frac{y^2}{3} - x + \frac{2}{3}y - \frac{5}{3} &= 0 \\ 2x^2 - xy + \frac{y^2}{3} - 6x + \frac{7}{3}y + 5 &= 0 \quad | \cdot (-1) \\ \hline 5x - \frac{5}{3}y - \frac{20}{3} &= 0 \\ 3x - y - 4 &= 0 \\ y &= 3x - 4 \end{aligned}$$

$$2x^2 - x(3x-4) + \frac{9x^2 - 24x + 16}{3} - x + 2x - \frac{8}{3} - \frac{5}{3} = 0$$

$$2x^2 - 3x + 1 = 0 \quad x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{4} = \begin{cases} 1 \Rightarrow y = -1 \\ \frac{1}{2} \Rightarrow y = -\frac{5}{2} \end{cases}$$

\Rightarrow Dva stacionární body, $a_1 = (1, -1)$, $a_2 = (\frac{1}{2}, -\frac{5}{2})$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = e^{x+y} \cdot (4x - y - 1 + 2x^2 - xy + \frac{y^2}{3} - x + \frac{2}{3}y - \frac{5}{3})$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = e^{x+y} \cdot (-x + \frac{2}{3}y + \frac{2}{3} + 2x^2 - xy + \frac{y^2}{3} - x + \frac{2}{3}y - \frac{5}{3})$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{x+y} \cdot (-x + \frac{2}{3}y + \frac{7}{3} + 2x^2 - xy + \frac{y^2}{3} - 6x + \frac{7}{3}y + 5)$$

$$H_f(a_1) = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \quad \det H_f(a_1) > 0$$

$\Rightarrow H_f(a_1)$ je poz. def. a v bodě a_1 je lokální minimum

$$H_f(a_2) = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \quad \det H_f(a_2) < 0$$

$\Rightarrow H_f(a_2)$ je indefinitní a v bodě a_2 není extrém.

$$5) f(x,y) = xy \ln(x^2+y^2) \quad \text{pro } (x,y) \neq (0,0) \\ = 0 \quad \text{pro } (x,y) = (0,0)$$

Na okolí počátku je $\ln(x^2+y^2) < 0$ a xy může nabývat kladných i záporných hodnot $\Rightarrow f(x,y)$ je na okolí počátku kladná i záporná a v počátku není extrém. Dále uvažujeme mimo počátek.

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= y \ln(x^2+y^2) + \frac{2x^2y}{x^2+y^2} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= x \ln(x^2+y^2) + \frac{2xy^2}{x^2+y^2} = 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} y &= 0 \text{ nebo } \ln(x^2+y^2) + \frac{2x^2}{x^2+y^2} = 0 \\ x &= 0 \text{ nebo } \ln(x^2+y^2) + \frac{2y^2}{x^2+y^2} = 0 \end{aligned}$$

$$a) y=0 \text{ a } \ln x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$b) x=0 \text{ a } \ln y^2 = 0 \Rightarrow y = \pm 1$$

$$c) x^2 = y^2 \text{ a } \ln(2x^2) + 1 = 0 \Rightarrow 2x^2 = e^{-1} \\ \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{2e}} \text{ a } y = \pm \sqrt{\frac{1}{2e}}$$

Máme 8 stac. bodů: $(1,0), (-1,0), (0,1), (0,-1), (\sqrt{\frac{1}{2e}}, \sqrt{\frac{1}{2e}}), (-\sqrt{\frac{1}{2e}}, \sqrt{\frac{1}{2e}}), (-\sqrt{\frac{1}{2e}}, -\sqrt{\frac{1}{2e}}), (\sqrt{\frac{1}{2e}}, -\sqrt{\frac{1}{2e}})$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2xy}{x^2+y^2} + \frac{4xy}{x^2+y^2} - \frac{4x^3y}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2xy}{x^2+y^2} + \frac{4xy}{x^2+y^2} - \frac{4xy^3}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \ln(x^2+y^2) + \frac{2y^2}{x^2+y^2} + \frac{2x^2}{x^2+y^2} - \frac{4x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

V bodech $(1,0), (-1,0), (0,1)$ a $(0,-1)$ máme $H_f = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ ($H_f|_{1,1} = 0 \Rightarrow$ matice není poz. def. ani neg. def.) (4)

$\det H_f \neq 0 \Rightarrow$ matice je indefinitní.

Extrémy v těchto bodech nejsou.

Pro zjednodušení zápisu označíme $r = \sqrt{\frac{1}{2e}}$.

Pak v bodě (r,r) : $H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ je poz. def. \Rightarrow v tomto bodě je lok. minimum

V bodě $(r,-r)$: $H_f = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ je neg. def. \Rightarrow v tomto bodě je lok. maximum

V bodě $(-r,r)$: $H_f = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ je neg. def. \Rightarrow lok. maximum

V bodě $(-r,-r)$: $H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ je poz. def. \Rightarrow lok. minimum

$$6) f(x,y) = x + y + 4 \cos x \cos y$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= 1 - 4 \sin x \cos y = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= 1 - 4 \cos x \sin y = 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \sin x \cos y &= \cos x \sin y \text{ a nic z toho nemůže být } = 0 \\ \tan x &= \tan y \Rightarrow y = x + k\pi \end{aligned}$$

$$4 \sin x \cos(x + k\pi) = 1, \text{ tedy } (-1)^k \cdot 4 \sin x \cos x = 1, \text{ neboli } \sin 2x = \pm \frac{1}{2}$$

$$\text{a odtud pro } k \text{ sudé: } 2x = \frac{\pi}{6} + 2l\pi \text{ a } 2x = \frac{5\pi}{6} + 2l\pi$$

$$\text{tedy } x = \frac{\pi}{12} + l\pi \quad x = \frac{5\pi}{12} + l\pi$$

$$\text{a odpovídající } y = \frac{\pi}{12} + l\pi + 2m\pi, \quad y = \frac{5\pi}{12} + l\pi + 2m\pi$$

$$\text{pro } k \text{ liché: } 2x = \frac{7\pi}{6} + 2l\pi \quad \text{a} \quad 2x = \frac{11\pi}{6} + 2l\pi$$

$$\text{tedy } x = \frac{7\pi}{12} + l\pi \quad \text{a} \quad x = \frac{11\pi}{12} + l\pi$$

$$\text{a odpovídající } y = \frac{7\pi}{12} + l\pi + (2m+1)\pi \quad \text{a} \quad y = \frac{11\pi}{12} + l\pi + (2m+1)\pi$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -4 \cos x \cos y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 4 \sin x \sin y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -4 \cos x \cos y$$

$$\text{Body } \left(\frac{\pi}{12} + l\pi, \frac{\pi}{12} + l\pi + 2m\pi \right): H_f = \begin{pmatrix} -2-\sqrt{3} & 2-\sqrt{3} \\ 2-\sqrt{3} & -2-\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{aligned} \det &> 0 \\ \Delta_1 &< 0 \\ &\Rightarrow \text{neg. def.} \end{aligned}$$

$$\text{Body } \left(\frac{5\pi}{12} + l\pi, \frac{5\pi}{12} + l\pi + 2m\pi \right): H_f = \begin{pmatrix} 2-\sqrt{3} & 2+\sqrt{3} \\ 2+\sqrt{3} & 2-\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{aligned} \det &< 0 \\ \Delta_1 &> 0 \\ &\Rightarrow \text{indéf.} \Rightarrow \text{nemí extrém} \end{aligned}$$

$$\text{Body } \left(\frac{7\pi}{12} + l\pi, \frac{11\pi}{12} + l\pi + 2m\pi \right): H_f = \begin{pmatrix} 2-\sqrt{3} & -2-\sqrt{3} \\ -2-\sqrt{3} & 2-\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{aligned} \det &< 0 \\ \Delta_1 &> 0 \\ &\Rightarrow \text{indéf.} \Rightarrow \text{nemí extrém} \end{aligned}$$

$$\text{Body } \left(\frac{11\pi}{12} + l\pi, \frac{23\pi}{12} + l\pi + 2m\pi \right): H_f = \begin{pmatrix} 2+\sqrt{3} & -2+\sqrt{3} \\ -2+\sqrt{3} & 2+\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{aligned} \det &> 0 \\ \Delta_1 &> 0 \\ &\Rightarrow \text{poz. def.} \Rightarrow \text{lok. min} \end{aligned}$$

7) $f(x,y) = \sin x + \cos y + \cos(x-y)$ na intervalu $(0, \pi/2) \times (0, \pi/2)$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \cos x - \sin(x-y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = -\sin y + \sin(x-y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos x = \sin y \Rightarrow x = \pi/2 - y \\ -\sin y + \sin(\pi/2 - 2y) = 0 \end{cases}$$

$-\sin y + \cos 2y = 0 \dots$ to se moc neladí

$$\sin(\pi/2 - 2y) = \sin y \Rightarrow \pi/2 - 2y = y \text{ protože } y \in (0, \pi/2)$$

$$y = \pi/6 \Rightarrow x = \pi/3$$

$$a = (\pi/3, \pi/6)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\sin x - \cos(x-y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \cos(x-y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -\cos y - \cos(x-y)$$

$$H_f(a) = \begin{pmatrix} -\sqrt{3} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$\det > 0$$

$$1,1 < 0$$

\Rightarrow neg. def. \Rightarrow lokální maximum

8, DÚ

9) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 2 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2y + 4 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 2z - 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{stac. bod } a = (-1, -2, 3)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = 0$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2, \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 2$$

$$H_f(a) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

poz. def. \Rightarrow v bodě a je lok. minimum

10) $f(x,y,z) = (ax+by+cz)e^{-x^2-y^2-z^2}$. Nalezt alespoň jedno z čísel a, b, c je nenulové, jinak $f \equiv 0$.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = e^{-x^2-y^2-z^2} \cdot (a - 2x(ax+by+cz)) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = e^{-x^2-y^2-z^2} \cdot (b - 2y(ax+by+cz)) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} = e^{-x^2-y^2-z^2} \cdot (c - 2z(ax+by+cz)) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{Očividně musí být } ax+by+cz \neq 0. \text{ Necht } a, b, c \neq 0 \\ a \text{ dostáváme } \frac{a}{2x} = \frac{b}{2y} = \frac{c}{2z} \Rightarrow y = \frac{b}{a}x, z = \frac{c}{a}x \\ a - 2x \cdot (ax + \frac{b^2x}{a} + \frac{c^2x}{a}) = 0 \\ a^2 - 2x^2(a^2 + b^2 + c^2) = 0 \Rightarrow x = \frac{\pm a}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \cdot \sqrt{2} \end{cases}$$

Máme tedy 2 stac. body, výpočet platí i pokud je některý parametr = 0. $y = \frac{\pm b}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \cdot \sqrt{2}, z = \frac{\pm c}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \cdot \sqrt{2}$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = e^{-x^2-y^2-z^2} \cdot (-2(ax+by+cz) - 2ax - 2x(a - 2x(ax+by+cz))) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-x^2-y^2-z^2} \cdot (-2(ax+by+cz) - 2by - 2y(b - 2y(ax+by+cz))) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = e^{-x^2-y^2-z^2} \cdot (-2(ax+by+cz) - 2cz - 2z(c - 2z(ax+by+cz))) \end{cases} \begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = e^{-x^2-y^2-z^2} \cdot (-2bx - 2y(a - 2x(ax+by+cz))) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} = e^{-x^2-y^2-z^2} \cdot (-2cx - 2z(a - 2x(ax+by+cz))) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = e^{-x^2-y^2-z^2} \cdot (-2cy - 2z(b - 2y(ax+by+cz))) \end{cases}$$

$$\text{Označme } A_1 = \left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}, \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \right) \text{ a } A_2 = -A_1. \text{ Označme také } r = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$$

$$\text{Pak } (ax+by+cz)(A_1) = \frac{r}{\sqrt{2}}, (ax+by+cz)(A_2) = -\frac{r}{\sqrt{2}}, e^{-x^2-y^2-z^2} \cdot (A_1) = e^{-1/2}, e^{-x^2-y^2-z^2} \cdot (A_2) = e^{-1/2}$$

$$H_f(A_1) = \frac{2}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -2r - \frac{4a^2}{r} + \frac{2a^2}{r} & -\frac{4ab}{r} + \frac{2ab}{r} & -\frac{4ac}{r} + \frac{2ac}{r} \\ -\frac{4ab}{r} + \frac{2ab}{r} & -2r - \frac{4b^2}{r} + \frac{2b^2}{r} & -\frac{4bc}{r} + \frac{2bc}{r} \\ -\frac{4ac}{r} + \frac{2ac}{r} & -\frac{4bc}{r} + \frac{2bc}{r} & -2r - \frac{4c^2}{r} + \frac{2c^2}{r} \end{pmatrix} = \frac{2}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -r^2 - a^2 & -ab & -ac \\ -ab & -r^2 - b^2 & -bc \\ -ac & -bc & -r^2 - c^2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{neg. def.} \Rightarrow \\ \Rightarrow \text{loc. max.} \end{matrix}$$

$$H_f(A_2) = \frac{2}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} r^2 + a^2 & ab & ac \\ ab & r^2 + b^2 & bc \\ ac & bc & r^2 + c^2 \end{pmatrix} \text{poz. def.} \Rightarrow \text{loc. minimum}$$

11) $F(x,y) = x^3 + y^3 - 2xy$. Předně $F(1,1) = 0$. F je spojitá všude.

Dále musíme ověřit, že $y \mapsto F(x,y)$ je ryze monotónní na okolí bodu $(1,1)$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 3y^2 - 2x, \quad \frac{\partial F}{\partial y}(1,1) = 1 \neq 0. \quad y \mapsto F(x,y) \text{ je v bodě } (1,1) \text{ rostoucí}$$

a ze spojitosti derivace je také na okolí $(1,1)$ ryze monotónní.

Označme příslušnou implicitní funkci $y = f(x)$ a víme $f(1) = 1$.

$$f'(1) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(1,1)}{\frac{\partial F}{\partial y}(1,1)} = - \frac{(3x^2 - 2y)(1,1)}{1} = \underline{\underline{-1}}$$

Vyšší derivace: Budeme derivovat vztah $F(x, f(x)) = 0$ podle x .

$$\text{Máme: } x^3 + f^3(x) - 2xf(x) = 0$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 3f^2(x)f'(x) - 2f(x) - 2xf'(x) = 0 \Rightarrow f'(x) = \frac{2f(x) - 3x^2}{3f^2(x) - 2x}, \quad \underline{\underline{f'(1) = -1 \text{ opravdu}}}$$

$$f''(x) = \frac{(2f'(x) - 6x) \cdot (3f^2(x) - 2x) - (6f(x)f'(x) - 2) \cdot (2f(x) - 3x^2)}{(3f^2(x) - 2x)^2}$$

$$\text{a odtud } f''(1) = \frac{-8 \cdot 1 - (-8) \cdot (-1)}{1^2} = \underline{\underline{-16}}$$

12, D6

$$13) F(x,y,z) = x + y + z - e^{-x-y-z} = 0$$

Nejprve $\frac{\partial F}{\partial z} = 1 + e^{-x-y-z} > 0$ všude, tedy všude to určuje implicitně $z(x,y)$

$$\text{Derivujeme } F(x,y,z(x,y)) = 0 \text{ podle } x: 1 + \frac{\partial z}{\partial x} - e^{-x-y-z} \cdot \left(-1 - \frac{\partial z}{\partial x}\right) = 0$$

$$\left(1 + \frac{\partial z}{\partial x}\right) \cdot (1 + e^{-x-y-z}) = 0.$$

Druhá závorka je vždy kladná, proto $\frac{\partial z}{\partial x} = -1$. Analogicky $\frac{\partial z}{\partial y} = -1$ a proto

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

$$14) F(x, y, z) = z - x - \arctg \frac{y}{z-x} = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = 1 - \frac{1}{1 + \frac{y^2}{(z-x)^2}} \cdot (-1) \cdot \frac{1 \cdot y}{(z-x)^2} = 1 + \frac{y}{(z-x)^2 + y^2} \cdot \text{Vše tedy děláme mimo body, kde } \frac{\partial F}{\partial z} = 0$$

$$\text{Derivujeme podle } x: \frac{\partial z}{\partial x} - 1 - \frac{1}{1 + \frac{y^2}{(z-x)^2}} \cdot y \cdot (-1) \cdot \frac{1}{(z-x)^2} \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial x} - 1\right) = 0$$

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x} - 1\right) \cdot \left(1 + \frac{y}{(z-x)^2 + y^2}\right) = 0. \text{ Druhá závorka je ale } \frac{\partial z}{\partial z}, \text{ což předpokládáme že je } \neq 0.$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = 1$$

$$\text{Derivujeme podle } y: \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{1}{1 + \frac{y^2}{(z-x)^2}} \cdot \frac{(z-x) - y \cdot \frac{\partial z}{\partial y}}{(z-x)^2} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} \cdot \left(1 + \frac{y}{(z-x)^2 + y^2}\right) = \frac{z-x}{(z-x)^2 + y^2} \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z-x}{(z-x)^2 + y^2 + y}$$

$$\text{Odtud tedy } dz = (w) = w_1 + \frac{z-x}{(z-x)^2 + y^2 + y} \cdot w_2$$

$$\text{Snadno vidíme } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0. \text{ Zderivujeme výraz pro } \frac{\partial z}{\partial y} \text{ podle } y:$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\frac{\partial z}{\partial y} \cdot [(z-x)^2 + y^2 + y] - (z-x) \cdot [2 \cdot (z-x) \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + 2y + 1]}{((z-x)^2 + y^2 + y)^2} = \frac{-(z-x) \cdot 2 \cdot [y + \frac{(z-x)^2}{(z-x)^2 + y^2 + y}]}{((z-x)^2 + y^2 + y)^2} = \frac{-2(z-x)(y+1)((z-x)^2 + y^2)}{((z-x)^2 + y^2 + y)^3}$$

$$\text{A odtud } d^2z(w_1, k) = \frac{-2(z-x)(y+1)((z-x)^2 + y^2)}{((z-x)^2 + y^2 + y)^3} w_2 k_2$$

$$15) F(x, y, z) = 0. \text{ Vše provádíme za předpokladu, že } \frac{\partial F}{\partial x} \neq 0, \frac{\partial F}{\partial y} \neq 0 \text{ a } \frac{\partial F}{\partial z} \neq 0.$$

$$x = f(y, z). \text{ Potřebujeme } \frac{\partial f}{\partial y}, \text{ tedy derivujeme původní předpis podle } y \text{ a } x \text{ je funkce } y.$$

$$\text{Podle řetězového pravidla } \frac{\partial F}{\partial x} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial y} = 0. \text{ Odtud } \frac{\partial f}{\partial y} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial x}}$$

$$y = g(x, z) \text{ a derivujeme podle } z: \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{\partial g}{\partial z} + \frac{\partial F}{\partial z} = 0. \text{ Odtud } \frac{\partial g}{\partial z} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial z}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$$

$$z = h(x, y) \text{ a derivujeme podle } x: \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial h}{\partial x} = 0. \text{ Odtud } \frac{\partial h}{\partial x} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}$$

$$\text{Celkem } f_y g_z h_x = - \frac{F_y}{F_x} \cdot \left(- \frac{F_z}{F_y}\right) \cdot \left(- \frac{F_x}{F_z}\right) = -1.$$

16) $w+v = x+y$ $\left\{ \begin{array}{l} F_1(x,y,w,v) = w+v-x-y = 0 \\ F_2(x,y,w,v) = \frac{\sin w}{\sin v} - \frac{x}{y} = 0 \end{array} \right.$ Chceme $w(x,y), v(x,y)$

Verze ~~tedy~~ = implicitní funkce vyžaduje nenulovost determinantu

$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial w} & \frac{\partial F_1}{\partial v} \\ \frac{\partial F_2}{\partial w} & \frac{\partial F_2}{\partial v} \end{pmatrix} \neq 0$. Máme $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{\cos w}{\sin v} & -\frac{\sin w}{\sin^2 v} \cos v \end{pmatrix} = -\frac{\sin w \cos v}{\sin^2 v} - \frac{\cos w}{\sin v} = -\frac{\sin(w+v)}{\sin^2 v}$

Můžeme tedy pracovat v bodech $v \neq k\pi$
a $w+v \neq k\pi$, také $y \neq 0$

Pro zjištění dw a dv potřebujeme parciální derivace w, v podle x, y .

Derivujeme tedy $F_1(x,y,w(x,y),v(x,y)) = 0$ podle x a y .
 $F_2(x,y,w(x,y),v(x,y)) = 0$

$\frac{\partial F_1}{\partial x} : \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x} - 1 = 0$
 $\frac{\partial F_2}{\partial x} : \frac{\cos w \frac{\partial w}{\partial x} \sin v - \sin w \cos v \frac{\partial v}{\partial x}}{\sin^2 v} - \frac{1}{y} = 0$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Řešíme soustavu: } \frac{\partial v}{\partial x} = 1 - \frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\sin(w+v)}{\sin^2 v} \frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\sin w \cos v}{\sin^2 v} - \frac{1}{y} = 0 \end{array} \right.$

$\frac{\partial w}{\partial x} = \left(\frac{1}{y} + \frac{\sin w \cos v}{\sin^2 v} \right) \cdot \frac{\sin^2 v}{\sin(w+v)}$
 $\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\cos w \sin v}{\sin(w+v)} - \frac{\sin^2 v}{y \cdot \sin(w+v)}$

Podobně derivace podle y :

$\frac{\partial F_1}{\partial y} : \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} - 1 = 0$
 $\frac{\cos w \frac{\partial w}{\partial y} \sin v - \sin w \cos v \frac{\partial v}{\partial y}}{\sin^2 v} + \frac{x}{y^2} = 0$

$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial v}{\partial y} = 1 - \frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\sin(w+v)}{\sin^2 v} \frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\sin w \cos v}{\sin^2 v} + \frac{x}{y^2} = 0 \end{array} \right.$

$\frac{\partial w}{\partial y} = \left(-\frac{x}{y^2} + \frac{\sin w \cos v}{\sin^2 v} \right) \cdot \frac{\sin^2 v}{\sin(w+v)}$
 $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\cos w \sin v}{\sin(w+v)} + \frac{x \sin^2 v}{y^2 \sin(w+v)}$

Máme výsledek $dw(w) = \left(\frac{\sin^2 v}{y \cdot \sin(w+v)} + \frac{\sin w \cos v}{\sin(w+v)} \right) h_1 + \left(\frac{-x \sin^2 v}{y^2 \sin(w+v)} + \frac{\sin w \cos v}{\sin(w+v)} \right) h_2$

$dv(w) = \left(\frac{\cos w \sin v}{\sin(w+v)} - \frac{\sin^2 v}{y \cdot \sin(w+v)} \right) h_1 + \left(\frac{\cos w \sin v}{\sin(w+v)} + \frac{x \sin^2 v}{y^2 \sin(w+v)} \right) h_2$

$$17) F(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^2 - a^2(x^2 + y^2 - z^2) = 0$$

$a = 0$: Rovnici $F(x, y, z) = 0$ splňuje jen bod $(x, y, z) = (0, 0, 0)$. Nemáme žádnou fci

Proto necht' $a \neq 0$ a buďto $a > 0$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = 2 \cdot (x^2 + y^2 + z^2) \cdot 2z + 2a^2z = 2z \cdot (a^2 + 2(x^2 + y^2 + z^2)), \text{ tedy potřebujeme } z \neq 0.$$

Dále pracujeme v bodech, kde $z \neq 0$ a $z = 0$ vyřešíme zvlášť [z tam není jednoznačné, není tam extrém]

$$\text{Derivujeme } F(x, y, z(x, y)) \text{ podle } x \text{ a } y: 2 \cdot (x^2 + y^2 + z^2) \cdot (2x + 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial x}) - a^2 \cdot (2x - 2z \frac{\partial z}{\partial x}) = 0$$

$$2z \frac{\partial z}{\partial x} \cdot (a^2 + 2(x^2 + y^2 + z^2)) = 2x \cdot (a^2 - 2(x^2 + y^2 + z^2))$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{z} \cdot \frac{a^2 - 2(x^2 + y^2 + z^2)}{a^2 + 2(x^2 + y^2 + z^2)}$$

$$\text{Podobně } \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{z} \cdot \frac{a^2 - 2(x^2 + y^2 + z^2)}{a^2 + 2(x^2 + y^2 + z^2)}. \quad \nabla z = 0 \text{ nastane mimo počátek v bodech } x^2 + y^2 + z^2 = \frac{a^2}{2}$$

V počátku máme jen $z = 0$, kde nám věta o implicitní fci nefunguje.

$$\text{Dosazením } x^2 + y^2 + z^2 = \frac{a^2}{2} \text{ do } F(x, y, z) = 0: \frac{a^4}{4} - a^2 \left(\frac{a^2}{2} - z^2 - z^2 \right) = 0 \Rightarrow \underline{z^2 = \frac{a^2}{8}} \text{ a tedy } x^2 + y^2 = \frac{3a^2}{8}$$

Ze zadání je zřejmé, že máme dvě takto zadání fce, jedna je kladná a druhá záporná.

Pokud $z_1 \geq 0$, pak $z_2 = -z_1 \leq 0$.

Dále potřebujeme druhé derivace v bodech, které jsme našli, tj. $x^2 + y^2 = \frac{3a^2}{8}$.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\left(\frac{a^2 - 2(x^2 + y^2 + z^2)}{a^2 + 2(x^2 + y^2 + z^2)} + x \cdot (-4x - 4z \frac{\partial z}{\partial x}) \right) \cdot z \cdot (a^2 + 2(x^2 + y^2 + z^2)) - x \cdot (a^2 - 2(x^2 + y^2 + z^2)) \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial x} \cdot (a^2 + 2(x^2 + y^2 + z^2)) + z \cdot (4x + 4z \frac{\partial z}{\partial x}) \right)}{z^2 \cdot (a^2 + 2(x^2 + y^2 + z^2))^2}$$

Vyčísleme v stacionárních bodech, kde máme $a^2 - 2(x^2 + y^2 + z^2) = 0$, $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$, $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{a^2}{2}$

$$\text{a dostáváme } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(B) = \frac{-4x^2z \cdot 2a^2 - 0}{\frac{a^2}{8} \cdot (2a^2)^2} = \frac{-16x^2z}{a^4}. \quad \text{Podobně } \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}(B) = \frac{-16y^2z}{a^4}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{x \cdot (-4y - 4z \frac{\partial z}{\partial y}) \cdot z \cdot (a^2 + 2(x^2 + y^2 + z^2)) - x \cdot (a^2 - 2(x^2 + y^2 + z^2)) \cdot \dots}{z^2 \cdot (a^2 + 2(x^2 + y^2 + z^2))^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(B) = \frac{-16xy z}{a^4}$$

$$H_f(B) = \frac{-16z}{a^4} \begin{pmatrix} x^2 & xy \\ xy & y^2 \end{pmatrix}. \quad \text{Matice } \begin{pmatrix} x^2 & xy \\ xy & y^2 \end{pmatrix} \text{ je pozitivně semidefiniční, příslušná kvadrátová}$$

$$\text{forma je } Q(h) = x^2 h_1^2 + y^2 h_2^2 + 2xy h_1 h_2 = (x h_1 + y h_2)^2 \geq 0$$

Altud: pro $z \geq 0$ je $H_f(B)$ negativně semidef. a v bodech B jsou lokální neostří maxima.

pro $z \leq 0$ je $H_f(B)$ pozitivně semidef. a v bodech B jsou lokální neostří minima.