

## Domácí úkol 10

Termín odevzdání: 10. 1. 2026 do večera

1.)

Spočtete integrál

$$\int_{\Gamma} (299x^{987} + y) dx + (x^2 + e^{e^y}) dy,$$

kde  $\Gamma$  je kladně orientovaná hranice elipsy se středem v počátku a poloosami o délkách  $A$  a  $B$ .

*Hint: Můžete použít Greenovu větu.*

*Řešení:* Podle instrukcí použijeme Greenovu větu pro plochu  $S \subset \mathbb{R}^2$  ohraničenou hladkou křivkou  $\partial S$

$$= \int_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_S \text{rot}(\vec{F}) dS.$$

Výpočet se velmi zjednoduší, když si uvědomíme, jak vypadá  $\text{rot}(\vec{F})$  v našem případě.

$$\text{rot}(\vec{F}) = \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + e^{e^y}) - \frac{\partial}{\partial y} (299x^{987} + y) = 2x - 1$$

Integrál jsme tedy schopni přepsat do tvaru

$$\int_S 2x - 1 dS,$$

kde  $S$  je právě zadaná elipsa. Jelikož má elipsa střed v počátku, je tedy symetrická podle osy  $y$  a integrál z  $2x$  je proto nulový (lichá funkce). Počítáme proto pouze záporně vzatý obsah této elipsy a ten je roven

$$\int_S -1 dS = -\pi AB$$

□

**2.)**

Uvažujme vektorové pole

$$\vec{\mathcal{G}}(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x^3y + 8\cos(z) \\ -3x^2y^2 + ze^y \\ z^4 + x\sin(y) \end{pmatrix}.$$

Vypočtete vnější tok tohoto pole přes povrch kváдру s protějšími vrcholy  $(0, 0, 0)$  a  $(1, 2, 3)$ .

*Řešení:* Podobně jako v předchozí úloze se práce zjednoduší použitím vhodné věty, v tomto případě použijeme větu Gaussovu pro  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  s po částech hladkou hranicí  $\partial\Omega$ :

$$\int_{\partial\Omega} \vec{\mathcal{G}} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{\mathcal{G}} \, dx.$$

Spočtěme tedy divergenci  $\vec{\mathcal{G}}$ 

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{\mathcal{G}} &= \frac{\partial}{\partial x} (2x^3y + 8\cos(z)) + \frac{\partial}{\partial y} (-3x^2y^2 + ze^y) + \frac{\partial}{\partial z} (z^4 + x\sin(y)) = \\ &= 6x^2y - 6x^2y + ze^y + 4z^3 = ze^y + 4z^3. \end{aligned}$$

Kvádr je velmi jednoduchá množina na parametrizaci, vystačíme s obyčejnými kartézskými souřadnicemi. Počítejme tedy

$$\int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 ze^y + 4z^3 \, dz \, dy \, dx = \int_0^2 \frac{9}{2}e^y + 81 \, dy = \frac{9}{2}(e^2 - 1) + 162$$

□