

## Domácí úkol 4

Termín odevzdání: 5. 11. 2025 do večera

1.)

Rozhodněte, zda řada funkcí

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{n^2}{n+\frac{1}{5}}x\right)}{n^{x^2-3x+3}}$$

konverguje stejnoměrně na  $[0, 2\pi]$ .

*Řešení:* Nejprve zkontrolujme zda není možné použít Weierstrassův M-test a srovnat naši řadu s číselnou řadou typu

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}.$$

Exponent ve jmenovateli je kvadratický polynom, který je sice vždy kladný (a naše řada tak splňuje nutnou podmínku konvergence), ale již ne všude je větší než 1.

$$\begin{aligned} x^2 - 3x + 3 &\leq 1 \\ x^2 - 3x + 2 &\leq 0 \\ (x-1)(x-2) &\leq 0, \end{aligned}$$

tedy problém nastává na intervalu  $[1, 2]$ . Zde není možné použít Weierstrasse a musíme si poradit jinak.

V čitateli máme člen, který se chová zhruba jako " $\sin(nx)$ ", zkusíme proto napasovat Dirichleta. Nejprve, ale musíme čítelel upravit do přesně takového tvaru, na to se hodí součtové vzorce.

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{n^2}{n+\frac{1}{5}}x\right) &= \sin\left(\frac{n^2 + \frac{n}{5} - \frac{n}{5}}{n+\frac{1}{5}}\right) = \sin\left(nx - \frac{n}{5n+1}x\right) = \\ &= \sin(nx) \cos\left(\frac{n}{5n+1}x\right) - \cos(nx) \sin\left(\frac{n}{5n+1}x\right) \end{aligned}$$

Rozdělme naši řadu na dvě a studujme je zvlášť. Nejprve

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^{x^2-3x+3}} \cos\left(\frac{n}{5n+1}x\right),$$

o funkcích  $\sin(nx)$  víme, že mají stejně stejnoměrně omezené částečné součty na  $[\delta, 2\pi - \delta]$  pro libovolné  $\delta > 0$ . Posloupnost

$$\frac{1}{n^{x^2-3x+3}}$$

jde k nule pro všechna  $x$ , nejpomaleji v bodě  $x = \frac{3}{2}$ , ale i v něm je exponent kladný a roven  $\frac{3}{4}$ , platí tedy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 2\pi]} \left| \frac{1}{n^{x^2-3x+3}} - 0 \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{4}}} = 0,$$

a posloupnost tak konverguje k 0 stejnoměrně. Nakonec si všimneme, že posloupnost  $\cos\left(\frac{n}{5n+1}x\right)$  je monotónní, platí totiž

$$0 \leq \frac{n}{5n+1}x \leq \frac{2\pi}{5} < \pi \quad \forall x \in [0, 2\pi], \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

a my můžeme aplikovat  $\arccos$  jako ekvivalentní úpravu (je to bijekce z  $[-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ , a proto můžeme psát  $\arccos\left(\cos\left(\frac{n}{5n+1}x\right)\right) = \frac{n}{5n+1}x$ .

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{n}{5n+1}x\right) &\geq \cos\left(\frac{n+1}{5n+6}x\right) \\ \frac{n}{5n+1}x &\leq \frac{n+1}{5n+6}x && \text{Pozn.: funkce } \arccos \text{ je klesající,} \\ 5n^2 + 6n &\leq 5n^2 + 6n + 1 && \text{proto otáčíme znaménko nerovnosti} \end{aligned}$$

Navíc jsou cosiny zjevně stejně stejnoměrně omezené jedničkou. Máme tedy dohromady

$$\sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\frac{\sin(nx)}{n^{x^2-3x+3}} \cos\left(\frac{n}{5n+1}x\right)}_{\substack{\text{Dirichlet} \\ \text{Abel}}} \Rightarrow \text{ na } [\delta, 2\pi - \delta]$$

Velmi podobně dokážeme, že stejnoměrně konverguje i druhá část původní řady,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^{x^2-3x+3}} \sin\left(\frac{n}{5n+1}x\right).$$

Omezené částečné součty  $\cos(nx)$  máme, stejnoměrnou konvergenci jmenovatele k 0 taky. Siny jsou také stejně stejnoměrně omezené jedničkou. Jen k monotonii  $\sin\left(\frac{n}{5n+1}x\right)$  potřebujeme trochu jinou podmínku, která ale také platí:

$$-\frac{\pi}{2} \leq 0 \leq \frac{n}{5n+1}x \leq \frac{2\pi}{5} \leq \frac{\pi}{2}.$$

Platí tedy

$$\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^{x^2-3x+3}} \sin\left(\frac{n}{5n+1}x\right)}_{\substack{\text{Dirichlet} \\ \text{Abel}}} \Rightarrow \text{ na } [\delta, 2\pi - \delta]$$

Dohromady máme tedy, že řada

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{n^2}{n+\frac{1}{5}}x\right)}{n^{x^2-3x+3}} \Rightarrow \text{ na } [\delta, 2\pi - \delta] \quad (\star)$$

Spojíme-li teď dohromady naše poznatky s těmi z Weierstrassova M-testu, vidíme, že dokážeme pokrýt celý interval  $[0, 2\pi]$ . Volme například  $\delta = \frac{1}{2}$ . Platí

$$\inf_{x \in [0, \frac{1}{2}] \cup [2\pi - \frac{1}{2}, 2\pi]} x^2 - 3x + 3 = \frac{7}{4}.$$

Můžeme proto odhadnout funkce

$$\frac{1}{n^{x^2-3x+3}} \leq \frac{1}{n^{\frac{7}{4}}},$$

a podle Weierstrasse konverguje řada stejnoměrně na  $[0, \frac{1}{2}]$  a také na  $[2\pi - \frac{1}{2}, 2\pi]$ . Podle  $(\star)$  vidíme, že řada také konverguje stejnoměrně na  $[\frac{1}{2}, 2\pi - \frac{1}{2}]$ . Jelikož máme 3 (konečný počet) množiny - intervaly -, na kterých konvergujeme stejnoměrně, konvergujeme stejnoměrně také na jejich sjednocení a tedy na celém intervalu  $[0, 2\pi]$ .

□

2.)

Vypočtete hmotnost desky ohraničené křivkami

$$y = x^2,$$


$$y = 3x^2,$$

$$y = \frac{1}{2x},$$

$$y = \frac{2}{x}$$

s plošnou hustotou  $\rho(x, y) = 6xy^2$ .

*Řešení:* Tvar desky není nikterak pěkný, navíc její hustota se mění jak s  $x$ -ovou tak s  $y$ -ovou souřadnicí.



Provedeme speciální záměnu souřadnic, která bude reflektovat tvar naší množiny. Definujme

$$u = \frac{y}{x^2}$$

$$v = xy,$$

inverzní zobrazení má předpis

$$x = \sqrt[3]{\frac{v}{u}}$$

$$y = \sqrt[3]{uv^2}.$$

Proto tedy platí

$$\varphi(u, v) = \left( \sqrt[3]{\frac{v}{u}}, \sqrt[3]{uv^2} \right),$$

kde  $\varphi$  je zobrazení z věty o substituci. Z obrázku je zřejmé že se pohybujeme v kladných  $x$  a  $y$ , tedy také  $u$  a  $v$ . Vše je tedy správně definované a  $\varphi \in C^1$ . Spočtěme Jakobiho matici

$$J_\varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \frac{-\frac{v}{u^2}}{\sqrt[3]{\frac{v}{u}}} & \frac{1}{3} \frac{\frac{1}{u}}{\sqrt[3]{\frac{v}{u}}} \\ \frac{1}{3} \frac{v^2}{\sqrt[3]{uv^2}} & \frac{1}{3} \frac{2uv}{\sqrt[3]{uv^2}} \end{pmatrix}$$

a její determinant

$$|\det J_\varphi| = \left| -\frac{1}{9} \frac{2v^2}{u} - \frac{1}{9} \frac{v^2}{v^2} \right| = \frac{1}{3u}.$$

Můžeme sestavit integrál, bude dvojný ve tvaru

$$\begin{aligned} \int_1^3 \int_{\frac{1}{2}}^2 6x(u, v) y^2(u, v) \frac{1}{3u} \, dv \, du &= 2 \int_1^3 \int_{\frac{1}{2}}^2 \sqrt[3]{\frac{v}{u}} \sqrt[3]{uv^2}^2 \frac{1}{u} \frac{1}{3u} \, dv \, du = \\ &= 2 \int_1^3 \int_{\frac{1}{2}}^2 u^{-\frac{2}{3}} v^{\frac{5}{3}} \, dv \, du = 2 \int_1^3 u^{-\frac{2}{3}} \left[ \frac{3}{8} v^{\frac{8}{3}} \right]_{\frac{1}{2}}^2 \, du = \frac{3}{4} \left( 4\sqrt[3]{4} - \frac{1}{4\sqrt[3]{4}} \right) \int_1^3 u^{-\frac{2}{3}} \, du = \\ &= \frac{3}{4} \left( 4\sqrt[3]{4} - \frac{1}{4\sqrt[3]{4}} \right) \left[ 3u^{\frac{1}{3}} \right]_1^3 = \frac{9}{4} \left( 4\sqrt[3]{4} - \frac{1}{4\sqrt[3]{4}} \right) (\sqrt[3]{3} - 1) \approx 6.16153 \dots \end{aligned}$$

□