Till revisorer valdes prokurist CARL-ERIC REGNELL och lektor ANEL WEGELIUS med mag. SAMUEL PANELIUS och mag. PER EKBOM som suppleanter.

## Månadsmöte — 20. II. 1962 — Kuukausikokous

Prof. Pontus Palmgren höll ett föredrag om spindelfaunan i Koli. I föredraget framhölls bland annat förekomsten av sydliga element i faunan på mikroklimatiskt gynnsamma biotoper. Prof. Palmgren påpekade även önskvärdigheten av entomologisk undersökning av området i form av en vår eller sommarexkursion. Förslaget diskuterades preliminärt.

Till nya medlemmar invaldes studerandena Bo Forsskähl, Ulf Eriksson, Björn Federley, Rolf Storbacka, Marita Meinander.

Beslöts inleda skriftutbyte med Australian Museum i Sidney.

Mag. OSKAR NYLUND redogjorde för trenne Pammene-arter som hos oss delvis tolkats oriktigt men sedermera uträtts av ing. NIELS WOLFF: Den art som i våra förteckningar gått under namnet suspectana Zell. är den riktiga gallicolana Zell. medan däremot fraxinana Peyer är synonym med suspectana Zell. Det senare namnet har prioritet. Den tredje arten har hos oss gått under namnet gallicolana Zell, men är i själva verket albuginana Guené. Kvarstår alltså 1) Pammene gallicolana Zell. tagen för första gången i Finland 4. 7. 1941 i Saltvik av O. Nylund. 2) P. albuginana Guné känd från Lemland. Flaka och anmäld av dr H. BRUUN, 3) P. suspectana Z. (fraxinana Deyer) likaledes känd från Åland.

Forstm. RABBE ELFVING förevisade det för faunan nya solitärbiet Andrena fulvago Chr. från Åland. Dessutom förevisades en hane och en hona av Prosopis pictilis samt hanar av Halictus punctatissimus, H. viridiaeneus och perkinsi från Åland

Lektor AXEL WEGELIUS meddelade att han anträffat den sällsynta jordlopparten Haltica carinthiaca Weise 27 juni 1952, 29 och 30 maj 1960 i Hattula pa Lathyrus pratensis. Arten anmäldes för ett par år sedan som ny för landet av dr E. Thuneberg på basen av exemplar från Masku.

Mag. EITEL LINDQVIST meddelade att Nematus arcticola Enslin, som ansetts vara synonym med N. arcticus Thoms. är en god art, men att Amauronematus helleni var. polaris tillhör arcticola Enslin. Nematus arcticola sensu Konde är däremot en nova species. Vidare anmälde mag. LINDQVIST Nematus pustulatus från Kuusamo och N. longidens från Utsjoki.

Dr Walter Hackman redögjorde för tvenne mycket närstående Scaptomyzaarter från Hawaji, Scaptomyza abrupta Hackm. och S. mitchelli Hackm. I ett större material av arterna i en kollektion som dr Hackman erhållit till bestämning av prof. Elmo Hardy på Hawaji kunde följande konstateras: bägge arterna har insamlats på samma lokal i Paliku, ett krateromrade på Mt. Haleakala på ön Maui men dessutom föreligger S. abrupta från an annan lokal, en regnskog lägre ned på samma bergsomrade. En biometrisk analys av vingmåtten mg2 och mg3 visar att olikheterna är större mellan abrupta och mitchelli från Paliku än mellan abrupta från regnskogen och mitchelli från Paliku. Paralleller till denna företeelse, att tvenne närstående arter uppvisar större olikheter i de områden där de förekomma tillsammans finner man bland annat i fråga om vissa faglar, men frågan om orsakssammanhanget måste i detta fall lämnas öppen.

Dr Wolter Hellén anmälde en för landet ny stekel Tetramesa eximia Gir., tagen i Parikkala.