

색으로 찾는 우리꽃 정원식물

Korean Native Garden Plants Classified by Their Color



재민중앙기관

산림청 국립수목원
Korea National Arboretum

색으로 찾는 우리꽃 정원식물

Korean Native Garden Plants Classified by Their Color

목차

008 일러두기

009 이 책을 보는 방법

010 식물의 색

013 빨간색

029 분홍색

049 주황색

063 노란색

095 초록색

117 보라색

143 흰색

174 국명 찾아보기

177 학명 찾아보기

181 참고자료

빨간색

- | | | | |
|-------------|---------|----------|----------|
| 14 완도호랑가시나무 | 18 매발톱 | 22 단풍나무 | 26 동백나무 |
| 15 참빗살나무 | 19 할미꽃 | 23 당단풍나무 | 27 가막살나무 |
| 16 화살나무 | 20 산사나무 | 24 복자기 | |
| 17 흰말채나무 | 21 호자나무 | 25 남오미자 | |

분홍색

- | | | | |
|------------|---------|-----------|----------|
| 30 땃강나무 | 35 진달래 | 40 수수꽃다리 | 45 줌조팝나무 |
| 31 슬페랭이꽃 | 36 참꽃나무 | 41 털개회나무 | 46 해당화 |
| 32 패랭이꽃 | 37 꽃싸리 | 42 자란 | 47 생열귀나무 |
| 33 둥근잎평의비름 | 38 참싸리 | 43 앵초 | 48 분꽃나무 |
| 34 산철쭉 | 39 솔나리 | 44 꼬리조팝나무 | |

주황색

- | | | | |
|----------|-----------|---------|---------|
| 50 백양꽃 | 53 제비동자꽃 | 56 땅나리 | 59 털중나리 |
| 51 제주상사화 | 54 범부채 | 57 섬말나리 | 60 하늘나리 |
| 52 산솜방망이 | 55 날개하늘나리 | 58 참나리 | 61 부들 |

노란색

64 노랑원추리	72 털머위	80 태백기린초	88 동의나물
65 감국	73 병꽃나무	81 개노삼	89 개복수초
66 갯취	74 물레나물	82 히어리	90 뱀무
67 금불초	75 기린초	83 생강나무	91 양지꽃
68 미역취	76 돌나물	84 개나리	92 짚신나물
69 산국	77 땅채송화	85 만리화	93 솔나물
70 솜방망이	78 섬기린초	86 피나물	94 모감주나무
71 쯤썸바귀	79 애기기린초	87 쯤샬풀	

초록색

96 파드득나물	102 우산나물	108 도깨비쇠고비	114 산조플
97 팡팡나무	103 회양목	109 속새	115 주목
98 두루미천남성	104 사철나무	110 샷갯나물	
99 큰천남성	105 연화바위솔	111 청나래고사리	
100 단풍취	106 측백나무	112 돈나무	
101 병풍썸	107 대사초	113 조릿대	

보라색

118 족도리풀	125 도라지	132 제비붓꽃	139 큰제비고깔진범
119 좀비비추	126 과납풀	133 타래붓꽃	140 진범
120 주걱비비추	127 산수국	134 꿀풀	141 한라돌쩌귀
121 흑산도비비추	128 각시붓꽃	135 용머리	
122 각시취	129 꽃창포	136 얼레지	
123 까실쑥부쟁이	130 대청부채	137 처녀치마	
124 쑥부쟁이	131 부채붓꽃	138 동강할미꽃	

흰색

144 괴불나무	152 누리장나무	160 큰꽃으아리	168 조팝나무
145 벼룩이울타리	153 함박꽃나무	161 국수나무	169 팔배나무
146 산딸나무	154 미선나무	162 귀룽나무	170 고추나무
147 층층나무	155 이팝나무	163 돌배나무	171 때죽나무
148 꼬리진달래	156 쥐똥나무	164 병아리꽃나무	172 쪽동백나무
149 말발도리	157 백작약	165 쉬땅나무	173 백당나무
150 매화말발도리	158 섬노루귀	166 아그배나무	
151 노랑무늬붓꽃	159 으아리	167 야광나무	

일러두기

1. 이 책에서 활용된 식물소재는 모두 우리 산과 들에서 자라는 자생식물입니다.
2. 식물은 APG IV 분류체계에 따른 과명을 기준으로 배열하였습니다.
3. 식물의 국명과 학명은 국가표준식물목록을 기준으로 하였습니다.
4. 식물은 다양한 색을 지니고 있으나 해당 식물의 관상 가치가 가장 높은 부분의 색을 고려하여 총 7가지의 색상인 '빨간색, 분홍색, 주황색, 노란색, 초록색, 보라색, 흰색'으로 나누었습니다. 빨간색과 더불어 붉은계열의 색상은 빨간색으로, 자주계열은 분홍색으로, 파란계열의 색상은 보라색으로 묶어서 배열하였습니다.
5. 총 150종의 식물을 선정하였으며 색상에 따라 빨간색(14종), 분홍색(19종), 주황색(12종), 노란색(31종), 초록색(20종), 보라색(24종), 흰색(30종)으로 구분하였습니다.
6. 한국 적색목록(Redlist)기준 평가등급에 따라 '위급(CR), 위기(EN), 취약(VU), 약관심(LC), 준위협(NT), 자료부족(DD)'으로 표기해두었습니다. 또한 한반도 자생환경에 적응하여 진화하였으며 세계적으로 우리나라에만 분포하는 귀중한 유전자원인 특산식물(Korean Endemic Plants)도 같이 표기하였습니다.
7. 이 책은 색을 이용하여 식재 조합을 하기 위한 가이드라인으로서 식물이 가진 색상에 초점을 맞추었습니다. 실제 적용 시 정원의 환경과 공간의 상황에 알맞게 적용하시기 바랍니다.

이 책을 보는 방법

본 도서는 식물의 시각적 요소 중 하나인 색을 주제로 식재 조합을 하기 위한 가이드라인을 제시하고 있습니다. 단풍, 열매, 줄기, 꽃, 잎 등 식물이 가지고 있는 색을 빨간색, 분홍색, 주황색, 노란색, 초록색, 보라색, 흰색 총 7가지 색으로 구분하였고, 각 식물의 기본 정보 및 생육환경, 번식법, 이름 유래에 대한 정보를 함께 담았습니다.

상세사진

전체사진

식물 유래 정보




Sapindaceae > Acer

무환자나무과 단풍나무속

복자기

Acer triflorum Kom.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	술속, 숲 가장자리
단풍	10-11월
높이	20m
경조건	양지, 반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목

과명, 속명(영문)

과명, 속명(국문)

국명

학명

한국 적색목록 평가등급 및 특산 여부

식물 성상 및 기본생육정보

국명 유래 — 복자기라는 이름은 잎이 있는 삼출결임의 독특한 모양 또는 겨울눈과 열매에 털이 밀생(密生)하는 모습이 털이 보송하게 난 노루(사슴)를 뜻하는 ‘복작이’ 또는 ‘복장아’를 닮았다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다. 평북 방언을 제외한 것에서 비롯했다.

학명 유래 — 속명 *Acer*는 아카드어 arku(긴, 큰)가 어원으로 유럽에 자생하는 단풍나무(field maple: *A. campestre*)의 라틴명에서 유래했으며 단풍나무속을 일컫는다. 종소명 *triflorum*은 '3화(三花)'의 '라'는 뜻으로 꽃이 세 송이씩 모여 피는 것에서 유래했다.


대표색

빨간색

식물의 색

색은 우리의 감정과 분위기에 큰 영향을 미칩니다. 정원을 조성할 때도 마찬가지입니다. 정원에 심을 식물을 고를 때 적절한 색상 조합을 통해 환경의 분위기를 다양하게 조성할 수 있습니다. 예를 들어 빨간색, 주황색, 노란색과 같은 난색 계열(Warm Colors)의 식물은 생동감 있고 활기찬 느낌을 줄 수 있으며, 초록색, 파란색, 보라색과 같은 한색 계열(Cool Colors)의 식물은 조용하고 차분한 분위기를 연출합니다.

이러한 다양한 색상의 의미와 효과를 이해하고 적절히 활용하는 것이 중요하며 색상 조합을 통해 정원 디자인의 부가가치를 한 단계 더 높일 수 있습니다.



색의 역할과 비율

색상의 조합은 디자인의 핵심 부분 중 하나로, 색의 선택과 배치는 전체적인 인상과 이미지를 형성하는 데 큰 영향을 미칩니다. 특히 식물 조합에서는 색의 조화로운 사용이 중요하며, 이를 위해 주조색, 강조색, 보조색의 개념을 이해하는 것이 필요합니다. 색을 조화롭게 배치하기 위해서는 함께 사용하는 색들의 비율과 역할을 고려해야 합니다.

주조색(Primary Color)

식재 조합에서 주조색은 해당 공간에서 가장 많이 사용되는 색을 의미합니다. 주로 정원 전체의 기본 배경이 되며 부드럽고 톤이 낮은 식물을 70~75% 사용합니다.

보조색(Secondary Color)

주조색을 보조해주며 전체적인 조화를 이루는 데 중요한 역할을 합니다. 정원의 20~25% 정도 차지합니다.

강조색(Accent Color)

주조색에 대비되어 돋보이는 색으로 정원에 생명력을 불어 넣어주는 역할을 합니다. 일반적으로 원색이나 강한 톤의 색을 가진 식물을 5~10% 정도 배치합니다.



함백산 야생화영농조합

- 주조색 ● - 큰산꼬리풀 *Pseudolysimachion kiusianum* var. *glabrifolium*
 보조색 ● - 노루오줌 *Astilbe chinensis*
 강조색 ● - 백운산원추리 *Hemerocallis hakuunensis*, ● - 동자꽃 *lychnis cognata*



천리포수목원

- 주조색 ● - 목련 재배품종 *Magnolia* cv.
 보조색 ● ○ - 수선화류 재배품종 *Narcissus* spp.

빨간색

감탕나무과 감탕나무속

완도호랑가시나무

Ilex × *wandoensis* C.F.Mill. & M.Kim

특산식물

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	해안 숲속, 숲 가장자리
열매	10~12월
높이	2~3m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목



학명 유래 — 속명 *Ilex*는 호랑잎가시나무(*Quercus ilex* L.: holm oak)의 고대 라틴명에서 유래한 것으로 감탕나무속을 일컫는다. 종소명 *wandoensis*는 전남 완도에서 처음 발견된 호랑가시나무 종류라는 뜻이다.





노박덩굴과 화살나무속

참빗살나무

Euonymus hamiltonianus Wall.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
열매	10~11월
높이	8m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 참빗살나무라는 이름은 옛날에 목재로 참빗(篋子)의 살을 만들었던 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Euonymus*는 유럽화나무(*E. europaeus*)의 고대 그리스명으로 '좋은 이름'이란 뜻의 고대그리스어 euonymon에서 유래했으며 화살나무속을 일컫는다. 종소명 *hamiltonianus*는 영국 물리학자이자 식물학자인 Francis Buchanan Hamilton(1762~1829)의 이름에서 유래했다.

노박덩굴과 화살나무속

화살나무

Euonymus alatus (Thunb.) Siebold

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 관목지대
단풍	10~11월
높이	3m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 화살나무라는 이름은 줄기에 날개 모양의 코르크가 발달하는 것을 화살의 깃에 비유한 데서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Euonymus*는 유럽회나무(*E. europaeus*)의 고대 그리스명으로 ‘좋은 이름’이란 뜻의 고대그리스어 *euonymon*에서 유래했으며 화살나무속을 일컫는다. 종소명 *alatus*는 ‘날개가 있는’이라는 뜻으로 줄기에 화살의 깃(날개)을 닮은 코르크가 발달해서 붙여졌다.



층층나무과 층층나무속

흰말채나무

Cornus alba L.

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 냇가 주변
출기	12~3월
높이	3~4m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	삽목, 파종



국명 유래 — 흰말채나무라는 이름은 말채나무를 닮았으나 열매가 흰색으로 익는 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Cornus*는 라틴어 cornu(뿔)가 어원으로 미국산수유(*Cornus mas*)의 라틴명에서 전용되어 층층나무속을 일컫는다. 종소명 *alba*는 '흰색의'라는 뜻으로 열매가 하얗게 익는 것에서 유래했다.

미나리아재비과 매발톱속

매발톱

Aquilegia buergeriana var. *oxysepala* (Trautv. & C.A.Mey.) Kitam.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지, 계곡 주변
꽃	5~7월
높이	0.3~1.3m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 『조선식물향명집』에서 기록한 ‘매발톱꽃’을 축약한 것으로, 꽃잎 뒤쪽의 꽃받침이 매의 발톱처럼 생긴 데서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Aquilegia*는 라틴어 *aquilina*(독수리의)에서 유래했는데, 꼬부라진 거(距: 꽃받침)를 독수리의 발톱(距: 머느리발톱)에 비유한 것으로 매발톱속을 일컫는다. 종소명 *buergeriana*는 독일 식물학자로 일본 식물을 채집한 Heinrich Bürger(1806~1858)의 이름에서 유래했다. 변종명 *oxysepala*는 ‘효족한 꽃받침이 있는’이라는 뜻으로 꽃받침의 모양을 나타낸다.



미나리아재비과 할미꽃속

할미꽃

Pulsatilla koreana (Y.Yabe ex Nakai)
Nakai ex T.Mori

약관심(LC)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	4~5월
높이	0.3~0.4m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 할미꽃이라는 이름은 약용하는 땅속줄기를 노인의 흰머리에 비유한 데서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Pulsatilla*는 라틴어 pulso(두드리다, 치다)에서 유래한 것으로, 꽃이 종(鐘)을 닮아서 붙여졌으며 할미꽃속을 일컫는다. 종소명 *koreana*는 '한국의'라는 뜻으로 한국 특산종이라는 뜻이다.

장미과 산사나무속

산사나무

Crataegus pinnatifida Bunge

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 관목지대
열매	9~10월
높이	6m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목, 접목



국명 유래 — 산사나무라는 이름은 산에서 자라는 아가위나무를 뜻하는 한자어 산자수(仙楂樹)에서 온 말이다. 산사나무의 옛이름은 ‘아가외나무’인데, 아가외는 ‘아가’(아기)와 ‘외’(오이)의 합성어로 둥근 열매가 아기처럼 작은 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Crataegus*는 kratos(힘)와 akis(가시)의 합성어로, 산사나무 종류의 고대 그리스명 krataigos 또는 뾰족한 잎을 가진 어떤 식물을 일컫던 라틴어 crategos에서 유래했으며 산사나무속을 일컫는다. 종소명 *pinnatifida*는 ‘깃모양으로 갈라진’이라는 뜻으로 갈라진 잎의 모양에서 유래했다.





꼭두서니과 호자나무속

호자나무

Damnacanthus indicus C.F.Gaertn.

약관심(LC)

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	숲속
열매	9~11월
높이	1m
광조건	반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 호자나무라는 이름은 한자명 '虎刺'(호자)에서 유래한 것으로 호랑이와 같은 가시라는 뜻이며, 긴 가시가 있는 것을 호랑이에 비유해 붙여졌다.

학명 유래 — 속명

*Damnacanthus*는 그리스어 damnao(정복하다, 극복하다)와 acantha(가시)의 합성어로, 줄기에 있는 가시에서 유래했으며 호자나무속을 일컫는다. 종소명 *indicus*는 '인도의'라는 뜻이다.

무환자나무과 단풍나무속

단풍나무

Acer palmatum Thunb.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
단풍	10~11월
높이	15m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 접목, 삽목



국명 유래 — 단풍나무라는 이름은 한자명 '丹楓'(단풍)에서 비롯한 것으로, 가을에 잎이 붉게 물들고 가는 가지가 바람에 흔들리는 모양을 나타낸 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Acer*는 아카드어 arku(긴, 큰)가 어원으로 유럽에 자생하는 단풍나무(field maple: *A. campestre*)의 라틴명에서 유래했으며 단풍나무속을 일컫는다. 종소명 *palmatum*은 '손바닥 모양의'라는 뜻으로 잎의 생김새에서 유래했다.






무환자나무과 단풍나무속

당단풍나무

Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
단풍	10~11월
높이	8m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 당단풍나무라는 이름은 한자명 '唐丹楓(당단풍)'에서 비롯한 것으로, 상대적으로 더 북쪽(唐)에서 자라는 단풍나무라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Acer*는 아카드어 arku(긴, 큰)가 어원으로 유럽에 자생하는 단풍나무 (field maple: *A. campestre*)의 라틴명에서 유래했으며 단풍나무속을 일컫는다. 종소명 *pseudosieboldianum*은 pseudo(가짜의, 유사한)와 sieboldianum(일본 식물을 연구한 Siebold)의 합성어로 *A. sieboldianum*이라는 종과 비슷하다는 뜻에서 유래했다.

무환자나무과 단풍나무속

복자기

Acer triflorum Kom.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
단풍	10~11월
높이	20m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 복자기라는 이름은 털이 있는 삼출접잎의 독특한 모양 또는 겨울눈과 열매에 털이 밀생(密生)하는 모습이 털이 보송하게 난 노루(사슴)를 뜻하는 ‘복작이’ 또는 ‘복장이’를 닮았다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다. 평북 방언을 채록한 것에서 비롯했다.

학명 유래 — 속명 *Acer*는 아카더어 arku(긴, 큰)가 어원으로 유럽에 자생하는 단풍나무(field maple: *A. campestre*)의 라틴명에서 유래했으며 단풍나무속을 일컫는다. 종소명 *triflorum*은 ‘3화(三花)의’라는 뜻으로 꽃이 세 송이씩 모여 피는 것에서 유래했다.



오미자와 남오미자속

남오미자

Kadsura japonica (L.) Dunal

약관심(LC)

성상	상록 활엽 덩굴
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
열매	9~10월
높이	3m
광조건	반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 오미자와 비슷하고 남부 지방에 치우쳐 자란다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Kadsura*는 일본명 Sanekadsura(サネカズラ)의 일부를 취한 것으로 남오미자속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 ‘일본의’라는 뜻으로 최초 발견지를 나타낸다.

차나무과 동백나무속

동백나무

Camellia japonica L.

약관심(LC)

성상	상록 활엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 해안지대
꽃	11~5월
높이	7m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 삽목, 접목



국명 유래 — 한자명 ‘冬栢’(동백)에서 비롯한 것으로, 추운 겨울에 꽃을 피우고 푸르른 나무라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Camellia*는 체코슬로바키아 예수회 선교사로 필리핀 식물을 유럽에 소개한 G. J. Kamel(Camel, 1661~1706)의 이름에서 유래했으며 동백나무속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 ‘일본의’라는 뜻으로 최초 발견지 또는 분포지를 나타낸다.





산분꽃나무과 산분꽃나무속

가막살나무

Viburnum dilatatum Thunb.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대
열매	9~10월
높이	5m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 나무의 껍질이 검은색을 띠고 사립문(살)을 만드는 데 사용한 것에서 유래한 것으로 추정한다. 열매는 식용하고 나무를 땀감으로 사용했다. 주요 자생지인 전라남도 방언을 채록한 것이다. 옛말 ‘가마오디’, ‘가마괴’, ‘가막조개’ 등에서 ‘가마’ 또는 ‘가막’은 검은색을 뜻하고, 전라남도 방언에서 ‘살’은 사립(문)을 뜻한다.

학명 유래 — 속명 *Viburnum*은 의미 불명의 비브르눔 란타나(*V. lantana*)의 라틴명에서 유래한 것으로 산분꽃나무속을 일컫는다. 종소명 *dilatatum*은 ‘넓어진, 확대의’라는 뜻이다.

분홍색

인동과 덩강나무속

덩강나무

Zabelia tyaihyonii (Nakai) Hisauti & H.Hara

취약(VU)

특산식물

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	바위틈, 전석지, 관목지대
꽃	5~6월
높이	2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 나뭇가지를 꺾으면 ‘덩강’하고 잘 부러지거나, 봄에 가지의 모습이 쇠소리가 날 정도로 바짝 말라 있다는 뜻에서 유래했다. 주요 자생지인 평안남도 방언을 채록한 것이다. 평안남도를 비롯한 북한 지역에서 ‘덩강덩강’은 단단한 물건이 쇠소리가 날 정도로 바짝 마른 모양을 뜻한다. 이에 비추어 봄에 자원식물로 이용할 때 바짝 마른 나뭇가지의 모습이나 그 가지가 부러지는 모습에서 유래한 이름으로 보인다.





석죽과 패랭이꽃속

술패랭이꽃

Dianthus longicalyx Miq.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	7~8월
높이	0.3~1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 『조선식물향명집』에서 신칭(新稱)한 것으로, 꽃잎이 술과 같이 갈라진 패랭이꽃이라는 뜻이다. '술'은 물건을 장식하기 위해 다는 여러 가닥의 실을 말한다.

학명 유래 — 속명 *Dianthus*는 Dios(Zeus, God)와 anthos(꽃)의 합성어로, 제우스의 꽃 또는 신성한 꽃이라는 뜻이며 패랭이꽃속을 일컫는다. 종소명 *longicalyx*는 '긴 꽃받침의'라는 뜻이다.

석죽과 패랭이꽃속

패랭이꽃

Dianthus chinensis L.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	6~8월
높이	0.3m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 옛날에 신분이 낮은 사람이 쓰던 갓(冠)의 일종인 패랭이와 꽃이 닮은 데서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Dianthus*는 Dios(Zeus, God)와 anthos(꽃)의 합성어로, 제우스의 꽃 또는 신성한 꽃이라는 뜻이며 패랭이꽃속을 일컫는다. 종소명 *chinensis*는 '중국에 분포하는'이라는 뜻으로 최초 발견지를 나타낸다.



돌나물과 꿩의비름속

둥근잎꿩의비름

Hylotelephium ussuriense (Kom.)

H.Ohba

취약(VU)

성상	여러해살이풀(다육)
자생 환경	절벽 바위틈, 전석지
꽃	7~8월
높이	0.15~0.25m
광조건	반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Hylotelephium*은 그리스어 hylo(숲)와 telepheion(건강)에서 유래했으며 꿩의비름속을 일컫는다.

진달래과 진달래속

산철쭉

Rhododendron yedoense f. *poukhanense* (H.Lév.) Sugim. ex T.Yamaz.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	계곡 숲 가장자리, 산능선부 초지
꽃	4~5월
높이	1~2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 산철쭉이라는 이름은 산에서 자라는 철쭉이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명

*Rhododendron*은 그리스어 rhodon(장미)과 dendron(나무)의 합성어로 장미를 닮은 나무라는 뜻인데, 꽃의 모양을 나타낸 것으로 추정하며 진달래속을 일컫는다.

종소명 *yedoense*는 에도(江戸: 일본 도쿄의 옛이름)에 분포한다는 뜻이다. 품종명 *poukhanense*는 '북한산에 분포하는'이라는 뜻으로 발견지 또는 분포지를 나타낸다.





진달래과 진달래속

진달래

Rhododendron mucronulatum Turcz.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 능선
꽃	3~4월
높이	2~3m
광조건	양지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 옛이름 ‘진돌비(진돌비)’에서 유래한 것으로, ‘진’은 꽃 색이 진하다는 뜻의 고유어고 ‘돌비(돌비)’는 산야에서 자라는 먹을 수 있는 들꽃이라는 뜻의 고유어다. 따라서 진한 분홍색의 꽃이 피고 식용할 수 있는 들꽃이라는 뜻에서 붙여진 이름으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Rhododendron*은 그리스어 rhodon(장미)과 dendron(나무)의 합성어로 장미를 닮은 나무라는 뜻인데, 꽃의 모양을 나타낸 것으로 추정하며 진달래속을 일컫는다. 종소명 *mucronulatum*은 ‘약간 미세하게 불룩한’이라는 뜻이다.

진달래과 진달래속

참꽃나무

Rhododendron weyrichii Maxim.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목, 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	5~6월
높이	3~6m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 참꽃나무라는 이름은 다른 진달래속 식물에 비해 꽃이 크고 식물체가 높게 자라는 모양이 진짜(참) 꽃나무(철쭉)라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Rhododendron*은 그리스어 rhodon(장미)과 dendron(나무)의 합성어로 장미를 닮은 나무라는 뜻인데, 꽃의 모양을 나타낸 것으로 추정하며 진달래속을 일컫는다. 종소명 *weyrichii*는 러시아인으로 동북아 식물을 채집한 Heinrich Weyrich(1828~1863)의 이름에서 유래했다.




콩과 꽃싸리속

꽃싸리

Campylotropis macrocarpa (Bunge)
Rehder

자료부족(DD)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대, 냇가 주변
꽃	8~9월
높이	1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



학명 유래 — 속명 *Campylotropis*는 그리스어 campylos(굽은)와 tropis(용골龍骨)의 합성어로 ‘용골판이 낮처럼 굽는다’라는 뜻이며 꽃싸리속을 일컫는다.

콩과 싸리속

참싸리

Lespedeza cyrtobotrya Miq.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대
꽃	7~9월
높이	2m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 참싸리라는 이름은 진짜(참) 싸리라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Lespedeza*는 프랑스 식물학자 André Michaux(1746~1802)의 북아메리카 플로리다 탐사 활동을 후원한 스페인 총독 Vicente Manuel de Céspedes(1721?~1794)를 기리기 위한 이름으로 Céspedes를 Lespedez로 오기한 데서 유래했으며 싸리속을 일컫는다. 종소명 *cyrtobotrya*는 ‘굽은 꽃송이의’라는 뜻으로 꽃차례의 모습을 나타낸다.



백합과 백합속

솔나리

Lilium cernuum Kom.

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대 초지
꽃	7~8월
높이	0.7m
광조건	반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 『조선식물향명집』에서 그 이름이 최초로 발견되는데, 소나무(솔)의 잎처럼 가는 잎을 가진 나리라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Lilium*은 고대 라틴명으로 켈트어의 li, 그리스어의 leirion 모두 흰색을 뜻하는데 꽃의 색과 관련이 있으며 백합속을 일컫는다. 종소명 *cernuum*은 '고개 숙인, 앞으로 구부린'이라는 뜻이다.

물푸레나무과 수수꽃다리속

수수꽃다리

Syringa oblata var. *dilatata* (Nakai)

Rehder

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	석회암지대, 관목지대, 능선
꽃	4월
높이	2~3m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기, 접목



국명 유래 — 원뿔모양꽃차례가 수수의 이삭과 비슷하고 풍성하게 달리는 모습에서 유래했다. '수수'(蜀黍)와 '꽃'(花)과 '다리'(여자들의 머리술이 많아 보이라고 덧넣었던 판머리)의 합성어로 이해된다.

학명 유래 — 속명 *Syringa*는 그리스어 syrinx(관, 대롱)가 어원으로 꽃자루의 모양을 나타낸 것이며 수수꽃다리를 일컫는다. 종소명 *oblata*는 '오래된'이라는 뜻이며, 변종명 *dilatata*는 '넓어진'이라는 뜻이다.



물푸레나무과 수수꽃다리속

털개회나무

Syringa patula (Palib.) Nakai

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대, 능선
꽃	4~5월
높이	3m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기, 접목



국명 유래 — 벨벳 같은 털이 있는 개회나무라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Syringa*는 그리스어 syrinx(관, 대롱)가 어원으로 꽃자루의 모양을 나타낸 것이며 수수꽃다리속을 일컫는다. 종소명 *patula*는 '열린, 벌어진'이라는 뜻이다.

난초과 자란속

자란

Bletilla striata (Thunb.) Rchb.f.

준위협(NT)

성상	여러해살이풀
자생 환경	해안 숲 가장자리, 초지
꽃	5~6월
높이	0.5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Bletilla*는 스페인 식물학자이자 약제사인 Don Luis Blet를 기념한 것에 유래하였으며 자란속을 일컫는다.





앵초과 앵초속

앵초

Primula sieboldii E.Morren

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속 계곡주변, 습한 초지
꽃	4월
높이	0.15~0.4m
광조건	반음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 한자명 ‘櫻草’(앵초)가 어원으로, 꽃의 모양이 앵도나무의 꽃과 유사하다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Primula*는 라틴어 *primus*(최초)가 어원으로 이른 봄에 피는 프리물라 베리스(*P. veris*)에서 유래했으며 앵초속을 일컫는다. 종소명 *sieboldii*는 독일 의사이자 생물학자로 일본 식물을 연구한 Philipp Franz von Siebold(1796~1866)의 이름에서 유래했다.

장미과 조팝나무속

꼬리조팝나무

Spiraea salicifolia L.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	습지, 초지
꽃	7~8월
높이	1~1.5m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 꼬리조팝나무라는 이름은 꼬리같이 긴 꽃차례가 있는 조팝나무라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Spiraea*는 그리스어 speira(나선, 화환, 바퀴)에 어원을 둔 speiraia(이 식물로 화환을 만들었고 어떤 종은 열매의 모양이 나선형이어서 붙여진 이름)에서 전용-유래했으며 조팝나무속을 일컫는다. 종소명 *salicifolia*는 'Salix(버드나무속)와 비슷한 잎의'라는 뜻으로 잎이 버드나무를 닮은 것에서 유래했다.





장미과 조팝나무속

좀조팝나무

Spiraea microgyna Nakai

특산식물

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 암석지
꽃	5~6월
높이	1.5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 씨방이 작은(좀) 조팝나무라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Spiraea*는 그리스어 *speira*(나선, 화환, 바퀴)에 어원을 둔 *speiraia*(이 식물로 화환을 만들었고 어떤 종은 열매의 모양이 나선형이어서 붙여진 이름)에서 전용·유래했으며 조팝나무속을 일컫는다. 종소명 *microgyna*는 '작은 씨방의'라는 뜻으로 열매가 상대적으로 작은 것에서 유래했다.

장미과 장미속

해당화

Rosa rugosa Thunb.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	해안초지, 사구
꽃	5~7월
높이	1.2~1.8m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 해당화라는 이름은 한자명 ‘海棠花’(해당화)에서 비롯된 것으로 바다에 피는 당(棠) 꽃이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Rosa*는 아카데미 russu(붉은)에서 유래한 고대 라틴명으로 장미속을 일컫는다. 종소명 *rugosa*는 ‘주름진’이라는 뜻으로 잎의 표면에 주름이 있는 것에서 유래했다.



장미과 장미속

생열귀나무

Rosa davurica Pall.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	6~7월
높이	1~1.5m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 생열귀나무라는 이름은 ‘생’(강조의 의미)과 ‘열귀’(아가위)와 ‘나무’(木)의 합성어로 꽃과 열매 등이 아가위(해당화 또는 산사나무)를 닮았다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Rosa*는 아카드어 *rossu*(붉은)에서 유래한 고대 라틴명으로 장미속을 일컫는다. 종소명 *davurica*는 ‘(바이칼호 동쪽) 다후리아 지방의’라는 뜻으로 발견지를 나타낸다.

산분꽃나무과 산분꽃나무속

분꽃나무

Viburnum carlesii Hemsl.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대, 전석지
꽃	4~5월
높이	1.2~1.8m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목, 접목



국명 유래 — 꽃이 긴 통모양으로 분꽃을 닮았고, 꽃이 피었을 때 나는 강한 향이 분 냄새를 연상시킨다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Viburnum*은 의미 불명의 비브르눔 란타나(*V. lantana*)의 라틴명에서 유래한 것으로 산분꽃나무속을 일컫는다. 종소명 *carlesii*는 영국 식물 채집가 William Richard Carles(1848~1929)의 이름에서 유래했는데, 그는 1883~1884년에 인천과 서울에서 식물을 채집한 바 있다.

주황색

수선화과 상사화속

백양꽃

Lycoris sanguinea var. *koreana*
(Nakai) T.Koyama

준위협(NT)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	9월
높이	0.3~0.4m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Lycoris*는 고대 로마의 정치가 안토니우스(Marcus Antonius, B.C.83~B.C.30)의 연인이었던 미인 *Lycoris*의 이름에서 유래했으며, 꽃이 아름다운 상사화속을 일컫는다. 종소명 *sanguinea*는 피(血)를 뜻하는 라틴어 *sanguis*에서 유래한 말로 '피처럼 붉은색의'라는 뜻이다.



수선화과 상사화속

제주상사화

Lycoris × chejuensis K.H.Tae & S.C.Ko

취약(VU)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	8월
높이	0.5~0.6m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	포기나누기



학명 유래 — 속명 *Lycoris*는 고대 로마의 정치가 안토니우스(Marcus Antonius, B.C.83~B.C.30)의 연인이었던 미인 Lycoris의 이름에서 유래했으며, 꽃이 아름다운 상사화속을 일컫는다. 종소명 *chejuensis*는 '제주도의'라는 뜻이다.

국화과 산썸방망이속

산썸방망이

Tephroseris flammea (Turcz. ex DC.) Holub

준위협(NT)

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대 초지, 숲 가장자리
꽃	8월
높이	0.15~0.4m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Tephroseris*는 그리스어 tephros(잿빛의)와 seris(치커리, 상추)의 합성어로 짙은 잿빛의 잎 때문에 붙여졌으며 산썸방망이속을 일컫는다.





석죽과 동자꽃속

제비동자꽃

Lychnis wilfordii (Regel) Maxim.

위기(EN)

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대 습지, 초지, 숲 가장자리
꽃	6~7월
높이	0.5~0.8m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 제비동자꽃이라는 이름은 『조선식물향명집』에서 신칭한 것으로, 실처럼 갈라진 꽃잎의 모습이 제비 꼬리를 연상시켜서 붙여졌다. ‘동자꽃’을 기본으로 하고 ‘제비’를 추가해 만든 이름이다.

학명 유래 — 속명 *Lychnis*는 그리스어 lychnos(불꽃)에서 유래한 것으로 붉은색을 띠는 종에 붙여졌는데, 유럽에서는 옛날에 이 속의 식물로 램프의 심지를 만들었다고 하며 동자꽃속을 일컫는다. 종소명 *wilfordii*는 영국 식물학자로 한국과 일본, 중국의 식물을 채집하고 연구한 Charles Wilford(?~1893)의 이름에서 유래했다.

붓꽃과 붓꽃속

범부채

Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월
높이	0.5~1m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 오래된 고유명으로, 황적색 꽃에 호랑이 무늬 같은 짙은 반점이 있고 좌우로 편평한 잎이 2열로 배열된 모양이 마치 부채를 절반쯤 펼쳐놓은 듯하다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Iris*는 그리스 신화에 나오는 신들의 전령으로 무지개를 의인화한 신의 이름이며 붓꽃속을 일컫는다. 종소명 *domestica*는 '국내의, 가정의'라는 뜻이다.





백합과 백합속

날개하늘나리

Lilium pensylvanicum Ker Gawl.

위급(CR)

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대 초지
꽃	7~8월
높이	0.2~0.9m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 하늘나리를 닮았는데 줄기에 좁은 날개가 있다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Lilium*은 고대 라틴명으로 켈트어의 li, 그리스어의 leirion 모두 흰색을 뜻하는데 꽃의 색과 관련이 있으며 백합속을 일컫는다.

백합과 백합속

땅나리

Lilium callosum Siebold & Zucc.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	7월
높이	0.3~1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 땅나리라는 이름은 꽃이 하늘을 향해 피는 하늘나리에 대응해서 꽃이 땅을 향해 피어나는 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Lilium*은 고대 라틴명으로 켈트어의 li, 그리스어의 leirion 모두 흰색을 뜻하는데 꽃의 색과 관련이 있으며 백합속을 일컫는다. 종소명 *callosum*은 '단단한 피부가 있는, 혹이 있는, 자색 반점이 있는'이라는 뜻이다.





백합과 백합속

섬말나리

Lilium hansonii Leichtlin ex
D.D.T.Moore

준위협(NT)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	6~7월
높이	0.5~1m
광조건	반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 섬말나리라는 이름은 섬(울릉도)에서 자라는 말나리라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Lilium*은 고대 라틴명으로 켈트어의 li, 그리스어의 leirion 모두 흰색을 뜻하는데 꽃의 색과 관련이 있으며 백합속을 일컫는다. 종소명 *hansonii*는 덴마크 생물학자 Emil Christian Hansen(1842~1909)의 이름에서 유래한 것으로 추정한다.

백합과 백합속

참나리

Lilium lancifolium Thunb.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지, 냇가, 암벽틈
꽃	7~8월
높이	1~2m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 참나리라는 이름은 진짜(眞)나리라는 뜻이다. 여기서 '나리'는 나비처럼 아름다운 꽃 또는 먹는 나물을 뜻하는 우리말에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Lilium*은 고대 라틴명으로 켈트어의 li, 그리스어의 leirion 모두 흰색을 뜻하는데 꽃의 색과 관련이 있으며 백합속을 일컫는다. 종소명 *lancifolium*은 lancea(창)와 folium(잎)의 합성어로 '피침모양 잎의'라는 뜻이다.





백합과 백합속

털중나리

Lilium amabile Palib.

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	6~8월
높이	0.5~1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 털중나리라는 이름은 참나리와 땅나리의 중간 크기 나리이고 줄기에 잔털이 밀생(密生)하는 특징이 있어서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Lilium*은 고대 라틴명으로 켈트어의 li, 그리스어의 leirion 모두 흰색을 뜻하는데 꽃의 색과 관련이 있으며 백합속을 일컫는다. 종소명 *amabile*는 '사랑스러운, 매력적인'이라는 뜻이다.

백합과 백합속

하늘나리

Lilium concolor var. *partheneion*
(Siebold & de Vriese) Baker

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대 초지
꽃	6~7월
높이	0.3~0.8m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 하늘나리라는 이름은 꽃이 곧추서서 하늘을 보고 핀다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Lilium*은 고대 라틴명으로 켈트어의 li, 그리스어의 leirion 모두 흰색을 뜻하는데 꽃의 색과 관련이 있으며 백합속을 일컫는다. 종소명 *concolor*는 '같은 색의'라는 뜻이다.





부들과 부들속

부들

Typha orientalis C.Presl

약관심(LC)

성상	여러해살이풀(수생)
자생 환경	습지
꽃	6~8월
높이	1.3~2m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 15세기경부터 그 표현이 확인되는 옛이름인 부들은 분꽃(붓꽃)과 어원을 같이하는 이름으로, 지상부(주로 꽃이삭)의 모양이 ‘분’(筆, 붓)처럼 보이는 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Typha*는 고대 그리스명 typhē에서 유래한 것으로 tiphos(늪, 연못)가 어원이며, 늪지나 습지에서 주로 자라기에 붙여졌으며 부들속을 일컫는다. 종소명 *orientalis*는 ‘동양의’라는 뜻이다.

노란색

아스포델루스와 원추리속

노랑원추리

Hemerocallis thunbergii Baker

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	6~7월
높이	1m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Hemerocallis*는 그리스어 hemera(하루)와 callos(아름다움)의 합성어로, 꽃이 피고 하루만에 시드는 속성에서 유래했으며 원추리속을 일컫는다. 종소명 *thunbergii*는 스웨덴 식물학자로 일본 식물을 연구한 Carl Peter Thunberg(1743~1828)의 이름에서 유래했다.



국화과 쑥갓속

감국

Chrysanthemum indicum L.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 해안 돌틈, 관목지대, 초지
꽃	10~11월
높이	0.3~0.8m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 감국이라는 이름은 한자명 ‘甘菊’(감국)에서 유래한 것으로, 약재나 먹거리로 이용할 때에 맛이 달다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 종소명 *indicum*은 ‘인도의’라는 뜻으로 발견지 또는 분포지를 나타낸다.

국화과 곰취속

갯취

Ligularia mongolica (Turcz.) DC.

취약(VU)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 습한 초지
꽃	6~7월
높이	1~1.5m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Ligularia*는 라틴어 ligula(작은 혀, 작은 검)가 어원으로 혀 모양 꽃잎에서 유래했으며 곰취속을 일컫는다. 종소명 *mongolica*는 '몽골 지방의'라는 뜻이다.



국화와 금불초속

금불초

Inula japonica Thunb.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	넷가 주변 초지
꽃	7~10월
높이	0.2~0.6m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 한자명

‘金沸草’(금불초 또는 금비초)에서 유래한 것으로, 노란색의 꽃을 황금이 끓거나 용솟음친다고 보아 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Inula*는

목향(*Inula helenium*)의 고대 라틴명에서 유래했으며 금불초속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 ‘일본의’라는 뜻으로 최초 발견지 또는 분포지를 나타낸다.

국화과 미역취속

미역취

Solidago virgaurea subsp. *asiatica*
(Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~10월
높이	0.3~0.8m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 미역 맛이 나는 나물(취)이라는 뜻에서 유래했다. 어린잎을 식용했는데, 데치거나 국을 끓이면 미역 맛이 난다. 미역취라는 이름은 자원식물로 이용하면서 형성된 것으로, 경상남도과 강원도의 방언을 채록한 것이다.

학명 유래 — 속명 *Solidago*는 그리스어 solidus(모든, 온전한)와 ago(상태를 나타내는 접미사)의 합성어로 상처와 궤양을 치료하는 탕약으로 쓰인 데서 유래했으며 미역취속을 일컫는다. 종소명 *virgaurea*는 '황금색 가지'라는 뜻이며, 아종명 *asiatica*는 '아시아의'라는 뜻이다.





국화와 속갓속

산국

Chrysanthemum boreale (Makino)
Makino

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	9~11월
높이	1~1.5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 산국이라는 이름은 한자명 '山菊'(산국)에서 유래한 것으로, 산에서 자라는 국화라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 종소명 *boreale*는 '북방의, 북방계의'라는 뜻이다.

국화과 산썸방망이속

썸방망이

Tephroseris kirilowii (Turcz. ex DC.) Holub

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	4~5월
높이	0.2~0.65m
광조건	양지
토질	양토
번식	파종



국명 유래 — 썸과 같은 흰 털로 덮여 있고 하나의 꽃대에 여러 개의 꽃이 소담스럽게 피어 있는 모습이 방망이를 닮았다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Tephroseris*는 그리스어 tephros(젓빛의)와 seris(치커리, 상추)의 합성어로 짙은 젓빛의 잎 때문에 붙여졌으며 산썸방망이속을 일컫는다. 종소명 *kirilowii*는 러시아 식물채집가 Porfirij Jevdokimovic Kirilov(1801~1864)의 이름에서 유래했다.





국화와 선썸바귀속

썸바귀

Ixeris stolonifera A.Gray

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	5~6월
높이	0.1m
광조건	양지
토질	사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Ixeris*는 썸바귀 유사식물에 대한 인디언 이름에서 유래했다고 하지만 정확한 어원은 알려져 있지 않으며 선썸바귀속을 일컫는다. 종소명 *stolonifera*는 '기느줄기가 있는'이라는 뜻이다.

국화과 털머위속

털머위

Farfugium japonicum (L.) Kitam.

약관심(LC)

성상	상록성 여러해살이풀
자생 환경	해안 숲속, 숲 가장자리
꽃	9~11월
높이	0.3~0.5m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Farfugium*의 어원은 불분명하지만 관동(*Tussilago farfara* L.)을 뜻하는 라틴어 *farfara*에서 유래하여 관동과 잎이 유사하다는 점에서 유래했거나, 라틴어 *far*(밀가루)과 라틴어 *fugio*(사라지다)의 합성어로 신엽의 전개 과정에서 엽병과 엽신에 난 백색의 털이 사라지는 특성을 지닌다는 점에서 유래한 것으로 추정하며 털머위속을 일컫는다. 종소명 *japonicum*은 '일본의'라는 뜻이다.





인동과 병꽃나무속

병꽃나무

Weigela subsessilis (Nakai)

L.H.Bailey

약관심(LC)

특산식물

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 계곡 주변
꽃	5~6월
높이	2~3m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 꽃 모양이 병(瓶)처럼 보인다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Weigela*는 독일 식물학자 Christian Ehrenfried von Weigel(1748~1831)의 이름에서 유래했으며 병꽃나무속을 일컫는다. 종소명 *subsessilis*는 '잎자루가 거의 없는'이라는 뜻으로 잎의 형태에서 유래했다.

물레나물과 물레나물속

물레나물

Hypericum ascyron L.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	6~8월
높이	0.5~1m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 물레나물이라는 이름은 꽃잎이 바람개비처럼 휘어져 있는 모습이 실을 잣는 물레와 닮았다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Hypericum*은 고대 그리스명 hypereikon에 어원을 두고 있으며 hyper(위)와 eikon(그림)의 합성어로, 귀신을 쫓기 위해 그림 위에 꽃을 올려놓던 풍습에서 유래한 것으로 추정하며 물레나물속을 일컫는다. 종소명 *ascyron*은 '단단하지 않은'이라는 뜻으로 물레나물의 그리스명에서 유래했다.





돌나물과 기린초속

기린초

Phedimus aizoon var. *floribundus*

H.Ohba

약관심(LC)

성상	여러해살이풀(다육)
자생 환경	암석지
꽃	6~7월
높이	0.05~0.3m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 한자어

기린초(麒麟草)에서 유래한 것으로, 두꺼운 잎과 노랗게 피는 꽃 모양이 상상 속 동물인 기린(麒麟) 또는 그 뿔을 닮았다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Phedimus*는 그리스어 phaidimos(빛나는)에서 비롯한 것으로, 이 속의 어떤 종의 잎 모양에서 유래했다고 추정되며 기린초속을 일컫는다.

돌나물과 돌나물속

돌나물

Sedum sarmentosum Bunge

약관심(LC)

성상	여러해살이풀(다육)
자생 환경	숲 가장자리, 암석지
꽃	5~6월
높이	0.15m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 돌(石)이 많이 나는 곳에서 자라는 나물이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Sedum*은 플리니우스(Plinius, 23~79)가 돌나물과의 식물(houseleek)에 사용한 라틴명에서 유래했다. 라틴어 sedo(진정시키다) 또는 sedeo(앉다)에서 유래했다는 설도 있으며 돌나물속을 일컫는다.

종소명 *sarmentosum*은 '덩굴줄기의, 기는줄기가 있는'이라는 뜻으로 포복성줄기로 번식하는 것에서 유래했다.





돌나물과 돌나물속

땅채송화

Sedum oryzifolium Makino

약관심(LC)

성상	여러해살이풀(다육)
자생 환경	해안 바위틈
꽃	5~6월
높이	0.05~0.12m
광조건	양지
토질	사토
번식	삽목



학명 유래 — 속명 *Sedum*은 플리니우스(Plinius, 23~79)가 돌나물과의 식물(houseleek)에 사용한 라틴명에서 유래했다. 라틴어 sedo(진정시키다) 또는 sedeo(앉다)에서 유래했다는 설도 있으며 돌나물속을 일컫는다.

돌나물과 기린초속

섬기린초

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart

약관심(LC)

특산식물

성상	여러해살이풀(다육)
자생 환경	해안 숲 가장자리, 바위틈
꽃	7월
높이	0.5m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Phedimus*는 그리스어 phaidimos(빛나는)에서 비롯한 것으로, 이 속의 어떤 종의 잎 모양에서 유래했다고 추정되며 기린초속을 일컫는다. 종소명 *takesimensis*는 '울릉도에 분포하는'이라는 뜻이다.



돌나물과 기린초속

애기기린초

Phedimus middendorffianus (Maxim.) 't Hart

성상	여러해살이풀(다육)
자생 환경	고산지대 바위 위, 돌밭
꽃	6~8월
높이	0.2m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 애기기린초라는 이름은 기린초에 비해 식물 전체의 크기가 작은 데서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Phedimus*는 그리스어 phaidimos(빛나는)에서 비롯된 것으로, 이 속의 어떤 종의 잎 모양에서 유래했다고 추정되며 기린초속을 일컫는다. 종소명 *middendorffianus*는 러시아 출신의 생물학자 Alexander Theodor von Middendorff(1815~1894)의 이름에서 유래했다.

돌나물과 기린초속

태백기린초

Phedimus latiovalifolius (Y.N.Lee)

D.C.Son & H.J.Kim

약관심(LC)

특산식물

성상	여러해살이풀(다육)
자생 환경	숲 가장자리, 암석지대
꽃	6월
높이	0.2m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Phedimus*는 그리스어 phaidimos(빛나는)에서 비롯한 것으로, 이 속의 어떤 종의 잎 모양에서 유래했다고 추정되며 기린초속을 일컫는다.



콩과 고삼속

개느삼

Sophora koreensis Nakai

위기(EN)

특산식물

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대
꽃	4~5월
높이	1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 개느삼이라는 이름은 느삼(=고삼)과 잎과 꽃 등의 생김 모습이 비슷하다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Sophora*는 아라비아어 sophera, sufayra에서 유래한 것으로 린네(Carl von Linné, 1707~1787)가 우리나라에는 분포하지 않는 *Sophora alopecuroides* L.(苦豆子, 고두자)을 설명하기 위해 사용한 것에서 비롯되어 고삼속을 일컫는다. 종소명 *koreensis*는 ‘한국에 분포하는’이라는 뜻으로 한국 특산식물임을 나타낸다.

조록나무과 히어리속

히어리

Corylopsis coreana Uyeki

준위협(NT)

특산식물

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	3~4월
높이	1~2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종



학명 유래 — 종소명 *coreana*는 '한국의'라는 뜻으로 한국 특산종을 나타낸다.



녹나무과 생강나무속

생강나무

Lindera obtusiloba Blume

약관심(IC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 계곡 주변
꽃	3~4월
높이	3m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 생강나무라는 이름은 고유명으로, 가지를 꺾거나 잎을 비비면 생강 냄새가 난다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Lindera*는 스웨덴 식물학자 Johann Linder(1676~1723)의 이름에서 유래했으며 생강나무속을 일컫는다. 종소명 *obtusiloba*는 '둔두 잔열의, 열편의 가장자리가 둔한'이라는 뜻으로 잎끝의 갈라짐이 무딘 것에서 유래했다.

물푸레나무과 개나리속

개나리

Forsythia koreana (Rehder) Nakai

약관심(LC)

특산식물

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대
꽃	3~4월
높이	3m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 개나리라는 이름은 노란색의 작은 꽃이 야생의 백합속(*Lilium*) 식물인 ‘개나리’와 비슷하다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Forsythia*는 영국왕립원예협회(Royal Horticultural Society) 설립자 중 한 명인 스코틀랜드 원예가 William A. Forsyth(1737~1804)의 이름에서 유래했으며 개나리속을 일컫는다. 종소명 *koreana*는 ‘한국의’라는 뜻으로 한국 특산식물임을 나타내지만 자생지가 발견되지 않고 있다.



물푸레나무과 개나리속

만리화

Forsythia ovata Nakai

위기(EN)

특산식물

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대, 암석지대
꽃	3~4월
높이	1~1.5m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 만리화라는 이름은 길게 줄지어 자라는 모습을 만 리(萬里)에 꽃이 피어 있는 것에 비유해 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Forsythia*는 영국왕립원예협회(Royal Horticultural Society) 설립자 중 한 명인 스코틀랜드 원예가 William A. Forsyth(1737~1804)의 이름에서 유래했으며 개나리속을 일컫는다. 종소명 *ovata*는 ‘둥근’이라는 뜻으로 잎의 모양에서 유래했다.

양귀비과 피나물속

피나물

Hylomecon vernalis Maxim.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	4~5월
높이	0.3m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 줄기를 자르면 붉은 피 같은 유액이 나오고 나물로 식용하는 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Hylomecon*은 그리스어 hylo(숲)와 mecon(양귀비)의 합성어로, 숲속에서 자라는 양귀비라는 뜻이며 피나물속을 일컫는다. 종소명 *vernalis*는 ‘봄의’라는 뜻으로 봄에 꽃이 피는 것에서 유래했다.



앵초과 참좁쌀풀속

좁쌀풀

Lysimachia vulgaris var. *davurica*
(Ledeb.) R.Knuth

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	산지 습지
꽃	6~8월
높이	0.4~0.8m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 노란색의 작은 꽃들이 원뿔모양꽃차례로 조밀하게 달리는 모양을 좁쌀에 비유한 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Lysimachia*는 이 속 식물을 발견한 마케도니아 리시마코스(Lysimachos) 왕의 이름에서 유래했다는 설과 그리스어 lysis(석방, 작별)와 mache(갈등, 불화)의 합성어인 lysimachos(갈등의 종료)에서 유래했다는 설이 있으며 참좁쌀풀속을 일컫는다. 종소명 *vulgaris*는 '보통의, 통상의'라는 뜻이다. 변종명 *davurica*는 '바이칼호 동쪽' 다후리아 지방의'라는 뜻이다.

미나리아재비과 동의나물속

동의나물

Caltha palustris L.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	습지, 냇가 주변
꽃	4~5월
높이	0.6m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 심장모양의 잎이 물을 길는 물동이(동이)처럼 오므라지고 나물로 식용한다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Caltha*는 어원이 calathus(큰 술잔, 사발, 광주리)로 강한 냄새가 나는 노란 꽃을 가리키는 라틴어에서 전용되어 동의나물속을 일컫는다. 종소명 *palustris*는 '습지생의'라는 뜻으로 서식처와 관련 있다.





미나리아재비과 복수초속

개복수초

Adonis pseudoamurensis W.T.Wang

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 초지, 관목지대
꽃	3~4월
높이	0.1~0.4m
광조건	반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Adonis*는 그리스 신화에 나오는 미소년의 이름에서 유래했으며 복수초속을 일컫는다. 이 속의 유럽종은 꽃이 붉은데, 이를 사냥 중에 다쳐서 아프로디테(Aphrodite)의 팔에 안겨 죽은 아도니스(Adonis)의 피에 비유한 것이다.

장미과 뱀무속

뱀무

Geum japonicum Thunb.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	6월
높이	0.25~1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 잎몸의 모양이 무를 닮았는데 무보다는 가치가 덜하다는 뜻에서 유래한 이름으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Geum*은 허브베니트(*G. urbanum*)의 고대 라틴명에서 유래한 것으로 뱀무속을 일컫는다. 종소명 *japonicum*은 ‘일본의’라는 뜻으로 발견지 또는 분포지를 나타낸다.





장미과 양지꽃속

양지꽃

Potentilla fragarioides var. *major*
Maxim.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지, 관목지대
꽃	4~6월
높이	0.3~0.5m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 무덤가와 같은 양지바른 곳에서 꽃이 피어나는 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Potentilla*는 라틴어 *potens*(강력한, 효과적인)에서 유래했는데 이 속 어떤 종들의 약성을 언급한 것이며 양지꽃속을 일컫는다. 종소명 *fragarioides*는 '*Fragaria*(딸기속)와 비슷한'이라는 뜻으로 딸기와 닮은 것에서 유래했다.

장미과 짚신나물속

짚신나물

Agrimonia pilosa Ledeb.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	6~8월
높이	0.3~1m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 짚신나물이라는 이름은 옛이름 ‘집신나물’에서 비롯된 것으로, 잎의 모양이 짚신과 비슷하고 나물로 식용한 것에서 유래했다. 풀로 된 신발을 닮았고 나물(菜)로 사용한다는 뜻이므로 짚신나물과 뜻이 통한다.

학명 유래 — 속명 *Agrimonia*는 양귀비의 고대 그리스명 argemone 또는 디오스코리데스(Dioscorides, 40~90)가 바람꽃속에 붙인 이름 argemonion에서 유래했다는 설과, agros(들판)와 monos(홀로)의 합성어 또는 agrimaos(야생의)에서 유래했다는 설이 있으며 짚신나물속을 일컫는다. 종소명 *pilosa*는 ‘연모(軟毛)가 있는, 털로 덮인’이라는 뜻이다.



꼭두서니과 갈퀴덩굴속

솔나물

Galium verum subsp. *asiaticum*
(Nakai) T.Yamaz.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지, 건조지
꽃	6~8월
높이	0.7~1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 솔나물이라는 이름은 ‘솔’(松)과 ‘나물’(菜)의 합성어로, 잎이 솔잎처럼 선형이고 나물로 식용한다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Galium*은 그리스어로 우유를 뜻하는 *galion*에서 전용된 것으로, 솔나물 (*G. verum*)의 노란 꽃이 치즈를 응고시키거나 착색하는 데 쓰인 것에서 유래했으며 갈퀴덩굴속을 일컫는다. 종소명 *verum*은 ‘정통의, 진짜의’라는 뜻의 라틴어로 솔나물 종류 중에서 기본종임을 나타낸다.

무환자나무과 모감주나무속

모감주나무

Koelreuteria paniculata Laxm.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	해안 숲 가장자리
꽃	6~7월
높이	8~10m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 모감주나무라는 이름은 한자명 ‘무환자(無患子)’의 옛말 ‘모관주’가 변화한 것으로, 무환자와 동일하게 열매 혹은 씨앗으로 염주를 만들었기 때문에 이름이 혼용되어 유래했다. 모관주는 무환자(無患子)라는 한자어에 염주의 뜻을 가진 珠(주)가 결합해 형성된 것으로 이해되고 있다.

학명 유래 — 속명 *Koelreuteria*는 독일 식물학자 Joseph Gottlieb Koelreuter(1734~1806)의 이름에서 유래했으며 모감주나무속을 일컫는다. 종소명 *paniculata*는 ‘원뿔모양꽃차례의’라는 뜻으로 이 나무의 꽃차례의 모양에서 유래했다.

초록색

산형과 파드득나물속

파드득나물

Cryptotaenia japonica Hassk.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 냇가, 습지
꽃	6~7월
높이	0.3~0.6m
광조건	반음지, 음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 나물로 먹는 어린잎의 반질거리는 모습이 파드득 소리가 날 것 같다고 하여 붙여진 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Cryptotaenia*는 그리스어 kryptos(숨겨진)와 tainia(그물눈 모양의 레이스, 리본)의 합성어로 열매의 모양을 언급한 것이며 파드득나물속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 '일본의'라는 뜻으로 최초 발견지 또는 분포지를 나타낸다.





감탕나무과 감탕나무속

팥팥나무

Ilex crenata Thunb.

약관심(LC)

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 관목지대
꽃	5~6월
높이	3m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 팥팥나무라는 이름은 나뭇잎이 두터워 불에 타면 ‘팥팥’하고 소리를 내는 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Ilex*는 호랑잎가시나무(*Quercus ilex* L.)의 고대 라틴명에서 유래한 것으로 감탕나무속을 일컫는다. 종소명 *crenata*는 ‘둥근 톱니 모양의’라는 뜻으로 이 식물의 잎가장자리 모양에서 유래했다.

천남성과 천남성속

두루미천남성

Arisaema heterophyllum Blume

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 관목지대
꽃	5~6월
높이	0.5m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Arisaema*는 그리스어 aris(arum이라는 식물의)와 haima(피)의 합성어로, 잎에 반점이 있는 것에서 유래했으며 천남성속을 일컫는다.





천남성과 천남성속

큰천남성

Arisaema ringens (Thunb.) Schott

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	5월
높이	0.3~0.45m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Arisaema*는 그리스어 aris(arum이라는 식물의)와 haima(피)의 합성어로, 앞에 반점이 있는 것에서 유래했으며 천남성속을 일컫는다. 종소명 *ringens*는 라틴어로 ‘입을 벌린, 으르렁거리는’의 뜻을 지니며, 불염포의 입구가 벌려진 입과 유사하다는 뜻이다.

국화과 단풍취속

단풍취

Ainsliaea acerifolia Sch.Bip.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	7~9월
높이	0.35~0.8m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 단풍취라는 이름은 잎이 단풍나무의 잎과 유사한 취(나물)라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Ainsliaea*는 영국 의사이자 식물학자인 Whitelaw Ainslie(1767~1837)의 이름에서 유래했으며 단풍취속을 일컫는다. 종소명 *acerifolia*는 'Acer(단풍나무속)를 닮은 잎의'라는 뜻이다.





국화와 박쥐나물속

병풍쌈

Parasenecio firmus (Kom.) Y.L.Chen

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	7~9월
높이	1~2m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — ‘병풍’과 ‘쌈’의 합성어로, 넓고 큰 잎의 모양을 장식용으로 사용하는 병풍(屏風)에 비유하고 쌈으로 식용했다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Parasenecio*는 그리스어 para(거의, 가까운)와 *Senecio*(금방망이속)의 합성어로 금방망이속을 닮았다는 뜻이며 박쥐나물속을 일컫는다. 종소명 *firmus*는 ‘강한, 견고한’이라는 뜻이다.

국화과 우산나물속

우산나물

Syneilesis palmata (Thunb.) Maxim.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	6~9월
높이	0.7~1.2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 우산나물이라는 이름은 새잎이 날 때 손바닥 모양으로 처진 모양이 마치 우산(雨傘)같고 나물로 식용한 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Syneilesis*는 그리스어로 '끝단을 접어 올림, 통합, 합성'이라는 뜻으로 한테 붙어서 말린 떡잎이 있는 것에서 유래했으며 우산나물속을 일컫는다. 종소명 *palmata*는 '손바닥 모양의'라는 뜻으로 잎의 모양에서 유래했다.





회양목과 회양목속

회양목

Buxus sinica var. *insularis* (Nakai)

M.Cheng

약관심(LC)

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 바위틈, 능선, 석회암지대
꽃	3~4월
높이	7m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 회양목이라는 이름은 중국에서 전래된 한자명 '黃楊木'(황양목)의 발음이 '화양목'을 거쳐 '회양목'으로 변화한 것이다.

학명 유래 — 속명 *Buxus*는 그리스어 pyxos(상자)에서 유래한 것으로 이 속 식물로 작은 상자를 만들어서 붙여졌으며 회양목속을 일컫는다.

노박덩굴과 화살나무속

사철나무

Euonymus japonicus Thunb.

약관심(LC)

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 해안
꽃	6~7월
높이	3m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 사계절 내내 늘 푸른 나무라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Euonymus*는 유럽회나무(*E. europaeus*)의 고대 그리스명으로 '좋은 이름'이란 뜻의 고대그리스어 euonymon에서 유래했으며 화살나무속을 일컫는다. 종소명 *japonicus*는 '일본의'라는 뜻으로 최초 발견지를 나타낸다.





돌나물과 바위솔속

연화바위솔

Orostachys iwarenge (Makino) H.Hara

자료부족(DD)

성상	여러해살이풀(다육)
자생 환경	해안 절벽 바위틈
꽃	10~11월
높이	0.1~0.5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종



학명 유래 — 속명 *Orostachys*는 그리스어 oros(산)와 stachys(이삭)의 합성어로, 산에서 자생하고 이삭 모양의 꽃차례를 이루는 데서 유래했으며 바위솔속을 일컫는다.

측백나무과 측백나무속

측백나무

Platycladus orientalis (L.) Franco

취약(VU)

성상	상록 침엽 교목
자생 환경	구릉지, 경사진 돌틈
꽃	4월
높이	25m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 한자어

측백(側柏)에서 유래했다. 중국의 『본초강목』에 의하면 잎이 납작하게 자라기 때문에 側(측)이라는 글자가 붙었고, 16세기 초경에 저술된 중국의 『육서정온』에 의하면 다른 나무와 달리 서쪽을 향하는 음지성 나무이기 때문에 서쪽을 뜻하는 白(백)을 넣어 柏(백)이라는 글자가 붙었다고 한다.

학명 유래 — 속명 *Platycladus*는 그리스어 platy(넓은)와 cardus(새순)의 합성어로 새순이 편평하게 자라는 것에서 유래했으며 측백나무속을 일컫는다. 종소명 *orientalis*는 '동양의'라는 뜻으로 서양측백 (*Thuja occidentalis*)에 대비하여 붙여졌다.





사초과 사초속

대사초

Carex siderosticta Hance

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	7월
높이	0.3m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 대사초라는 이름은 잎이 나란히맥으로 대나무와 유사한 사초라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Carex*는 갈대나 꿀풀을 뜻하는 고대 라틴명 *carex*에서 유래했으며 사초속을 일컫는다. 종소명 *siderosticta*는 '햇 빛의 점이 있는'이라는 뜻이다.

관중과 쇠고비속

도깨비쇠고비

Cyrtomium falcatum (L.f.) C.Presl

약관심(LC)

성상	상록성 양치식물
자생 환경	해안 숲 가장자리
포자기	7~9월
높이	0.3~0.4m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	양토, 사토
번식	포자 번식, 포기나누기



국명 유래 — 도깨비쇠고비라는 이름은 잎의 깃조각 모양이 도깨비를 닮았고 고비에 비해 거친 모양(쇠)이라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Cyrtomium*은 그리스어 cyrtoma(굽은)에서 유래한 것으로 깃조각이 굽어 있어서 붙여졌으며 쇠고비속을 일컫는다. 종소명 *falcatum*은 '낫모양의'라는 뜻으로 깃조각의 모양에서 유래했다.



속새과 속새속

속새

Equisetum hyemale L.

약관심(LC)

성상	상록성 양치식물
자생 환경	숲속 습지
포자기	5~6월
높이	0.3~0.6m
광조건	반음지
토질	점토, 양토, 사토, 이탄토
번식	포기나누기



국명 유래 — ‘속’과 ‘새’의 합성어로, ‘속’은 거죽이나 껍질로 싸인 물체의 안쪽 부분을 뜻하는 옛말이고, ‘새’는 풀(현재는 날카로운 잎을 가진 풀을 의미함)을 뜻하는 옛말이다.

학명 유래 — 속명 *Equisetum*은 그리스어 equus(말)와 saeta(꼬리)의 합성어로 층층이 둘러나기 하는 잔가지가 말의 꼬리를 닮아서 붙여졌으며 속새속을 일컫는다. 종소명 *hyemale*는 ‘겨울철의’라는 뜻으로 겨울이 가까운 시기에 포자낭수가 생겨나는 데서 유래한 것으로 보인다.

멜란티움과 삿갓나물속

삿갓나물

Paris verticillata M.Bieb.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 초지, 관목지대
꽃	6~7월
높이	0.2~0.4m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 삿갓나물이라는 이름은 잎이 돌려나기를 하는 모양이 삿갓을 닮았고 어린잎은 나물로 식용한 데서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Paris*는 라틴어 par(같은)에 어원을 두고 있는데, 꽃잎이 같은 모양이어서 유래했다는 견해와 그리스 신화의 파리스(Paris)에서 유래했다는 견해가 있으며 삿갓나물속을 일컫는다. 종소명 *verticillata*는 '윤생의'라는 뜻으로 잎이 돌려나기를 하는 것에서 유래했다.





야산고비과 청나래고사리속

청나래고사리

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

약관심(LC)

성상	양치식물
자생 환경	숲속, 계곡 주변
포자기	7~9월
높이	0.8~1m
광조건	반음지, 음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	포자 번식, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Matteuccia*는 이탈리아의 자연과학자 Carlo Matteucci(1811~1868)에서 유래되었다. 종소명 *struthiopteris*은 '타조 날개'라는 뜻이다.

돈나무과 돈나무속

돈나무

Pittosporum tobira (Thunb.)

W.T.Aiton

약관심(LC)

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	해안 숲 가장자리
꽃	4~5월
높이	2~3m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 돈나무라는 이름은 제주 방언 '퐁낭'에서 유래했다. 꽃이 지고 난 가을과 겨울에 노란 열매가 벌어지면서 끈끈하고 악취가 나는 액체가 분비되는데, 이때 온갖 곤충은 물론 특히 파리가 많이 꼬여 지저분하고 냄새가 좋지 않아 '퐁'(糞)을 연상시키는 나무라는 뜻에서 제주 방언 퐁낭이 유래했고 이를 돈나무로 채록한 것이다.

학명 유래 — 속명 *Pittosporum*은 그리스어 pitta(수지, 樹脂)와 spora(열매)의 합성어로, 열매가 까맣고 윤이 나며 점착성이 있는 것에서 유래했으며 돈나무속을 일컫는다. 종소명 *tobira*는 이 식물을 일컫는 일본명 トベラ에서 유래했다.



벼과 조릿대속

조릿대

Sasamorpha borealis (Hack.) Nakai

약관심(LC)

성상	상록 관목
자생 환경	숲 가장자리
꽃	4월
높이	1~2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	포기나누기



국명 유래 — 조릿대라는 이름은 쌀에서 돌을 골라내는 기구인 조리(또는 복조리)를 이 식물의 줄기로 만들었던 것에서 유래했다. 즉 조리를 만드는 대나무라는 뜻이다.

벼과 산새풀속

산조풀

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	하천 주변, 습지, 해안초지
꽃	7~9월
높이	0.6~1.5m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Calamagrostis*는 그리스어 calamos(갈대)와 *Agrostis*(겨이삭속)의 합성어로 갈대와 겨이삭을 닮은 식물이라는 뜻이며 산새풀속을 일컫는다.



주목과 주목속

주목

Taxus cuspidata Siebold & Zucc.

약관심(LC)

성상	상록 침엽 교목
자생 환경	고산지대 숲 가장자리, 능선부
꽃	4월
높이	20m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 한자어 주목(朱木)에서 유래했다. 예로부터 목재를 불상 제작 등 중요한 자원으로 활용해왔는데 나무껍질, 심재(心材) 및 목질 씨껍질에서 붉은 빛깔이 나는 것에서 유래한 이름이다.

학명 유래 — 속명 *Taxus*는 주목을 뜻하는 그리스명 taxos에서 유래했으며 주목속을 일컫는다. 종소명 *cuspidata*는 '급격히 뾰족해지는'이라는 뜻으로 잎의 모양에서 유래했다.

보라색

귀방울덩굴과 족도리풀속

족도리풀

Asarum sieboldii Miq.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속 계곡주변
꽃	4~5월
높이	0.15m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 족도리풀이라는 이름은 꽃의 모양이 혼례 때 신부가 머리에 쓰는 족두리와 닮은 데서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Asarum*은 플리니우스(Plinius, 23~79)가 유럽족도리풀(*Asarum europaeum* L.)에 붙였던 이름으로, 이 속을 가리키는 그리스어 asaron이 어원이며 족도리풀속을 일컫는다. 종소명 *sieboldii*는 독일 의사이자 생물학자로 일본 식물을 연구한 Philipp Franz von Siebold(1796~1866)의 이름에서 유래했다.



비짜루과 비비추속

좀비비추

Hosta minor (Baker) Nakai

약관심(LC)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	7~8월
높이	0.3~0.35m
광조건	반음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 좀비비추라는 이름은 식물체가 작은(좀) 비비추라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Hosta*는 오스트리아 의사 Nicholas Thomas Host(1761~1834)의 이름에서 유래했으며 비비추속을 일컫는다. 종소명 *minor*는 '작은'이라는 뜻으로 비비추에 비해 개체가 작다는 뜻이다.

비짜루과 비비추속

주걱비비추

Hosta clausa Nakai

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월
높이	0.3~0.76m
광조건	반음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 잎이 주걱모양인 비비추라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Hosta*는 오스트리아 의사 Nicholaus Thomas Host(1761~1834)의 이름에서 유래했으며 비비추속을 일컫는다. 종소명 *clausa*는 ‘폐쇄된’이라는 뜻이다.



비짜루과 비비추속

흑산도비비추

Hosta yingeri S.B.Jones

취약(VU)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	7~9월
높이	0.2~0.3m
광조건	반음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Hosta*는 오스트리아 의사 Nicholas Thomas Host(1761~1834)의 이름에서 유래했으며 비비추속을 일컫는다.

국화과 취나물속

각시취

Saussurea pulchella (Fisch.) Fisch. ex Colla

약관심(LC)

성상	두해살이풀
자생 환경	고산지대 초지, 관목지대
꽃	8~10월
높이	0.3~1.5m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Saussurea*는 스위스 과학자 Horace Bénédict de Saussure(1740~1799)의 이름에서 유래했으며 취나물속을 일컫는다.






국화와 참취속

까실쑥부쟁이

Aster ageratoides Turcz.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	8~10월
높이	1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 쑥부쟁이를 닮았는데 잎의 양면에 잔털이 있어 까실(까슬)한 느낌을 준다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Aster*는 라틴어로 별을 뜻하는데 방사상으로 뻗는 꽃잎의 모양 때문에 붙여졌으며 참취속을 일컫는다. 종소명 *ageratoides*는 국화과의 *Ageratum*(등골나물·아재비속)과 닮았다고 하여 붙여졌다.

국화과 참취속

쑥부쟁이

Aster indicus L.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	8~10월
높이	0.3~1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 쑥부쟁이라는 이름은 '쑥'과 '부쟁이'의 합성어로, 잎과 줄기가 쑥처럼 생겼고 부지깥이처럼 긴 막대기 모양으로 자란다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Aster*는 라틴어로 별을 뜻하는데 방사상으로 뻗는 꽃잎의 모양 때문에 붙여졌으며 참취속을 일컫는다.



초롱꽃과 도라지속

도라지

Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월
높이	0.4~1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 옛이름 '도랏'이 어원이며, 돌밭과 같은 척박한 곳에서 자라는 것이라는 뜻에서 유래했다. 옛 문헌에 '돌앗'이라는 이름이 기록되어 있고 방언에 돌가지(돌갓)라는 이름이 남아 있는 것으로 보아, '도랏'은 '돌'(石)과 '갓'(物)의 합성어이고 '갓'은 현재의 갓(物)을 뜻한다.

학명 유래 — 속명 *Platycodon*은 그리스어 platys(넓은)와 kodon(종)의 합성어로 꽃의 모양에서 유래했으며 도라지속을 일컫는다. 종소명 *grandiflorus*는 '큰 꽃의'라는 뜻으로 꽃이 큰 것에서 유래했다.

용담과 용담속

과남풀

Gentiana triflora var. *japonica* (Kusn.)

H.Hara

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	습지, 습초지
꽃	7~8월
높이	0.3~0.8m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 과남풀이라는 이름은 생약명 용담(龍膽)의 옛이름 관음풀(觀音草)에서 유래한 것으로, 꽃이 피었을 때의 모습 또는 다양한 효과가 있는 약성이 불교의 관세음보살을 연상시킨다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Gentiana*는 용담속 식물의 약효를 발견한 로마 시대 의학자 플리니(Pliny)가 붙인 이름으로, 일리리아의 왕 Gentius(B.C.500년경)의 이름에서 유래했으며 용담속을 일컫는다. 종소명 *triflora*는 ‘꽃이 3개인’이라는 뜻이지만 반드시 꽃이 3개씩 피는 것은 아니다.





수국과 수국속

산수국

Hydrangea serrata (Thunb.) Ser.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	전석지, 바위틈, 계곡 주변
꽃	6~7월
높이	1m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 산수국이라는 이름은 산에서 자라는 수국이라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Hydrangea*는 그리스어 hydro(물)와 angeion(그릇)의 합성어로, 습한 곳을 좋아하는 특성을 나타내고 삭과(蒴果)를 그릇에 비유한 것이며 수국속을 일컫는다. 종소명 *serrata*는 '톱니가 있는'이라는 뜻이다.

붓꽃과 붓꽃속

각시붓꽃

Iris rossii Baker

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지, 건조지
꽃	4~5월
높이	0.05~0.15m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 각시붓꽃이라는 이름은 작은 식물체의 예쁜 모양이 각시를 연상시킨다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Iris*는 그리스 신화에 나오는 신들의 전령으로 무지개를 의인화한 신의 이름이며 붓꽃속을 일컫는다. 종소명 *rossii*는 스코틀랜드 출신으로 중국에 파견되었던 선교사 John Ross(1842~1915)의 이름에서 유래했다.



붓꽃과 붓꽃속

꽃창포

Iris ensata Thunb.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	습지
꽃	6~7월
높이	0.6~1.2m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 꽃창포라는 이름은 창포에 비해 아름다운 꽃을 피운다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Iris*는 그리스 신화에 나오는 신들의 전령으로 무지개를 의인화한 신의 이름이며 붓꽃속을 일컫는다. 종소명 *ensata*는 '칼모양의'라는 뜻이다.

붓꽃과 붓꽃속

대청부채

Iris dichotoma Pall.

위키(EN)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	7~8월
높이	0.7m
광조건	양지
토질	사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 대청부채라는 이름은 서해 대청도에서 자라고 잎이 범부채를 닮은 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Iris*는 그리스 신화에 나오는 신들의 전령으로 무지개를 의인화한 신의 이름이며 붓꽃속을 일컫는다. 종소명 *dichotoma*는 '가위 모양으로 분지(分枝)하는'이라는 뜻으로 가지가 나누어지는 모양 때문에 붙여졌다.





붓꽃과 붓꽃속

부채붓꽃

Iris setosa Pall. ex Link

위기(EN)

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대 초지, 냇가 주변, 습초지
꽃	5~6월
높이	0.3~0.7m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 점토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 잎이 넓고 편평한 것이 부채 모양을 이루는 붓꽃이라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Iris*는 그리스 신화에 나오는 신들의 전령으로 무지개를 의인화한 신의 이름이며 붓꽃속을 일컫는다. 종소명 *setosa*는 '가시털 모양의, 역센 털의'라는 뜻이다.

붓꽃과 붓꽃속

제비붓꽃

Iris laevigata Fisch.

위기(EN)

성상	여러해살이풀
자생 환경	습지, 연못 주변
꽃	5~6월
높이	0.5~0.7m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 제비붓꽃이라는 이름은 『조선식물향명집』에서 전통 명칭 ‘붓꽃’을 기본으로 하고 식물의 형태적 특징을 나타내는 ‘제비’를 추가해 신칭했다. 물 찬 제비처럼 예쁜 붓꽃이라는 뜻에서 붙여졌다고 한다. 보다 정확히는 꽃잎이에 난 흰색의 문양이 물 찬 제비 같은 느낌을 주는 것과 관련 있는 것으로 보인다.

학명 유래 — 속명 *Iris*는 그리스 신화에 나오는 신들의 전령으로 무지개를 의인화한 신의 이름이며 붓꽃속을 일컫는다. 종소명 *laevigata*는 ‘털이 없는, 평활한’이라는 뜻이다.



붓꽃과 붓꽃속

타래붓꽃

Iris lactea var. *chinensis* (Fisch.)
Koidz.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	해안초지, 건초지
꽃	4~5월
높이	0.4m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 잎이 실·고삐·노끈 등을 사려서 뭉쳐 놓은 타래처럼 꼬여 있다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Iris*는 그리스 신화에 나오는 신들의 전령으로 무지개를 의인화한 신의 이름이며 붓꽃속을 일컫는다. 종소명 *lactea*는 ‘유백색의’라는 뜻이다.

꿀풀과 꿀풀속

꿀풀

Prunella vulgaris subsp. *asiatica* (Nakai) H.Hara

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	5월
높이	0.2~0.3m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 꿀풀이라는 이름은 꽃에 꿀이 많은 풀이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Prunella*는 15~16세기에 독일 약제상들이 사용했던 *brunella*가 변형된 것인데 '자주색의'라는 뜻의 독일어 *braun* 또는 라틴어 *prunum*이 어원으로 보이며, 꽃의 색깔을 나타낸 것으로 꿀풀속을 일컫는다. 종소명 *vulgaris*는 '보통의, 통상의'라는 뜻이며, 아종명 *asiatica*는 '아시아의'라는 뜻으로 주된 분포지를 나타낸다.



꿀풀과 용머리속

용머리

Dracocephalum argunense Fisch. ex Link

준위협(NT)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지, 건조지, 관목지대
꽃	6~8월
높이	0.15~0.4m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 용머리라는 이름은 꽃의 형태를 용(龍)의 머리에 비유한 것에서 유래했다. 가는 줄기에 잎이 모여나고 그 위에 보라색의 꽃이 달리는데 그 모습이 마치 용의 머리처럼 보인다.

학명 유래 — 속명 *Dracocephalum*은 그리스어 drakon(용)과 kephale(머리)의 합성어로, 꽃부리와 꽃받침 또는 꽃의 모양이 용의 머리를 연상시킨다 하여 붙여졌으며 용머리속을 일컫는다. 종소명 *argunense*는 ‘(헤이룽강의 지류) 아르군강에 분포하는’이라는 뜻이다.

백합과 알레지속

알레지

Erythronium japonicum Decne.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	4월
높이	0.25m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종



국명 유래 — 잎의 표면에 있는 자주색 무늬가 얼룩덜룩하게 보이는 것에서 유래했다. ‘얼레’(얼네 또는 얼너)는 현재의 ‘얼룩’을 뜻하는 말로 이해된다.

학명 유래 — 속명 *Erythronium*은 그리스어 erythros(붉은색)에 기원을 두고 있는데, 붉은색 꽃이 피는 식물이라는 뜻으로 알레지속을 일컫는다. 종소명 *japonicum*은 ‘일본의’라는 뜻으로 발견지를 나타낸다.



멜란티움과 처녀치마속

처녀치마

Heloniopsis koreana Fuse, N.S.Lee
& M.N.Tamura

약관심(LC)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	4월
높이	0.1~0.3m
광조건	반음지, 음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 처녀치마라는 이름은 『조선식물향명집』에서 최초로 기록한 것으로 보이는데, 이른 봄에 잎이 사방으로 펼쳐진 상태에서 꽃을 피우는 모습을 처녀의 치마에 비유해 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Heloniopsis*는 속명인 *Helonias*와 *opsis*(비슷한)의 합성어로, *Helonias*속 식물과 유사하다는 뜻이며 처녀치마속을 일컫는다. 종소명 *koreana*는 '한국의'라는 뜻으로 원산지를 나타낸다.

미나리아재비과 할미꽃속

동강할미꽃

Pulsatilla tongkangensis Y.N.Lee & T.C.Lee

위기(EN)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	석회암지대
꽃	4~5월
높이	0.15m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Pulsatilla*는 라틴어 pulso(두드리다, 치다)에서 유래한 것으로, 꽃이 종(鐘)을 닮아서 붙여졌으며 할미꽃속을 일컫는다.



미나리아재비과 제비고깔속

큰제비고깔

Delphinium maackianum Regel

준위험(NT)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~9월
높이	1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 제비고깔에 비해 식물체가 대형이라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Delphinium*은 그리스어 delphinos(돌고래)에서 유래한 것으로, 꽃봉오리의 모양이 돌고래를 닮아서 붙여졌으며 제비고깔속을 일컫는다. 종소명 *maackianum*은 에스토니아계 러시아 생물학자인 Richard Otto Maack(1825~1886)의 이름에서 유래했다.

미나리아재비과 투구꽃속

진범

Aconitum pseudolaeve Nakai

약관심(LC)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	8월
높이	0.3~0.8m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 진범이라는 이름은 원래 중국에서 유래한 한약명 진교(秦艽)를 『산림경제』 등에서 진봉(秦茛)으로 오기하고 이를 다시 진범으로 오독해 붙였던 데서 유래했다. 중국 고전에서 진교(秦艽)라는 이름은 진(秦)나라에서 주로 나고 뿌리가 엉겨서 그물 문양을 만드는 것이 깔개(笊)처럼 보인 데서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Aconitum*은 그리스의 철학자 테오프라스토스(Theophrastos, B.C.371~B.C.287)가 유독성 식물에 사용한 이름인 Akoniton에서 유래했으며 투구꽃속을 일컫는다. 종소명 *pseudolaeve*는 pseudo(가짜의)와 laevus(겹쟁이)의 합성어로 겹쟁이와 유사함을 나타낸다.



미나리아재비과 투구꽃속

한라돌쩌귀

Aconitum japonicum subsp. *napi-forme* (H.Lév. & Vaniot) Kadota

준위협(NT)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	9월
높이	0.45~1m
광조건	반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종



학명 유래 — 속명

*Aconitum*은 그리스의 철학자 테오프라스토스(Theophrastos, B.C.371~B.C.287)가 유독성 식물에 사용한 이름인 Akoniton에서 유래했으며 투구꽃속을 일컫는다. 종소명 *japonicum*은 '일본의'라는 뜻으로 발견지 또는 분포지를 나타낸다.

흰색

인동과 인동속

괴불나무

Lonicera maackii (Rupr.) Maxim.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목, 소교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	5~6월
높이	5m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 괴불나무라는 이름은 꽃과 열매의 모양이 괴불을 닮았다는 뜻에서 유래했다. ‘괴불’은 괴불주머니의 줄임말로 어린아이가 주머니 끈 끝에 차는 세모 모양의 조그만 노리개를 뜻한다.

학명 유래 — 속명 *Lonicera*는 독일 수학자이자 식물학자인 Adam Lonitzer(1528~1586)의 이름에서 유래했으며 인동속을 일컫는다. 종소명 *maackii*는 러시아 식물학자 Richard Otto Maack(1825~1886)의 이름에서 유래했다.



석죽과 관모개미자리속

벼룩이울타리

Eremogone juncea (M.Bieb.) Fenzl

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월
높이	0.5m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — ‘벼룩이’와 ‘울타리’의 합성어로, 『조선식물향명집』에서 그 이름이 최초로 보인다. 벼룩이자리(*Arenaria serpyllifolia*)와 꽃의 모양 등이 닮았는데 잎이 골풀처럼 길게 자라므로 이를 울타리에 비유한 데서 유래한 것으로 보인다.

학명 유래 — 속명 *Eremogone*는 그리스어 eremos(외로운, 버려진)와 gonos(씨앗, 자손)의 합성어로 관모개미자리속을 일컫는다. 종소명 *juncea*는 골풀속(*Juncus*)과 유사하다는 뜻이다.

층층나무과 층층나무속

산딸나무

Cornus kousa Bürger ex Hance

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲 가장자리
꽃	5~6월
높이	7m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 산딸나무라는 이름은 딸기와 비슷한 열매가 열리며 산에서 자라는 나무라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Cornus*는 라틴어 cornu(뿔)가 어원으로 미국산수유(*Cornus mas*)의 라틴명에서 전용되어 층층나무속을 일컫는다. 종소명 *kousa*는 산딸나무에 대한 일본 하코네(箱根) 방언 クサ에서 유래했다.



층층나무과 층층나무속

층층나무

Cornus controversa Hemsl.

약관심(IC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲 가장자리
꽃	5~6월
높이	20m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 삽목, 접목



국명 유래 — 층층나무라는 이름은 둘러나는 가지가 층을 이루어 자라는 나무라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Cornus*는 라틴어 cornu(뿔)가 어원으로 미국산수유(*Cornus mas*)의 라틴명에서 전용되어 층층나무속을 일컫는다. 종소명 *controversa*는 '논쟁적인, 반대 방향의'라는 뜻이다.

진달래과 진달래속

꼬리진달래

Rhododendron micranthum Turcz.

준위협(NT)

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대
꽃	6~7월
높이	1~2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 꼬리진달래라는 이름은 꽃차례가 동물의 꼬리를 연상시키는 진달래 종류라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Rhododendron*은 그리스어 rhodon(장미)과 dendron(나무)의 합성어로 장미를 닮은 나무라는 뜻인데, 꽃의 모양을 나타낸 것으로 추정하며 진달래속을 일컫는다. 종소명 *micranthum*은 ‘꽃이 작은’이라는 뜻이다.



수국과 말발도리속

말발도리

Deutzia parviflora Bunge

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대, 전석지
꽃	5~6월
높이	2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 말발도리라는 이름은 강원 방언으로, 열매의 모양이 말굽(말발)을 닮았다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Deutzia*는 Carl Peter Thunberg(1743~1828)가 일본의 식물을 탐사할 때 자신의 후견인이었던 네덜란드 법률가 Johan van der Deutz(1743~1788)를 기리기 위해 붙였으며 말발도리속을 일컫는다. 종소명 *parviflora*는 '꽃이 작음'이라는 뜻이다.

수국과 말발도리속

매화말발도리

Deutzia uniflora Shirai

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	바위틈
꽃	4~5월
높이	1m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 매화말발도리라는 이름은 꽃이 매화를 닮은 말발도리라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Deutzia*는 Carl Peter Thunberg(1743~1828)가 일본의 식물을 탐사할 때 자신의 후견인이었던 네덜란드 법률가 Johan van der Deutz(1743~1788)를 기리기 위해 붙였으며 말발도리속을 일컫는다. 종소명 *uniflora*는 '꽃이 1개인'이라는 뜻이다.





붓꽃과 붓꽃속

노랑무늬붓꽃

Iris odaesanensis Y.N.Lee

준위협(NT)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	4~5월
높이	0.2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종



학명 유래 — 속명 *Iris*는 그리스 신화에 나오는 신들의 전령으로 무지개를 의인화한 신의 이름이며 붓꽃속을 일컫는다.

꿀풀과 누리장나무속

누리장나무

Clerodendrum trichotomum Thunb.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월
높이	2m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — ‘누리’와 ‘장나무’의 합성어로, ‘누리’는 역한 냄새를 의미하는 누린내라는 뜻이고, ‘장나무’는 작대기 또는 막대기(杆子 또는 枵)라는 뜻이다. 따라서 잎 등에서 강한 누린내가 나고 관목으로 작대기 같은 모양으로 자란다는 뜻에서 유래한 이름이다. 전라남도 및 경상남도 방언을 채록한 것이다.

학명 유래 — 속명 *Clerodendrum*은 그리스어 kleros(운, 운명)와 dendrum(나무)의 합성어로, 이 속 어떤 종들의 약성이 불확실하고 변화가 심한 것에서 유래한 것으로 추정하며 누리장나무속을 일컫는다. 종소명 *trichotomum*은 ‘3개로 갈라진’이라는 뜻이다.



목련과 목련속

함박꽃나무

Magnolia sieboldii K.Koch

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲속
꽃	5~6월
높이	7m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 함박꽃나무라는 이름은 ‘함박꽃’과 ‘나무’의 합성어로, 함박꽃을 피우는 나무라는 뜻에서 유래했다. 옛 문헌에 따르면 함박꽃은 작약(芍藥)에 대한 고유명이며 한박꽃(한박곳)에서 발음이 전이된 단어로, 박꽃과 비슷하게 큰 꽃 또는 함지박(함박)을 닮은 꽃이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Magnolia*는 프랑스 몽펠리에 대학의 식물학 교수 Pierre Magnol(1638~1715)의 이름에서 유래했으며 목련속을 일컫는다. 종소명 *sieboldii*는 독일 의사이자 생물학자로 일본 식물을 연구한 Philipp Franz von Siebold(1796~1866)의 이름에서 유래했다.

물푸레나무과 미선나무속

미선나무

Abeliophyllum distichum Nakai

위키(EN)

특산식물

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 암석지
꽃	3~4월
높이	1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 접목, 포기나누기



국명 유래 — 열매의 모양이 미선(尾扇)을 닮았다는 뜻에서 유래했다. 대오리의 한끝을 가늘게 찌꺼이 둥글게 펴고 실로 엮은 뒤, 종이로 앞뒤를 바른 둥그스름한 모양의 부채를 미선(尾扇)이라고 하는데 열매가 미선을 닮았다.

학명 유래 — 속명 *Abeliophyllum*은 *Abelia*속과 잎(phyllon)이 닮았다고 하여 붙여졌으며 미선나무속을 일컫는다. 종소명 *distichum*은 '2열성의, 2열로 된'이라는 뜻으로 잎이 2열로 줄지어 마주나기 하는 것에서 유래했다.



물푸레나무과 이팝나무속

이팝나무

Chionanthus retusus Lindl. & Paxton

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	해안 숲 가장자리
꽃	5~6월
높이	25m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 흰 꽃이 피는 모습이 쌀밥(이팝)을 연상시키는 나무라는 뜻에서 유래했다. 자생지 중의 하나인 전라남도 방언을 채록한 것이다.

학명 유래 — 속명 *Chionanthus*는 그리스어 chion(눈)과 anthos(꽃)의 합성어로, 나무에 피어 있는 흰색 꽃이 마치 눈이 내린 것 같다고 하여 붙여졌으며 이팝나무속을 일컫는다. 종소명 *retusus*는 '미세하게 오목한 모양의'라는 뜻이다.

물푸레나무과 쥐똥나무속

쥐똥나무

Ligustrum obtusifolium Siebold & Zucc.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리
꽃	5~6월
높이	2~4m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 작고 까만 열매를 쥐의 똥에 비유한 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Ligustrum*은 ligo(묵다, 땀다)가 어원으로 이 속 식물(*L. vulgare*)의 나뭇가지를 물건을 묶는데 사용한 것에서 유래했으며 쥐똥나무속을 일컫는다. 종소명 *obtusifolium*은 ‘끝이 둔한 잎의’라는 뜻이다.



작약과 작약속

백작약

Paeonia japonica (Makino) Miyabe & Takeda

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	6월
높이	0.4~0.5m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Paeonia*는 그리스 신화에서 약초로 신들을 치료해주는 의술의 신 파에온(Paeon)에서 유래한 것으로, 뿌리를 약용한 것과 연관이 있으며 작약속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 '일본의'라는 뜻으로 발견지 또는 분포지를 나타낸다.

미나리아재비과 노루귀속

섬노루귀

Hepatica maxima (Nakai) Nakai

취약(VU)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	4월
높이	0.2m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 울릉도 섬에서 자라는 노루귀라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Hepatica*는 라틴어 hepaticus(간)의 여성형이며, 잎 모양이 간(肝)과 비슷해 붙여졌다. 종소명 *maxima*는 '최대의'라는 뜻으로 노루귀에 비해 식물체가 상대적으로 큼을 나타낸다.




미나리아재비과 으아리속

으아리

Clematis mandshurica Rupr.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 덩굴
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대
꽃	5~9월
높이	2m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	삽목, 파종, 포기나누기



국명 유래 — ‘으아리’는 통증을 의미하는 ‘아리다’ 또는 맺힌 덩어리를 의미하는 ‘응어리’와 음운상 유사하다. 따라서 으아리라는 이름은 그 약재가 독성으로 인해 아린 맛을 낸다는 뜻, 또는 응어리진 것을 제거하는 약성이 있다는 뜻에서 유래했을 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Clematis*는 그리스어 clema(가지, 가는 가지)에서 유래했으며, 가늘고 길게 뻗어나가는 줄기의 특성을 나타낸 것으로 으아리속을 일컫는다. 종소명 *mandshurica*는 ‘만주의’라는 뜻으로 분포지 또는 발견지를 나타낸다.


미나리아재비과 으아리속

큰꽃으아리

Clematis patens C.Morren & Decne.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 덩굴
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대
꽃	5~6월
높이	4m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 꽃이 큰 종류의 으아리라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Clematis*는 그리스어 clema(가지, 가는 가지)에서 유래했으며, 가늘고 길게 뻗어나가는 줄기의 특성을 나타낸 것으로 으아리속을 일컫는다. 종소명 *patens*는 '열려 있는, 드러난, 활짝 트인'이라는 뜻이다.



장미과 국수나무속

국수나무

Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대, 냇가 주변
꽃	5~6월
높이	1~2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 국수나무라는 이름은 줄기의 뽕침이나 흰색의 속(pith)이 국수 가락과 비슷한 나무라는 뜻에서 유래했다. 옛날 아이들이 소꿉 놀이를 할 때 나무의 줄기에서 속을 뽑아 국수라고 부르며 놀았다고도 하며, 가지를 잘라 벗기면 껍질이 국수같이 얇게 벗겨진다는 뜻으로 해석하는 견해도 있다.

학명 유래 — 속명

*Stephanandra*는 그리스어 Stephanos(관)와 andron(수술)의 합성어로, 수술이 관(冠) 모양이어서 붙여졌으며 국수나무속을 일컫는다. 종소명 *incisa*는 '예리하게 갈라진'이라는 뜻이다.

장미과 벚나무속

귀룽나무

Prunus padus L.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲 가장자리, 계곡 주변
꽃	4~6월
높이	15m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 삽목, 접목, 포기나누기



국명 유래 — 귀룽나무라는 이름은 줄기가 아홉 마리의 용이 꿈틀거리는 모양 같다는 뜻의 구룽목(九龍木)에서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Prunus*는 서양자두나무의 고대 라틴명에서 유래한 것으로 벚나무속을 일컫는다. 종소명 *padus*는 이 종류 식물의 고대 그리스명에서 유래했다.





장미과 배나무속

돌배나무

Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대
꽃	4월
높이	5m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 돌배나무라는 이름은 야생하는(돌) 배나무라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Pyrus*는 배나무를 뜻하는 고대 라틴어 *Pirus*에서 유래했으며 배나무속을 일컫는다. 종소명 *pyrifolia*는 '*Pyrus*(배나무속)의 잎과 비슷함'이라는 뜻이다.

장미과 병아리꽃나무속

병아리꽃나무

Rhodotypos scandens (Thunb.)

Makino

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	해안 숲 가장자리
꽃	4~5월
높이	2m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	점토, 양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — ‘병아리’와 ‘꽃’과 ‘나무’의 합성어로 꽃이 병아리와 같은 나무라는 뜻이며, 순백색의 하얀 꽃을 병아리처럼 귀엽다고 본 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Rhodotypos*는 그리스어 rhodon(장미)과 typos(형태)의 합성어로 꽃과 식물체가 장미를 닮았다는 뜻에서 유래했으며 병아리꽃나무속을 일컫는다. 종소명 *scandens*는 ‘불잡고 오르는 성질의’라는 뜻으로 줄기가 늘어져 덩굴처럼 보이는 것에서 유래했다.



장미과 쉬땅나무속

쉬땅나무

Sorbaria sorbifolia var. *stellipila*
Maxim.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대
꽃	7~8월
높이	2m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Sorbaria*는 *Sorbus*(마가목속)와 잎의 모양이 닮은 것에서 유래했으며 쉬땅나무속을 일컫는다. 종소명 *sorbifolia*는 '*Sorbus*(마가목속) 잎과 같은'이라는 뜻이다.

장미과 사과나무속

아그배나무

Malus toringo (Siebold) Siebold ex de Vriese

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목, 소교목
자생 환경	숲 가장자리, 계곡 주변
꽃	4~5월
높이	2~10m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 접목



국명 유래 — 아그배나무라는 이름은 '아그'와 '배'와 '나무'의 합성어로, 나무에 열리는 작은 열매가 아기 배(작은 배) 모양인 데서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Malus*는 그리스어 malon(사과)에서 유래했으며 사과나무속을 일컫는다. 종소명 *toringo*는 *Malus*(사과나무속) 식물을 가리키는 일본어에서 유래했다.





장미과 사과나무속

야광나무

Malus baccata (L.) Borkh.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	계곡 주변, 관목지대
꽃	4~6월
높이	7m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 접목



국명 유래 — 『조선삼림수목감요』에서 최초 발견되며, 평북 방언을 채록한 것이다. ‘야광’은 야광주(夜光珠)와 같이 빛을 내어 칠혹같이 어두운 밤을 밝혀준다는 뜻으로, 야광나무라는 이름은 흰 꽃이 흐드러지게 피어 밤에도 밝게 빛나는 나무인 데서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Malus*는 그리스어 malon(사과)에서 유래했으며 사과나무속을 일컫는다. 종소명 *baccata*는 ‘장과(漿果)’의라는 뜻으로 열매의 모양에서 유래했다.

장미과 조팝나무속

조팝나무

Spiraea prunifolia f. *simpliciflora*

Nakai

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	4~5월
높이	1.5~2m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 조팝나무라는 이름에서 조팝은 ‘조(苧)’(粟)와 ‘밥’(飯)의 합성어로, 작은 꽃들이 모여 있는 모양이 조로 만든 밥 또는 튀긴 좁쌀을 붙인 것 같다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Spiraea*는 그리스어 speira는(나선, 회전, 바퀴)에 어원을 둔 speiraia(이 식물로 회전을 만들었고 어떤 종은 열매의 모양이 나선형이어서 붙여진 이름)에서 전용·유래했으며 조팝나무속을 일컫는다. 종소명 *prunifolia*는 ‘*Prunus*(벚나무속)와 잎이 비슷한’ 이라는 뜻이며, 품종명 *simpliciflora*는 ‘홀꽃의’라는 뜻이다.



장미과 팔배나무속

팔배나무

Aria alnifolia (Siebold & Zucc.) Decne.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대
꽃	4~6월
높이	15m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 열매가 작고 흰 점이 산재해 팔(小豆) 모양이고 흰색의 꽃이 피는 모습이 배나무(梨木)를 닮았다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 종소명 *alnifolia*는 '*Alnus*(오리나무속)의 잎과 비슷함'이라는 뜻이다.

고추나무과 고추나무속

고추나무

Staphylea bumalda DC.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목, 소교목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대
꽃	4~6월
높이	3~5m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 고추나무라는 이름은 잎의 모양이 고추와 유사한 나무라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Staphylea*는 그리스어 staphyle(포도송이, 꽃송이)가 어원으로 총상꽃차례의 모양 때문에 붙여졌으며 고추나무속을 일컫는다. 종소명 *bumalda*는 이탈리아 식물학자 Ovidio Montalbano(1601~1671)의 라틴명 *Johannus Antonius Bumaldus*에서 유래했다.



때죽나무과 때죽나무속

때죽나무

Styrax japonicus Siebold & Zucc.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲 가장자리
꽃	5~6월
높이	10m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 접목



국명 유래 — 때죽나무라는 이름은 나무껍질이 검고 일년생가지의 나무껍질이 실처럼 벗겨지는 것을 줄기에 때가 많다고 본 것에서 유래했다고 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Styrax*는 수지(樹脂)나 수지를 뽑던 나무에 대한 고대 그리스명 storax에서 유래한 것으로 때죽나무속을 일컫는다. 종소명 *japonicus*는 '일본의'라는 뜻으로 최초 발견지 또는 분포지를 나타낸다.

매죽나무과 매죽나무속

쪽동백나무

Styrax obassia Siebold & Zucc.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲 가장자리
꽃	5~6월
높이	10m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 쪽동백나무라는 이름은 열매가 동백나무보다 작은 나무라는 뜻에서 유래했다. '쪽'은 여러 뜻으로 사용되는데, '작은'의 뜻을 더하는 접두사로도 사용된다.

학명 유래 — 속명 *Styrax*는 수지(樹脂)나 수지를 뽑던 나무에 대한 고대 그리스명 storax에서 유래한 것으로 매죽나무속을 일컫는다.



산분꽃나무과 산분꽃나무속

백당나무

Viburnum opulus var. *sargentii*
(Koehne) Takeda

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	계곡 주변
꽃	5~6월
높이	3m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목, 절목, 포기나누기



국명 유래 — 꽃이 하얗게 피는 모양이 마치 흰 엿이나 흰 피륙을 펼쳐놓은 듯하다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다. 옛 문헌에서 흰색의 엿을 의미하는 ‘백당’(白糖)을 기록했고, 무명실로 짠 고운 흰색 피륙을 ‘백당목’(白唐木) 또는 ‘백당’(白唐)이라 했다. 백당의 이러한 뜻과 지방명 ‘사발꽃나무’가 꽃의 모양과 관련한 이름이라는 점이 유래를 뒷받침한다.

학명 유래 — 속명 *Viburnum*은 의미 불명의 비브르눔 란타나(*V. lantana*)의 라틴명에서 유래한 것으로 산분꽃나무속을 일컫는다. 종소명 *opulus*는 단풍나무 종류의 관목에 대한 라틴명에서 유래한 것으로 알려져 있다.

국명 찾아보기

가막살나무	27	노랑원추리	64
각시붓꽃	128	누리장나무	152
각시취	122	단풍나무	22
감국	65	단풍취	100
개나리	84	당단풍나무	23
개느삼	81	대사초	107
개복수초	89	대청부채	130
갯취	66	댕강나무	30
고추나무	170	도깨비쇠고비	108
과남풀	126	도라지	125
괴불나무	144	돈나무	112
국수나무	161	돌나물	76
귀룽나무	162	돌배나무	163
금불초	67	동강할미꽃	138
기린초	75	동백나무	26
까실쑥부쟁이	123	동의나물	88
꼬리조팝나무	44	두루미천남성	98
꼬리진달래	148	둥근잎꿩의비름	33
꽃싸리	37	땅나리	56
꽃창포	129	땅채송화	77
팥팥나무	97	매죽나무	171
꿀풀	134	만리화	85
날개하늘나리	55	말발도리	149
남오미자	25	매발톱	18
노랑무늬붓꽃	151	매화말발도리	150

모감주나무	94	생강나무	83
물레나물	74	생열귀나무	47
미선나무	154	섬기린초	78
미역취	68	섬노루귀	158
백당나무	173	섬말나리	57
백양꽃	50	속새	109
백작약	157	솔나리	39
뱀무	90	솔나물	93
범부채	54	숨방망이	70
벼룩이울타리	145	수수꽃다리	40
병꽃나무	73	슬퍼랭이꽃	31
병아리꽃나무	164	쉬땅나무	165
병풍삼	101	쑥부쟁이	124
복자기	24	아그배나무	166
부들	61	애기기린초	79
부채붓꽃	131	앵초	43
분꽃나무	48	야광나무	167
사철나무	104	양지꽃	91
산국	69	얼레지	136
산딸나무	146	연화바위솔	105
산사나무	20	완도호랑가시나무	14
산숨방망이	52	용머리	135
산수국	127	우산나물	102
산조플	114	으아리	159
산철쭉	34	이팝나무	155
삿갓나물	110	자란	42

제비동자꽃	53	큰제비고깔	139
제비붓꽃	132	큰천남성	99
제주상사화	51	타래붓꽃	133
조릿대	113	태백기린초	80
조팝나무	168	털개회나무	41
족도리풀	118	털머위	72
좀비비추	119	털중나리	59
좀씀바귀	71	파드득나물	96
좀조팝나무	45	팔배나무	169
좁쌀풀	87	패랭이꽃	32
주걱비비추	120	피나물	86
주목	115	하늘나리	60
쥐똥나무	156	한라돌쩌귀	141
진달래	35	할미꽃	19
진범	140	함박꽃나무	153
짚신나물	92	해당화	46
쪽동백나무	172	호자나무	21
참꽃나무	36	화살나무	16
참나리	58	회양목	103
참빗살나무	15	흑산도비비추	121
참싸리	38	흰말채나무	17
처녀치마	137	히어리	82
청나래고사리	111		
측백나무	106		
층층나무	147		
큰꽃으아리	160		

학명 찾아보기

<i>Abeliophyllum distichum</i> Nakai	154	<i>Camellia japonica</i> L.	26
<i>Acer palmatum</i> Thunb.	22	<i>Campylotropis macrocarpa</i> (Bunge)	
<i>Acer pseudosieboldianum</i> (Pax)		Rehder	37
Kom.	23	<i>Carex siderosticta</i> Hance	107
<i>Acer triflorum</i> Kom.	24	<i>Chionanthus retusus</i> Lindl. & Paxton	
<i>Aconitum japonicum</i> subsp. <i>napi-</i>			155
<i>forme</i> (H.Lév. & Vaniot) Kadota	141	<i>Chrysanthemum boreale</i> (Makino)	
<i>Aconitum pseudolaeve</i> Nakai	140	Makino	69
<i>Adonis pseudoamurensis</i> W.T.Wang	89	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	65
		<i>Clematis mandshurica</i> Rupr.	159
<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	92	<i>Clematis patens</i> C.Morren & Decne.	160
<i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.Bip.	100		
<i>Aquilegia buergeriana</i> var. <i>oxysepa-</i>		<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	152
<i>la</i> (Trautv. & C.A.Mey.) Kitam.	18		
<i>Aria alnifolia</i> (Siebold & Zucc.) Decne.	169	<i>Cornus alba</i> L.	17
		<i>Cornus controversa</i> Hemsl.	147
<i>Arisaema heterophyllum</i> Blume	98	<i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hance	146
<i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott	99	<i>Corylopsis coreana</i> Uyeki	82
<i>Asarum sieboldii</i> Miq.	118	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge	20
<i>Aster ageratoides</i> Turcz.	123	<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.	96
<i>Aster indicus</i> L.	124	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl	108
<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f.	42	<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn.	21
<i>Buxus sinica</i> var. <i>insularis</i> (Nakai)		<i>Delphinium maackianum</i> Regel	139
M.Cheng	103	<i>Deutzia parviflora</i> Bunge	149
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	114	<i>Deutzia uniflora</i> Shirai	150
<i>Caltha palustris</i> L.	88	<i>Dianthus chinensis</i> L.	32
		<i>Dianthus longicalyx</i> Miq.	31

<i>Dracocephalum argunense</i> Fisch. ex Link	135	<i>Hylotelephium ussuriense</i> (Kom.) H.Ohba	33
<i>Equisetum hyemale</i> L.	109	<i>Hypericum ascyron</i> L.	74
<i>Eremogone juncea</i> (M.Bieb.) Fenzl	145	<i>Ilex crenata</i> Thunb.	97
<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	136	<i>Ilex × wandoensis</i> C.F.Mill. & M.Kim	14
<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold	16	<i>Inula japonica</i> Thunb.	67
<i>Euonymus hamiltonianus</i> Wall.	15	<i>Iris dichotoma</i> Pall.	130
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	104	<i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt & Mabb.	54
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	72	<i>Iris ensata</i> Thunb.	129
<i>Forsythia koreana</i> (Rehder) Nakai	84	<i>Iris lactea</i> var. <i>chinensis</i> (Fisch.) Koidz.	133
<i>Forsythia ovata</i> Nakai	85	<i>Iris laevigata</i> Fisch.	132
<i>Galium verum</i> subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz.	93	<i>Iris odaesanensis</i> Y.N.Lee	151
<i>Gentiana triflora</i> var. <i>japonica</i> (Kusn.) H.Hara	126	<i>Iris rossii</i> Baker	128
<i>Geum japonicum</i> Thunb.	90	<i>Iris setosa</i> Pall. ex Link	131
<i>Heloniopsis koreana</i> Fuse, N.S.Lee & M.N.Tamura	137	<i>Ixeris stolonifera</i> A.Gray	71
<i>Hemerocallis thunbergii</i> Baker	64	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal	25
<i>Hepatica maxima</i> (Nakai) Nakai	158	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	94
<i>Hosta clausa</i> Nakai	120	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq.	38
<i>Hosta minor</i> (Baker) Nakai	119	<i>Ligularia mongolica</i> (Turcz.) DC.	66
<i>Hosta yingeri</i> S.B.Jones	121	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold & Zucc.	156
<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser.	127	<i>Lilium amabile</i> Palib.	59
<i>Hylomecon vernalis</i> Maxim.	86	<i>Lilium callosum</i> Siebold & Zucc.	56
		<i>Lilium cernuum</i> Kom.	39

<i>Lilium concolor</i> var. <i>partheneion</i> (Siebold & de Vriese) Baker	60	<i>Phedimus aizoon</i> var. <i>floribundus</i> H.Ohba	75
<i>Lilium hansonii</i> Leichtlin ex D.D.T.Moore	57	<i>Phedimus latiovalifolius</i> (Y.N.Lee) D.C.Son & H.J.Kim	80
<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	58	<i>Phedimus middendorffianus</i> (Max- im.) 't Hart	79
<i>Lilium pensylvanicum</i> Ker Gawl.	55	<i>Phedimus takesimensis</i> (Nakai) 't Hart	78
<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	83	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	112
<i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim.	144	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	106
<i>Lychnis wilfordii</i> (Regel) Maxim.	53	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.	125
<i>Lycoris</i> × <i>chejuensis</i> K.H.Tae & S.C.Ko	51	<i>Potentilla fragarioides</i> var. <i>major</i> Maxim.	91
<i>Lycoris sanguinea</i> var. <i>koreana</i> (Nakai) T.Koyama	50	<i>Primula sieboldii</i> E.Morren	43
<i>Lysimachia vulgaris</i> var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R.Knuth	87	<i>Prunella vulgaris</i> subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H.Hara	134
<i>Magnolia sieboldii</i> K.Koch	153	<i>Prunus padus</i> L.	162
<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	167	<i>Pulsatilla koreana</i> (Y.Yabe ex Nakai) Nakai ex T.Mori	19
<i>Malus toringo</i> (Siebold) Siebold ex de Vriese	166	<i>Pulsatilla tongkangensis</i> Y.N.Lee & T.C.Lee	138
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	111	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai	163
<i>Orostachys iwarenge</i> (Makino) H.Hara	105	<i>Rhododendron micranthum</i> Turcz.	148
<i>Paeonia japonica</i> (Makino) Miyabe & Takeda	157	<i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz.	35
<i>Parasenecio firmus</i> (Kom.) Y.L.Chen	101		
<i>Paris verticillata</i> M.Bieb.	110		

<i>Rhododendron weyrichii</i> Maxim.	36	<i>Styrax japonicus</i> Siebold & Zucc.	171
<i>Rhododendron yedoense</i> f.			
<i>poukhanense</i> (H.Lév.) Sugim. ex		<i>Styrax obassia</i> Siebold & Zucc.	172
T.Yamaz.	34	<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.	102
<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	164		
		<i>Syringa oblata</i> var. <i>dilatata</i> (Nakai)	
<i>Rosa davurica</i> Pall.	47	Rehder	40
<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	46	<i>Syringa patula</i> (Palib.) Nakai	41
<i>Sasamorpha borealis</i> (Hack.) Nakai	113	<i>Taxus cuspidata</i> Siebold & Zucc.	115
		<i>Tephroseris flammea</i> (Turcz. ex	
<i>Saussurea pulchella</i> (Fisch.) Fisch.		DC.) Holub	52
ex Colla	122	<i>Tephroseris kirilowii</i> (Turcz. ex DC.)	
<i>Sedum oryzifolium</i> Makino	77	Holub	70
<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge	76	<i>Typha orientalis</i> C.Presl	61
<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>asiatica</i>		<i>Viburnum carlesii</i> Hemsl.	48
(Nakai ex H.Hara) Kitam. ex		<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	27
H.Hara	68	<i>Viburnum opulus</i> var. <i>sargentii</i>	
<i>Sophora koreensis</i> Nakai	81	(Koehne) Takeda	173
<i>Sorbaria sorbifolia</i> var. <i>stellipila</i>		<i>Weigela subsessilis</i> (Nakai) L.H.Bai-	
Maxim.	165	ley	73
<i>Spiraea microgyna</i> Nakai	45	<i>Zabelia tyaihyonii</i> (Nakai) Hisauti &	
<i>Spiraea prunifolia</i> f. <i>simpliciflora</i>		H.Hara	30
Nakai	168		
<i>Spiraea salicifolia</i> L.	44		
<i>Staphylea bumalda</i> DC.	170		
<i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel	161		

참고자료

식물 특성정보

- 국립수목원. 국가표준식물목록. <http://www.nature.go.kr/>
- 국립수목원. 국가생물종지식정보시스템. <http://www.nature.go.kr>
- Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO & Harvard University Herbaria. eFloras. <http://www.efloras.org/>

국명 및 학명 유래

- 조민제, 최동기, 최성호, 심미영, 지용주, 이웅. (2021). 『한국 식물 이름의 유래 ‘조선식물향명집’ 주해서』. 심플라이프
- Dave's Garden. Botany. <https://davesgarden.com/guides/botany/>
- Wikimedia Foundation. Wiktionary. <https://www.wiktionary.org/>

사진 제공

- 권우찬 - 국수나무, 매화말발도리, 병꽃나무, 부채붓꽃, 산딸나무, 진달래, 처녀치마(위), 피나무, 할미꽃, 해당화
- 이기홍 - 각시붓꽃, 대청부채, 돌배나무, 동강할미꽃, 땅채송화, 제비붓꽃, 쯤썸바귀, 짚신나물, 처녀치마(아래)

색으로 찾는 우리꽃 정원식물

발행일	2023년 12월 31일
발행처	국립수목원
발행인	국립수목원장
집필진	이경미, 정채연, 박소현, 이문규, 안시내, 박효근, 강자우, 이주영, 이경연, 김현정, 주이슬, 김진우, 배준규, 최 경, 정미애
식물검수	손동찬
디자인	품투필
인쇄	수디자인
사진	국립수목원, 권우찬, 이기홍
발간등록번호	11-1400119-000497-01
I S B N	979-11-92743-38-7 90520

국립수목원 2023

이 책에 실린 모든 글과 사진은 저작권법에 따라 보호받으며 무단복제나 전제를 금합니다.

색으로 찾는 우리꽃 정원식물

발간등록번호 11-1400119-000497-01

비매품/무료



ISBN 979-11-92743-38-7