

질감으로 찾는 우리꽃 정원식물

Korean Native Garden Plants Classified by Their Texture



국립수목원

산림청 국립수목원
Korea National Arboretum

질감으로 찾는 우리꽃 정원식물

Korean Native Garden Plants Classified by Their Texture

목차

- 008 일러두기
- 009 이 책을 보는 방법
- 010 식물의 질감
- 015 고운 질감
- 073 중간 질감
- 145 거친 질감
- 170 국명 찾아보기
- 173 학명 찾아보기
- 177 참고자료

고운 질감

16	벼룩이울타리	30	너도개미자리	44	모래지치	58	관중
17	그늘사초	31	솔나물	45	암대극	59	일색고사리
18	김의털	32	개회향	46	애기우산나물	60	십자고사리
19	꼬랑사초	33	고본	47	백두산떡쑥	61	낙시고사리
20	개맥문동	34	비짜루	48	갯사상자	62	발풀고사리
21	노랑무늬붓꽃	35	남산제비꽃	49	금강봄맞이	63	애기모람
22	지리대사초	36	개복수초	50	평의바람꽃	64	섬백리향
23	두메부추	37	산괴불주머니	51	개정향풀	65	등근인가목
24	타래붓꽃	38	한라개승마	52	금평의다리	66	꼬리조팝나무
25	도루박이	39	투구꽃	53	평의다리	67	국수나무
26	갈풀	40	전호	54	넉줄고사리	68	구슬꽃나무
27	띠	41	궁궁이	55	공작고사리	69	갯버들
28	실새풀	42	바위채송화	56	개고사리	70	좁목형
29	수크령	43	애기기린초	57	청나래고사리	71	자귀나무

중간 질감

74 연화바위솔	92 백선	110 매자나무	128 산호수
75 옥녀꽃대	93 산비장이	111 작살나무	129 제주조릿대
76 삿갓나물	94 참당귀	112 가침박달	130 죽절초
77 냉초	95 금강애기나리	113 개암나무	131 왕백량금
78 삼지구엽초	96 꽃고비	114 산겨릅나무	132 돈나무
79 연영초	97 야산고비	115 박쥐나무	133 광나무
80 일월비비추	98 고비	116 생강나무	134 식나무
81 감자난초	99 가지고비고사리	117 쪽동백나무	135 붓순나무
82 박새	100 세뿔석위	118 당단풍나무	136 새덕이
83 새우난초	101 세잎종덩굴	119 고로쇠나무	137 아왜나무
84 섬남성	102 개다래	120 신나무	138 참식나무
85 대청부채	103 바위수국	121 복자기	139 셀달나무
86 가락지나물	104 왕머루	122 오갈피나무	140 생달나무
87 세뿔투구꽃	105 순비기나무	123 모감주나무	141 육박나무
88 갯기름나물	106 다정큼나무	124 마가목	142 비목나무
89 갯활랑나물	107 백서향	125 눈향나무	143 후박나무
90 미나리냉이	108 구슬땃냉이	126 개비자나무	
91 노루삼	109 상산	127 비자나무	

거친 질감


146 바늘엉겅퀴	153 개병풍	160 파초일엽	167 팔손이
147 가시엉겅퀴	154 가시연꽃	161 나도히초미	168 굴거리나무
148 큰절굿대	155 갯취	162 도깨비쇠고비	169 까마귀쪽나무
149 터리풀	156 큰천남성	163 석위	
150 돌단풍	157 나도생강	164 모람	
151 도깨비부채	158 문주란	165 호랑가시나무	
152 털머위	159 골고사리	166 만병초	

일러두기

1. 이 책에서 활용된 식물소재는 모두 우리 산과 들에서 자라는 자생식물입니다.
2. 식물은 질감의 유사성을 기준으로 배열하였습니다.
3. 식물의 과명은 APG IV 분류체계에 따랐으며 국명과 학명은 국가표준식물목록을 기준으로 하였습니다.
4. 총 150종의 식물을 선정하였으며 식물의 질감은 잎의 크기, 갈라진 정도, 거치, 가지 등을 복합적으로 검토하여 고운 질감(56종), 중간 질감(70종), 거친 질감(24종)으로 구분했습니다.
5. 한국 적색목록(Redlist)기준 평가등급에 따라 '위급(CR), 위기(EN), 취약(VU), 약관심(LC), 준위협(NT), 자료부족(DD)'으로 표기해두었습니다. 또한 한반도 자생환경에 적응하여 진화하였으며 세계적으로 우리나라에만 분포하는 귀중한 유전자원인 특산식물(Korean Endemic Plants)도 같이 표기하였습니다.
6. 이 책은 질감을 주제로 식재 조합을 하기 위한 가이드라인을 제시하기 위해 제작되었습니다. 실제 활용 시 정원의 환경과 공간에 알맞게 적용하시기를 바랍니다.

이 책을 보는 방법

본 도서는 식물의 시각적 요소 중 하나인 질감을 주제로 식재 조합을 하기 위한 가이드라인을 제시하고 있습니다. 다양한 요소를 바탕으로 식물의 질감을 고운 질감, 중간 질감, 거친 질감으로 구분하였고, 각 식물의 기본 정보, 생육환경, 번식법, 이름 유래와 관련된 정보를 함께 담았습니다.



식물의 질감

이 책은 다음과 같은 기준으로 질감을 구분했습니다.

구분	내용	고운	중간	거친
표면	잎의 광택은 거친 느낌을 준다.	없다	-----	있다
크기	잎이 클수록 일반적으로 거친 느낌을 준다.	작다	-----	크다
두께	잎이 두꺼울수록 견고하여 뚜렷한 질감으로 거친 느낌을 준다.	얇다	-----	두껍다
톱니/가시	톱니나 가시는 만지지 않아도 시각적으로 거친 느낌을 준다.	없다	-----	있다
움직임	잎의 움직임은 규칙적인 패턴이 깨져서 고운 느낌을 준다.	많다	-----	적다
밀도	잎이 조밀하게 달리면 경계가 흐리게 인식되어 고운 느낌을 준다.	높다	-----	낮다

* 위와 같은 접근 방식을 사용하여 분류하였지만 질감은 주관적인 평가이기 때문에 같은 식물을 다르게 평가할 수 있으므로 이 점을 고려하시길 바랍니다.

질감은 정원에 깊이를 더해주는 중요한 요소입니다.

동선 가까이에는 거친 질감의 식물을 배치하고, 화단 뒤편에는 부드럽고 고운 질감의 식물을 심으면 화단이 실제보다 더 깊고 멀어 보이는 효과가 있습니다.

이처럼 식물의 다양한 질감을 활용하면 정원이 더욱 입체적으로 살아납니다. 비슷한 질감의 식물만으로 꾸미면 정원이 단조롭거나 산만해 보일 수 있습니다. 거친

질감의 식물로 공간을 강조하고, 그 사이를 부드러운 질감의 식물로 채우면 대비와 조화가 어우러져 한층 더 다채로운 분위기를 연출할 수 있습니다.



고운 질감

고운 질감의 식물은 작은 잎이 조밀하게 달려있거나 얇은 잎, 혹은 바람의 움직임으로 인해 전체적인 분위기가 부드럽고 잔잔한 느낌을 줍니다. 시선을 끄는 역할보다 초점 식물을 돋보이게 하거나 시각적으로 강한 식물 사이에서 분위기를 부드럽게 해주는 역할을 합니다. 또 밝고 가벼운 느낌을 주어 거리가 멀어 보이는 효과를 나타냅니다. 작은 정원에서 사용하면 공간을 풍성하고 넓어 보이게 연출할 수 있지만, 지나치게 많이 사용하면 단조로운 느낌이 날 수 있습니다.



김의털



좁목형



갯사상자

중간 질감

대부분 식물은 중간 정도의 질감을 가지고 있습니다. 잎이 너무 크지도 작지도 않고, 두껍거나 얇지도 않으며, 광택이나 가시 등이 도드라지지 않아 안정적인 느낌을 줍니다.

중간 질감의 식물은 정원에서 배경 역할을 해주며 거친 질감과 고운 질감 사이를 채워 하나로 연결해 줍니다.



거친 질감

전반적으로 광택과 두께가 있으며 잎이 크거나 거치, 혹은 가시로 인해 거친 느낌을 줍니다. 이러한 거친 질감의 식물은 강렬한 시각적 이미지로 시선을 끄는 초점 식재로 활용할 수 있습니다.

또 극적이며 압도적인 분위기를 자아내기 때문에 울창하고 이국적인 숲속 경관을 연출할 수 있지만, 시각적으로 무거운 느낌을 주어 지나치게 많이 사용하면 정원이 복잡하고 좁아 보일 수 있습니다.



고운 질감

석죽과 관모개미자리속

벼룩이울타리

Eremogone juncea (M.Bieb.) Fenzl

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월, 흰색
높이	0.5m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — ‘벼룩이’와 ‘울타리’의 합성어로, 『조선식물향명집』에서 그 이름이 최초로 보인다. 벼룩이자리(*Arenaria serpyllifolia*)와 꽃의 모양 등이 닮았는데 잎이 골풀처럼 길게 자라므로 이를 울타리에 비유한 데서 유래한 것으로 보인다.

학명 유래 — 속명 *Eremogone*는 그리스어 eremos(외로운, 버려진)와 gonos(씨앗, 자손)의 합성어로 관모개미자리속을 일컫는다. 종소명 *juncea*는 골풀속(*Juncus*)과 유사하다는 뜻이다.



사초과 사초속

그늘사초

Carex lanceolata Boott

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	4~7월, 적갈색
높이	0.1~0.35m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Carex*는 갈대나 꿀풀을 뜻하는 고대 라틴명 *carex*에서 유래했으며 사초속을 일컫는다. 종소명 *lanceolata*는 '창모양의'라는 뜻이다.

벼과 김의털속

김의털

Festuca ovina L.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지, 돌밭
꽃	4~7월, 연두색
높이	0.3~0.5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 김의털이라는 이름은 옛 문헌에서 한자어 모초(茅草)와 함께 사용되었고, '김'의 뜻에 비추어볼 때 논밭에 난 잡초 같고 털을 닮은 풀이라는 뜻에서 유래한 것으로 이해된다.

학명 유래 — 속명 *Festuca*는 이 속에 속하는 벼과 식물에 대한 고대 라틴어에서 유래했는데 밀짚이라는 뜻도 있으며 김의털속을 일컫는다. 종소명 *ovina*는 '양(羊)의, 양이 좋아하는'이라는 뜻이다.





사초과 사초속

꼬랑사초

Carex mira Kük.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	산지 능선, 계곡 주변 바위
꽃	4~5월, 자주색
높이	0.15~0.4m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Carex*는 갈대나 꿀풀을 뜻하는 고대 라틴명 *carex*에서 유래했으며 사초속을 일컫는다.

비짜루과 맥문동속

개맥문동

Liriope spicata (Thunb.) Lour.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 초지
꽃	5~7월, 보라색
높이	0.25~0.4m
광조건	반음지, 음지
토질	점토, 양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 개맥문동이라는 이름은 맥문동(麥門冬)과 닮았다는(개) 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Liriope*는 그리스 신화에서 나르시스(Narcissus)의 어머니이자 샘물의 요정 이름에서 유래한 것으로 맥문동속을 일컫는다. 종소명 *spicata*는 spica(이삭)의 형용사형으로 '이삭 모양 꽃의, 이삭 모양의'라는 뜻이다.



붓꽃과 붓꽃속

노랑무늬붓꽃

Iris odaesanensis Y.N.Lee

준위협(NT)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	4~5월, 흰색
높이	0.2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종



학명 유래 — 속명 *Iris*는 그리스 신화에 나오는 신들의 전령으로 무지개를 의인화한 신의 이름이며 붓꽃속을 일컫는다.

사초과 사초속

지리대사초

Carex okamotoi Ohwi

약관심(LC)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	5~6월, 갈색
높이	0.15~0.2m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Carex*는 갈대나 꿀풀을 뜻하는 고대 라틴명 *carex*에서 유래했으며 사초속을 일컫는다.



수선화과 부추속

두메부추

Allium dumebuchum H.J.Choi

위급(CR)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	건초지, 돌틈 및 웅벽, 해안 암석지대
꽃	8~9월, 분홍색
높이	0.2~0.3m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Allium*은 마늘을 일컫는 고대 라틴어로, 냄새라는 뜻의 alere 또는 ha-에 어원을 두고 있으며 부추속을 일컫는다.

붓꽃과 붓꽃속

타래붓꽃

Iris lactea var. *chinensis*
(Fisch.) Koidz.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	해안초지, 건조지
꽃	4~5월, 보라색
높이	0.4m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 잎이 실·고삐·노끈 등을 사려서 뭉쳐 놓은 타래처럼 꼬여 있다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Iris*는 그리스 신화에 나오는 신들의 전령으로 무지개를 의인화한 신의 이름이며 붓꽃속을 일컫는다. 종소명 *lactea*는 ‘유백색의’라는 뜻이다.





사초과 고랭이속

도루박이

Scirpus radicans Schkuhr

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	수변, 수공간
꽃	6~9월, 갈색
높이	0.7~1.5m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Scirpus*는 골풀 또는 그와 유사한 식물의 라틴명이 전용된 것으로 고랭이속을 일컫는다. 종소명 *radicans*는 '뿌리를 가진, 뿌리 모양의'라는 뜻이다.

벼과 갈풀속

갈풀

Phalaris arundinacea L.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	수변
꽃	5~6월, 연두색
높이	0.7~1.8m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 종소명 *arundinacea*는 '갈대와 비슷한'이라는 뜻이다.



벼과 락속

띠

Imperata cylindrica (L.) Raeusch.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	5~6월, 흰색
높이	0.3~0.8m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 락라는 이름은 옛말 ‘뒤잇(뒤)’이 어원으로, 땅속줄기가 보이지 않고 땅속에 있는 데서 유래한 것으로 추정한다. ‘뒤잇’은 뒤에 있는 것 또는 보이지 않는 것이라는 뜻을 지닌 것으로 이해된다.

학명 유래 — 속명 *Imperata*는 이탈리아 자연연구가 Ferrante Imperate(1525~1615)의 이름에서 유래했으며 락속을 일컫는다. 종소명 *cylindrica*는 ‘원주상의, 통모양의’라는 뜻으로 원뿔모양꽃차례에서 유래했다.

벼과 산새풀속

실새풀

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	8~9월, 자주색
높이	0.6~1.5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 실새풀이라는 이름은 소수(小穗)의 작고 부드러운 생김새가 짧은 실 모양인 새 종류의 풀이라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명

*Calamagrostis*는

그리스어 calamos(갈대)와

Agrostis(겨이삭속)의 합성어로

갈대와 겨이삭을 닮은 식물이라는

뜻이며 산새풀속을 일컫는다.

종소명 *arundinacea*는 '갈대와 비슷한'이라는 뜻이다.





벼과 수크령속

수크령

Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지, 건조지
꽃	7~10월, 자주색
높이	0.3~0.8m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 수크령이라는 이름은 그령을 암크령으로 한 것에 대응한 것으로, 식물체 전체와 꽃이삭의 모양이 훨씬 더 억세고 커서 수컷 같은 그령이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Pennisetum*은 라틴어 penna(깃털)와 seta(가시털)의 합성어로 소수(小穗)에 까락이 많음을 나타내며 수크령속을 일컫는다. 종소명 *alopecuroides*는 'Alopecurus(뚝새풀속)와 비슷한'이라는 뜻이다.

석죽과 나도개미자리속

너도개미자리

Minuartia laricina (L.) Mattf.

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산 바위지대
꽃	7~10월, 흰색
높이	0.1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Minuartia*는 18세기 스페인 식물학자이자 약사였던 Jean Minuart의 이름에서 유래했으며 나도개미자리속을 일컫는다. 종소명 *laricina*는 라틴어 *Larix*(일본잎갈나무)에서 유래한 것으로 낙엽송과 닮았다는 뜻이다.





꼭두서니과 갈퀴덩굴속

솔나물

Galium verum subsp. *asiaticum*
(Nakai) T.Yamaz.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지, 건조지
꽃	6~8월, 노란색
높이	0.7~1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 솔나물이라는 이름은 ‘솔’(松)과 ‘나물’(菜)의 합성어로, 잎이 솔잎처럼 선형이고 나물로 식용한다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Galium*은 그리스어로 우유를 뜻하는 galion에서 전용된 것으로, 솔나물(*G. verum*)의 노란 꽃이 치즈를 응고시키거나 착색하는데 쓰인 것에서 유래했으며 갈퀴덩굴속을 일컫는다. 종소명 *verum*은 ‘정통의, 진짜의’라는 뜻의 라틴어로 솔나물 종류 중에서 기본종임을 나타낸다.

산형과 기름당귀속

개회향

Ligusticum tachiroei (Franch. & Sav.) M.Hiroe & Constance

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산 바위지대, 숲 가장자리
꽃	7~8월, 흰색
높이	0.1~0.3m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Ligusticum*은 그리스어 ligustikos에서 유래한 것으로 '리구리아(Liguria) 지역의'라는 뜻을 뜻하며 기름당귀속을 일컫는다.



산형과 당귀속

고본

Angelica tenuissima Nakai

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	8~9월, 흰색
높이	0.3~0.8m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 고본이라는 이름은 한자명 ‘藺本’(고본)에서 비롯했으며 ‘藺’(고)는 마른나무, ‘本’(본)은 뿌리의 뜻으로, 뿌리의 윗부분에서 싹이 나는 부분까지의 모양이 마른나무와 비슷하다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Angelica*는 그리스어 angelos(천사)에서 유래한 것으로 감심효과가 있는 약효와 관련하여 죽은 사람을 소생시킨다는 뜻에서 붙여졌으며 당귀속을 일컫는다. 종소명 *tenuissima*는 ‘매우 섬세한, 매우 얇은’이라는 뜻으로 가늘게 갈라지는 잎의 모양에서 유래했다.

비짜루과 비짜루속

비짜루

Asparagus schoberioides Kunth

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
열매	5~6월, 빨간색
높이	0.5~1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 『물보』에 현재 비짜루와 가장 유사한 형태인 '비즈르(未)'라는 표현이 나오는데 이는 현재 청소 도구인 빗자루를 뜻하고, 『조선식물명집』에 '빗자루'라는 이름으로 기록된 점에 비추어 비짜루는 줄기와 엽상체가 이루는 모양이 빗자루를 닮은 것에서 유래한 이름으로 이해된다.

학명 유래 — 속명 *Asparagus*는 그리스어 asparagos에 기원을 두고 있는데, 가지가 심하게 갈라진다는 뜻으로 비짜루속을 일컫는다. 종소명 *schoberioides*는 '*Schoberia*(나문재속의 옛이름)와 비슷한'이라는 뜻이다.





제비꽃과 제비꽃속

남산제비꽃

Viola albida var. *chaerophylloides*
(Regel) F.Maek. ex H.Hara

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 초지
꽃	4~6월, 흰색
높이	0.05~0.2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 남산에서 최초로 발견된 제비꽃이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Viola*는 라틴어로 보라색 꽃을 뜻하고 최초로 일컬은 제비꽃이 보라색인 것에서 유래했으며 제비꽃속을 일컫는다. 종소명 *albida*는 '연한 백색의'라는 뜻이다.

변종명 *chaerophylloides*는 'chaerophylla 종과 유사한'이라는 뜻인데, chaerophylla는 cheirophylla의 오기로 '손바닥 모양 잎의'라는 뜻이다.

미나리아재비과 복수초속

개복수초

Adonis pseudoamurensis W.T.Wang

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 초지, 관목지대
꽃	3~4월, 노란색
높이	0.1~0.4m
광조건	반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Adonis*는 그리스 신화에 나오는 미소년의 이름에서 유래했으며 복수초속을 일컫는다. 이 속의 유럽종은 꽃이 붉은데, 이를 사냥 중에 다쳐서 아프로디테(Aphrodite)의 팔에 안겨 죽은 아도니스(Adonis)의 피에 비유한 것이다.





양귀비과 현호색속

산괴불주머니

Corydalis speciosa Maxim.

약관심(LC)

성상	두해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 건조지
꽃	4~5월, 노란색
높이	0.5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종



학명 유래 — 속명 *Corydalis*는 종달새를 뜻하는 그리스어 korydalis에서 유래한 말로, 긴 꽃뿔이 달린 꽃의 형태가 종달새의 머리 깃을 닮아 붙여졌으며 현호색속을 일컫는다. 종소명 *speciosa*는 '아름다운, 화려한, 불만한 가치가 있는'이라는 뜻이다.

장미과 눈개승마속

한라개승마

Aruncus dioicus var. *aethusifolius*
(H.Lév.) H.Hara

위기(EN)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	8월, 흰색
높이	0.2m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 종소명 *dioicus*는 '자웅이주의'라는 뜻으로 암수딴그루임을 일컫는다. 변종명 *aethusifolius*는 그리스어에서 aithō(태우다)에서 유래한 속명 *Aethusa*(맛이 자극적이라는 특성을 반영하여 부여됨)에서 다시 유래한 이름으로 *Aethusa*속의 식물과 잎이 유사하다는 뜻이다.



미나리아재비과 투구꽃속

투구꽃

Aconitum jaluense Kom.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	9월, 보라색
높이	1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 투구꽃이라는 이름은 꽃의 모습이 투구를 닮아 붙여졌으며, 『조선식물향명집』에 그 이름이 최초로 보인다. 예로부터 생약명으로 사용하던 초오(草烏)는 초오두(草烏頭)의 줄임말로, 까마귀의 머리를 닮은 식물이라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Aconitum*은 그리스의 철학자 테오프라스토스(Theophrastos, B.C.371~B.C.287)가 유독성 식물에 사용한 이름인 Akoniton에서 유래했으며 투구꽃속을 일컫는다. 종소명 *jaluense*는 '압록강의'라는 뜻으로 분포지 또는 발견지를 나타낸다.


산형과 전호속

전호

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	5~6월, 흰색
높이	1m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 전호라는 이름은 중국에서 전래된 한자명 ‘前胡’(전호)에서 유래한 것으로 그 정확한 뜻은 알려져 있지 않다.

학명 유래 — 속명 *Anthriscus*는 향초의 일종인 southern chervil(*Scandix australis* L.)의 고대 그리스명 anthriskon에서 유래했으며 전호속을 일컫는다. 종소명 *sylvestris*는 ‘숲속에서 자라는, 야생의’라는 뜻이다.



산형과 당귀속

궁궁이

Angelica polymorpha Maxim.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지, 냇가 주변
꽃	8~9월, 흰색
높이	0.8~1.5m
광조건	반음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 궁궁이라는 이름은 ‘궁궁’(芎藭)과 ‘이’(葜미사)의 합성어로, ‘궁궁’(芎藭)은 활 모양으로 하늘을 향해 끝없이 이어져 있는 모습을 나타내며 약성이 주로 사람의 머리를 치료하는 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Angelica*는 그리스어 angelos(천사)에서 유래한 것으로 감심효과가 있는 약효와 관련하여 죽은 사람을 소생시킨다는 뜻에서 붙여졌으며 당귀속을 일컫는다. 종소명 *polymorpha*는 ‘여러 형태의’라는 뜻이다.

돌나물과 돌나물속

바위채송화

Sedum polytrichoides Hemsl.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀(다육)
자생 환경	숲 가장자리, 돌밭, 돌틈 및 옹벽
꽃	8~9월, 노란색
높이	0.1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 바위채송화라는 이름은 바위에서 자라는 채송화라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Sedum*은 플리니우스(Plinius, 23~79)가 돌나물과의 식물(houseleek)에 사용한 라틴명에서 유래했다. 라틴어 sedo(진정시키다) 또는 sedeo(앉다)에서 유래했다는 설도 있으며 돌나물속을 일컫는다. 종소명 *polytrichoides*는 '*Polytrichum*(솔이끼속)과 비슷한 (-oides)'이라는 뜻이다.



돌나물과 기린초속

애기기린초

Phedimus middendorffianus
(Maxim.) 't Hart

성상	여러해살이풀(다육)
자생 환경	고산지대 바위 위, 돌밭
꽃	6~8월, 노란색
높이	0.2m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 애기기린초라는 이름은 기린초에 비해 식물 전체의 크기가 작은 데서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Phedimus*는 그리스어 phaidimos(빛나는)에서 비롯된 것으로, 이 속의 어떤 종의 잎 모양에서 유래했다고 추정되며 기린초속을 일컫는다. 종소명 *middendorffianus*는 러시아 출신의 생물학자 Alexander Theodor von Middendorff(1815~1894)의 이름에서 유래했다.

지치과 모래지치속

모래지치

Argusia sibirica (L.) Dandy

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	해변, 해안사구
꽃	5~8월, 흰색
높이	0.25~0.4m
광조건	양지
토질	사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 모래지치라는 이름은 해안가 모래밭에서 자라는 지치라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 종소명 *sibirica*는 '시베리아의'라는 뜻으로 발견지 또는 분포지를 나타낸다.



대극과 대극속

암대극

Euphorbia jolkinii Boiss.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	해변 바위지대
꽃	4~5월, 연두색
높이	0.4~0.8m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 암대극이라는 이름은 한자명 '巖大戟(암대극)'에서 유래한 것으로, 해안가의 바위틈에서 주로 자라는 대극이라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Euphorbia*는 로마 시대 모리타니의 왕 유바 2세의 시의(侍醫)였던 Euphorbus(B.C.30~A.D.23)의 이름에서 유래한 것으로, 유액을 약용했기에 좋은(eu)과 식품(phorbe)이란 의미도 내포하고 있으며 대극속을 일컫는다. 종소명 *jolkinii*는 1854~1855년에 일본에서 식물을 채집한 Peter Jolkin(생물년 미상)의 이름에서 유래했다.

국화과 우산나물속

애기우산나물

Syneilesis aconitifolia (Bunge) Maxim

자료부족(DD)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	7~8월, 분홍색
높이	0.7~1.2m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 애기우산나물이라는 이름은 작은(애기) 우산나물이라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Syneilesis*는 그리스어로 '끝단을 접어 올림, 통합, 합성'이라는 뜻으로 한데 붙어서 말린 떡잎이 있는 것에서 유래했으며 우산나물속을 일컫는다. 종소명 *aconitifolia*는 '*Aconitum*(투구꽃속)과 비슷한 잎을 가진'이라는 뜻이다.



국화과 백두산떡썩속

백두산떡썩

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 건조지, 돌밭
꽃	6월, 분홍색
높이	0.06~0.25m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Antennaria*는 라틴어 antenna(더듬이)가 어원으로 수꽃이 곤충의 더듬이와 닮았기 때문에 유래했다. 종소명 *dioica*는 '별도의 식물에 수꽃과 암꽃이 핀다'라는 뜻이다.

산형과 갯사상자속

갯사상자

Cnidium japonicum Miq.

약관심(LC)

성상	두해살이풀
자생 환경	해변, 돌틈 및 응벽, 건조지
꽃	8~10월, 흰색
높이	0.1~0.3m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 갯사상자라는 이름은 바닷가에서 자라는 사상자라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Cnidium*은 해파리나 켄기풀을 의미하는 그리스어 knide 또는 라틴어 cnide에서 유래한 것으로, 꽃 모양이나 두드러기를 치료하는 약효와 연관된 것으로 보이며 갯사상자속을 일컫는다. 종소명 *japonicum*은 '일본의'라는 뜻으로 발견지를 나타낸다.



앵초과 봄맞이꽃속

금강봄맞이

Androsace cortusifolia Nakai

위기(EN)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	돌틈 및 응벽
꽃	6월, 흰색
높이	0.07~0.12m
광조건	반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 금강봄맞이라는 이름은 금강산에서 자라는 봄맞이라는 뜻에서 붙여졌다. 금강산에서 최초로 발견되었다.

학명 유래 — 속명 *Androsace*는 디오스코리데스(Dioscorides, 40~90)가 다른 식물에 붙인 이름을 전용한 것인데, 그리스어 andros(남자, 수컷)와 sakos(방패)의 합성어로 잎 또는 꽃밥의 모양을 묘사한 것이며 봄맞이꽃속을 일컫는다. 종소명 *cortusifolia*는 '*Cortusa*(종다리꽃속)와 잎이 유사한'이라는 뜻이다.

미나리아재비과 바람꽃속

평의바람꽃

Anemone raddeana Regel

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	4~5월, 흰색
높이	0.15~0.2m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 평의바람꽃이라는 이름은 땅속줄기에서 나온 잎이나 꽃받침 등의 모양이 평의 발을 닮았다는 뜻에서, 또는 평이 서식하는 산 숲속에서 자라는 바람꽃이라는 뜻에서 붙여진 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Anemone*는 그리스어 Anemos(바람)가 어원으로 '바람의 딸'을 뜻하는 지중해산 아네모네의 그리스명에서 전용되어 바람꽃속을 일컫는다. 종소명 *raddeana*는 폴란드에서 태어나 조지아에 정착한 독일인 자연연구가 Gustav Ferdinand Richard Radde(1831~1903)의 이름에서 유래했다.



협죽도과 수궁초속

개정향풀

Apocynum lancifolium Russanov

준위협(NT)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	6월, 분홍색
높이	0.4~0.8m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 종소명

*lancifolium*은 lancea(창)와 folium(잎)의 합성어로 '피침모양 잎의'라는 뜻이다.

미나리아재비과 췌의다리속

금췌의다리

Thalictrum rochebruneum
Franch. & Sav.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월, 자주색
높이	0.7~1m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 금췌의다리라는 이름은 수술대가 노란색(금색)의 실모양을 이루는 췌의다리 종류라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Thalictrum*은 디오스코리데스(Dioscorides, 40~90)가 고수 잎을 닮은 식물에 부여한 그리스어 Taliktron, 플리니우스(Plinius, 23~79)가 이 속의 한 식물에 부여한 라틴어 thalictrum 또는 thalitruum에서 유래했으며 췌의다리속을 일컫는다.





미나리아재비과 췌의다리속

췌의다리

Thalictrum aquilegifolium var.
sibiricum Regel & Tiling

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월, 흰색
높이	0.5~1m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 췌의다리라는 이름은 길게 뻗은 줄기에 드문드문 마디가 있는 모습을 췌(雉)의 다리(脚)에 비유한 데서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Thalictrum*은 디오스코리데스(Dioscorides, 40~90)가 고수 잎을 닮은 식물에 부여한 그리스어 Taliktron, 플리니우스(Plinius, 23~79)가 이 속의 한 식물에 부여한 라틴어 thalictrum 또는 thalitruum에서 유래했으며 췌의다리속을 일컫는다. 변종명 *sibiricum*은 '시베리아 지역의'라는 뜻으로 유럽에 분포하는 종을 기본종으로 하고 동아시아에 분포하는 종을 변종으로 취해 붙여졌다.

넉줄고사리과 넉줄고사리속

넉줄고사리

Davallia mariesii H.J.Veitch

약관심(LC)

성상	양치식물(작생)
자생 환경	돌틈 및 웅벽, 바위길, 수피
포자기	6~8월
높이	0.15~0.2m
광조건	반음지
토질	사토, 착생식물 용토(수태, 부석, 바크 등)
번식	포자 번식, 포기나누기



국명 유래 — 넉줄고사리라는 이름은 덩굴성 고사리라는 뜻에서 유래한 것으로 보인다. ‘넉줄’은 방언에서 덩굴(넉출)을 뜻하므로, 바위 위로 뻗는 땅속줄기를 덩굴로 보아 넉줄고사리라는 이름이 붙여진 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Davallia*는 영국인 Edm. Davall(1763~1799)의 이름에서 유래했으며 넉줄고사리속을 일컫는다. 종소명 *mariesii*는 영국 식물학자로 중국과 일본 식물을 채집한 Charles Maries(1851~1902)의 이름에서 유래했다.



봉의꼬리과 공작고사리속

공작고사리

Adiantum pedatum L.

준위협(NT)

성상	양치식물
자생 환경	숲속
포자기	6~9월
높이	0.2~0.4m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	포자 번식, 포기나누기



국명 유래 — 공작고사리라는 이름은 잎의 모양이 공작이 날개를 편 것과 같다는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Adiantum*은 그리스어 a(부정)와 dianotos(젖다)의 합성어로 비에 젖지 않는 잎을 가진 데서 유래했으며 공작고사리속을 일컫는다. 종소명 *pedatum*은 '새 발 모양의'라는 뜻으로 잎의 모양에서 유래했다.

개고사리과 개고사리속

개고사리

Athyrium niponicum (Mett.) Hance

약관심(LC)

성상	양치식물
자생 환경	숲 가장자리
포자기	7~9월
높이	0.2~0.4m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	포자 번식, 포기나누기



국명 유래 — 개고사리라는 이름은 고사리와 유사한데 이용 가치가 없거나 못하다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Athyrium*은 '문이 없는, 열린'이라는 뜻의 그리스어 *athyros*, *athyron*에서 유래한 것으로 포자낭군이 자라면서 포막의 가장자리로 나온다고 해서 붙여졌으며 개고사리속을 일컫는다. 종소명 *niponicum*은 '일본의'라는 뜻이다.



야산고비과 청나래고사리속

청나래고사리

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

약관심(LC)

성상	양치식물
자생 환경	숲속, 계곡 주변
포자기	7~9월
높이	0.8~1m
광조건	반음지, 음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	포자 번식, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Matteuccia*는 이탈리아의 자연과학자 Carlo Matteucci(1811~1868)에서 유래되었다. 종소명 *struthiopteris*은 '타조 날개'라는 뜻이다.

관중과 관중속

관중

Dryopteris crassirhizoma Nakai

약관심(LC)

성상	양치식물
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
포자기	6~9월
높이	0.5~1m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	포자 번식, 포기나누기



국명 유래 — 관중이라는 이름은 한자어 관중(貫衆)에서 유래했다. 위에서 내려다보면 방사상으로 무리 지어 난 엽축 가운데에 뿌리가 있어 마치 뿌리 하나가 여러 엽축을 꿰고 있는 듯해서 붙여진 이름이다.

학명 유래 — 속명 *Dryopteris*는 그리스어 dryos(참나무 또는 나무)와 pteris(양치식물)의 합성어로 참나무 숲에서 자라는 양치식물이라는 뜻이며 관중속을 일컫는다. 종소명 *crassirhizoma*는 ‘뿌리가 큰, 큰 땅속줄기를 가진’이라는 뜻이다.



관중과 쇠고사리속

일색고사리

Arachniodes standishii (T.Moore)

Ohwi

약관심(LC)

성상	상록성 양치식물
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 숲속 바위지대
포자기	7~9월
높이	0.8~1.2m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	포자 번식, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Arachniodes*는 그리스어 arachne(거미)와 -odes(~을 닮은)의 합성어로 거미를 닮았다는 뜻이며 쇠고사리속을 일컫는다. 종소명 *standishii*는 19세기 영국 양묘업자 John Standish의 이름에서 유래했다.

관중과 십자고사리속

십자고사리

Polystichum tripterum (Kunze)

C.Presl

약관심(LC)

성상	반상록성 양치식물
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 숲속 바위지대
포자기	7~9월
높이	0.6m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	포자 번식, 포기나누기



국명 유래 — 십자고사리라는 이름은 좌우의 첫째 깃조각만 길게 옆으로 자라 앞 전체 모양이 ‘十’자와 같은 모양을 이루는 특징이 있으므로 십(十)자를 이루는 고사리라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Polystichum*은 그리스어 polys(많은)와 stichos(열, 列)의 합성어로 이 속의 어떤 종에서 포자낭군이 많은 열을 이룬 데서 유래했으며 십자고사리속을 일컫는다. 종소명 *tripterum*은 ‘3개의 날개가 있는’이라는 뜻으로 하나의 잎자루에 3개의 깃모양겹잎이 달리는 것에서 유래했다.



관중과 십자고사리속

낙시고사리

Polystichum craspedosorum
(Maxim.) Diels

약관심(LC)

성상	상록성 양치식물
자생 환경	숲속 바위지대
포자기	7~9월
높이	0.1~0.2m
광조건	반음지, 음지
토질	사토
번식	포자 번식



국명 유래 — 낙시고사리라는 이름은 잎의 끝부분이 길게 자라서 땅에 닿으면 새로운 개체를 만드는 것을 낙시에 비유하고 고사리를 닮았다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Polystichum*은 그리스어 polys(많은)와 stichos(열, 列)의 합성어로 이 속의 어떤 종에서 포자낭군이 많은 열을 이룬 데서 유래했으며 십자고사리속을 일컫는다. 종소명 *craspedosorum*은 '둘러싸인 포자낭군의'라는 뜻이다.

풀고사리와 발풀고사리속

발풀고사리

Dicranopteris pedata (Houtt.)

Nakaike

약관심(LC)

성상	상록성 양치식물
자생 환경	숲 가장자리, 초지
높이	0.5~3m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	포자 번식



국명 유래 — 발풀고사리라는 이름은 식물의 모습이 새의 발과 같이 생겼고 풀고사리를 닮았다는 뜻으로, 학명에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Dicranopteris*는 dicranoss(둘로 갈라지는)와 pteris(양치식물)의 합성어로, 잎자루 끝에서 둘로 갈라져 좌우 이엽(二葉)을 이루는 것에서 유래했으며 발풀고사리속을 일컫는다.



뽕나무과 무화과나무속

애기모람

Ficus thunbergii Maxim.

성상	상록 활엽 관목, 덩굴
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 바위 위
열매	10~1월, 자주색
높이	2~3m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목(유년상의 가지만)



학명 유래 — 속명 *Ficus*는 무화과나무를 일컫는 라틴어로 무화과를 뜻하는 그리스어 sycon 또는 좁다는 의미의 아카드어 piqu에서 유래했으며 무화과나무속을 일컫는다. 종소명 *thunbergii*는 스웨덴 식물학자로 일본 식물을 연구한 Carl Peter Thunberg(1743~1828)의 이름에서 유래했다.

꿀풀과 백리향속

섬백리향

Thymus quinquecostatus var.
magnus (Nakai) Kitam.

위급(CR)

특산식물

성상	낙엽 활엽 반관목
자생 환경	돌밭, 암석지대, 초지
꽃	6~8월, 분홍색
높이	0.1~0.3m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 섬백리향이라는 이름은 울릉도(섬)에 분포하는 백리향이라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Thymus*는 thymiao(향기, 향수)가 어원인 고대 그리스명에서 유래한 것으로, 신에게 바치는 것이었기에 신성하다는 의미도 내포하며 백리향속을 일컫는다. 종소명 *quinquecostatus*는 '5개의 주맥이 있는'이라는 뜻이다.



장미과 장미속

둥근인가목

Rosa spinosissima L.

자료부족(DD)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 초지, 암석지대
꽃	5월, 흰색
높이	1m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 둥근인가목이라는 이름은 열매가 원모양인 인가목이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Rosa*는 아카드어 *rossu*(붉은)에서 유래한 고대 라틴명으로 장미속을 일컫는다.

종소명 *spinosissima*는 ‘가시가 밀생(密生)하는’이라는 뜻이다.

장미과 조팝나무속

꼬리조팝나무

Spiraea salicifolia L.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	습지, 초지
꽃	7~8월, 분홍색
높이	1~1.5m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 꼬리조팝나무라는 이름은 꼬리같이 긴 꽃차례가 있는 조팝나무라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Spiraea*는 그리스어 speira(나선, 화환, 바퀴)에 어원을 둔 speiraia(이 식물로 화환을 만들었고 어떤 종은 열매의 모양이 나선형이어서 붙여진 이름)에서 전용·유래했으며 조팝나무속을 일컫는다. 종소명 *salicifolia*는 '*Salix*(버드나무속)와 비슷한 잎의'라는 뜻으로 잎이 버드나무를 닮은 것에서 유래했다.



장미과 국수나무속

국수나무

Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대, 냇가 주변
꽃	5~6월, 흰색
높이	1~2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 국수나무라는 이름은 줄기의 뽕침이나 흰색의 속(pith)이 국수 가락과 비슷한 나무라는 뜻에서 유래했다. 옛날 아이들이 소꿉 놀이를 할 때 나무의 줄기에서 속을 뽑아 국수라고 부르며 놀았다고도 하며, 가지를 잘라 벗기면 껍질이 국수같이 얇게 벗겨진다는 뜻으로 해석하는 견해도 있다.

학명 유래 — 속명 *Stephanandra*는 그리스어 Stephanos(관)와 andron(수술)의 합성어로, 수술이 관(冠) 모양이어서 붙여졌으며 국수나무속을 일컫는다. 종소명 *incisa*는 '예리하게 갈라진'이라는 뜻이다.

꼭두서니과 구슬꽃나무속

구슬꽃나무

Adina rubella Hance

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 냇가 주변, 바위틈
꽃	7~8월, 흰색
높이	3~4m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



학명 유래 — 속명 *Adina*는 그리스어 adinos(균중)에서 유래했다. 종소명 *rubella*는 '약간 빨간색'이라는 뜻이다.



버드나무과 버드나무속

갯버들

Salix gracilistyla Miq.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	수변
꽃	3~4월, 회색
높이	2~3m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 갯버들은 주로 물가(갯)에서 자라는 버들(버드나무)이라는 뜻에서 유래했다. 예전에는 버드나무와 유사하거나 그보다 못하다는 뜻에서 '개버들'이라고도 했다.

학명 유래 — 속명 *Salix*는 버드나무나 갯버들의 고대 라틴명으로 켈트어 sal(가깝다)과 lis(물)의 합성어에서 유래했고, 물가에서 자라는 특성 때문에 붙여졌으며 버드나무속을 일컫는다. 종소명 *gracilistyla*는 '가늘고 긴 암술대의'라는 뜻이다.

꿀풀과 순비기나무속

좁목형

Vitex negundo var. *incisa*
(Lam.) C.B. Clarke

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대, 돌밭, 하천제방
꽃	6~8월, 보라색
높이	2m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



학명 유래 — 속명 *Vitex*는 플리니우스(Plinius, 23~79)가 순비기나무 종류에 붙인 라틴명으로, vieo(여다, 땅다, 휘감다)가 어원이며 이 속의 식물로 바구니를 엮은 것에서 기원하며 순비기나무속을 일컫는다. 변종명 *incisa*는 '예리하게 갈라지는'이라는 뜻이다.



콩과 자귀나무속

자귀나무

Albizia julibrissin Durazz.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 소교목
자생 환경	숲 가장자리, 건조지, 관목지대
꽃	6~7월, 분홍색
높이	3~5m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 자귀나무라는 이름은 잠을 자는 나무라는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다. 한글명은 17세기에 저술된 『동의보감』에 ‘자귀나모’로 처음 나타나지만, 15세기에 저술된 『향약집성방』은 향명을 ‘佐歸木’(좌귀목)으로 기록했는데 이를 한글로 표기하면 ‘자귀나모’가 된다. 현대어 ‘잠자다’의 15세기 표현은 ‘좀자다’이므로 ‘자귀’는 ‘자’(잠자다)와 ‘귀’(어귀의 의미)가 합쳐진 말로 보인다.

학명 유래 — 속명 *Albizia*는 자귀나무를 유럽에 최초로 소개한 18세기의 이탈리아 자연사학자 Filippo Delgi Albizzi(생몰년 미상)의 이름에서 유래했으며 자귀나무속을 일컫는다. 종소명 *julibrissin*은 페르시아어 gul-i abrisham에서 유래한 말로 비단꽃(silk flower)이라는 뜻이다.

중간 질감

돌나물과 바위솔속

연화바위솔

Orostachys iwarenge (Makino) H.Hara

자료부족(DD)

성상	여러해살이풀(다육)
자생 환경	해안 절벽 바위틈
꽃	10~11월, 흰색
높이	0.1~0.5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종



학명 유래 — 속명 *Orostachys*는 그리스어 oros(산)와 stachys(이삭)의 합성어로, 산에서 자생하고 이삭 모양의 꽃차례를 이루는 데서 유래했으며 바위솔속을 일컫는다.



홀아비꽃대와 홀아비꽃대속

옥녀꽃대

Chloranthus fortunei (A.Gray) Solms

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	4~5월, 흰색
높이	0.15~0.4m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Chloranthus*는 그리스어 chlor(녹색)와 anthus(꽃)의 합성어로, 녹색 꽃대축을 표현한 것으로 보이며 홀아비꽃대속을 일컫는다. 종소명 *fortunei*는 스코틀랜드인으로 아시아 지역의 식물을 채집한 Robert Fortune(1812~1880)의 이름에서 유래했다.

멜란티움과 삿갓나물속

삿갓나물

Paris verticillata M.Bieb.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 초지, 관목지대
꽃	6~7월, 연두색
높이	0.2~0.4m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 삿갓나물이라는 이름은 잎이 돌려나기를 하는 모양이 삿갓을 닮았고 어린잎은 나물로 식용한 데서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Paris*는 라틴어 par(같은)에 어원을 두고 있는데, 꽃잎이 같은 모양이어서 유래했다는 견해와 그리스 신화의 파리스(Paris)에서 유래했다는 견해가 있으며 삿갓나물속을 일컫는다. 종소명 *verticillata*는 ‘윤생의’라는 뜻으로 잎이 돌려나기를 하는 것에서 유래했다.



질경이과 냉초속

냉초

Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월, 보라색
높이	0.5~0.9m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 냉초라는 이름은 한자명 '冷草'(냉초)에서 유래한 것으로, 냉증(冷症)을 치료하는 약으로 사용해서 붙여졌다. 땅속줄기를 여성의 냉대하증(冷帶下症)을 치료하는 약재로 사용했다.

학명 유래 — 속명 *Veronicastrum*은 *Veronica*(개불알풀속)와 -astrum(유사한)의 합성어로, *Veronica*속 식물과 유사하다는 뜻에서 유래했으며 냉초속을 일컫는다. 종소명 *sibiricum*은 '시베리아의'라는 뜻으로 발견지를 나타낸다.

매자나무과 삼지구엽초속

삼지구엽초

Epimedium koreanum Nakai

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	4~5월, 흰색
높이	0.3m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 삼지구엽초(三枝九葉草)

라는 이름은 엽축에서 갈라진

작은잎자루가 3개이고

작은잎자루마다 달리는 잎이 3개씩

모두 9개라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Epimedium*은

그리스 지명 Media에서 유래한

epimedium이라는 식물명이

어원이지만 어떤 식물이었는지는

미상이며 전용되어 삼지구엽초속을

일컫는다. 종소명 *koreanum*은

‘한국의’라는 뜻으로 한국이

원산지임을 나타낸다.





멜란티움과 연영초속

연영초

Trillium camschatcense Ker Gawl.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	5~6월, 흰색
높이	0.2~0.3m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 연영초라는 이름은 수명을 연장한다는 뜻이 있는 한자명 연령초(延齡草)에서 유래한 것으로, 한약재로 사용하는 것과 관련이 있다.

학명 유래 — 속명 *Trillium*은 그리스어 treis(3)에서 유래한 것으로, 잎과 흰 꽃덮이가 모두 3장이어서 붙여졌으며 연영초속을 일컫는다. 종소명 *camschatcense*는 '캄차카에 분포하는'이라는 뜻이다.

비짜루과 비비추속

일월비비추

Hosta capitata (Koidz.) Nakai

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 고산초지
꽃	8~9월, 보라색
높이	0.5~0.6m
광조건	반음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Hosta*는 오스트리아 의사 Nicholas Thomas Host(1761~1834)의 이름에서 유래했으며 비비추속을 일컫는다. 종소명 *capitata*는 '머리모양의, 머리모양꽃차례의'라는 뜻으로 꽃차례의 모양에서 유래했다.





난초과 감자난초속

감자난초

Oreorchis patens (Lindl.) Lindl.

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	5~6월, 노란색
높이	0.3~0.5m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 감자난초라는 이름은 감자 모양의 둥근 가짜비늘줄기가 달리는 난초라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Oreorchis*는 그리스어 oreos(바위, 산)와 charis(난초속 식물)의 합성어로, 바위틈에서 자라는 난초 종류라는 뜻이며 감자난초속을 일컫는다.

종소명 *patens*는 '열려 있는'이라는 뜻으로 꽃의 모양을 묘사한 것으로 보인다.

멜란티움과 여로속

박새

Veratrum oxysepalum Turcz.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	6~7월, 흰색
높이	1.5m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 박새라는 이름의 유래와 의미에 대해 정확히 알려진 바는 없다. 다만 박새를 고유어로 볼 경우 '박'과 '새'의 합성어로 분석할 수 있는데, '박'은 일반적으로 둥근 형태인 것에 붙이는 말이고 '새'는 일반적으로 날카로운 잎을 가진 벼과와 그 유사한 풀 종류에 대한 우리말 표현이다. 따라서 외떡잎식물로 벼과 식물처럼 짝이 돌고 자라는 것에서 유래했다고 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Veratrum*은 라틴어 verator(예언자)에서 유래한 것으로, 해당 식물의 뿌리에 재채기를 일으키는 성분이 있는 점을 '재채기 후에 하는 말은 진실'이라는 북유럽의 전설과 관련지은 것이며 여로속을 일컫는다. 종소명 *oxysepalum*은 '뾰족한 꽃받침이 있는'이라는 뜻이다.





난초과 새우난초속

새우난초

Calanthe discolor Lindl.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	4~5월, 백색, 연한 자주색
높이	0.3~0.5m
광조건	반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 새우난초라는 이름은 가짜비늘줄기에 마디가 있고 새우의 등처럼 굽은 난초라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Calanthe*는 그리스어 calos(아름다움)와 anthos(꽃)의 합성어로, 아름다운 꽃을 가지고 있어 붙여졌으며 새우난초속을 일컫는다. 종소명 *discolor*는 '다른 색의'라는 뜻으로 꽃잎의 색깔이 다른 것에서 유래했다.

천남성과 천남성속

섬남성

Arisaema takesimense Nakai

준위협(NT)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	5~7월, 자주색
높이	0.3~0.5m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Arisaema*는 그리스어 aris(arum이라는 식물의)와 haima(피)의 합성어로, 잎에 반점이 있는 것에서 유래했으며 천남성속을 일컫는다. 종소명 *takesimense*는 ‘울릉도에 분포하는’이라는 뜻이다.



붓꽃과 붓꽃속

대청부채

Iris dichotoma Pall.

위기(EN)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	7~8월, 보라색
높이	0.7m
광조건	양지
토질	사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 대청부채라는 이름은 서해 대청도에서 자라고 잎이 범부채를 닮은 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Iris*는 그리스 신화에 나오는 신들의 전령으로 무지개를 의인화한 신의 이름이며 붓꽃속을 일컫는다. 종소명 *dichotoma*는 '가위 모양으로 분지(分枝)하는'이라는 뜻으로 가지가 나누어지는 모양 때문에 붙여졌다.

장미과 양지꽃속

가락지나물

Potentilla anemonifolia Lehm.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	5~7월, 노란색
높이	0.2~0.6m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 —가락지나물이라는 이름은 아이들이 꽃을 따서 가락지를 만들어 놀이에 사용하고 나물로 식용하는 것에서 유래했다.

학명 유래 —속명 *Potentilla*는 라틴어 potens(강력한, 효과적인)에서 유래했는데 이 속 어떤 종들의 약성을 언급한 것이며 양지꽃속을 일컫는다.



미나리아재비과 투구꽃속

세뿔투구꽃

Aconitum austrokoreense Koidz.

준위협(NT)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	9월, 보라색
높이	0.6~0.8m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Aconitum*은 그리스의 철학자 테오프라스토스(Theophrastos, B.C.371~B.C.287)가 유독성 식물에 사용한 이름인 Akoniton에서 유래했으며 투구꽃속을 일컫는다.

산형과 기름나물속

갯기름나물

Peucedanum japonicum Thunb.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	건초지, 해안가, 해안초지
꽃	6~8월, 흰색
높이	0.6~1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 갯기름나물이라는 이름은 ‘갯’과 ‘기름나물’의 합성어로, 바닷가(갯)에서 나는 기름나물이라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Peucedanum*은 그리스어 *peuke*(소나무)와 *danos*(마른, 건조한)의 합성어로, 쓴맛이 나는 것에서 유래했으며 기름나물속을 일컫는다. 종소명 *japonicum*은 ‘일본의’라는 뜻으로 최초 발견지를 나타낸다.



콩과 갯활랑나물속

갯활랑나물

Thermopsis fabacea (Pall.) DC.

위급(CR)

성상	여러해살이풀
자생 환경	건초지, 해안가, 해안초지
꽃	5~6월, 노란색
높이	0.4~0.8m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Thermopsis*는 그리스어 thermos(루피너스)에서 유래한 것으로 루피너스와 닮았다는 뜻이다. 종소명 *fabacea*는 라틴어 Faba(누에콩)에서 유래한 것으로 누에콩과 유사하게 생겼다는 뜻이다.

배추과 황새냉이속

미나리냉이

Cardamine leucantha (Tausch)

O.E.Schulz

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	4~5월, 흰색
높이	0.5m
광조건	반음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 미나리냉이라는 이름은 잎은 미나리를 닮았고 꽃은 냉이를 닮았다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Cardamine*는 식용하는 논냉이의 일종을 뜻하는 그리스어 kardamon에서 유래했으며 황새냉이속을 일컫는다. 종소명 *leucantha*는 ‘하얀 꽃의’라는 뜻으로 흰색 꽃이 피는 것에서 유래했다.



미나리아재비과 노루삼속

노루삼

Actaea asiatica H.Hara

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	5~6월, 흰색
높이	0.4~0.7m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 노루삼이라는 이름은 꽃차례가 노루의 꼬리를 닮았고 잎이 삼(麻)을 닮은 데서 유래한 이름으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Actaea*는 냄새가 강한 식물이라는 뜻에서 노루삼을 지칭한 라틴어 *actaea*, 또는 딱총나무를 뜻하는 그리스어 *aktea*가 잎과 열매가 닮은 것에서 전용된 것으로 노루삼속을 일컫는다. 종소명 *asiatica*는 '아시아의'라는 뜻으로 주된 분포지 또는 발견지를 나타낸다.

운향과 백선속

백선

Dictamnus dasycarpus Turcz.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	5~6월, 분홍색
높이	0.9m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 백선이라는 이름은 한자명 ‘白鮮’(백선)에서 비롯한 것인데, 이는 白羊鮮(백양선)을 축약한 것으로 식물체에서 나는 강한 향기가 마치 양에서 나는 노린내와 같고 뿌리가 희고 곱다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Dictamnus*는 이 속 어떤 식물의 주산지(主產地)인 크레타섬의 산 이름 Dicte에서 유래한 그리스명 diktamnion이 어원으로 백선속을 일컫는다.





국화과 산비장이속

산비장이

Serratula coronata subsp. *insularis*
(Iljin) Kitam.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~10월, 자주색
높이	0.3~1.4m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Serratula*는 톱니 모양의 잎을 가리키는 '작은 톱니'라는 뜻에서 유래했다. 아종명 *insularis*는 라틴어로 '섬의'라는 뜻이다.

산형과 당귀속

참당귀

Angelica gigas Nakai

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	8~9월, 자주색
높이	1~2m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Angelica*는 그리스어 angelos(천사)에서 유래한 것으로 강심효과가 있는 약효와 관련하여 죽은 사람을 소생시킨다는 뜻에서 붙여졌으며 당귀속을 일컫는다.





백합과 죽대아재비속

금강애기나리

Streptopus ovalis (Ohwi)

F.T.Wang & Y.C.Tang

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	4~6월, 황백색
높이	0.1~0.3m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Streptopus*는 그리스어 *steptos*(꼬이다)와 *pous*(발)의 합성어로, 꽃자루가 잎 아래에 꼬여 있는 것을 나타내며 죽대아재비속을 일컫는다. 종소명 *ovalis*는 '넓은타원모양의'라는 뜻이다.

꽃고비과 꽃고비속

꽃고비

Polemonium caeruleum subsp.
kiushianum (Kitam.) H.Hara

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월, 보라색
높이	0.6~0.9m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 꽃고비라는 이름은 잎이 고비를 닮았는데 화려한 꽃을 피운다고 해서 붙여진 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Polemonium*은 *Hypericum*(물레나물속) 식물의 어떤 종에 대한 그리스명 polemonion에서 유래한 것으로 꽃고비속을 일컫는다. 종소명 *caeruleum*은 '푸른색의'라는 뜻으로 꽃의 색깔에서 유래했다.



야산고비과 야산고비속

야산고비

Onoclea interrupta (Maxim.)

Ching & P.C.Chiu

약관심(LC)

성상	양치식물
자생 환경	숲 가장자리, 초지
포자기	9~10월
높이	0.2~0.5m
광조건	반음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	포자 번식, 포기나누기



국명 유래 — 야산고비라는 이름은 야산에서 자라는 고비를 닮은 식물이란 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Onoclea*는 그리스어 onos(그릇)와 kleio(폐쇄)의 합성어로 포자낭군이나 돌돌 말린 홀씨잎을 뜻하며, 디오스코리데스(Dioscorides, 40~90)가 다른 식물명에 onokleia를 사용했으나 이를 전용하여 야산고비속을 일컫는다. 종소명 *interrupta*는 ‘끊어졌다 이어졌다 하는, 중단된’이라는 뜻이다.

고비과 고비속

고비

Osmunda japonica Thunb.

약관심(LC)

성상	양치식물
자생 환경	숲 가장자리, 초지
포자기	3~5월
높이	0.6~1m
광조건	반음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	포자 번식, 포기나누기



국명 유래 — 고비라는 이름의 어원에 대해 명확히 밝혀진 바는 없으나, 고사리와 마찬가지로 짝이 둘을 때의 구부러진 생김새 때문에 휘었다는 뜻의 ‘곱다’와 ‘이’(명사와 접미사)가 합쳐져 고비→고비로 변했을 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Osmunda*는 어원이 불확실하나 영국 민담에 덴마크의 침공 당시 양치식물 속에 처와 아이들을 숨겼다는 뱃사공의 이름 Osmund에서 유래했다거나, 영어 또는 프랑스어의 양치식물(fern)에 대한 중세어에서 유래했다는 설이 있으며 고비속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 ‘일본의’라는 뜻이다.



봉의꼬리과 고비고사리속

가지고비고사리

Coniogramme japonica
(Thunb.) Diels

약관심(LC)

성상	상록성 양치식물
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
포자기	7~9월
높이	0.8~1m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	포자 번식, 포기나누기



국명 유래 — 가지고비고사리라는 이름은 고비고사리에 비해 잎의 가는맥이 가지를 쳐서 그물맥을 이룬다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Coniogramme*는 그리스어 conia(선 모양)와 gramme(분말)의 합성어로 포자낭균이 선형으로 자라며 포자낭에 포막이 없어 가루처럼 보이는 것에서 유래했으며 고비고사리속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 '일본의'라는 뜻으로 최초 발견지 또는 분포지를 나타낸다.

고란초과 석위속

세뿔석위

Pyrrosia hastata (Thunb. ex Houtt.) Ching

약관심(LC)

성상	상록성 양치식물(작생)
자생 환경	숲 가장자리, 돌틈 및 옹벽, 수피, 바위겉면
포자기	7~9월
높이	0.1~0.2m
광조건	반음지, 음지
토질	사토
번식	포자 번식, 포기나누기



국명 유래 — 세뿔석위라는 이름은 잎이 3~5개로 창살같이 갈라지는 석위라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Pyrrosia*는 그리스어 pyro(불꽃)에서 유래한 것으로 비늘조각이 붉은 차(茶) 색이어서 붙여졌으며 석위속을 일컫는다. 종소명 *hastata*는 '칼끝 모양의'라는 뜻으로 갈라진 잎이 날카로워서 붙여졌다.



미나리아재비과 으아리속

세잎종덩굴

Clematis koreana Kom.

약관심(IC)

성상	낙엽 활엽 덩굴
자생 환경	숲 가장자리
꽃	6~8월, 자주색
높이	1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 세잎종덩굴이라는 이름은 잎이 삼출접임으로 되어 있는 종덩굴이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Clematis*는 그리스어 clema(가지, 가는 가지)에서 유래했으며, 가늘고 길게 뻗어나가는 줄기의 특성을 나타낸 것으로 으아리속을 일컫는다. 종소명 *koreana*는 '한국의'라는 뜻이다.

다래나무과 다래나무속

개다래

Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Planch. ex Maxim.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 덩굴
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	6~7월, 흰색
높이	5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 개다래라는 이름은 다래와 비슷하지만 열매가 헛바닥을 쏘는 듯한 맛을 낼 뿐 달지 않아 먹기가 쉽지 않고 쓰임새가 덜하여 다래보다 못하다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Actinidia*는 그리스어 aktin(광선)에서 유래한 것으로 방사상의 암술머리를 나타내며 다래나무속을 일컫는다. 종소명 *polygama*는 '잡성주의'라는 뜻이다.





수국과 바위수국속

바위수국

Schizophragma hydrangeoides
Siebold & Zucc.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 덩굴
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	5~6월, 흰색
높이	10m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목



학명 유래 — 속명

*Schizophragma*는 그리스어 skhizo(갈라지다, 나뉘다)와 phragma(벽, 울타리)에서 유래했으며 열매 내부에 격벽이 있어 나누어지는 특성을 나타내며 바위수국속을 일컫는다.

포도과 포도속

왕머루

Vitis amurens Rupr.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 덩굴
자생 환경	숲 가장자리
열매	9월, 검정색
높이	10m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 왕머루라는 이름은 야생하는 머루 종류 중에서 열매가 보다 크고 더 맛이 있다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Vitis*는 아카드어 ebitu(뭍인)에 어원을 둔 라틴어 vietum(굽은, 땅은, 엮은)에서 유래했으며 포도의 고대 라틴명으로 포도속을 일컫는다. 종소명 *amurensis*는 '아무르강 유역에 분포하는'이라는 뜻이다.





꿀풀과 순비기나무속

순비기나무

Vitex rotundifolia L.f.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	해안초지, 사구
꽃	7~10월, 보라색
높이	0.3~0.6m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 순비기나무라는 이름은 제주 방언 ‘숨비기낭’서 유래한 것으로, 나무의 줄기가 모래땅에 숨어 뻗어 나가는 특성 때문에 붙여졌다. 제주 방언에서 ‘숨비다’는 ‘(해녀가) 숨을 죽이고 깊은 물속으로 들어가다’라는 뜻으로, 나무의 뿌리가 모래땅에 숨어 뻗어 나가는 모습이 숨비는 것과 비슷하다.

학명 유래 — 속명 *Vitex*는 플리니우스(Plinius, 23~79)가 순비기나무 종류에 붙인 라틴명으로, vico(엮다, 땅다, 휘감다)가 어원이며 이 속의 식물로 바구니를 엮은 것에서 기원하며 순비기나무속을 일컫는다. 종소명 *rotundifolia*는 ‘둥근 잎의’라는 뜻이다.

장미과 다정큼나무속

다정큼나무

Rhaphiolepis indica var. *umbellata*
(Thunb. ex Murray) H.Ohashi

약관심(LC)

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 해안초지, 해안돌틈
꽃	5~6월, 흰색
높이	2~4m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 다정큼나무라는 이름은 가지 여러 개가 끝에서 모여 다정하게 크는 나무라는 뜻에서 유래했다고 추정하는 견해가 있다.

학명 유래 — 속명 *Rhaphiolepis*는 그리스어 *rhaphis*(침)와 *lepis*(비늘조각)의 합성어로, 침(바늘) 모양의 포(苞)에서 유래했으며 다정큼나무속을 일컫는다. 종소명 *indica*는 '인도의'라는 뜻으로 원산지를 나타낸다.



팔꽃나무과 백서향속

백서향

Daphne kiusiana Miq.

위기(EN)

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	2~4월, 흰색
높이	1m
광조건	반음지, 음지
토질	사토, 유기질토
번식	파종, 삽목



학명 유래 — 속명 *Daphne*는 아카드어 dapnu(영웅적인, 싸움의)가 어원으로 월계수(*Laurus nobilis*)의 그리스명이었으나 전용되어 잎의 형태가 비슷한 백서향속을 일컫는다. 종소명 *kiusiana*는 '일본 규슈의'라는 뜻이다.

인동과 인동속

구슬덩대이

Lonicera vesicaria Kom.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대, 돌밭
꽃	5~6월, 흰색, 노란색
높이	0.8~1.6m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 구슬덩대이라는 이름은 덩대이나마에 비해 열매가 구슬처럼 둥글다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Lonicera*는 독일 수학자이자 식물학자인 Adam Lonitzer(1528~1586)의 이름에서 유래했으며 인동속을 일컫는다. 종소명 *vesicaria*는 '작은포가 있는'이라는 뜻으로 작은포가 꽃 전체를 둘러싸고 있는 모습 때문에 붙여졌다.



운향과 상산속

상산

Orixia japonica Thunb.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	4~5월, 노란색
높이	2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



학명 유래 — 속명 *Orixia*는 일본명 Kokusagi가 와전된 Orisagi를 라틴어화하여 지어진 이름으로 상산속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 '일본의'라는 뜻으로 발견지 또는 분포지를 나타낸다.

매자나무과 매자나무속

매자나무

Berberis koreana Palib.

약관심(LC)

특산식물

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 암석지대, 관목지대
꽃	5월, 노란색
높이	2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 매자나무라는 이름은 '매'(鷹)와 '자'(刺)와 '나무'의 합성어로, 매의 발톱과 같이 날카로운 가시를 가진 나무라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Berberis*는 좋은 열매라는 뜻의 아라비아어 berberys 또는 잎이 조개껍질(berberi)을 닮은 데서 유래했다고 하며 매자나무속을 일컫는다. 종소명 *koreana*는 '한국의'라는 뜻으로 한국 특산식물임을 나타내지만, 중국 동북부 지역에도 분포하는 것으로 알려져 있다.



꿀풀과 작살나무속

작살나무

Callicarpa japonica Thunb.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 관목지대
열매	9~10월, 보라색
높이	2~3m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 작살나무라는 이름은 줄기가 물고기를 찢어 잡는 기구인 작살처럼 갈라진다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Callicarpa*는 그리스어 *kalli*(아름다운)와 *karpos*(열매)의 합성어로, 열매가 아름다운 것에서 유래했으며 작살나무속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 '일본의'라는 뜻으로 최초 발견지 또는 분포지를 나타낸다.


장미과 가침박달속

가침박달

Exochorda serratifolia S.Moore

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리, 관목지대
꽃	4~5월, 흰색
높이	1~5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



학명 유래 — 속명 *Exochorda*는 그리스어 *exo*(바깥)와 *chorde*(끈)의 합성어로 심피 바깥쪽에 접하여 끈모양의 태좌가 달리는 것을 나타낸 것을 뜻하며 가침박달속을 일컫는다. 종소명 *serratifolia*는 ‘앞에 톱니가 있는’이라는 뜻으로 앞의 가장자리에 난 거치가 있어서 붙여졌다.



자작나무과 개암나무속

개암나무

Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리
꽃	3~4월, 노란색
높이	7m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 개암나무라는 이름은 ‘개’(접사)와 ‘밤’(栗)과 ‘나무’(木)로 이루어진 합성어로, 밤나무를 닮았다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Corylus*는 그리스어 corys(투구)를 어원으로 하는 고대 라틴어로, 소총포의 모양을 표현한 것이며 개암나무속을 일컫는다. 종소명 *heterophylla*는 ‘이엽성(異葉性)’의 뜻이다.

무환자나무과 단풍나무속

산겨릅나무

Acer tegmentosum Maxim.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
열매	9~10월, 갈색
높이	15m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 산겨릅나무라는 이름은 '산'(山)과 '겨릅'(껍질을 벗긴 삼대: 麻骨)과 '나무'(木)의 합성어로, 산에서 자라고 가지가 겨릅을 닮았으며 그와 유사한 용도로 사용하는 나무라는 뜻에서 유래했다. 가지의 껍질을 벗겨 노끈(繩)으로 사용하는 것이 삼(麻)의 껍질을 벗겨 노끈과 베틀을 짜던 것과 비슷하다고 해 붙여진 이름이다.

학명 유래 — 속명 *Acer*는 아카드어 arku(긴, 큰)가 어원으로 유럽에 자생하는 단풍나무(field maple: *A. campestre*)의 라틴명에서 유래했으며 단풍나무속을 일컫는다.

종소명 *tegmentosum*은 '비늘눈으로 덮인'이라는 뜻으로 겨울눈이 접합상(鑷合狀)의 비늘눈으로 덮인 모습에서 유래했다.



층층나무과 박쥐나무속

박쥐나무

Alangium platanifolium var.
trilobum (Miq.) Ohwi

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	5~6월, 흰색
높이	3~4m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 박쥐나무라는 이름은 박쥐의 날개가 펼쳐진 것처럼 생긴 잎의 모양에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Alangium*은 이 속 식물의 한 종(*A. salviifolium*)에 대한 인도 서남부 케랄라 지역의 토속어인 말라얌알어 *alangi* 또는 *angolam*에서 유래한 것으로 박쥐나무속을 일컫는다.

종소명 *platanifolium*은 '*Platanus*(버즘나무속)와 비슷한 잎의'라는 뜻으로 버즘나무속 식물과 잎이 유사하다는 뜻에서 유래했다.

녹나무과 생강나무속

생강나무

Lindera obtusiloba Blume

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 계곡 주변
꽃	3~4월, 노란색
높이	3m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 생강나무라는 이름은 고유명으로, 가지를 꺾거나 잎을 비비면 생강 냄새가 난다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Lindera*는 스웨덴 식물학자 Johann Linder(1676~1723)의 이름에서 유래했으며 생강나무속을 일컫는다. 종소명 *obtusiloba*는 '둔두 잔열의, 열편의 가장자리가 둔한'이라는 뜻으로 잎끝의 갈라짐이 무딘 것에서 유래했다.






매죽나무과 매죽나무속

쪽동백나무

Styrax obassia Siebold & Zucc.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲 가장자리
꽃	5~6월, 흰색
높이	10m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 쪽동백나무라는 이름은 열매가 동백나무보다 작은 나무라는 뜻에서 유래했다. ‘쪽’은 여러 뜻으로 사용되는데, ‘작은’의 뜻을 더하는 접두사로도 사용된다.

학명 유래 — 속명 *Styrax*는 수지(樹脂)나 수지를 뽑던 나무에 대한 고대 그리스명 storax에서 유래한 것으로 매죽나무속을 일컫는다.

무환자나무과 단풍나무속

당단풍나무

Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
단풍	10~11월, 빨간색
높이	8m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 당단풍나무라는 이름은 한자명 '唐丹楓'(당단풍)에서 비롯된 것으로, 상대적으로 더 북쪽(唐)에서 자라는 단풍나무라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Acer*는 아카드어 arku(긴, 큰)가 어원으로 유럽에 자생하는 단풍나무(field maple: *A. campestre*)의 라틴명에서 유래했으며 단풍나무속을 일컫는다.

종소명 *pseudosieboldianum*은 pseudo(가짜의, 유사한)와 *sieboldianum*(일본 식물을 연구한 Siebold)의 합성어로 *A. sieboldianum*이라는 종과 비슷하다는 뜻에서 유래했다.





무환자나무과 단풍나무속

고로쇠나무

Acer pictum var. *mono* (Maxim.)
Maxim. ex Franch.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
단풍	10~11월, 노란색
높이	20m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 고로쇠나무라는 이름은 초봄에 수액을 채취해 먹으면 뼈에 이롭다는 뜻의 한자어 골리수(骨利水) 또는 골리수(骨利樹)에서 유래한 것으로 알려져 있다.

학명 유래 — 속명 *Acer*는 아카드어 arku(긴, 큰)가 어원으로 유럽에 자생하는 단풍나무(field maple: *A. campestre*)의 라틴명에서 유래했으며 단풍나무속을 일컫는다. 종소명 *pictum*은 '색이 있는, 색채가 있는, 아름다운'이라는 뜻이다. 변종명 *mono*는 '하나의, 일(1)의'라는 뜻으로 잎의 가운데 열편(裂片)이 다시 갈라지지 않는 특징을 나타낸다.

무환자나무과 단풍나무속

신나무

Acer tataricum subsp. *ginnala*
(Maxim.) Wesm.


약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲 가장자리, 초지, 관목지대
단풍	10~11월, 빨간색
높이	8m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 널리 단풍나무류(楓)에 대한 우리 옛말 '심'에 '나무'(木)가 추가되어 신나무→싯나무→신나무→신나무로 변해 형성된 말이다. 옛말 '심'의 정확한 어원이나 뜻은 알려져 있지 않다. 다만 현대어 '싯누렇다', '시퍼렇다', '시꺼멓다' 등의 '싯' 또는 '시'라는 표현이 매우 짙고 선명하다는 뜻을 더하는 접두사이고, 단풍나무류가 가을이 되면 잎의 색깔이 짙게 변하는 특성이 있으므로, '심'은 색깔이 매우 짙고 선명하다는 뜻과 관련 있는 옛말로 추론된다.

학명 유래 — 속명 *Acer*는 아카드어 arku(긴, 큰)가 어원으로 유럽에 자생하는 단풍나무(field maple: *A. campestre*)의 라틴명에서 유래했으며 단풍나무속을 일컫는다. 종소명 *tataricum*은 '타타르(Tatar)'의'라는 뜻으로 주요 분포지를 나타내며, 아종명 *ginnala*는 이 나무의 시베리아 지방명에서 유래했다.






무환자나무과 단풍나무속

복자기

Acer triflorum Kom.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
단풍	10~11월, 빨간색
높이	20m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 복자기라는 이름은 털이 있는 삼출엽의 독특한 모양 또는 겨울눈과 열매에 털이 밀생(密生)하는 모습이 털이 보송하게 난 노루(사슴)를 뜻하는 ‘복작이’ 또는 ‘복장이’를 닮았다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다. 평북 방언을 채록한 것에서 비롯했다.

학명 유래 — 속명 *Acer*는 아카드어 arku(긴, 큰)가 어원으로 유럽에 자생하는 단풍나무(field maple: *A. campestre*)의 라틴명에서 유래했으며 단풍나무속을 일컫는다. 종소명 *triflorum*은 ‘3화(三花)의’라는 뜻으로 꽃이 세 송이씩 모여 피는 것에서 유래했다.

두릅나무과 오갈피나무속

오갈피나무

Eleutherococcus sessiliflorus
(Rupr. & Maxim.) S.Y.Hu

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 초지
열매	10월, 검정색
높이	3~4m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 오갈피나무라는 이름은 ‘오갈피’와 ‘나무’의 합성어로, 잎이 5개로 갈라지고 수피(나무껍질)를 약재로 쓴다는 뜻의 한자명 ‘五加皮(오가피)’가 발음 과정에서 오갈피로 변화한 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명

*Eleutherococcus*는 그리스어 eleutheros(자유로운, 마음대로)와 kokkos(열매)의 합성어로, 열매 모양에서 유래했으며 오갈피나무속을 일컫는다.

종소명 *sessiliflorus*는 ‘꽃자루가 없는’이라는 뜻이다.





무환자나무과 모감주나무속

모감주나무

Koelreuteria paniculata Laxm.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	해안 숲 가장자리
꽃	6~7월, 노란색
높이	8~10m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 모감주나무라는 이름은 한자명 '무환자'(無患子)의 옛말 '모관주'가 변화한 것으로, 무환자와 동일하게 열매 혹은 씨앗으로 염주를 만들었기 때문에 이름이 혼용되어 유래했다. 모관주는 무환자(無患子)라는 한자어에 염주의 뜻을 가진 珠(주)가 결합해 형성된 것으로 이해되고 있다.

학명 유래 — 속명 *Koelreuteria*는 독일 식물학자 Joseph Gottlieb Kolreuter(1734~1806)의 이름에서 유래했으며 모감주나무속을 일컫는다. 종소명 *paniculata*는 '원뿔모양꽃차례의'라는 뜻으로 이 나무의 꽃차례의 모양에서 유래했다.

장미과 마가목속

마가목

Sorbus commixta Hedl.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲 가장자리, 능선
열매	9~10월, 빨간색
높이	6~8m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 마가목이라는 이름은 다양한 한자 표현에 '馬'(마)가 공통적으로 쓰인 것을 볼 때 말(馬)과 연관해 유래했을 것으로 추정하지만, 정확한 어원이나 의미는 확인되지 않는다.

학명 유래 — 속명 *Sorbus*는 마가목의 고대 라틴명 *Sorbus*에서 유래했으며 마가목속을 일컫는다. 종소명 *commixta*는 '혼합한'이라는 뜻이다.





측백나무과 향나무속

눈향나무

Juniperus chinensis var. *sargentii*
A. Henry

취약(VU)

성상	상록 침엽 관목
자생 환경	고산, 바위틈
열매	9~11월, 초록색
높이	0.3~0.6m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 눈향나무라는 이름은 줄기가 굽은 향나무라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Juniperus*는 향나무 종류의 고대 라틴명에서 유래했으며 향나무속을 일컫는다.

종소명 *chinensis*는 '중국에 분포하는'이라는 뜻으로 발견지 또는 분포지를 나타내며, 변종명 *sargentii*는 미국 식물학자 C. S. Sargent(1841~1927)의 이름에서 유래했다.

개비자나무과 개비자나무속

개비자나무

Cephalotaxus harringtonia
(Knight ex J.Forbes) K.Koch

약관심(LC)

성상	상록 침엽 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
열매	9~10월, 빨간색
높이	3m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 개비자나무라는 이름은 비자나무와 닮았는데 쓰임새 등이 그보다 못하다는(개) 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Cephalotaxus*는 그리스어 cephalos(머리)와 *Taxus*(주목)의 합성어로 소포자낭수(수구화수)가 머리모양으로 달리는 주목이라는 뜻이며 개비자나무속을 일컫는다. 종소명 *harringtonia*는 이 나무를 처음으로 유럽에서 재배하기 시작한 사람 중 하나인 영국 군인 Charles Stanhope, 4th Earl of Harrington(1780~1851)의 이름에서 유래했다.



주목과 비자나무속

비자나무

Torreya nucifera (L.) Siebold & Zucc.

약관심(LC)

성상	상록 침엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
열매	9~10월, 초록색
높이	25m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 비자나무라는 이름은 한자어 비자목(榧子木)에 어원을 두고 있다. 비자나무를 뜻하는 한자 ‘榧’(비)는 木(나무)과 匪(대나무 상자, 문체)가 합쳐진 것으로 아름다운 광채가 나는 나무라고 해석되므로, 비자나무는 목재의 문양과 아름다움에서 유래한 이름이라고 이해된다.

학명 유래 — 속명 *Torreya*는 미국 식물학자 John Torrey(1796~1873)의 이름에서 유래했으며 비자나무속을 일컫는다. 종소명 *nucifera*는 ‘견과(堅果)가 달리는’이라는 뜻으로 종자의 모양에서 유래했다.

앵초과 자금우속

산호수

Ardisia pusilla A.DC.

약관심(LC)

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	숲속
열매	9월, 빨간색
높이	0.05~0.08m
광조건	음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Ardisia*는 그리스어 ardis(화살촉)에서 유래한 이름으로 꽃밥이 뾰족하다는 것을 나타내며 자금우속을 일컫는다. 종소명 *pusilla*는 라틴어로 '매우 작다'라는 뜻이다.



벼과 신이대속

제주조릿대

Sasa quelpaertensis Nakai

약관심(LC)

특산식물

성상	상록 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	4~5월, 갈색
높이	0.1~0.8m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 제주조릿대라는 이름은 제주에 자라는 조릿대 종류라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Sasa*는 조릿대의 일본명 ササ(笹)에서 유래한 것으로 신이대속을 일컫는다.

홀아비꽃대와 죽절초속

죽절초

Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai

위급(CR)

성상	상록 활엽 반관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
열매	11~12월, 빨간색
높이	1m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Sarcandra*는 그리스어 sarkos(살집)와 andros(남성)에서 유래한 말로 수술이 다육질이라는 점을 나타내며, 죽절초속을 일컫는다. 종소명 *glabra*는 라틴어로 '매끈한, 털이 없는'이라는 뜻으로 식물체에 털이 없이 매끈해서 붙여졌다.





앵초과 자금우속

왕백량금

Ardisia crenata Sims

준위협(NT)

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
열매	9~12월, 빨간색
높이	1m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Ardisia*는 그리스어 ardis(화살촉)에서 유래한 이름으로 꽃밥이 뾰족하다는 것을 나타내며 자금우속을 일컫는다. 종소명 *crenata*는 라틴어로 '파상형의'라는 뜻으로 엽연이 파상형인 것을 나타낸다.

돈나무과 돈나무속

돈나무

Pittosporum tobira (Thunb.)

W.T.Aiton

약관심(LC)

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	해안 숲 가장자리
꽃	4~5월, 흰색
높이	2~3m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 돈나무라는 이름은 제주 방언 '똥낭'에서 유래했다. 꽃이 지고 난 가을과 겨울에 노란 열매가 벌어지면서 끈끈하고 악취가 나는 액체가 분비되는데, 이때 온갖 곤충은 물론 특히 파리가 많이 꼬여 지저분하고 냄새가 좋지 않아 '똥'(糞)을 연상시키는 나무라는 뜻에서 제주 방언 똥낭이 유래했고 이를 돈나무로 채록한 것이다.

학명 유래 — 속명 *Pittosporum*은 그리스어 pitta(수지, 樹脂)와 spora(열매)의 합성어로, 열매가 까맣고 윤이 나며 점착성이 있는 것에서 유래했으며 돈나무속을 일컫는다. 종소명 *tobira*는 이 식물을 일컫는 일본명 トベラ에서 유래했다.



물푸레나무과 쥐똥나무속

광나무

Ligustrum japonicum Thunb.

약관심(LC)

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리
꽃	6~7월, 흰색
높이	3~5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 광나무라는 이름은 백랍(白蠟)이 만들어질 때 흰 점액이 나뭇가지를 싸는 모습이 뼈 또는 응어리(瘻)를 연상시킨다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다. 주요 자생지인 제주도의 방언을 채록한 것이다.

학명 유래 — 속명 *Ligustrum*은 ligo(묶다, 땀다)가 어원으로 이 속 식물(*L. vulgare*)의 나뭇가지를 물건을 묶는데 사용한 것에서 유래했으며 쥐똥나무속을 일컫는다. 종소명 *japonicum*은 '일본의'라는 뜻이다.

가리아과 식나무속

식나무

Aucuba japonica Thunb.

약관심(LC)

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
열매	11~2월, 빨간색
높이	3m
광조건	음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 식나무라는 이름은 주요 자생지인 제주도의 방언 '식낭'에서 유래했다. '식낭'은 색깔이 섞여 얼룩덜룩한 무늬를 이루는 나무라는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다. 즉, 붉은 푸른 잎을 유지한 채 새잎이 갈색으로 돋는 모습 또는 열매가 붉게 익어 잎과 대비되는 모습이 얼룩덜룩해 보인다는 뜻에서 붙여진 이름으로 이해된다. '신남(신나무)'이라는 이름도 기록되었는데, '신'은 제주 방언으로 신발(靴)을 뜻하므로 넓적하고 크게 자라는 잎의 모양을 신발에 비유한 것에서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Aucuba*는 이 속 식물의 일본명 アオキバ(青木葉)에서 유래했으며 식나무속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 '일본의'라는 뜻으로 발견지 또는 분포지를 나타낸다.



붓순나무과 붓순나무속

붓순나무

Illicium anisatum L.

준위협(NT)

성상	상록 활엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 계곡 주변
꽃	3~4월, 흰색
높이	3~5m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 붓순나무라는 이름은 새싹이 돌아나는 모양이 붓처럼 생긴 나무라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Illicium*은 라틴어 *illicio*(피다, 유혹하다)에서 유래한 말로, 꽃의 향기가 좋은 것과 연관이 있으며 붓순나무속을 일컫는다. 종소명 *anisatum*은 'anise(산형과 식물)의 향이 있는'이라는 뜻으로 꽃의 향기와 관련 있다.

녹나무과 참식나무속

새덕이

Neolitsea aciculata (Blume) Koidz.

약관심(LC)

성상	상록 활엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	3~4월, 빨간색
높이	10m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 새덕이라는 이름은 제주 방언 ‘흰식덕이’에서 유래했다. 흰식덕이는 ‘흰’과 ‘식덕이’의 합성어로, 잎 뒷면이 흰색이고 잎의 모양이 생달나무(사다가나무)와 유사하다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Neolitsea*는 그리스어 neo(새로운)와 *Litsea* (까마귀쪽나무속)의 합성어로, 까마귀쪽나무속과 유사해 붙여졌으며 참식나무속을 일컫는다. 종소명 *aciculata*는 ‘바늘모양의’라는 뜻이다.





산분꽃나무과 산분꽃나무속

아왜나무

Viburnum odoratissimum var. *awabuki* (K.Koch) Zabel ex Rümpler

약관심(LC)

성상	상록 활엽 교목
자생 환경	숲 가장자리
꽃	6~7월, 흰색
높이	10m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 아왜나무라는 이름은 외로운 나무라는 뜻으로, 잎에 물기가 많은 것을 외롭다고 보아 붙여진 것으로 추정한다. 잎에 물기가 많아 방화수(防火樹) 목적의 산울타리로 사용했다. 자생지인 제주도 방언으로 '아웨다'는 외롭다는 뜻으로 방화수로 사용한 것 또는 울타리로 서 있는 모습과 관련된 이름으로 이해된다.

학명 유래 — 속명 *Viburnum*은 의미 불명의 비브르눔 란타나(*V. lantana*)의 라틴명에서 유래한 것으로 산분꽃나무속을 일컫는다. 종소명 *odoratissimum*은 '최고로 좋은 향기가 나는'이라는 뜻으로 꽃의 향기가 좋은 것에서 유래했다.

녹나무과 참식나무속

참식나무

Neolitsea sericea (Blume) Koidz.

약관심(LC)

성상	상록 활엽 교목
자생 환경	숲 가장자리
열매	다음해 7~11월, 빨간색
높이	10m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 참식나무라는 이름은 참(진짜) 식나무라는 뜻으로, '식당'은 색깔이 섞여 얼룩덜룩한 무늬를 이루는 나무라는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다. 즉, 봄에 푸른 잎을 유지한 채 새잎이 갈색으로 드는 모습 또는 열매가 붉게 익어 잎과 대비되는 모습이 얼룩덜룩해 보이는 것에서 붙여진 이름으로 이해된다.

학명 유래 — 속명 *Neolitsea*는 그리스어 neo(새로운)와 *Litsea*(까마귀쪽나무속)의 합성어로, 까마귀쪽나무속과 유사해 붙여졌으며 참식나무속을 일컫는다. 종소명 *sericea*는 '견모상(絹毛狀)의, 견사상(絹糸狀)의'라는 뜻이다.



녹나무과 후박나무속

센달나무

Machilus japonica Siebold & Zucc. ex Blume

약관심(LC)

성상	상록 활엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	5~6월, 노란색
높이	10m
광조건	반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 센달나무라는 이름은 전남 방언에서 유래했다. 녹나무과 식물 중 센달나무와 함께 제주도와 남부 지방에 서식하는 생달나무(한자어 性穉에서 유래한 이름으로 잎이 찌처럼 좁고 가늘며 박달나무를 닮았다는 뜻)는 서로 형태가 비슷하고 발음도 유사하다. 이러한 점에 비추어 센달나무는 생달나무로 통칭되다가 발음이 변화해 지역에 따라 '센달나무'로도 불리던 이름이 채록되었을 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Machilus*는 인도네시아 암보이나의 지역명 makilan을 독일 식물학자 Georg Eberhard Rumphius(1627~1702)가 라틴어화한 것으로 후박나무속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 '일본의'이라는 뜻으로 발견지 또는 분포지를 나타낸다.

녹나무과 생달나무속

생달나무

Cinnamomum chekiangense Nakai

약관심(LC)

성상	상록 활엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	6월, 노란색
높이	15m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 생달나무라는 이름은 전남 방언에서 유래한 것으로, 옛 문헌에 한자명 '性槿'(생달)로 기록된 바 있다. 한자명 性槿에서 '性'은 특별히 기억할 만한 것을 표시하기 위해 글씨를 써서 붙이는 좁은 종이쪽(씨)을 뜻하고 '槿'은 박달나무를 뜻한다. 따라서 생달나무라는 이름은 잎이 찌처럼 좁고 가늘며 박달나무를 닮았다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Cinnamomum* 은 계피를 뜻하는 히브리어 qinnamon 또는 고대 그리스어 kinamomon이 어원으로 생달나무속을 일컫는다.





녹나무과 까마귀쪽나무속

육박나무

Litsea coreana H.Lév.

약관심(LC)

성상	상록 활엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
열매	7~8월, 빨간색
높이	15m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	양토, 사토
번식	파종



학명 유래 — 속명 *Litsea*는 중국어李子(li si, 자두)에서 유래한 것으로, 열매가 작은 자두를 닮은 것을 나타내며 까마귀쪽나무속을 일컫는다. 종소명 *coreana*는 '한국의'라는 뜻이다.

녹나무과 생강나무속

비목나무

Lindera erythrocarpa Makino

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 교목
자생 환경	숲 가장자리
열매	8~10월, 빨간색
높이	15m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 『조선삼림수목감요』는 비목나무의 한자명으로 白木(백목)을 기록했는데 이는 중국이나 일본에서 비목나무에 사용하지 않는 한자명이고, 함께 기록한 ‘보안폭이’에서 ‘보안’은 흐린 흰색을 뜻하는 ‘보양다’와 관련 있는 것으로 보인다. 나무껍질이 황백색 또는 흐릿한 흰색을 띠는 점에 비추어 비목나무는 ‘백목’(白木)에서 파생해 불리던 지방명일 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Lindera*는 스웨덴 식물학자 Johann Linder(1676~1723)의 이름에서 유래했으며 생강나무속을 일컫는다. 종소명 *erythrocarpa*는 ‘붉은 열매의’라는 뜻으로 열매가 붉게 익어서 붙여졌다.





녹나무과 후박나무속

후박나무

Machilus thunbergii Siebold &

Zucc.

약관침(LC)

성상	상록 활엽 교목
자생 환경	숲 가장자리
열매	7~8월, 검정색
높이	20m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 후박나무라는 이름은 한자어 후박(厚朴)에서 유래한 것으로, 나무가 질박하고 나무껍질이 두텁다는 뜻에서 붙여진 이름이다.

학명 유래 — 속명 *Machilus*는 인도네시아 암보니아의 지역명 makilan을 독일 식물학자 Georg Eberhard Rumphius(1627~1702)가 라틴어화한 것으로 후박나무속을 일컫는다. 종소명 *thunbergii*는 스웨덴 식물학자로 일본 식물을 연구한 Carl Peter Thunberg(1743~1828)의 이름에서 유래했다.

거친 질감

국화과 엉겅퀴속

바늘엉겅퀴

Cirsium rhinoceros (H.Lév. & Vaniot) Nakai

준위협(NT)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	6~8월, 자주색
높이	0.5m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 바늘엉겅퀴라는 이름은 잎에 바늘과 같이 생긴 가시가 많아서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Cirsium*은 그리스어 kirsion에서 유래했는데 고대 의학자 디오스코리데스(Dioscorides)에 의하면 엉겅퀴의 한 종류로 kirsos(정맥류) 치유에 효과가 있다고 하여 붙여졌으며 엉겅퀴속을 일컫는다. 종소명 *rhinoceros*는 ‘코뿔소’라는 뜻으로 큰 포를 가진 식물체의 모양이 코뿔소를 연상시킨다고 하여 붙여졌다.



국화과 엉겅퀴속

가시엉겅퀴

Cirsium japonicum var. *spinosissimum* Kitam.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	6~8월, 자주색
높이	0.5~1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Cirsium*은 그리스어 kirsion에서 유래했는데 고대 의학자 디오스코리데스(Dioscorides)에 의하면 엉겅퀴의 한 종류로 kirsos(정맥류) 치유에 효과가 있다고 하여 붙여졌으며 엉겅퀴속을 일컫는다. 종소명 *japonicum*은 '일본의'라는 뜻이다.

국화과 절굿대속

큰절굿대

Echinops dahuricus Fisch. ex
Hornem.

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월, 파란색
높이	0.6~0.8m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Echinops*는 그리스어 echinos(고슴도치, 성게)와 pos(외관, 닮음)의 합성어로 머리모양꽃차례의 꽃이 고슴도치나 성게를 닮았다고 하여 붙여졌으며 절굿대속을 일컫는다. 종소명 *dahuricus*는 '바이칼호 동쪽) 다후리아 지방의'라는 뜻이다.






장미과 터리풀속

터리풀

Filipendula glaberrima Nakai

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월, 흰색
높이	1m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 터리풀이라는 이름은 '터리'와 '풀'의 합성어로, 꽃이 핀 모습이 마치 털을 묶어 가지 끝에 땀 것처럼 보이는 것에서 유래했다. 터리풀의 '터리'는 털의 옛말이다.

학명 유래 — 속명 *Filipendula*는 라틴어 filum(실)과 pendulus(매달린)의 합성어로 땅속줄기의 모양에서 유래했으며 터리풀속을 일컫는다. 종소명 *glaberrima*는 '전혀 털이 없는'이라는 뜻이다.

범의귀과 돌단풍속

돌단풍

Mukdenia rossii (Oliv.) Koidz.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	계곡 주변, 돌틈 및 옹벽
꽃	3~4월, 흰색
높이	0.3m
광조건	반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 돌단풍이라는 이름은 깊은 계곡 물가 바위(돌)틈에서 자라고 잎이 단풍나무를 닮았다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Mukdenia*는 Mukden(만주의 선양 지역)을 가리키는 말로 원산지의 지명에서 유래했으며 돌단풍속을 일컫는다. 종소명 *rossii*는 스코틀랜드 출신의 선교사 John Ross(1842~1915)의 이름에서 유래했다.



범의귀과 도깨비부채속

도깨비부채

Rodgersia podophylla A.Gray

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 돌밭
꽃	6~7월, 흰색
높이	1m
광조건	반음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 도깨비부채라는 이름은 비정상적으로 크고 갈라진 잎 모양이 도깨비를 연상시키고 부채모양으로 크다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Rodgersia*는 미국 북태평양탐험대(1853~1856)의 리더 중 한 사람이었으며 식물 채집에 공헌한 John Rodgers(1812~1882)의 이름에서 유래한 것으로 도깨비부채속을 일컫는다. 종소명 *podophylla*는 '잎자루가 있는 잎의'라는 뜻이다.

국화과 털머위속

털머위

Farfugium japonicum (L.) Kitam.

약관심(LC)

성상	상록성 여러해살이풀
자생 환경	해안 숲속, 숲 가장자리
꽃	9~11월, 노란색
높이	0.3~0.5m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Farfugium*의 어원은 불분명하지만 관동(*Tussilago farfara* L.)을 뜻하는 라틴어 *farfara*에서 유래하여 관동과 잎이 유사다는 점에서 유래했거나, 라틴어 *far*(밀가루)과 라틴어 *fugio*(사라지다)의 합성어로 신엽의 전개 과정에서 엽병과 엽신에 난 백색의 털이 사라지는 특성을 지닌다는 점에서 유래한 것으로 추정하며 털머위속을 일컫는다. 종소명 *japonicum*은 '일본의'라는 뜻이다.






범의귀과 개병풍속

개병풍

Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl.

위기(EN)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	6~7월, 흰색
높이	1~1.5m
광조건	반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 개병풍이라는 이름은 잎과 식물체가 자라는 모습이 국화과의 병풍(병풍쌈)과 유사하다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Astilboides*는 *Astilbe*(노루오줌속)와 -oides(~와 비슷한, 닮은)의 합성어로, 꽃차례가 노루오줌속과 닮아 붙여졌으며 개병풍속을 일컫는다. 종소명 *tabularis*는 '평판(平板)'의라는 뜻으로 잎의 모양에서 유래한 것으로 보인다.

수련과 가시연속

가시연꽃

Euryale ferox Salisb.

취약(VU)

성상	한해살이풀(수생)
자생 환경	수공간
꽃	7~8월, 보라색
높이	0.3~1m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종



국명 유래 — 가시연꽃이라는 이름은 '가시'와 '연꽃'의 합성어이며 식물체에 가시가 있는 연꽃이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Euryale*는 그리스 신화에서 머리카락이 뱀으로 이루어진 세 자매 괴물 Sthenno·Euryale·Medusa 중 하나로 가시투성이인 식물체를 괴물의 형상에 비유한 것이며 가시연속을 일컫는다. 종소명 *ferox*는 '가시가 많은, 억센 가시가 있는'이라는 뜻이다.



국화와 곰취속

갯취

Ligularia mongolica (Turcz.) DC.

취약(VU)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 습한 초지
꽃	6~7월, 노란색
높이	1~1.5m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Ligularia*는 라틴어 *ligula*(작은 혀, 작은 검)가 어원으로 혀 모양 꽃잎에서 유래했으며 곰취속을 일컫는다. 종소명 *mongolica*는 '몽골 지방의'라는 뜻이다.

천남성과 천남성속

큰천남성

Arisaema ringens (Thunb.) Schott

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	5월, 연두색
높이	0.3~0.45m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Arisaema*는 그리스어 aris(arum이라는 식물의)와 haima(피)의 합성어로, 앞에 반점이 있는 것에서 유래했으며 천남성속을 일컫는다. 종소명 *ringens*는 라틴어로 ‘입을 벌린, 으르렁거리는’의 뜻을 지니며, 불염포의 입구가 벌려진 입과 유사하다는 뜻이다.



닭의장풀과 나도생강속

나도생강

Pollia japonica Thunb.

준위협(NT)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	8~9월, 흰색
높이	0.3~0.8m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Pollia*는 은행가이자 암스테르담 시장을 지냈던 네덜란드 사람 Jan van der Poll의 이름에서 유래했으며 나도생강속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 '일본의'라는 뜻으로 발견지 또는 분포지를 나타낸다.

수선화과 문주란속

문주란

Crinum asiaticum var. *japonicum*
Baker

준위협(NT)

성상	상록성 여러해살이풀
자생 환경	해안, 해안초지, 사구
꽃	7~8월, 흰색
높이	0.3~0.5m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Crinum*는 그리스어 krinon(백합)에서 기원한 말로 문주란속을 일컫는다.
종소명 *asiaticum*은 '아시아의'라는 뜻으로 분포지를 나타낸다. 변종명 *japonicum*은 '일본의'라는 뜻이다.



꼬리고사리과 꼬리고사리속

골고사리

Asplenium komarovii Akasawa

약관심(LC)

성상	상록성 양치식물
자생 환경	숲속
포자기	6~9월
높이	0.2~0.25m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	포자 번식, 포기나누기



국명 유래 — 골고사리라는 이름은 습한 골짜기에서 자라는 고사리라는 뜻에서 붙여진 것으로 추정한다. 『조선식물향명집』에서 전통 명칭 ‘고사리’를 기본으로 하고 식물의 산지(產地)를 나타내는 ‘골’을 추가해 신징했다.

학명 유래 — 속명 *Asplenium*는 a-(부정의 접두사)와 splen(비장)의 합성어로 이 속의 어떤 종이 비장의 통증 치료용 약재로 쓰인 데서 유래한 것으로 추정하며 꼬리고사리속을 일컫는다. 종소명 *komarovii*는 러시아 식물학자로 만주 식물을 연구한 Vladimir Leontyevich Komarov(1869~1945)의 이름에서 유래했다.

꼬리고사리과 꼬리고사리속

파초일엽

Asplenium antiquum Makino

위급(CR)

성상	상록성 양치식물
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 돌틈 및 웅벽
포자기	6~9월
높이	0.5~1m
광조건	반음지
토질	사토, 유기질토
번식	포자 번식, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Asplenium*는 a-(부정의 접두사)와 splen(비장)의 합성어로 이 속의 어떤 종이 비장의 통증 치료용 약재로 쓰인 데서 유래한 것으로 추정하며 꼬리고사리속을 일컫는다. 종소명 *antiquum*은 라틴어로 ‘고대의’라는 뜻으로, 명명자 마키노 도미타로가 일본 역사서 고사기와 일본서기에 기록된 닌토쿠 천황에 관한 고사에 언급된 mitsuna-gashiwa라는 식물이 해당 종을 지칭하는 것으로 여겨 이와 같이 명명한 것이라는 설이 있다.



관중과 십자고사리속

나도히초미

Polystichum polyblepharum
(Roem. ex Kunze) C.Presl

약관심(LC)

성상	상록성 양치식물
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
포자기	6~9월
높이	0.37~0.7m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	포자 번식, 포기나누기



국명 유래 — 나도히초미라는 이름은 히초미(관중의 다른이름)와 닮았다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Polystichum*은 그리스어 polys(많은)와 stichos(열, 列)의 합성어로 이 속의 어떤 종에서 포자낭군이 많은 열을 이룬 데서 유래했으며 십자고사리속을 일컫는다. 종소명 *polyblepharum*은 '연모(軟毛)가 있는, 가장자리에 털이 있는'이라는 뜻이다.

관중과 쇠고비속

도깨비쇠고비

Cyrtomium falcatum (L.f.) C.Presl

약관심(LC)

성상	상록성 양치식물
자생 환경	해안 숲 가장자리
포자기	7~9월
높이	0.3~0.4m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	양토, 사토
번식	포자 번식, 포기나누기



국명 유래 — 도깨비쇠고비라는 이름은 잎의 깃조각 모양이 도깨비를 닮았고 고비에 비해 거친 모양(쇠)이라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Cyrtomium*은 그리스어 *cyrtoma*(굽은)에서 유래한 것으로 깃조각이 굽어 있어서 붙여졌으며 쇠고비속을 일컫는다. 종소명 *falcatum*은 '낫모양의'라는 뜻으로 깃조각의 모양에서 유래했다.



고란초과 석위속

석위

Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw.

약관심(LC)

성상	상록성 양치식물(착생)
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 돌틈 및 옹벽, 바위, 절벽
포자기	7~9월
높이	0.13~0.3m
광조건	반음지, 음지
토질	사토
번식	포자 번식, 포기나누기



국명 유래 — 석위라는 이름은 한자어 석위(石韮)에서 유래했다. 바위에서 자라는 가죽 모양의 식물이라는 뜻으로 서식처와 부드러운 가죽질의 잎 때문에 붙여진 이름이다.

학명 유래 — 속명 *Pyrrosia*는 그리스어 pyro(불꽃)에서 유래한 것으로 비늘조각이 붉은 차(茶) 색이어서 붙여졌으며 석위속을 일컫는다. 종소명 *lingua*는 '혀의, 리본의'라는 뜻으로 잎의 모양에서 유래했다.

뽕나무과 무화과나무속

모람

Ficus oxyphylla Miq. ex Zoll.

약관심(LC)

성상	상록 활엽 관목, 덩굴
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 바위 위
열매	9~11월, 자주색
높이	2~5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목(유년상의 가지만)



국명 유래 — 모람이라는 이름은 제주 방언에서 유래했다. 현재도 제주에서 모람 또는 모람줄이라고 부르고 있으나 그 정확한 뜻이나 어원은 알려져 있지 않다.

학명 유래 — 속명 *Ficus*는 무화과나무를 일컫는 라틴어로 무화과를 뜻하는 그리스어 sycon 또는 좁다는 의미의 아카드어 piqu에서 유래했으며 무화과나무속을 일컫는다.



감탕나무과 감탕나무속

호랑가시나무

Ilex cornuta Lindl. & Paxton

준위협(NT)

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리
열매	10~12월, 빨간색
높이	2~3m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 호랑가시나무라는 이름은 잎 가장자리에 난 톱니의 가시 모양이 예리한 것이 마치 호랑이 같다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Ilex*는 호랑잎가시나무(*Quercus ilex* L.: holm oak)의 고대 라틴명에서 유래한 것으로 감탕나무속을 일컫는다. 종소명 *cornuta*는 ‘뿔(角)이 있는’이라는 뜻으로 이 식물의 잎가장자리에 난 가시 모양에서 유래했다.

진달래과 진달래속

만병초

Rhododendron brachycarpum

D.Don ex G.Don

준위협(NT)

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리
꽃	6~7월, 흰색
높이	4m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 만병초라는

이름은 여러 가지 병에 효력이

있는 풀이라는 뜻의 한자명

‘萬病草’(만병초)에서 유래했다.

학명 유래 — 속명

*Rhododendron*은 그리스어

rhodon(장미)과 dendron(나무)의

합성어로 장미를 닮은 나무라는

뜻인데, 꽃의 모양을 나타낸 것으로

추정하며 진달래속을 일컫는다.

종소명 *brachycarpum*은 ‘짧은

열매의’라는 뜻이다.





두릅나무과 팔손이속

팔손이

Fatsia japonica (Thunb.) Decne.
& Planch.

약관심(LC)

성상	상록 활엽 관목
자생 환경	숲 가장자리
꽃	11~12월, 흰색
높이	2~4m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Fatsia*의 어원은 불명확하나, 라틴어 *facies*(얼굴)에서 유래했거나, 일본어 이름 *Yatsude*(여덟개의 손)에서 유래한 것으로 추정하며 둘 다 잎의 형태를 표현한 이름으로 팔손이속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 '일본의'라는 뜻으로 발견지 또는 분포지를 나타낸다.

굴거리나무과 굴거리나무속

굴거리나무

Daphniphyllum macropodum Miq.

약관심(LC)

성상	상록 활엽 교목
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
열매	9~12월, 남색
높이	3~10m
광조건	반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 굴거리나무라는 이름은 주요 자생지인 제주 방언 ‘굴거리낭’에서 유래했다. ‘굴거리낭’을 분석해보면 ‘굴’은 산골을 뜻하고, ‘거리’는 거리왓(일정한 거리 내에 있는 밭)과 같이 일정한 지역에 있다는 것을 뜻하며, ‘낭’은 나무를 뜻하는 것으로 해석할 수 있다. 이에 따라 굴거리나무라는 이름은 산지(산골) 숲속에서 군락을 이루거나 일정한 지역에 모여 자라는 모습에서 유래한 것으로 추론된다.

학명 유래 — 속명

*Daphniphyllum*은 그리스어 daphne(월계수의 옛이름)와 phyllon(잎)의 합성어로, 잎의 형태가 월계수와 비슷한 것에서 유래했으며 굴거리나무속을 일컫는다. 종소명 *macropodum*은 ‘긴 자루의, 굵은 줄기의’라는 뜻으로 긴 잎자루의 형태에서 유래했다.





녹나무과 까마귀쪽나무속

까마귀쪽나무

Litsea japonica (Thunb.) Juss.

약관심(LC)

성상	상록 활엽 관목, 교목
자생 환경	숲 가장자리
열매	6~7월, 검정색
높이	7m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 까마귀쪽나무라는 이름은 제주 방언 '까마귀쪽낭'에서 비롯했다. '까마귀'는 열매가 검게 익는다는 뜻에서 붙여진 말이고, 족낭이 때죽나무의 제주 방언이므로 '쪽낭'은 때죽나무를 닮았다는 뜻에서 붙여진 말이다. 따라서 까마귀쪽나무라는 이름은 때죽나무를 닮았으나 열매가 검게 익는다는 뜻에서 붙여진 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Litsea*는 중국어李子(li si, 자두)에서 유래한 것으로, 열매가 작은 자두를 닮은 것을 나타내며 까마귀쪽나무속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 '일본의'라는 뜻으로 발견지 또는 분포지를 나타낸다.

국명 찾아보기

가락지나물	86	공작고사리	55
가시영경귀	147	관중	58
가시연꽃	154	광나무	133
가지고비고사리	99	구슬꽃나무	68
가침박달	112	구슬덩매이	108
갈풀	26	국수나무	67
감자난초	81	굴거리나무	168
개고사리	56	궁궁이	41
개다래	102	그늘사초	17
개맥문동	20	금강봄맞이	49
개병풍	153	금강애기나리	95
개복수초	36	금평의다리	52
개비자나무	126	김의털	18
개암나무	113	까마귀쪽나무	169
개정향풀	51	꼬랑사초	19
개회향	32	꼬리조팝나무	66
갯기름나물	88	꽃고비	96
갯버들	69	평의다리	53
갯사상자	48	평의바람꽃	50
갯취	155	나도생강	157
갯활량나물	89	나도히초미	161
고로쇠나무	119	낙시고사리	61
고본	33	남산제비꽃	35
고비	98	냉초	77
골고사리	159	너도개미자리	30

넉줄고사리	54	박새	82
노랑무늬붓꽃	21	박쥐나무	115
노루삼	91	밭풀고사리	62
눈향나무	125	백두산떡쑥	47
다정큼나무	106	백서향	107
당단풍나무	118	백선	92
대청부채	85	벼룩이울타리	16
도깨비부채	151	복자기	121
도깨비쇠고비	162	붓순나무	135
도루박이	25	비목나무	142
돈나무	132	비자나무	127
돌단풍	150	비짜루	34
두메부추	23	산겨릅나무	114
둥근인가목	65	산괴불주머니	37
띠	27	산비장이	93
마가목	124	산호수	128
만병초	166	삼지구엽초	78
매자나무	110	삿갓나무	76
모감주나무	123	상산	109
모람	164	새덕이	136
모래지치	44	새우난초	83
문주란	158	생강나무	116
미나리냉이	90	생달나무	140
바늘엉겅퀴	146	석위	163
바위수국	103	섬남성	84
바위채송화	42	섬백리향	64

세뿔석위	100	자귀나무	71
세뿔투구꽃	87	작살나무	111
세잎종덩굴	101	전호	40
센달나무	139	제주조릿대	129
솔나물	31	좀목형	70
수크령	29	죽절초	130
순비기나무	105	지리대사초	22
식나무	134	쪽동백나무	117
신나무	120	참당귀	94
실새풀	28	참식나무	138
십자고사리	60	청나래고사리	57
아왜나무	137	큰절굿대	148
암대극	45	큰천남성	156
애기기린초	43	타래붓꽃	24
애기모람	63	터리풀	149
애기우산나물	46	털머위	152
야산고비	97	투구꽃	39
연영초	79	파초일엽	160
연화바위솔	74	팔손이	167
오갈피나무	122	한라개승마	38
옥녀꽃대	75	호랑가시나무	165
왕머루	104	후박나무	143
왕백량금	131		
육박나무	141		
일색고사리	59		
일월비비추	80		

학명 찾아보기

<i>Acer pictum</i> var. <i>mono</i> (Maxim.) Maxim. ex Franch.	119	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	40
<i>Acer pseudosieboldianum</i> (Pax) Kom.	118	<i>Apocynum lancifolium</i> Russanov	51
<i>Acer tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i> (Maxim.) Wesm.	120	<i>Arachniodes standishii</i> (T.Moore) Ohwi	59
<i>Acer tegmentosum</i> Maxim.	114	<i>Ardisia crenata</i> Sims	131
<i>Acer triflorum</i> Kom.	121	<i>Ardisia pusilla</i> A.DC.	128
<i>Aconitum austrokoreense</i> Koidz.	87	<i>Argusia sibirica</i> (L.) Dandy	44
<i>Aconitum jaluense</i> Kom.	39	<i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott	156
<i>Actaea asiatica</i> H.Hara	91	<i>Arisaema takesimense</i> Nakai	84
<i>Actinidia polygama</i> (Siebold & Zucc.) Planch. ex Maxim.	102	<i>Aruncus dioicus</i> var. <i>aethusifolius</i> (H.Lév.) H.Hara	38
<i>Adiantum pedatum</i> L.	55	<i>Asparagus schoberioides</i> Kunth	34
<i>Adina rubella</i> Hance	68	<i>Asplenium antiquum</i> Makino	160
<i>Adonis pseudoamurensis</i> W.T.Wang	36	<i>Asplenium komarovii</i> Akasawa	159
<i>Alangium platanifolium</i> var. <i>trilobum</i> (Miq.) Ohwi	115	<i>Astilboides tabularis</i> (Hemsl.) Engl.	153
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	71	<i>Athyrium niponicum</i> (Mett.) Hance	56
<i>Allium dumebuchum</i> H.J.Choi	23	<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	134
<i>Androsace cortusifolia</i> Nakai	49	<i>Berberis koreana</i> Palib.	110
<i>Anemone raddeana</i> Regel	50	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	28
<i>Angelica gigas</i> Nakai	94	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.	83
<i>Angelica polymorpha</i> Maxim.	41	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	111
<i>Angelica tenuissima</i> Nakai	33	<i>Cardamine leucantha</i> (Tausch) O.E.Schulz	90
<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	47		

<i>Carex lanceolata</i> Boott	17	kaike	62
<i>Carex mira</i> Kük.	19	<i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz.	92
<i>Carex okamotoi</i> Ohwi	22	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai	58
<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex J.Forbes) K.Koch	126	<i>Echinops dahuricus</i> Fisch. ex Hornem.	148
<i>Chloranthus fortunei</i> (A.Gray) Solms	75	<i>Eleutherococcus sessiliflorus</i> (Rupr. & Maxim.) S.Y.Hu	122
<i>Cinnamomum chekiangense</i> Nakai	140	<i>Epimedium koreanum</i> Nakai	78
<i>Cirsium japonicum</i> var. <i>spinossi-</i> <i>mum</i> Kitam.	147	<i>Eremogone juncea</i> (M.Bieb.) Fenzl	16
<i>Cirsium rhinoceros</i> (H.Lév. & Vani- ot) Nakai	146	<i>Euphorbia jolkinii</i> Boiss.	45
<i>Clematis koreana</i> Kom.	101	<i>Euryale ferox</i> Salisb.	154
<i>Cnidium japonicum</i> Miq.	48	<i>Exochorda serratifolia</i> S.Moore	112
<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels	99	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	152
<i>Corydalis speciosa</i> Maxim.	37	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch.	167
<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. ex Trautv.	113	<i>Festuca ovina</i> L.	18
<i>Crinum asiaticum</i> var. <i>japonicum</i> Baker	158	<i>Ficus oxyphylla</i> Miq. ex Zoll.	164
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl	162	<i>Ficus thunbergii</i> Maxim.	63
<i>Daphne kiusiana</i> Miq.	107	<i>Filipendula glaberrima</i> Nakai	149
<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.	168	<i>Galium verum</i> subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz.	31
<i>Davallia mariesii</i> H.J.Veitch	54	<i>Hosta capitata</i> (Koidz.) Nakai	80
<i>Dicranopteris pedata</i> (Houtt.) Na-		<i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton	165
		<i>Illicium anisatum</i> L.	135
		<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	27

<i>Iris dichotoma</i> Pall.	85	<i>Onoclea interrupta</i> (Maxim.) Ching & P.C.Chiu	97
<i>Iris lactea</i> var. <i>chinensis</i> (Fisch.) Koidz.	24	<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.	81
<i>Iris odaesanensis</i> Y.N.Lee	21	<i>Orixa japonica</i> Thunb.	109
<i>Juniperus chinensis</i> var. <i>sargentii</i> A.Henry	125	<i>Orostachys iwarenge</i> (Makino) H.Hara	74
<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	123	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	98
<i>Ligularia mongolica</i> (Turcz.) DC.	155	<i>Paris verticillata</i> M.Bieb.	76
<i>Ligusticum tachiroei</i> (Franch. & Sav.) M.Hiroe & Constance	32	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	29
<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	133	<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb.	88
<i>Lindera erythrocarpa</i> Makino	142	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	26
<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	116	<i>Phedimus middendorffianus</i> (Maxim.) 't Hart	43
<i>Liriope spicata</i> (Thunb.) Lour.	20	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T. Aiton	132
<i>Litsea coreana</i> H.Lév.	141	<i>Polemonium caeruleum</i> subsp. <i>kiushianum</i> (Kitam.) H.Hara	96
<i>Litsea japonica</i> (Thunb.) Juss.	169	<i>Polia japonica</i> Thunb.	157
<i>Lonicera vesicaria</i> Kom.	108	<i>Polystichum craspedosorum</i> (Maxim.) Diels	61
<i>Machilus japonica</i> Siebold & Zucc. ex Blume	139	<i>Polystichum polyblepharum</i> (Roem. ex Kunze) C.Presl	161
<i>Machilus thunbergii</i> Siebold & Zucc.	143	<i>Polystichum tripterum</i> (Kunze) C.Presl	60
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	57	<i>Potentilla anemonifolia</i> Lehm.	86
<i>Minuartia laricina</i> (L.) Mattf.	30	<i>Pyrrosia hastata</i> (Thunb. ex Houtt.) Ching	100
<i>Mukdenia rossii</i> (Oliv.) Koidz.	150		
<i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz.	136		
<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.	138		

<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.	163	<i>Thalictrum rochebruneum</i>	
<i>Rhaphiolepis indica</i> var. <i>umbellata</i>		Franch. & Sav.	52
(Thunb. ex Murray) H. Ohashi	106	<i>Thermopsis fabacea</i> (Pall.) DC.	89
<i>Rhododendron brachycarpum</i>		<i>Thymus quinquecostatus</i> var. <i>mag-</i>	
D. Don ex G. Don	166	nus (Nakai) Kitam.	64
<i>Rodgersia podophylla</i> A. Gray	151	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold &	
<i>Rosa spinosissima</i> L.	65	Zucc.	127
<i>Salix gracilistyla</i> Miq.	69	<i>Trillium camschatcense</i> Ker Gawl.	
<i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai	130		79
<i>Sasa quelpaertensis</i> Nakai	129	<i>Veratrum oxysepalum</i> Turcz.	82
<i>Schizophragma hydrangeoides</i>		<i>Veronicastrum sibiricum</i> (L.) Pen-	
Siebold & Zucc.	103	nell	77
<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr	25	<i>Viburnum odoratissimum</i> var. <i>awa-</i>	
<i>Sedum polytrichoides</i> Hemsl.	42	buki (K. Koch) Zabel ex Rümpler	137
<i>Serratula coronata</i> subsp. <i>insularis</i>		<i>Viola albida</i> var. <i>chaerophylloides</i>	
(Iljin) Kitam.	93	(Regel) F. Maek. ex H. Hara	35
<i>Sorbus commixta</i> Hedl.	124	<i>Vitex negundo</i> var. <i>incisa</i> (Lam.)	
<i>Spiraea salicifolia</i> L.	66	C. B. Clarke	70
<i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel	67	<i>Vitex rotundifolia</i> L. f.	105
		<i>Vitis amurensis</i> Rupr.	104
<i>Streptopus ovalis</i> (Ohwi) F. T. Wang			
& Y. C. Tang	95		
<i>Styrax obassia</i> Siebold & Zucc.	117		
<i>Syneilesis aconitifolia</i> (Bunge) Max-			
im.	46		
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> var.			
<i>sibiricum</i> Regel & Tiling	53		

참고자료

식물 특성정보

- 국립수목원. 국가표준식물목록. <http://www.nature.go.kr/>
- 국립수목원. 국가생물종지식정보시스템. <http://www.nature.go.kr>
- Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO & Harvard University Herbaria. eFloras. <http://www.efloras.org/>

국명 및 학명 유래

- 조민제, 최동기, 최성호, 심미영, 지용주, 이웅. (2021). 『한국 식물 이름의 유래 ‘조선식물향명집’ 주해서』. 심플라이프
- Dave's Garden. Botany. <https://davesgarden.com/guides/botany/>
- Wikimedia Foundation. Wiktionary. <https://www.wiktionary.org/>

사진 제공

- 이기홍 - 연화바위술

질감으로 찾는
우리꽃
정원식물

발행일	2023년 12월 31일
발행처	국립수목원
발행인	국립수목원장
집필진	이경미, 안시내, 이문규, 주이슬, 박소현, 박효근, 정채연, 이주영, 강지우, 김현정, 배준규, 최 경, 정미애
식물검수	손동찬
디자인	품투필
인쇄	수디자인
사진	국립수목원, 이기홍
발간등록번호	11-1400119-000497-01
I S B N	979-11-92743-38-7 90520

국립수목원 2023

이 책에 실린 모든 글과 사진은 저작권법에 따라 보호받으며 무단복제나 전제를 금합니다.

질감으로 찾는 우리꽃 정원식물

발간등록번호 11-1400119-000497-01

비매품/무료



ISBN 979-11-92743-38-7