

형태로 찾는 우리꽃 정원식물

Korean Native Garden Plants Classified by Their Form



국립수목원

산림청 국립수목원
Korea National Arboretum

형태로 찾는 우리꽃 정원식물

Korean Native Garden Plants Classified by Their Form

목차

- 008 일러두기
- 009 이 책을 보는 방법
- 010 식물의 형태
- 017 화서로 구분하는 식물 형태

- 019 수직형
- 055 구형
- 069 반구형
- 089 기본형
- 121 분산형
- 153 곡선형

- 178 국명 찾아보기
- 181 학명 찾아보기
- 185 참고자료

수직형

20	무릇	29	조개나물	38	약난초	47	참좁쌀풀
21	맥문동	30	층꽃나무	39	주름제비란	48	노루삼
22	개맥문동	31	꽃향유	40	감자난초	49	왜승마
23	큰두루미꽃	32	송장풀	41	산괴불주머니	50	춧대승마
24	곤달비	33	전주물꼬리풀	42	꼬리풀	51	큰제비고깔
25	영아자	34	석잠풀	43	긴산꼬리풀	52	백선
26	숫잔대	35	털부처꽃	44	산꼬리풀	53	노루오줌
27	나도생강	36	참여로	45	냉초		
28	배초향	37	칠보치마	46	가는범꼬리		

구형

56	두메부추	59	한라부추	62	영경귀	65	삿죽채
57	산달래	60	산부추	63	고려영경귀	66	북방산비장이
58	산마늘	61	울릉산마늘	64	절굿대	67	수리취

반구형

70 지리강활	75 갯기름나물	80 미나리냉이	85 큰평의비름
71 참당귀	76 참나물	81 돌마타리	86 큰기린초
72 고본	77 톱풀	82 쥐오줌풀	87 섬기린초
73 섬바디	78 웅긔나물	83 갯패랭이꽃	88 피뿌리풀
74 어수리	79 등골나물	84 평의비름	

기본형

90 섬갯쑥부쟁이	98 울릉국화	106 물매화	114 홀아비바람꽃
91 눈갯쑥부쟁이	99 포천구절초	107 용담	115 평의바람꽃
92 벌개미취	100 솜나물	108 자주쓴풀	116 세바람꽃
93 좁개미취	101 깽깽이풀	109 둥근이질풀	117 노루귀
94 해국	102 슬체꽃	110 범부채	118 모데미풀
95 한라구절초	103 동자꽃	111 매미꽃	119 딱지꽃
96 산구절초	104 개별꽃	112 설앵초	120 나도양지꽃
97 구절초	105 큰개별꽃	113 남바람꽃	

분산형

122 전호	130 마타리	138 그림	146 터리풀
123 시호	131 독갈	139 은평의다리	147 단풍터리풀
124 뫇미나리	132 대나물	140 평의다리	148 오이풀
125 개정향풀	133 가는대나물	141 연잎평의다리	149 가는오이풀
126 비짜루	134 솔방울고랭이	142 좁평의다리	150 도깨비부채
127 참취	135 방아풀	143 금평의다리	151 토현삼
128 개미취	136 누린내풀	144 자주평의다리	
129 층층잔대	137 실새풀	145 눈개승마	

곡선형

154 은방울꽃	160 용dung굴레	166 금강초롱꽃	172 금낭화
155 풀솜대	161 죽대	167 윤판나물야재비	173 수크령
156 맥문야재비	162 등굴레	168 애기나리	174 까치수염
157 목포용dung굴레	163 도라지모시대	169 윤판나물	175 큰까치수염
158 통dung굴레	164 모시대	170 큰애기나리	176 세뿔투구꽃
159 늦dung굴레	165 초롱꽃	171 고삼	177 산오이풀

일러두기

1. 이 책에서 활용된 식물소재는 모두 우리 산과 들에서 자라는 자생식물입니다.
2. 식물은 APG IV 분류체계에 따른 과명을 기준으로 배열하였습니다.
3. 식물의 국명과 학명은 국가표준식물목록을 기준으로 하였습니다.
4. 식물의 형태는 꽃의 모양과 식물의 전체적인 모습이 정원에서 나타내는 시각적 효과를 고려하여 총 6가지의 형태인 '수직형, 구형, 반구형, 기본형, 분산형, 곡선형'으로 나누었습니다.
5. 총 150종의 식물을 선정하였으며 형태에 따라 수직형(34종), 구형(12종), 반구형(19종), 기본형(31종), 분산형(30종), 곡선형(24종)으로 구분하였습니다.
6. 한국 적색목록(Redlist)기준 평가등급에 따라 '위급(CR), 위기(EN), 취약(VU), 약관심(LC), 준위협(NT), 자료부족(DD)'으로 표기해두었습니다. 또한 한반도 자생환경에 적응하여 진화하였으며 세계적으로 우리나라에만 분포하는 귀중한 유전자원인 특산식물(Korean Endemic Plants)도 같이 표기하였습니다.
7. 이 책은 식물의 형태를 고려하여 식재 조합을 하기 위한 가이드라인으로서 식물이 가진 시각적 요소에 초점을 맞추었습니다. 실제 적용 시 정원의 환경과 공간에 알맞게 적용하시기를 바랍니다.

이 책을 보는 방법

본 도서는 식물이 가지는 시각적 요소 중 형태를 바탕으로 식재조합을 하기 위한 가이드라인을 제시하고 있습니다. 식물의 전체적인 모습과 꽃의 모양을 고려하여 형태를 수직형, 구형, 반구형, 기본형, 분산형, 곡선형 총 6가지로 구분하였고, 각 식물의 기본정보 및 생육환경, 번식법, 이름 유래에 대한 정보를 함께 담았습니다.

상세사진

전체사진

식물 유래 정보

Asparagaceae > Liriope



비짜루과 맥문동속

맥문동

Liriope muscari (Decne.) L.H.Bailey

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	5~6월, 자주색
높이	0.3~0.5m
광조건	양지, 반양지
토질	경토, 양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



과명, 속명(영문)

과명, 속명(국문)

국명

학명

한국 적색목록

평가등급 및 특산 여부

식물 성상 및 기본생육정보

수직형

대표형태

국명 유래 — 한자어 맥문동(麥門冬)에서 유래했는데, 잔뿌리가 있는 모양이 보리의 터럭(까끄라기)을 닮았고 겨울에도 잎이 마르지 않고 푸르다는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Liriope*는 그리스 신화에서 나르시스(Narcissus)의 어머니이자 샘물의 요정 이올에서 유래한 것으로 맥문동속을 일컫는다. 종소명 *muscari*는 그리스어 'moschos(시향 냄새가 나는)'에서 유래했다.

식물의 형태

정원 디자인에 깊이를 더해주는 식물의 형태는 정원에 개성을 부여하며 분위기를 조성하는 데 큰 역할을 합니다. 형태에 따른 식물의 역할은 시각적으로 눈에 잘 띄어 시선을 끄는 초점식물(수직형, 구형, 반구형), 정원의 양식을 결정하고 계절적 흥미를 제공하며 부피감이 있어 공간을 채우는 중간식물(기본형, 분산형, 곡선형), 낮게 바닥을 덮는 지피 식물로 구분할 수 있습니다. 서로 다른 형태를 적절하게 배치하면 대비, 부각 등의 효과가 나타나 정원의 다양한 시각적 즐거움을 만들어 낼 수 있습니다. 반대로 비슷한 형태를 가진 식물을 나란히 배치하면 균형을 이루고 안정적인 느낌을 줍니다. 이처럼 식물의 다양한 형태와 색채를 신중하게 고려하여 조합하면 사계절 내내 아름답고 역동적인 정원에 한 걸음 더 가까워질 수 있습니다.



오소정원



배케



여미지식물원



덴버식물원

수직형

직선적인 모양이 강하게 두드러지는 수직형 식물은 정원에 높이를 더해줍니다. 주로 수상화서, 총상화서, 원추화서 등을 가진 식물들이 이에 해당되며 원추화서의 경우 꽃이 달린 꽃자루가 비교적 짧아 선적인 느낌이 강할 경우 수직형으로 분류하였습니다. 수직형 식물은 시각적으로 강렬한 형태를 가지고 있어 초점식물로 사용되며 시선을 이동시키는 역할을 합니다.



긴산꼬리풀



왜승마



꽃향유



냉초

구형

시선을 단번에 주목시키는 동그란 모양의 구형 식물은 정원에 생동감을 부여해 극적인 효과를 줍니다. 두상화서와 산형화서의 식물처럼 작고 가는 꽃들이 모여 동그란 형태를 이루는 식물이 구형에 해당됩니다. 시선을 부드럽게 집중시키는 초점식물로 사용되며 뚜렷한 형태로 인해 다른 식물과 조합할 경우 정원에서 강한 대비 효과를 줄 수 있습니다. 나란히 반복하여 배치하면 정원에 리듬감을 주어 즐거움을 더할 수 있습니다.



백두재



환라부추



철곳대



두메부추

반구형

시각적으로 안정감과 차분함을 주는 반구형 식물은 나비와 벌들이 수월하게 착륙하여 쉬었다 갈 수 있는 휴식소가 되기도 합니다. 주로 두상화서, 산방화서, 산형화서, 취산화서 등 반원을 이루는 식물로 구성됩니다. 식재 계획에 있어 초점식물로 활용되기도 하며 수직형 식물과 같이 식재하면 강한 직선적인 느낌을 보완해주며 경관이 부드럽게 이어지도록 도와줍니다.



갯패랭이꽃



꿩의비름



고본



퍼부리풀

기본형

하늘을 향해 활짝 피어있는 기본형 식물은 우리의 얼굴에 미소를 짓게 합니다. 두상화서, 산방화서, 산형화서, 취산화서 등 방사상으로 대칭되는 화형을 가진 식물로 구분하였습니다. 같은 모양의 꽃들이 모여 피는 기본형 식물은 정원에 부피감을 주며 공간을 채워주거나 초점식물을 돋보이게 해주는 역할을 합니다.



구름국화



모데미풀



포천구절초



해국

분산형

분산형 식물은 정원에 빈 공간을 채워주고 멋진 배경을 제공합니다. 두상화서, 배상화서, 산방화서, 산형화서, 수상화서, 원추화서, 총상화서, 취산화서 중 꽃자루의 길이가 길고 줄기 사이에 빈 공간이 있는 식물, 잎 위로 작고 가는 꽃들이 흩뿌려진 듯한 형태를 가진 식물들이 주로 해당됩니다. 분산형 식물을 시각적으로 대비되는 식물 사이에 심어주면 분위기를 완화시켜 부드럽고 조화롭게 만들어줍니다. 식물 사이로 투영되는 모습은 정원에 장면 전환의 효과를 주기도 합니다.



독갈



금평의다리



마타리



참취

곡선형

곡선형 식물은 분수처럼 부드러운 선을 이룹니다. 수상화서, 원추화서, 총상화서의 식물이 해당되며 화서나 줄기가 땅을 향해 아래로 휘는 것이 특징입니다. 우아한 느낌을 주며 각기 다른 형태의 식물 사이를 자연스럽게 이어주는 역할을 합니다.



화서로 구분하는 식물 형태

분산형



배상화서
cyathium

컵 같은 종포 속에 한 개의 암꽃과 여러 개의 수꽃이 들어있는 꽃차례

반구형, 기산형



취산화서
cyme


정단에 있는 꽃이 먼저 다 핀 다음 주위의 꽃들이 피는 꽃차례

구형



산형화서
umbel

정단부가 평편하거나 볼록하고, 꽃자루가 한 지점에 모여 달리 우산살 모양을 하는 꽃차례



산방화서
corymb

꽃자루의 길이가 위로 갈수록 짧아져 꽃대 끝이 거의 같은 높이를 갖는 꽃차례



두상화서
capitulum

꽃자루가 없거나 짧은 꽃이 줄기 끝에 모여 밀생한 꽃차례

수직형, 곡선형



총상화서
raceme

꽃대축이 길게 자라고 꽃자루도 발달하나, 분리하지 않는 꽃차례



수상화서
spike

가늘고 긴 꽃대축에 꽃자루가 없는 작은 꽃이 여러 송이 붙은 이삭 모양의 꽃차례



원추화서
panicle

총상꽃차례가 분지하여 전체적으로 원뿔 모양을 이룬 꽃차례



수직형

비짜루과 무릇속

무릇

Barnardia japonica (Thunb.)
Schult.f.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 건조지
꽃	8~9월, 연보라색
높이	0.2~0.5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 무릇이라는 이름은 원모양의 비늘줄기가 있고 무리지어 꽃을 피우는 모습에서 유래했다. 땅속 비늘줄기를 나타내는 우리말 ‘모릅’과 비늘줄기를 통해 번식하여 무리 지어 꽃을 피우는 모습을 형상화한 ‘물꽃’(물꽃)이라는 서로 다른 어원에서 출발한 이름이 17세기를 거치면서 혼용되다가 ‘물꽃’으로 통합되고, 다시 변화를 거쳐 무릇으로 정착된 것으로 이해된다.

학명 유래 — 속명 *Barnardia*는 영국 생물학자 Edward Barnard(1786~1861)의 이름에서 유래했으며 무릇속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 ‘일본의’라는 뜻으로 최초 발견지를 나타낸다.



비짜루과 맥문동속

맥문동

Liriope muscari (Decne.) L.H.Bailey

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	5~6월, 자주색
높이	0.3~0.5m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 한자어 맥문동(麥門冬)에서 유래했는데, 잔뿌리가 있는 모양이 보리의 터럭(까끄라기)을 닮았고 겨울에도 잎이 마르지 않고 푸르다는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Liriope*는 그리스 신화에서 나르시스(Narcissus)의 어머니이자 샘물의 요정 이름에서 유래한 것으로 맥문동속을 일컫는다. 종소명 *muscari*는 그리스어 ‘moschos(사향 냄새가 나는)’에서 유래했다.



비짜루과 맥문동속

개맥문동

Liriope spicata (Thunb.) Lour.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 초지
꽃	5~7월, 보라색
높이	0.25~0.4m
광조건	반음지, 음지
토질	점토, 양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 개맥문동이라는 이름은 맥문동(麥門冬)과 닮았다는(개) 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Liriope*는 그리스 신화에서 나르시스(Narcissus)의 어머니이자 샘물의 요정 이름에서 유래한 것으로 맥문동속을 일컫는다. 종소명 *spicata*는 spica(이삭)의 형용사형으로 '이삭 모양 꽃의, 이삭 모양의'라는 뜻이다.



비짜루과 두루미꽃속

큰두루미꽃

Maianthemum dilatatum

(A.W.Wood) A.Nelson & J.F.Macbr.

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	5~6월, 흰색
높이	0.08~0.25m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 큰두루미꽃이라는 이름은 두루미꽃에 비해 잎과 식물체가 크다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Maianthemum*은 그리스어 majos(5월)와 anthemon(꽃)의 합성어로 꽃 피는 시기를 나타내며 두루미꽃속을 일컫는다. 종소명 *dilatatum*은 ‘넓어진’이라는 뜻으로 잎이 상대적으로 큰 것에서 유래했다.



국화과 곰취속

곤달비

Ligularia stenocephala (Maxim.)
Matsum. & Koidz.

자료부족(DD)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 냇가 주변
꽃	8~9월, 노란색
높이	1m
광조건	반음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Ligularia*는 라틴어 ligula(작은 혀, 작은 검)가 어원으로 혀 모양 꽃잎에서 유래했으며 곰취속을 일컫는다.





초롱꽃과 영아자속

영아자

Asyneuma japonicum (Miq.) Briq.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	7~9월, 보라색
높이	0.5~1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종



국명 유래 — 방울 모양의 꽃을 피우는 식물인 영아초(鈴兒草=더덕)를 닮은 식물이라는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Asyneuma*는 그리스어 a(부정)와 syn(유사)과 euma(속명 *Phyteuma*의 약어)의 합성어로, 과거 영아자가 속했던 속명 *Phyteuma*와 다른 속이라는 뜻에서 붙여졌으며 영아자속을 일컫는다. 종소명 *japonicum*은 ‘일본의’라는 뜻으로 분포지 또는 발견지를 나타낸다.



초롱꽃과 숫잔대속

숫잔대

Lobelia sessilifolia Lamb.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	습한 초지
꽃	8~9월, 보라색
높이	0.5~1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — ‘숫’(수컷)과 ‘잔대’의 합성어로, 잔대를 닮았으나 더 억세고 거칠어 보인다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다. 산지의 습지에서 주로 자라는데 땅속줄기가 있고 보라색 꽃이 피는 모습 등에서 잔대와 비슷하다. 식물명에서 ‘수(叟)’는 수까치깨와 숫명다래나무와 같이 일반적으로 수컷의 뜻으로, 보다 거칠고 억세어 보일 때 사용하는 것이므로 ‘숫잔대’의 ‘숫’을 수컷의 의미로 해석한다.

학명 유래 — 속명 *Lobelia*는 플랑드르(Flandre)의 물리학자이자 식물학자인 Matthias de Lobel(1538~1616)의 이름에서 유래했으며 숫잔대속을 일컫는다. 종소명 *sessilifolia*는 ‘자루가 없는 잎’의 뜻으로 잎자루가 없는 것에서 유래했다.





닭의장풀과 나도생강속

나도생강

Pollia japonica Thunb.

준위협(NT)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	8~9월, 흰색
높이	0.3~0.8m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Pollia*는 은행가이자 암스테르담 시장을 지냈던 네덜란드 사람 Jan van der Poll의 이름에서 유래했으며 나도생강속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 '일본의'라는 뜻으로 발견지 또는 분포지를 나타낸다.



꿀풀과 배초향속

배초향

Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	7~9월, 보라색
높이	0.4~1m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 한자명

‘排草香’(배초향)이 어원으로, 다른 풀을 물리치는 향기를 가진 식물이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Agastache*는

그리스어 *agan*(매우 많은)과 *stachys*(이삭)의 합성어로, 이삭처럼 많이 달리는 꽃 모양에서 유래했으며 배초향속을 일컫는다. 종소명 *rugosa*는 ‘주름이 있는’이라는 뜻으로 주름진 잎의 모양에서 유래했다.





꿀풀과 조개나물속

조개나물

Ajuga multiflora Bunge

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	4~5월, 보라색
높이	0.3m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 조개나물라는 이름은 마주나기를 하는 잎 사이에서 꽃이 피는 모양이 마치 조개처럼 보이고 나물로 식용한 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Ajuga*는 유래가 불분명하나 그리스어 a(아닌, 없는)와 ingum(꽃받침)의 합성어로, 꽃받침이 갈라지지 않는 것에서 유래했다고 추정하며 조개나물속을 일컫는다. 종소명 *multiflora*는 ‘꽃이 많은’이라는 뜻이다.



꿀풀과 층꽃나무속

층꽃나무

Caryopteris incana (Thunb. ex Houtt.) Miq.

약관심(LC)

성상	낙엽 활엽 관목
자생 환경	해변 바위지대
꽃	7~9월, 보라색
높이	0.3~0.6m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



학명 유래 — 속명 *Caryopteris*는 그리스어 karyon(호도)과 pteryx(날개)의 합성어로 열매에 날개가 달린 것을 의미한다. 종소명 *incana*는 '회백색의'라는 뜻이다.



꿀풀과 향유속

꽃향유

Elsholtzia splendens Nakai ex F.
Maek.

약관심(LC)

성상	한해살이풀
자생 환경	초지
꽃	9~10월, 흰색, 보라색, 자주색
높이	0.6m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종



학명 유래 — 속명 *Elsholtzia*는 독일 식물학자 Johann Siegesmund Elsholtz(1623~1688)의 이름에서 유래했으며 향유속을 일컫는다.



꿀풀과 익모초속

송장풀

Leonurus macranthus Maxim.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	8월, 흰색, 분홍색
높이	1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 약하지만 된장이 썩는 듯한 불쾌한 냄새가 나고, 숲속에 가늘게 곧추서서 자라는데 꽃이 반쯤 벌린 듯하면서 흰색에 붉은색의 줄이 있는 모습이 송장(시체)을 연상시킨다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Leonurus*는 그리스어 leon(사자)과 oura(꼬리)의 합성어로, 긴 꽃차례의 모양이 사자의 꼬리를 닮은 것에서 유래했으며 익모초속을 일컫는다. 종소명 *macranthus*는 '큰 꽃의'라는 뜻이다.





꿀풀과 물꼬리풀속

전주물꼬리풀

Pogostemon yatabeanus (Makino)
Press

위급(CR)

성상	여러해살이풀(수생)
자생 환경	수변
꽃	8~10월, 보라색, 자주색
높이	0.3~0.5m
광조건	양지
토질	점토
번식	파종, 삽목



학명 유래 — 종소명 *yatabeanus*는 일본의 식물학자 이름에서 유래되었다.



꿀풀과 석잠풀속

석잠풀

Stachys riederi var. *japonica* (Miq.)

H.Hara

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	5~9월, 분홍색, 자주색
높이	0.3~0.6m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Stachys*는 그리스어로 '이삭'이라는 뜻이다.





부처꽃과 부처꽃속

털부처꽃

Lythrum salicaria L.

성상	여러해살이풀
자생 환경	습지, 초지
꽃	7~8월, 자주색
높이	1m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	포기나누기, 삽목



국명 유래 — 백중날에 부처를 공양하는 꽃으로 사용되던 데서 유래한 것으로 추정한다. 그러나 우리나라에서는 부처꽃을 공양화로 사용했다는 기록이 없고 일본에서는 불교 행사에서 사용했다. 따라서 불전에 꽃을 공양하는 풍습은 우리나라에도 있었으나, 부처꽃이라는 이름이 생겨난 것은 일제강점기에 일본식 불교 행사가 전래된 것과 관련이 있는 것으로 추정된다.

학명 유래 — 속명 *Lythrum*은 산스크리트어 *rudhiram*에서 온 것으로, 그리스어로 *lythron*은 피를 의미 하는데 꽃의 색깔이 붉은 것을 나타내며 부처꽃속을 일컫는다. 종소명 *salicaria*는 잎 모양이 '*Salix*(버드나무속)와 비슷한'이라는 뜻이다.



멜란티움과 여로속

참여로

Veratrum nigrum var. *ussuriense*
O.Loes.

자료부족(DD)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	9월, 검정색, 자주색
높이	1.5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Veratrum*은 라틴어 verator(예언자)에서 유래한 것으로, 해당 식물의 뿌리에 재채기를 일으키는 성분이 있는 점을 '재채기 후에 하는 말은 진실'이라는 북유럽의 전설과 관련지은 것이며 여로속을 일컫는다. 종소명 *nigrum*은 '검은'이라는 뜻이다.






금광화과 칠보치마속

칠보치마

Metanarthecium luteoviride Maxim.

위기(EN)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	6~7월, 흰색, 노란색
높이	0.2~0.4m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종



학명 유래 — 속명 *Metanarthecium*는 그리스어 meta(같이, 후에)와 *Narthecium*속의 합성어이다.



난초과 약난초속

약난초

Cremastra variabilis (Blume) Nakai

준위협(NT)

성상	여러해살이풀(동록성)
자생 환경	숲속
꽃	5~6월, 자주색, 분홍색, 갈색
높이	0.4m
광조건	반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	포기나누기



학명 유래 — 종소명 *variabilis*는 '변하기 쉬운, 각종의'라는 뜻이다.



난초과 나도제비란속

주름제비란

Galearis camtschatica (Cham.)

X.H.Jin, Schuit. & W.T.Jin

취약(VU)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	5~6월, 분홍색
높이	0.3~0.6m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Galearis*는 라틴어 galea(투구)에서 유래되었다. 종소명 *camtschatica*는 '캄차카 지역의'라는 뜻이다.



난초과 감자난초속

감자난초

Oreorchis patens (Lindl.) Lindl.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	5~6월, 노란색
높이	0.3~0.5m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 감자난초라는 이름은 감자 모양의 둥근 가짜비늘줄기가 달리는 난초라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Oreorchis*는 그리스어 oreos(바위, 산)와 charis(난초속 식물)의 합성어로, 바위틈에서 자라는 난초 종류라는 뜻이며 감자난초속을 일컫는다. 종소명 *patens*는 '열려 있는'이라는 뜻으로 꽃의 모양을 묘사한 것으로 보인다.



양귀비과 현호색속

산괴불주머니

Corydalis speciosa Maxim.

약관심(LC)

성상	두해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 건조지
꽃	4~5월, 노란색
높이	0.5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종



학명 유래 — 속명 *Corydalis*는 종달새를 뜻하는 그리스어 korydalis에서 유래한 말로, 긴 꽃뿔이 달린 꽃의 형태가 종달새의 머리 깃을 닮아 붙여졌으며 현호색속을 일컫는다. 종소명 *speciosa*는 '아름다운, 화려한, 불만한 가치가 있는'이라는 뜻이다.



질경이과 꼬리풀속

꼬리풀

Pseudolysimachion linariifolium
(Pall. ex Link) Holub

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월, 보라색, 흰색
높이	0.4~0.7m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종



국명 유래 — 꼬리풀이라는 이름은 길게 자라는 이삭꽃차례의 모양이 짐승의 꼬리를 연상시킨다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명

*Pseudolysimachion*은 pseudo(가짜의, 유사한)와 *Lysimachia*(참좁쌀풀속)의 합성어로, 참좁쌀풀속의 꽃차례를 닮았다는 뜻에서 유래했으며 꼬리풀속을 일컫는다. 종소명 *linariifolium*은 *Linaria*(해란초속)와 비슷한 잎을 가졌다는 뜻에서 유래했다.





질경이과 꼬리풀속

긴산꼬리풀

Pseudolysimachion longifolium
(L.) Opiz

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월, 보라색
높이	1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Pseudolysimachion*은 pseudo(가짜의, 유사한)와 *Lysimachia*(참좁쌀풀속)의 합성어로, 참좁쌀풀속의 꽃차례를 닮았다는 뜻에서 유래했으며 꼬리풀속을 일컫는다.



질경이과 꼬리풀속

산꼬리풀

Pseudolysimachion rotundum var.
subintegrum (Nakai) T.Yamaz.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	8월, 보라색, 파란색
높이	0.4~0.8m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종, 삽목



학명 유래 — 속명 *Pseudolysimachion*은 pseudo(가짜의, 유사한)와 *Lysimachia*(참좁쌀풀속)의 합성어로, 참좁쌀풀속의 꽃차례를 닮았다는 뜻에서 유래했으며 꼬리풀속을 일컫는다. 종소명 *rotundum*은 ‘원모양의’라는 뜻으로 잎의 모양에서 유래했다.



질경이과 냉초속

냉초

Veronicastrum sibiricum (L.)

Pennell

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월, 보라색
높이	0.5~0.9m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 냉초라는

이름은 한자명 '冷草'(냉초)에서 유래한 것으로, 냉증(冷症)을 치료하는 약으로 사용해서 붙여졌다. 땅속줄기를 여성의 냉대하증(冷帶下症)을 치료하는 약재로 사용했다.

학명 유래 — 속명

*Veronicastrum*은 *Veronica*(개불알풀속)와 *-astrum*(유사한)의 합성어로, *Veronica*속 식물과 유사하다는 뜻에서 유래했으며 냉초속을 일컫는다. 종소명 *sibiricum*은 '시베리아의'라는 뜻으로 발견지를 나타낸다.



마디풀과 범꼬리속

가는범꼬리

Bistorta alopecuroides (Turcz. ex Kom.) Nakai

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	6~7월, 흰색, 분홍색
높이	0.15~0.3m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — ‘가는’과 ‘범꼬리’의 합성어로, 범꼬리에 비해 잎이 좁고 길다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Bistorta*는 라틴어 bis(중복)와 tortus(꼬이다)의 합성어로, 중복해서 꼬이는 땅속줄기의 형태에서 유래했으며 범꼬리속을 일컫는다. 종소명 *alopecuroides*는 벼과 독새풀속(*Alopecurus*)과 유사하다는 뜻에서 붙여졌다.





앵초과 참좁쌀풀속

참좁쌀풀

Lysimachia coreana Nakai

약관심(IC)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	습지, 냇가 주변
꽃	6~7월, 노란색, 빨간색
높이	0.5~1m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토
번식	삽목



학명 유래 — 속명 *Lysimachia*는 이 속 식물을 발견한 마케도니아 리시마코스(Lysimachos) 왕의 이름에서 유래했다는 설과 그리스어 lysis(석방, 작별)와 mache(갈등, 불화)의 합성어인 lysimachos(갈등의 종료)에서 유래했다는 설이 있으며 참좁쌀풀속을 일컫는다. 종소명 *coreana*는 '한국의'라는 뜻으로 한국 특산종을 나타낸다.



미나리아재비과 노루삼속

노루삼

Actaea asiatica H.Hara

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	5~6월, 흰색
높이	0.4~0.7m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 노루삼이라는 이름은 꽃차례가 노루의 꼬리를 닮았고 잎이 삼(麻)을 닮은 데서 유래한 이름으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Actaea*는 냄새가 강한 식물이라는 뜻에서 노루삼을 지칭한 라틴어 *actaea*, 또는 딱총나무를 뜻하는 그리스어 *aktea*가 잎과 열매가 닮은 것에서 전용된 것으로 노루삼속을 일컫는다. 종소명 *asiatica*는 '아시아의'라는 뜻으로 주된 분포지 또는 발견지를 나타낸다.





미나리아재비과 노루삼속

왜승마

Actaea japonica Thunb.

성상	여러해살이풀
자생 환경	계곡 주변
꽃	7~8월, 흰색
높이	0.6~0.8m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Actaea*는 냄새가 강한 식물이라는 뜻에서 노루삼을 지칭한 라틴어 *actaea*, 또는 딱총나무를 뜻하는 그리스어 *aktea*가 잎과 열매가 닮은 것에서 전용된 것으로 노루삼속을 일컫는다. 종소명 *japonica*는 '일본의'라는 뜻이다.



미나리아재비과 노루삼속

췌대승마

Actaea simplex (DC.) Wormsk.
ex Prantl

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대 숲속
꽃	4~5월, 흰색
높이	1m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 췌대승마라는 이름은 짧고 작은 꽃자루와 긴 총상꽃차례 모양에서 췌대가 연상되고 승마를 닮았다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Actaea*는 냄새가 강한 식물이라는 뜻에서 노루삼을 지칭한 라틴어 *actaea*, 또는 딱충나무를 뜻하는 그리스어 *aktea*가 잎과 열매가 닮은 것에서 전용된 것으로 노루삼속을 일컫는다. 종소명 *simplex*는 ‘단일한’이라는 뜻으로 꽃차례 모양에서 유래했다.



미나리아재비과 제비고깔속

큰제비고깔

Delphinium maackianum Regel

준위협(NT)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~9월, 보라색
높이	1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 제비고깔에 비해 식물체가 대형이라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Delphinium*은 그리스어 delphinos(돌고래)에서 유래한 것으로, 꽃봉오리의 모양이 돌고래를 닮아서 붙여졌으며 제비고깔속을 일컫는다. 종소명 *maackianum*은 에스토니아계 러시아 생물학자인 Richard Otto Maack(1825~1886)의 이름에서 유래했다.



운향과 백선속

백선

Dictamnus dasycarpus Turcz.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	5~6월, 분홍색
높이	0.9m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 백선이라는 이름은 한자명 '白鮮'(백선)에서 비롯된 것인데, 이는 白羊鮮(백양선)을 축약한 것으로 식물체에서 나는 강한 향기가 마치 양에서 나는 노린내와 같고 뿌리가 회고 곱다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Dictamnus*는 이 속 어떤 식물의 주산지(主產地)인 크레타섬의 산 이름 Dicte에서 유래한 그리스명 diktamnon이 어원으로 백선속을 일컫는다.



범의귀과 노루오줌속

노루오줌

Astilbe chinensis (Maxim.)

Franch. & Sav.

약관심(IC)


성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 계곡 주변
꽃	7~8월, 보라색, 자주색, 분홍색
높이	0.3~0.7m
광조건	반음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 식물에서 나는
냄새를 노루의 오줌 냄새(누린내)라
여긴 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Astilbe*는
그리스어 a(~없는)와 stilbe(윤기)의
합성어로, 비슷하게 생긴
Aruncus(눈개승마속)에 비해
잎과 꽃이 덜 반들거린다는
뜻이며 노루오줌속을 일컫는다.
종소명 *chinensis*는 '중국에
분포하는'이라는 뜻으로 발견지
또는 원산지를 나타낸다.





구형

수선화과 부추속

두메부추

Allium dumebuchum H.J.Choi

위급(CR)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	건초지, 돌틈 및 옹벽, 해안 암석지대
꽃	8~9월, 분홍색
높이	0.2~0.3m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Allium*은 마늘을 일컫는 고대 라틴어로, 냄새라는 뜻의 alere 또는 ha-에 어원을 두고 있으며 부추속을 일컫는다.



수선화과 부추속

산달래

Allium macrostemon Bunge

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 건조지
꽃	5~6월, 흰색, 분홍색, 보라색
높이	0.3~0.7m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 산달래라는 이름은 『물명고』 등에 기록된 山蒜(산산)이 그 어원이며 산에서 자라는 달래라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Allium*은 마늘을 일컫는 고대 라틴어로, 냄새라는 뜻의 alere 또는 ha-에 어원을 두고 있으며 부추속을 일컫는다. 종소명 *macrostemon*은 '수술이 긴'이라는 뜻이다.



수선화과 부추속

산마늘

Allium microdictyon Prokh.

위기(EN)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	5~7월, 연두색
높이	0.4~0.7m
광조건	음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Allium*은 마늘을 일컫는 고대 라틴어로, 냄새라는 뜻의 alere 또는 ha-에 어원을 두고 있으며 부추속을 일컫는다.



수선화과 부추속

한라부추

Allium taquetii H.Lév. & Vaniot

약관심(LC)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	8~9월, 자주색, 보라색
높이	0.27m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종



학명 유래 — 속명 *Allium*은 마늘을 일컫는 고대 라틴어로, 냄새라는 뜻의 alere 또는 ha-에 어원을 두고 있으며 부추속을 일컫는다. 종소명 *taquetii*는 프랑스 신부로 제주도 식물을 연구한 Emile Joseph Taquet [한국명 엄택기(嚴宅基), 1873~1952]의 이름에서 유래했다.



수선화과 부추속

산부추

Allium thunbergii G.Don

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	8~9월, 보라색
높이	0.3~0.6m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 산부추라는 이름은 강원 방언에서 유래했으며 산에서 자라는 야생 부추라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Allium*은 마늘을 일컫는 고대 라틴어로, 냄새라는 뜻의 alere 또는 ha-에 어원을 두고 있으며 부추속을 일컫는다. 종소명 *thunbergii*는 스웨덴 식물학자로 일본 식물을 연구한 Carl Peter Thunberg(1743~1828)의 이름에서 유래했다.





수선화과 부추속

울릉산마늘

Allium ulleungense H.J.Choi & N.Friesen

위기(EN)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대 초지
꽃	5~7월, 흰색, 노란색
높이	0.4~0.7m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Allium*은 마늘을 일컫는 고대 라틴어로, 냄새라는 뜻의 alere 또는 ha-에 어원을 두고 있으며 부추속을 일컫는다.



국화과 엉겅퀴속

엉겅퀴

Cirsium japonicum var. *maackii*
(Maxim.) Matsum.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지, 건초지, 넷가 주변
꽃	5~8월, 자주색, 보라색
높이	0.5~1m
광조건	양지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 옛 이두식 차자(借字)
大居塞(한거식)가 어원으로,
'한'(大)과 '거식'(刺)의 합성어이며
큰 가시가 있는 식물이라는 뜻에서
유래했다. 한거식→항것괴(항가시)→
항것귀→엉것귀→엉겅퀴로
변화했다.

학명 유래 — 속명 *Cirsium*은
그리스어 kirsion에서
유래했는데 고대 의학자
디오스코리데스(Dioscorides)에
의하면 엉겅퀴의 한 종류로
kirsos(정맥류) 치유에 효과가
있다고 하여 붙여졌으며
엉겅퀴속을 일컫는다. 종소명
*japonicum*은 '일본의'라는
뜻이며, 변종명 *maackii*는
러시아 식물학자 Richard Otto
Maack(1825~1886)의 이름에서
유래했다.





국화와 엉겅퀴속

고려엉겅퀴

Cirsium setidens (Dunn) Nakai

약관심(IC)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대 초지
꽃	7~10월, 보라색, 자주색
높이	1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 고려엉겅퀴라는 이름은 고려(한국)에서 나는 특산 엉겅퀴라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Cirsium*은 그리스어 kirsion에서 유래했는데 고대 의학자 디오스코리데스(Dioscorides)에 의하면 엉겅퀴의 한 종류로 kirsos(정맥류) 치유에 효과가 있다고 하여 붙여졌으며 엉겅퀴속을 일컫는다. 종소명 *setidens*는 '가시털 같은 톱니의'라는 뜻이다.



국화과 절굿대속

절굿대

Echinops setifer Iljin

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	4~5월, 파란색, 보라색, 회색
높이	1m
광조건	양지
토질	양토
번식	파종



국명 유래 — 절굿대라는 이름은 꽃차례와 열매의 형태가 절굿공이와 같다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Echinops*는 그리스어 echinos(고슴도치, 성게)와 pos(외관, 닮음)의 합성어로 머리모양꽃차례의 꽃이 고슴도치나 성게를 닮았다고 하여 붙여졌으며 절굿대속을 일컫는다. 종소명 *setifer*는 '가시털이 있는, 센털이 있는'이라는 뜻이다.





국화와 뽕쑥채속

뽕쑥채

Leuzea uniflora (L.) Holub

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	6~8월, 자주색, 보라색, 흰색
높이	0.3~0.7m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종



국명 유래 — ‘뽕쑥’과 ‘채’의 합성어로, 꽃이 핀 총포의 얼룩덜룩한 모습이 뽕쑥의 깃털과 닮았고 줄기에 달린 꽃의 모양이 긴 자루(채)를 연상시키는 것에서 유래했다.

학명 유래 — 종소명 *uniflora*는 ‘꽃이 1개인’이라는 뜻이다.



국화과 산비장이속

북방산비장이

Serratula coronata L.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지, 냇가 주변
꽃	7~10월, 자주색
높이	0.3~1.4m
광조건	양지
토질	양토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Serratula*는 라틴어 serratus(톱니가 있는)의 축소형이다.





국화와 수리취속

수리취

Synurus deltooides (Aiton) Nakai

약관심(IC)


성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 초지
꽃	9~10월, 자주색
높이	0.4~1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종



국명 유래 — 수릿날(단오)에 이 식물을 넣어 둥글게 만든 떡을 먹었던 것에서 유래했다고 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Synurus*는 그리스어 syn(합성)과 oura(꼬리)의 합성어로, 꽃밥의 하부 꼬리모양의 부속물이 합쳐져 통모양을 이루는 것에서 유래했으며 수리취속을 일컫는다. 종소명 *deltooides*는 '세모진 모양의, 삼각주 모양의'라는 뜻으로 잎의 모양에서 유래했다.





반구형

산형과 당귀속

지리강활

Angelica amurensis Schischk.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 냇가 주변
꽃	7월, 흰색
높이	1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Angelica*는 그리스어 angelos(천사)에서 유래한 것으로 강심효과가 있는 약효와 관련하여 죽은 사람을 소생시킨다는 뜻에서 붙여졌으며 당귀속을 일컫는다. 종소명 *amurensis*는 '아무르강 유역에 분포하는'이라는 뜻으로 발견지 또는 분포지를 나타낸다.





산형과 당귀속

참당귀

Angelica gigas Nakai

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	8~9월, 자주색
높이	1~2m
광조건	양지, 반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Angelica*는 그리스어 angelos(천사)에서 유래한 것으로 강심효과가 있는 약효와 관련하여 죽은 사람을 소생시킨다는 뜻에서 붙여졌으며 당귀속을 일컫는다.



산형과 당귀속

고본

Angelica tenuissima Nakai

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	8~9월, 흰색
높이	0.3~0.8m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 고본이라는 이름은 한자명 ‘藎本’(고본)에서 비롯했으며 ‘藎’(고)는 마른나무, ‘本’(본)은 뿌리의 뜻으로, 뿌리의 윗부분에서 싹이 나는 부분까지의 모양이 마른나무와 비슷하다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Angelica*는 그리스어 angelos(천사)에서 유래한 것으로 강심효과가 있는 약효와 관련하여 죽은 사람을 소생시킨다는 뜻에서 붙여졌으며 당귀속을 일컫는다. 종소명 *tenuissima*는 ‘매우 섬세한, 매우 얇은’이라는 뜻으로 가늘게 갈라지는 잎의 모양에서 유래했다.





산형과 섬바디속

섬바디

Dystaenia takesimana (Nakai) Kitag.

약관심(IC)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	건초지, 해안가, 해안초지
꽃	7월, 흰색
높이	2m
광조건	양지
토질	양토, 양토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 종소명

*takesimana*는 '울릉도의'라는 뜻으로 울릉도 특산종을 나타낸다.



산형과 어수리속

어수리

Heracleum moellendorffii Hance

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 냇가 주변
꽃	7~8월, 흰색
높이	0.7~1.5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종



학명 유래 — 속명

*Heracleum*는 그리스 신화 속 Hercules(헤라클레스)에서 유래되었다.





산형과 기름나물속

갯기름나물

Peucedanum japonicum Thunb.

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	건초지, 해안가, 해안초지
꽃	6~8월, 흰색
높이	0.6~1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 갯기름나물이라는 이름은 '갯'과 '기름나물'의 합성어로, 바닷가(갯)에서 나는 기름나물이라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Peucedanum*은 그리스어 *peuke*(소나무)와 *danos*(마른, 건조한)의 합성어로, 쓴맛이 나는 것에서 유래했으며 기름나물속을 일컫는다. 종소명 *japonicum*은 '일본의'라는 뜻으로 최초 발견지를 나타낸다.



산형과 참나물속

참나물

Pimpinella brachycarpa (Kom.) Nakai

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	6~8월, 흰색
높이	0.5~0.8m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 참나물이라는 이름은 '참'과 '나물'이 합쳐진 말로, 참은 좋다(眞)는 뜻이고 나물은 식용할 수 있다(菜)는 뜻이므로 맛이 있는 좋은 식용식물이란 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Pimpinella*는 pepo(호박) 또는 pampinus(포도의 잎 또는 새순)가 어원으로 추정되는 라틴어 pipinella에서 유래한 것으로 참나물속을 일컫는다.

종소명 *brachycarpa*는 그리스어 brachy(짧은)와 carpus(열매)의 합성어로 열매의 길이가 짧다는 뜻이다.





국화과 톱풀속

톱풀

Achillea alpina L.

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~10월, 흰색, 분홍색
높이	0.5~1.1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 톱풀이라는 이름은 잎이 깊게 찢어진 열편이 날카롭게 생겨서 양쪽에 날이 있는 톱을 연상시킨다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명

*Achillea*는 트로이 전쟁의 영웅 아킬레스(Achilles)가 케이론(Cheiron)으로부터 이 식물의 치유 효과를 배운 데서 유래했으며 톱풀속을 일컫는다. 종소명 *alpina*는 '고산의, 고산에 서식하는'이라는 뜻이다.



국화과 참취속

응굿나물

Aster fastigiatus Fisch.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	8~10월, 흰색, 노란색
높이	0.3~1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 꽃차례 또는 꽃이
짐을 나르는 데 사용하는 농기구인
응구를 닮았으며 나물로 식용한
데서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Aster*는
라틴어로 별을 뜻하는데
방사상으로 뻗는 꽃잎의 모양
때문에 붙여졌으며 참취속을
일컫는다. 종소명 *fastigiatus*는
'직립하여 모인'이라는 뜻으로
꽃차례의 모양에서 유래했다.





국화와 등골나물속

등골나물

Eupatorium makinoi var. *oppositifolium* (Koidz.) Kawah. & Yahara

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지, 냇가 주변
꽃	7~10월, 흰색, 분홍색
높이	1~1.5m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 등골나물이라는 이름은 줄기가 곧게 자라 올라가면서 잎이 옆으로 뻗는 모습이 꽃술이 길게 밖으로 나온 모습이 등골(脊骨)을 연상시킨다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Eupatorium*은 소아시아 폰투스의 왕 미트리다테스 (Mithridates Eupator, B.C.132~ B.C.63)에게 바친 이 속의 식물을 약용한 것에서 유래했으며 등골나물속을 일컫는다.



배추과 황새냉이속

미나리냉이

Cardamine leucantha (Tausch)

O.E.Schulz

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	4~5월, 흰색
높이	0.5m
광조건	반음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 미나리냉이라는 이름은 잎은 얇은 미나리를 닮았고 꽃은 냉이를 닮았다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Cardamine*는 식용하는 논냉이의 일종을 뜻하는 그리스어 kardamon에서 유래했으며 황새냉이속을 일컫는다. 종소명 *leucantha*는 '하얀 꽃의'라는 뜻으로 흰색 꽃이 피는 것에서 유래했다.



인동과 마타리속

돌마타리

Patrinia rupestris (Pall.) Juss.

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	바위틈, 초지
꽃	7~9월, 흰색, 노란색
높이	0.2~0.6m
광조건	양지
토질	사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 돌 틈에서 자라는 마타리라는 뜻에서 붙여졌다. 산지 돌 틈에서 주로 자란다. 『조선식물향명집』에서 전통 명칭 '마타리'를 기본으로 하고 식물의 산지(產地)와 학명에 착안한 '돌'을 추가해 신칭했다.

학명 유래 — 속명 *Patrinia*는 프랑스 자연과학자이자 광물학자인 Eugène Louis Melchior Patrin(1742~1815)의 이름에서 유래한 것으로 마타리속을 일컫는다. 종소명 *rupestris*는 '바위 위에서 자라는'이라는 뜻이다.



인동과 쥐오줌풀속

쥐오줌풀

Valeriana fauriei Briq.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	5~8월, 흰색, 분홍색
높이	0.4~0.8m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 뿌리에서 나는 악취가 쥐 오줌 냄새와 비슷하다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Valeriana*는 로마 시대 Valeria(로마 시대 Pannonia 지방의 일부) 지역의 식물명 또는 로마 황제 Publius Aurelius Licinius Valerianus(재위기간: 253~260)의 이름에서 유래했다고 알려져 있으며 쥐오줌풀속을 일컫는다. 종소명 *fauriei*는 프랑스 식물학자 Urbain Jean Faurie(1847~1915)의 이름에서 유래했다.



석죽과 패랭이꽃속

갯패랭이꽃

Dianthus japonicus Thunb.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	해변 바위지대
꽃	7~8월, 보라색, 자주색, 흰색
높이	0.2~0.5m
광조건	양지
토질	사토
번식	파종, 삽목



학명 유래 — 속명 *Dianthus*는 Dios(Zeus, God)와 anthos(꽃)의 합성어로, 제우스의 꽃 또는 신성한 꽃이라는 뜻이며 패랭이꽃속을 일컫는다. 종소명 *japonicus*는 '일본의'라는 뜻이다.



돌나물과 평의비름속

평의비름

Hylotelephium erythrostictum
(Miq.) H.Ohba

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	8~9월, 흰색, 분홍색
높이	0.3~0.9m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 평의비름이라는 이름은 꽃이 피어 있는 모습이 평을 연상시키고 (쇠)비름을 닮았다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명

*Hylotelephium*은 그리스어 hylo(숲)와 telepheion(건강)에서 유래했으며 평의비름속을 일컫는다. 종소명 *erythrostictum*은 '붉은 줄의'라는 뜻이다.





돌나물과 꿩의비름속

큰꿩의비름

Hylotelephium spectabile (Boreau)

H.Ohba

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	8~9월, 자주색, 분홍색
높이	0.3~0.7m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 꿩의비름 종류
중에서 식물체가 크다는 뜻에서
붙여졌다.

학명 유래 — 속명
*Hylotelephium*은 그리스어
hylo(숲)와 telepheion(건강)에서
유래했으며 꿩의비름속을 일컫는다.
종소명 *spectabile*는 '장관의, 눈에
띄는'이라는 뜻이다.



돌나물과 기린초속

큰기린초

Phedimus aizoon var. *latifolius*
(Maxim.) H. Ohba

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월, 노란색
높이	0.5m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Phedimus*는 그리스어 phaidimos(빛나는)에서 비롯한 것으로, 이 속의 어떤 종의 잎 모양에서 유래했다고 추정되며 기린초속을 일컫는다. 종소명 *aizoon*은 '늘푸른 식물'이라는 뜻으로 다른 식물의 속명에서 전용한 것이다.





돌나물과 기린초속

섬기린초

Phedimus takesimensis (Nakai) 't Hart

약관심(LC)

특산식물

성상	여러해살이풀(다육)
자생 환경	해안 숲 가장자리, 바위틈
꽃	7월, 노란색
높이	0.5m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Phedimus*는 그리스어 phaidimos(빛나는)에서 비롯한 것으로, 이 속의 어떤 종의 잎 모양에서 유래했다고 추정되며 기린초속을 일컫는다. 종소명 *takesimensis*는 '울릉도에 분포하는'이라는 뜻이다.



팔꽃나무과 피뿌리풀속

피뿌리풀

Stellera chamaejasme L.

위급(CR)

성상	여러해살이풀
자생 환경	건초지
꽃	7월, 분홍색
높이	0.2~0.4m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종




국명 유래 — 뿌리가 피와 같이 붉은색을 띠다는 뜻에서 유래했다. 뿌리가 긴 방추형으로 겹질은 적갈색이고 속은 흰색인데 독성이 강해 물고기를 잡는 데 이용했다.

학명 유래 — 속명 *Stellera*는 독일 식물학자로 러시아와 알래스카의 식물을 연구한 Georg Wihelm Steller(1709~1746)의 이름에서 유래했으며 피뿌리풀속을 일컫는다. 종소명 *chamaejasme*는 '작은 자스민의'라는 뜻으로 꽃이 자스민과 비슷한 것에서 유래했다.



기본형



국화과 참취속

섬갯쑥부쟁이

Aster arenarius (Kitam.) Nemoto

약관심(LC)

성상	두해살이풀
자생 환경	해안가 바위틈 및 초지
꽃	7~10월, 보라색
높이	0.3~1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Aster*는 라틴어로 별을 뜻하는데 방사상으로 뻗는 꽃잎의 모양 때문에 붙여졌으며 참취속을 일컫는다.



국화와 참취속

눈갯쭉부쟁이

Aster hayatae H.Lév. & Vaniot

준위협(NT)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대 초지, 바위틈
꽃	6~7월, 보라색
높이	0.15~0.25m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Aster*는 라틴어로 별을 뜻하는데 방사상으로 뻗는 꽃잎의 모양 때문에 붙여졌으며 참취속을 일컫는다.



국화과 참취속

별개미취

Aster koraiensis Nakai

약관심(LC)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지, 냇가 주변
꽃	7~10월, 보라색
높이	0.5~0.6m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Aster*는 라틴어로 별을 뜻하는데 방사상으로 뻗는 꽃잎의 모양 때문에 붙여졌으며 참취속을 일컫는다. 종소명 *koraiensis*는 '한국에 분포하는'이라는 뜻으로 한반도 고유종을 나타낸다.





국화와 참취속

좀개미취

Aster maackii Regel

자료부족(DD)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 초지
꽃	8~10월, 보라색
높이	0.45~0.85m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종



학명 유래 — 속명 *Aster*는 라틴어로 별을 뜻하는데 방사상으로 뻗은 꽃잎의 모양 때문에 붙여졌으며 참취속을 일컫는다. 종소명 *maackii*는 러시아 식물학자 Richard Otto Maack(1825~1886)의 이름에서 유래했다.



국화과 참취속

해국

Aster spathulifolius Maxim.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	해안 절벽
꽃	9~11 월, 보라색, 흰색
높이	0.3~0.6m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 해국이라는 이름은 바닷가에서 자라는 국화라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Aster*는 라틴어로 별을 뜻하는데 방사상으로 뻗는 꽃잎의 모양 때문에 붙여졌으며 참취속을 일컫는다. 종소명 *spathulifolius*는 '주걱모양의 잎을 가진'이라는 뜻으로 잎의 모양에서 유래했다.





국화과 구절초속

한라구절초

Dendranthema coreanum (H.Lév.
& Vaniot) Vorosch.

위급(CR)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대 초지, 바위틈
꽃	9~10월, 흰색, 분홍색
높이	0.1~0.2m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	삼목, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Dendranthema*는 그리스어 dendron(나무)과 anthemon(꽃)의 합성어로 다년생 초본을 포함하고 있는 구절초속을 일컫는다. 종소명 *coreanum*은 '한국의'라는 뜻으로 한반도 특산종을 나타낸다.



국화과 구절초속

산구절초

Dendranthema zawadskii (Herbich)
Tzvelev

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대 초지
꽃	7~9월, 분홍색, 흰색
높이	0.1~0.6m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	포기나누기



국명 유래 — 산구절초라는 이름은 산에서 자라는 구절초라는 뜻으로, 구절초에 비해 상대적으로 높은 지대에서 자란다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Dendranthema*는 그리스어 dendron(나무)과 anthemon(꽃)의 합성어로 다년생 초본을 포함하고 있는 구절초속을 일컫는다. 종소명 *zawadskii*는 헝가리 생물학자 Aleksander (Jan Antoni) Zawadski(1798~1868)의 이름에서 유래했다.



국화와 구절초속

구절초

Dendranthema zawadskii var.
latiloba (Maxim.) Kitam.

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대 초지
꽃	9~10월, 흰색, 노란색, 분홍색
높이	0.5m
광조건	양지
토질	양토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 구절초라는 이름은 한자명 '九節草'(구절초)에서 유래한 것으로, 중앙절(음력 9월 9일)이 되면 마디가 9개가 된다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명

*Dendranthema*는 그리스어 dendron(나무)과 anthemon(꽃)의 합성어로 다년생 초본을 포함하고 있는 구절초속을 일컫는다. 종소명 *zawadskii*는 헝가리 생물학자 Aleksander (Jan Antoni) Zawadski(1798~1868)의 이름에서 유래했다.



국화과 구절초속

울릉국화

Dendranthema zawadskii var.
lucida (Nakai) Pak

위기(EN)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	울릉도 산지 해변
꽃	9~10월, 흰색
높이	0.2~0.5m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Dendranthema*는 그리스어 dendron(나무)과 anthemon(꽃)의 합성어로 다년생 초본을 포함하고 있는 구절초속을 일컫는다. 종소명 *zawadskii*는 헝가리 생물학자 Aleksander (Jan Antoni) Zawadski(1798~1868)의 이름에서 유래했다.



국화와 구절초속

포천구절초

Dendranthema zawadskii var.
tenuisectum (Nakai) Kitag.

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	냇가 주변
꽃	9~10월, 분홍색, 흰색
높이	0.5m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종



학명 유래 — 속명 *Dendranthema*는 그리스어 dendron(나무)과 anthemon(꽃)의 합성어로 다년생 초본을 포함하고 있는 구절초속을 일컫는다. 종소명 *zawadskii*는 헝가리 생물학자 Aleksander (Jan Antoni) Zawadski(1798~1868)의 이름에서 유래했다.



국화과 솜나물속

솜나물

Leibnitzia anandria (L.) Turcz.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지, 냇가 주변
꽃	5~9월, 흰색
높이	0.2~0.6m
광조건	양지
토질	양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 전체에 솜 같은 털이 많고 나물로 식용한 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Leibnitzia*는 독일 철학자이자 수학자인 라이프니츠(Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646~1716)를 기념한 것이며 솜나물속을 일컫는다. 종소명 *anandria*는 미해결(unresolved) 속명인 *Anandria*에서 전용된 것으로 '수술이 없는'이라는 뜻이지만 수술이 없는 것은 아니다.



매자나무과 꿩꿩이풀속

꿩꿩이풀

Jeffersonia dubia (Maxim.) Benth. & Hook.f. ex Baker & Moore

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	4~5월, 보라색, 흰색
높이	0.2~0.3m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 쟁쟁이입(쟁쟁이닙)이 변화한 것으로, 약용하는 땅속줄기가 쓴맛이 아주 강해 입에서 신음 소리가 절로 나는 풀이라는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다. ‘쟁쟁이입(쟁쟁이닙)’은 ‘쟁쟁이(쟁쟁이)’와 ‘입(닙)’의 합성어다. 『조선어사전』은 ‘쟁쟁이’에 대해 노약자가 수고와 고생을 어렵게 견뎌내는 소리라는 취지로 기록했고, ‘입’ 또는 ‘닙’은 옛 표현에서 입(口)과 잎(葉)을 의미하는 것으로 혼용해왔다.

학명 유래 — 종소명 *dubia*는 ‘의심스러운, 불확정적인’이라는 뜻이다.



인동과 체꽃속

솔체꽃

Scabiosa comosa Fisch. ex
Roem. & Schult.

약관심(LC)

성상	두해살이풀
자생 환경	고산지대 초지
꽃	7~9월, 보라색
높이	0.5~0.9m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — ‘솔’과 ‘체꽃’의 합성어로, 잎이 솔잎처럼 가는 체꽃이라는 뜻에서 유래했다. ‘체’는 가루를 곱게 치거나 액체를 밭거나 거르는 데 쓰는 기구인 체를 닮았다는 뜻으로 꽃의 모양에서 유래했고, ‘솔’은 잎의 모양에서 유래한 것으로 보인다.

학명 유래 — 속명 *Scabiosa*는 ‘옴 오른, 깃무른, 거칠거칠한’(scabiosus)이란 뜻으로 피부병에 약효가 있는 것에서 유래했으며 체꽃속을 일컫는다. 종소명 *comosa*는 ‘머리 또는 털이) 촘촘한’이라는 뜻으로 머리모양꽃차례를 나타낸다.





석죽과 동자꽃속

동자꽃

Lychnis cognata Maxim.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월, 주황색
높이	0.4~1m
광조건	양지
토질	양토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 눈 속에서 얼어 죽은 동자승(童子僧)에 관한 설화에 나오는 동자승과 같이 예쁜 꽃이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Lychnis*는 그리스어 lychnos(불꽃)에서 유래한 것으로 붉은색을 띠는 종에 붙여졌는데, 유럽에서는 옛날에 이 속의 식물로 램프의 심지를 만들었다고 하며 동자꽃속을 일컫는다. 종소명 *cognata*는 ‘친근한, 관련된’이라는 뜻으로 다른 종과 매우 유사함을 나타낸다.



석죽과 개별꽃속

개별꽃

Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속 계곡
꽃	4~5월, 흰색
높이	0.08~0.12m
광조건	양지
토질	양토, 유기질토
번식	파종



국명 유래 — 개별꽃이라는 이름은 꽃의 모양이 별꽃과 유사하다는 뜻으로, 학명 *Pseudostellaria*(가짜 별꽃)에서 영향을 받아 형성된 이름으로 추정한다.

학명 유래 — 속명

*Pseudostellaria*는 라틴어 pseudos(거짓의, 모조의의)와 *Stellaria*(별꽃속)의 합성어로, 별꽃을 닮았다는 뜻이며 개별꽃속을 일컫는다. 종소명 *heterophylla*는 '이엽성(異葉性)'의 뜻이다.





석죽과 개별꽃속

큰개별꽃

Pseudostellaria palibiniana (Takeda)

Ohwi

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	4~6월, 흰색
높이	0.1~0.2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 유기질토
번식	포기나누기



국명 유래 — 줄기 윗부분에 나는 2쌍의 잎이 특별히 큰 개별꽃이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명

*Pseudostellaria*는 라틴어 pseudos(거짓의, 모조의)와 *Stellaria*(별꽃속)의 합성어로, 별꽃을 닮았다는 뜻이며 개별꽃속을 일컫는다. 종소명 *palibiniana*는 러시아 식물학자로 한국(서울 주변)과 북중국, 몽골, 북극 근처, 서남아시아의 식물을 연구한 Ivan Vladimirovich Palibin(1872~1949)의 이름에서 유래했다.



노박덩굴과 물매화속

물매화

Parnassia palustris L.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	넷가 및 계곡 주변, 초지
꽃	7~8월, 흰색
높이	0.07~0.45m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 물매화라는 이름은 꽃이 매화를 닮았고 물이 많은 계곡 등에 분포한다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명

*Parnassia*는 그리스

파르나소스(Parnassus)산에서

유래한 것으로 물매화속을

일컫는다. 종소명 *palustris*는

‘습지생의, 소지생(沼池生)’라는

뜻으로 서식처와 관련 있다.





용담과 용담속

용담

Gentiana scabra Bunge

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지, 냇가 주변
꽃	8~10월, 파란색, 보라색
높이	0.2~0.6m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 용담이라는 이름은 한자명 ‘龍膽’(용담)에 어원을 둔 것으로, 약재로 사용할 때 상상의 동물인 용(龍)의 쓸개(膽)에서나 느낄 수 있는 쓴맛이 난다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Gentiana*는 용담속 식물의 약효를 발견한 로마 시대 의학자 플리니(Pliny)가 붙인 이름으로, 일리리아의 왕 Gentius(B.C.500년경)의 이름에서 유래했으며 용담속을 일컫는다. 종소명 *scabra*는 ‘요철(凸凹)이 있는, 까칠까칠한 면의’라는 뜻으로 줄기와 잎 뒷면의 돌기 때문에 붙여졌다.



용담과 쓴풀속

자주쓴풀

Swertia pseudochinensis H.Hara

약관심(LC)

성상	두해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 냇가 주변
꽃	9~10월, 보라색
높이	0.15~0.3m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 꽃이 짙은 자주색으로 피고 아주 쓴 맛이 나는 풀이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Swertia*는 네덜란드 약초재배가 Emanuel Swert(1552~1612)의 이름에서 유래한 것으로 쓴풀속을 일컫는다. 종소명 *pseudochinensis*는 'chinensis(중국에 분포하는)와 유사한'이라는 뜻이다.






쥐손이풀과 쥐손이풀속

둥근이질풀

Geranium koreanum Kom.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 초지
꽃	6~7월, 분홍색
높이	0.3~0.8m
광조건	반음지
토질	양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 둥근이질풀이라는 이름은 이질풀을 닮았는데 꽃이 크고 끝이 둥글며 턱잎이 넓은 달걀모양을 이룬다는 뜻에서 붙여진 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Geranium*은 그리스어 geranos(학)가 어원으로 분열과(分裂果)인 열매의 모양이 학의 부리를 닮은 것에서 유래했으며 쥐손이풀속을 일컫는다. 종소명 *koreanum*은 '한국의'라는 뜻이다.



붓꽃과 붓꽃속

범부채

Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월, 주황색
높이	0.5~1m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 오래된 고유명으로, 황적색 꽃에 호랑이 무늬 같은 짙은 반점이 있고 좌우로 편평한 잎이 2열로 배열된 모양이 마치 부채를 절반쯤 펼쳐놓은 듯하다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Iris*는 그리스 신화에 나오는 신들의 전령으로 무지개를 의인화한 신의 이름이며 붓꽃속을 일컫는다. 종소명 *domestica*는 '국내의, 가정의'라는 뜻이다.





양귀비과 매미꽃속

매미꽃

Coreanomecon hylomeconoides Nakai

준위협(NT)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	6~7월, 노란색
높이	0.2~0.4m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종



학명 유래 — 종소명 *hylomeconoides*는 피나물속(*Hylomecon*)과 비슷하다는 뜻이다.



앵초과 앵초속

설앵초

Primula farinosa subsp. *modesta*
var. *koreana* T.Yamaz.

위키(EN)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대 초지
꽃	5~6월, 분홍색
높이	0.2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 설앵초라는 이름은 한자명 ‘雪櫻草’(설앵초)에서 유래한 것으로, 앵초를 닮았는데 잎 뒷면의 은황색 가루가 눈(雪)을 연상시킨다고 하여 붙여졌다. 『조선식물향명집』에서 ‘앵초’라는 명칭을 기본으로 하고 식물의 형태적 특징과 학명에 착안한 ‘설’(雪)을 추가해 신칭한 것으로 추론된다.

학명 유래 — 속명 *Primula*는 라틴어 *primus*(최초)가 어원으로 이른 봄에 피는 프리물라 베리스(*P. veris*)에서 유래했으며 앵초속을 일컫는다. 종소명 *farinosa*는 ‘가루의’라는 뜻으로 잎 뒷면에 가루가 있는 것에서 유래했으며, 아종명 *modesta*는 ‘온화한, 적당한’이라는 뜻이다.





미나리아재비과 바람꽃속

남바람꽃

Anemone flaccida F.Schmidt

위기(EN)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 냇가 주변
꽃	4월, 흰색
높이	0.1~0.2m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Anemone*는 그리스어 Anemos(바람)가 어원으로 '바람의 딸'을 뜻하는 지중해산 아네모네의 그리스명에서 전용되어 바람꽃속을 일컫는다.



미나리아재비과 바람꽃속

홀아비바람꽃

Anemone koraiensis Nakai

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대, 계곡 주변
꽃	4월, 흰색
높이	0.07~0.25m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 홀아비바람꽃이라는 이름은 꽃대가 보통 하나씩 달리는 것에서 홀아비가 연상되고 바람꽃과 닮았다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Anemone*는 그리스어 Anemos(바람)가 어원으로 ‘바람의 딸’을 뜻하는 지중해산 아네모네의 그리스명에서 전용되어 바람꽃속을 일컫는다. 종소명 *koraiensis*는 ‘한국에 분포하는’이라는 뜻으로 분포지 또는 발견지를 나타낸다.



미나리아재비과 바람꽃속

평의바람꽃

Anemone raddeana Regel

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	4~5월, 흰색
높이	0.15~0.2m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 평의바람꽃이라는 이름은 땅속줄기에서 나온 잎이나 꽃받침 등의 모양이 평의 발을 닮았다는 뜻에서, 또는 평이 서식하는 산 숲속에서 자라는 바람꽃이라는 뜻에서 붙여진 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Anemone*는 그리스어 Anemos(바람)가 어원으로 '바람의 딸'을 뜻하는 지중해산 아네모네의 그리스명에서 전용되어 바람꽃속을 일컫는다. 종소명 *raddeana*는 폴란드에서 태어나 조지아에 정착한 독일인 자연연구가 Gustav Ferdinand Richard Radde (1831~1903)의 이름에서 유래했다.



미나리아재비과 바람꽃속

세바람꽃

Anemone stolonifera Maxim.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	5~6월, 흰색, 노란색
높이	0.1~0.2m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종



국명 유래 — 세바람꽃이라는 이름은 『조선식물향명집』에서 신칭한 것으로, 꽃대가 3개씩 올라오는 바람꽃이라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Anemone*는 그리스어 Anemos(바람)가 어원으로 ‘바람의 딸’을 뜻하는 지중해산 아네모네의 그리스명에서 전용되어 바람꽃속을 일컫는다. 종소명 *stolonifera*는 ‘기는줄기가 있는’이라는 뜻이다.



미나리아재비과 노루귀속

노루귀

Hepatica asiatica Nakai

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	4월, 분홍색, 흰색, 보라색
높이	0.1m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종



국명 유래 — 노루귀라는 이름은 어린잎(포엽 포함)이 노루의 귀처럼 보이는 데서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Hepatica*는 라틴어 hepaticus(간)의 여성형이며, 잎 모양이 간(肝)과 비슷해 붙여졌다. 종소명 *asiatica*는 '아시아의'라는 뜻이다.



미나리아재비과 모데미풀속

모데미풀

Megaleranthis saniculifolia Ohwi

위기(EN)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속 계곡 주변
꽃	5월, 흰색
높이	0.2~0.4m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종



학명 유래 — 종소명

*saniculifolia*는 'Sanicula (참반디속)와 잎이 비슷함'이라는 뜻이다.





장미과 양지꽃속

딱지꽃

Potentilla chinensis Ser.

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	개울가, 들
꽃	6~8월, 노란색
높이	0.3~0.6m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 딱지꽃이라는 이름은 식용하는 잎이 땅에서 붙어 퍼져서 자라는 모습이 딱지를 연상시키는 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Potentilla*는 라틴어 potens(강력한, 효과적인)에서 유래했는데 이 속 어떤 종들의 약성을 언급한 것이며 양지꽃속을 일컫는다. 종소명 *chinensis*는 '중국에 분포하는'이라는 뜻으로 최초 발견지 또는 분포지를 나타낸다.



장미과 나도양지꽃속

나도양지꽃

Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch


약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	4~6월, 노란색
높이	0.1~0.15m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	삼목



학명 유래 — 종소명 *ternata*는 ‘삼출의, 셋의’라는 뜻으로 성숙한 개체의 잎이 3개로 갈라지는 것에서 유래했다.

분산형




산형과 전호속

전호

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	5~6월, 흰색
높이	1m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 전호라는 이름은 중국에서 전래된 한자명 ‘前胡’(전호)에서 유래한 것으로 그 정확한 뜻은 알려져 있지 않다.

학명 유래 — 속명 *Anthriscus*는 향초의 일종인 southern chervil(*Scandix australis* L.)의 고대 그리스명 anthriskon에서 유래했으며 전호속을 일컫는다. 종소명 *sylvestris*는 ‘숲속에서 자라는, 야생의’라는 뜻이다.



산형과 시호속

시호

Bupleurum komarovianum Lincz.

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	8~9월, 노란색
높이	0.4~0.7m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 한자명 '柴胡'(시호)에 어원을 두고 있는데 '柴'(시)는 쉼(떨감)을 뜻하고 '胡'(호)는 풀을 뜻하므로, 떨감으로 사용할 수 있는 풀이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Bupleurum*은 그리스어 bous(황소)와 pleuron(갈비뼈)의 합성어로, 아미(*Ammi majus*)의 그리스명에서 유래했으며 시호속을 일컫는다.



산형과 뿔미나리속

뿔미나리

Ostericum sieboldii (Miq.) Nakai

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	8~9월, 흰색
높이	1m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 뿔미나리라는 이름은 산(뿔)에 사는 미나리 또는 산지에서 야생하는 미나리라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Ostericum*은 그리스어 hysterikos(히스테리)가 어원으로, 이 속 식물이 히스테리에 효과가 있어 약용한 것에서 유래했으며 뿔미나리속을 일컫는다. 종소명 *sieboldii*는 독일 의사이자 생물학자로 일본 식물을 연구한 Philipp Franz von Siebold(1796~1866)의 이름에서 유래했다.





협죽도와 수궁초속

개정향풀

Apocynum lancifolium Russanov

준위협(NT)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	6월, 분홍색
높이	0.4~0.8m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 종소명 *lancifolium*은 lancea(창)와 folium(잎)의 합성어로 ‘피침모양 잎의’라는 뜻이다.



비짜루과 비짜루속

비짜루

Asparagus schoberioides Kunth

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	5~6월, 연두색
높이	0.5~1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 『물보』에 현재 비짜루와 가장 유사한 형태인 '비즈르(未)'라는 표현이 나오는데 이는 현재 청소 도구인 빗자루를 뜻하고, 『조선식물명집』에 '빗자루'라는 이름으로 기록된 점에 비추어 비짜루는 줄기와 엽상체가 이루는 모양이 빗자루를 닮은 것에서 유래한 이름으로 이해된다.

학명 유래 — 속명 *Asparagus*는 그리스어 asparagos에 기원을 두고 있는데, 가지가 심하게 갈라진다는 뜻으로 비짜루속을 일컫는다. 종소명 *schoberioides*는 '*Schoberia*(나문재속의 옛이름)와 비슷한'이라는 뜻이다.



국화과 참취속

참취

Aster scaber Thunb.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	8~10월, 흰색
높이	1~1.5m
광조건	반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 참취라는 이름은 진짜(참) 좋은 취(나물)라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Aster*는 라틴어로 별을 뜻하는데 방사상으로 뻗는 꽃잎의 모양 때문에 붙여졌으며 참취속을 일컫는다. 종소명 *scaber*는 '갈갈한, 요철이 있는'이라는 뜻으로 잎 표면에 거친 것에서 유래했다.



국화과 참취속

개미취

Aster tataricus L.f.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지, 냇가 주변
꽃	7~10월, 보라색
높이	1~1.5m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	삼목, 포기나누기



국명 유래 — 개미취라는 이름은 ‘개미’(蟻)와 ‘취’(菜)의 합성어로, 부리의 모양이 개미를 닮았고 나물로 이용했다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Aster*는 라틴어로 별을 뜻하는데 방사상으로 뻗는 꽃잎의 모양 때문에 붙여졌으며 참취속을 일컫는다. 종소명 *tataricus*는 ‘타타르(Tatar)지역에 분포하는’이라는 뜻으로 발견지를 나타낸다.





초롱꽃과 잔대속

층층잔대

Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC.

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	7~9월, 보라색, 흰색
높이	0.4~1.2m
광조건	양지
토질	양토
번식	파종



학명 유래 — 속명 *Adenophora*는 그리스어 aden(샘, 분비선)과 phoreo(지탱하다, 지니다)의 합성어로, 식물체 전체에 유액을 내는 샘세포가 있는 것에서 유래했으며 잔대속을 일컫는다. 종소명 *triphylla*는 '삼출엽잎의'라는 뜻이지만 잎의 형태는 다양하다.



인동과 마타리속

마타리

Patrinia serratifolia Link

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지, 건조지
꽃	7~8월, 노란색
높이	0.6~1.5m
광조건	반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 마타리라는 이름은 '맛달' 또는 '맛타리'에서 비롯했으며 '맛'(味)과 '타리'(갈기)의 합성어로, 맛이 있어 먹을 만하고 갈기를 닮은 식물이라는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Patrinia*는 프랑스 자연사학자이자 광물학자인 Eugène Louis Melchior Patrin(1742~1815)의 이름에서 유래한 것으로 마타리속을 일컫는다.





인동과 마타리속

독갈

Patrinia villosa (Thunb.) Juss.

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지, 건조지
꽃	7~8월, 흰색
높이	1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 독갈이라는 이름은 맛이 그다지 좋지 않거나 생긴 모습이 뚝뚝하다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Patrinia*는 프랑스 자연사학자이자 광물학자인 Eugène Louis Melchior Patrin(1742~1815)의 이름에서 유래한 것으로 마타리속을 일컫는다. 종소명 *villosa*는 ‘부드러운 털이 있는’이라는 뜻으로 잎과 줄기 등에 부드러운 털이 있는 것에서 유래했다.



석죽과 대나물속

대나물

Gypsophila oldhamiana Miq.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지, 해변 바위지대
꽃	6~7월, 흰색, 분홍색
높이	0.5~1m
광조건	양지
토질	사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 대나물이라는 이름은 『조선식물향명집』에 따른 것으로, 잎이 평행 잎맥으로 대나무와 유사한 데서, 또는 '대'와 '나물'의 합성어로 줄기가 대나무처럼 생겼고 나물로 이용한 데서 유래했다고 해석하고 있다.

학명 유래 — 속명 *Gypsophila*는 그리스어 gypsos(석회)와 phileo(사랑하다)에서 유래한 말로, 석회암지대에서 잘 자라는 특성을 나타내며 대나물속을 일컫는다. 종소명 *oldhamiana*는 영국 식물채집가로 일본과 타이완 식물을 채집한 Richard Oldham(1837~1864)의 이름에서 유래했다.





석죽과 대나물속

가는대나물

Gypsophila pacifica Kom.

위기(EN)

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대 절벽
꽃	6~7월, 흰색, 분홍색
높이	0.5~1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 대나물에 비해 잎이 가늘다는 뜻에서 붙여졌다고 알려져 있다. 그러나 실제로는 중국명 大石头花(대엽석두화)에서 보는 것처럼 잎이 달걀모양으로 대나물에 비해 가늘지 않다. 당시 일본명으로 기록된 イトナデツコ(絲撫子)가 꽃자루의 모양이 실처럼 가늘다는 뜻인 점에 비추어 가는대나물의 '가는'은 잎이 가는 것이 아니라 꽃자루가 가는 데서 붙여진 이름으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Gypsophila*는 그리스어 gypsos(석회)와 phileo(사랑하다)에서 유래한 말로, 석회암지대에서 잘 자라는 특성을 나타내며 대나물속을 일컫는다. 종소명 *pacifica*는 '태평양의'라는 뜻이다.



사초과 고랭이속

솔방울고랭이

Scirpus karuisawensis Makino

약관심(LC)

성상	여러해살이풀(수생)
자생 환경	습지, 수변
꽃	7~10월, 연두색, 흰색
높이	0.8~1.5m
광조건	양지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 다수의 소수군(小穗群)이 모여 달리는 모습이 마치 솔방울 같고 고랭이(골풀)를 닮은 식물이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Scirpus*는 골풀 또는 그와 유사한 식물의 라틴명이 전용된 것으로 고랭이속을 일컫는다. 종소명 *karuisawensis*는 일본의 지명 가루이자와(輕井澤)에서 유래한 것으로 보이며 발견지를 나타낸다.



꿀풀과 산박하속

방아풀

Isodon japonicus (Burm.f.) H.Hara

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	8~9월, 보라색
높이	0.5~1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 『향약구급방』에서 한자명 ‘薄荷’(박하)를 향명으로 발음이 비슷한 ‘芳荷’(방하)로도 표기한 데서 유래한 것으로 추정한다. 식물체에서 독특한 향기가 나기 때문에 박하를 일컫는 이름과 혼용된 것으로 보인다.

학명 유래 — 속명 *Isodon*은 그리스어 isos(같은)과 odontos(이빨)의 합성어로, 꽃받침의 열편이 이빨처럼 같은 크기로 찢어지는 것에서 유래했으며 산박하속을 일컫는다. 종소명 *japonicus*는 ‘일본의’라는 뜻으로 발견지 또는 분포지를 나타낸다.



꿀풀과 누린내풀속

누린내풀

Tripora divaricata (Maxim.) P.D.
Cantino

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~9월, 보라색, 남색
높이	1m
광조건	양지
토질	양토
번식	파종



국명 유래 — 식물체에서 누린 냄새가 나는 풀이라는 뜻에서 유래했다. 전초에서 고약한 냄새가 난다. 누린내는 짐승의 고기에서 나는 기름기의 냄새로 옛말은 ‘누린내’ 또는 ‘누린니’이다. 19세기에 저술된 『광재물보』와 『물명고』는 중국에서 유래한 ‘薺’(유)를 기록했는데, 薺는 누린내라는 뜻이므로 한글명과 뜻이 통한다.

학명 유래 — 속명 *Tripora*는 그리스어 tri(3)와 poros(통로, 구멍)의 합성어로, 가지가 3개로 갈라진다는 뜻에서 유래했으며 누린내풀속을 일컫는다. 종소명 *divaricata*는 ‘넓게 열려 분지하는’이라는 뜻이다.





벼과 산새풀속

실새풀

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	8~9월, 자주색
높이	0.6~1.5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 실새풀이라는

이름은 소수(小穗)의 작고 부드러운 생김새가 짧은 실 모양인 새 종류의 풀이라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Calamagrostis*는

그리스어 calamos(갈대)와

Agrostis(겨이삭속)의 합성어로

갈대와 겨이삭을 닮은 식물이라는

뜻이며 산새풀속을 일컫는다.

종소명 *arundinacea*는 '갈대와

비슷한'이라는 뜻이다.



벼과 참새그령속

그령

Eragrostis ferruginea (Thunb.)
P.Beauv.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지, 건조지
꽃	7~10월, 자주색
높이	0.3~0.8m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 『역어유해』에
여우 꼬리를 잡는 풀이라는 뜻의
狗尾把草(구미파초)라는 이름이
있는 것으로 보아 풀을 묶거나
동여매는 것과 관련 있는 이름으로
추정한다.

학명 유래 — 속명 *Eragrostis*는
그리스어 eros(사랑) 또는
era(earth, 지구, 땅)와 agrostis(풀,
잡초, 개밀)의 합성어에서
유래했으며 참새그령속을 일컫는다.
종소명 *ferruginea*는 '녹슨 색깔의,
더러워진'이라는 뜻이다.





미나리아재비과 쐽의다리속

은쐽의다리

Thalictrum actaeifolium var.
brevistylum Nakai

약관심(LC)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	7월, 분홍색
높이	0.3~0.6m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 은쐽의다리라는 이름은 자주색과 흰색이 섞여 피는 꽃의 꽃밥이 은색이어서 전체적으로 은색 빛이 강한 쐽의다리라는 뜻에서 붙여진 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Thalictrum*은 디오스코리데스(Dioscorides, 40~90)가 고수 잎을 닮은 식물에 부여한 그리스어 Taliktron, 플리니우스(Plinius, 23~79)가 이 속의 한 식물에 부여한 라틴어 thalictrum 또는 thalitruum에서 유래했으며 쐽의다리속을 일컫는다. 종소명 *actaeifolium*은 'Actaea(노루삼속)의 잎과 비슷한'이라는 뜻이다.



미나리아재비과 쐽의다리속

쐽의다리

Thalictrum aquilegifolium var.
sibiricum Regel & Tiling

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월, 흰색
높이	0.5~1m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 쐽의다리라는 이름은 길게 뻗은 줄기에 드문드문 마디가 있는 모습을 쐽(雌)의 다리(脚)에 비유한 데서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Thalictrum*은 디오스코리데스(Dioscorides, 40~90)가 고수 잎을 닮은 식물에 부여한 그리스어 Taliktron, 플리니우스(Plinius, 23~79)가 이 속의 한 식물에 부여한 라틴어 thalictrum 또는 thalitruum에서 유래했으며 쐽의다리속을 일컫는다. 변종명 *sibiricum*은 '시베리아 지역의'라는 뜻으로 유럽에 분포하는 종을 기본종으로 하고 동아시아에 분포하는 종을 변종으로 취해 붙여졌다.





미나리아재비과 췌의다리속

연잎췌의다리

Thalictrum coreanum H.Lév.

위기(EN)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	6~8월, 흰색, 분홍색
높이	0.2~0.8m
광조건	반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 연잎췌의다리라는 이름은 연꽃의 잎처럼 잎자루가 기부에 붙는 것이 아니라 잎의 안쪽에 붙는 순형저(peltate)인 췌의다리라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Thalictrum*은 디오스코리데스(Dioscorides, 40~90)가 고수 잎을 닮은 식물에 부여한 그리스어 Taliktron, 플리니우스(Plinius, 23~79)가 이 속의 한 식물에 부여한 라틴어 thalictrum 또는 thalitruum에서 유래했으며 췌의다리속을 일컫는다. 종소명 *coreanum*은 '한국의'라는 뜻으로 연잎췌의다리의 주된 분포지를 나타낸다.



미나리아재비과 췌의다리속

췌의다리

Thalictrum minus var. *hypoleucum*
(Siebold & Zucc.) Miq.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	7~8월, 노란색
높이	0.4~1.2m
광조건	반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 췌의다리라는 이름은 잎이 작고 꽃자루가 짧으며 췌의다리를 닮았다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Thalictrum*은 디오스코리데스(Dioscorides, 40~90)가 고수 잎을 닮은 식물에 부여한 그리스어 Taliktron, 플리니우스(Plinius, 23~79)가 이 속의 한 식물에 부여한 라틴어 thalictrum 또는 thalitruum에서 유래했으며 췌의다리속을 일컫는다. 종소명 *minus*는 '보다 작은'이라는 뜻이며, 변종명 *hypoleucum*은 '잎 뒷면이 흰색인'이라는 뜻이다.





미나리아재비과 췌의다리속

금췌의다리

Thalictrum rochebruneanum
Franch. & Sav.

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월, 자주색
높이	0.7~1m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 금췌의다리라는 이름은 수술대가 노란색(금색)의 실모양을 이루는 췌의다리 종류라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Thalictrum*은 디오스코리데스(Dioscorides, 40~90)가 고수 잎을 닮은 식물에 부여한 그리스어 Taliktron, 플리니우스(Plinius, 23~79)가 이 속의 한 식물에 부여한 라틴어 thalictrum 또는 thalitruum에서 유래했으며 췌의다리속을 일컫는다.



미나리아재비과 췌의다리속

자주핍의다리

Thalictrum uchiyamae Nakai

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 계곡 주변
꽃	6~7월, 분홍색, 보라색
높이	0.5m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 자주색 꽃이 피는 췌의다리라는 뜻이다.

학명 유래 — 속명 *Thalictrum*은 디오스코리데스(Dioscorides, 40~90)가 고수 잎을 닮은 식물에 부여한 그리스어 Taliktron, 플리니우스(Plinius, 23~79)가 이 속의 한 식물에 부여한 라틴어 thalictrum 또는 thalitruium에서 유래했으며 췌의다리속을 일컫는다. 종소명 *uchiyamae*는 일본 식물학자로 조선 식물을 채집한 우치야마 도미지로(内山富次郎, 1846~1915)의 이름에서 유래했다.





장미과 눈개승마속

눈개승마

Aruncus dioicus (Walter) Fernald

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 고산지대
꽃	6~8월, 연두색, 노란색
높이	0.3~1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Aruncus*는 산양의 수염을 뜻하는 고대 라틴어 *aeuncus*에서 유래되었다.
 종소명 *dioicus*는 '자웅이주의'라는 뜻으로 암수딴그루임을 일컫는다.




장미과 터리풀속

터리풀

Filipendula glaberrima Nakai

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	7~8월, 흰색
높이	1m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 터리풀이라는 이름은 '터리'와 '풀'의 합성어로, 꽃이 핀 모습이 마치 털을 묶어 가지 끝에 댄 것처럼 보이는 것에서 유래했다. 터리풀의 '터리'는 털의 옛말이다.

학명 유래 — 속명 *Filipendula*는 라틴어 *filum*(실)과 *pendulus*(매달린)의 합성어로 땅속줄기의 모양에서 유래했으며 터리풀속을 일컫는다. 종소명 *glaberrima*는 '전혀 털이 없는'이라는 뜻이다.



장미과 터리풀속

단풍터리풀

Filipendula palmata (Pall.) Maxim.

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	6월, 흰색, 분홍색
높이	1~1.5m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 단풍터리풀이라는 이름은 잎이 단풍잎처럼 깊게 갈라지는 터리풀이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Filipendula*는 라틴어 filum(실)과 pendulus(매달린)의 합성어로 땅속줄기의 모양에서 유래했으며 터리풀속을 일컫는다. 종소명 *palmata*는 '손바닥 모양의, 장상(掌狀)의'라는 뜻으로 손바닥 모양으로 갈라지는 잎의 형태에서 유래했다.



장미과 오이풀속

오이풀

Sanguisorba officinalis L.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지, 냇가 주변
꽃	7~9월, 빨간색, 자주색
높이	0.3~1.5m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 식물의 잎을 따 비벼서 코에 대어보면 오이 냄새가 진하게 나고 나물로 식용한 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Sanguisorba*는 라틴어 sanguis(피)와 sorbeo(흡수하다)의 합성어로 땅속줄기에 탄닌(tannin) 성분이 많아 지혈효과가 있기 때문에 붙여졌으며 오이풀속을 일컫는다. 종소명 *officinalis*는 '약용의, 약효가 있는'이라는 뜻으로 약재로 사용한 것에서 유래했다.



장미과 오이풀속

가는오이풀

Sanguisorba × *tenuifolia* Fisch. ex Link

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리, 초지
꽃	7~9월, 흰색, 분홍색
높이	1m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 오이풀에 비해 잎이 가늘다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Sanguisorba*는 라틴어 sanguis(피)와 sorbeo(흡수하다)의 합성어로 땅속줄기에 탄닌(tannin) 성분이 많아 지혈효과가 있기 때문에 붙여졌으며 오이풀속을 일컫는다. 종소명 *tenuifolia*는 '가느다란 잎의, 세엽(細葉)'이라는 뜻이다.




범의귀과 도깨비부채속

도깨비부채

Rodgersia podophylla A.Gray

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 돌밭
꽃	6~7월, 흰색
높이	1m
광조건	반음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 도깨비부채라는 이름은 비정상적으로 크고 갈라진 잎 모양이 도깨비를 연상시키고 부채모양으로 크다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Rodgersia*는 미국 북태평양탐험대(1853~1856)의 리더 중 한 사람이었으며 식물 채집에 공헌한 John Rodgers(1812~1882)의 이름에서 유래한 것으로 도깨비부채속을 일컫는다. 종소명 *podophylla*는 ‘잎자루가 있는 잎의’라는 뜻이다.



현삼과 현삼속

토현삼

Scrophularia koraiensis Nakai

약관심(LC)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	7월, 자주색, 빨간색
높이	1.5m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 토현삼이라는 이름은 한자명 ‘土玄蓼(토현삼)’에서 유래했는데, 재배하지 않고 노지(땅)에서 자라는 현삼이라는 뜻으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Scrophularia*는 라틴어 *scrofulae*(목의 분비샘 부종)가 어원으로, 이 속 한 종(*S. nodosa*)의 육질의 땅속줄기가 이를 치료하는 약효가 있다는 데서 유래했으며 현삼속을 일컫는다. 종소명 *koraiensis*는 ‘한국에 분포하는’이라는 뜻이다.





곡선형

비짜루과 은방울꽃속

은방울꽃

Convallaria keiskei Miq.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	4~5월, 흰색
높이	0.2~0.35m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 은방울꽃이라는 이름은 꽃차례에 흰 꽃이 달리는 모습이 은색 방울을 연상시키는 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Convallaria*는 라틴어 *convallis*(골짜기)와 그리스어 *leirion*(백합)이 합쳐진 말로, 골짜기의 백합이라는 뜻이며 은방울꽃속을 일컫는다. 종소명 *keiskei*는 일본 메이지 시대의 의사이자 식물학자인 이토 게이스케(伊藤圭介, 1803~1901)의 이름에서 유래했다.





비짜루과 두루미꽃속

풀솜대

Maianthemum japonicum (A.Gray)

LaFrankie

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	5~7월, 흰색
높이	0.2~0.5m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 죽대(*P. lasianthum*)

를 닮았지만 털이 많은 초본성 식물이라는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다. 같은 속에 자주솜대와 민솜대라는 이름이 있는 것에 비추어 풀솜대는 '풀'과 '솜대'의 합성어로 볼 수 있다.

학명 유래 — 속명

*Maianthemum*은 그리스어 majos(5월)와 anthemon(꽃)의 합성어로 꽃 피는 시기를 나타내며 두루미꽃속을 일컫는다. 종소명 *japonicum*은 '일본의'라는 뜻으로 최초 발견지를 나타낸다.



비짜루과 맥문아재비속

맥문아재비

Ophiopogon jaburan G.Lodd.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	5~7월, 흰색
높이	0.3~0.5m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Ophiopogon*은 그리스어 ophio(뱀)와 pogon(수염)의 합성어로 맥문아재비속을 일컫는다.



비짜루과 등굴레속

목포용등굴레

Polygonatum cryptanthum H.Lév. & Vaniot

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	5~6월, 연두색
높이	0.2~0.6m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Polygonatum*은 그리스어 poly(많은)와 gonu(마디)의 합성어로, 땅속줄기에 마디가 많은 것에서 유래했으며 등굴레속을 일컫는다.



비짜루과 등굴레속

통등굴레

Polygonatum inflatum Kom.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	5~6월, 초록색, 연두색
높이	0.3~0.8m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 통등굴레라는 이름은 등굴레에 비해 줄기가 통통한 통모양이라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명

*Polygonatum*은 그리스어 poly(많은)와 gonu(마디)의 합성어로, 땅속줄기에 마디가 많은 것에서 유래했으며 등굴레속을 일컫는다. 종소명 *inflatum*은 '자루 모양의, 부푼'이라는 뜻으로 꽃의 모양을 나타낸 것으로 보인다.





비짜루과 등굴레속

넣등굴레

Polygonatum infundiflorum

Y.S.Kim, B.U.Oh & C.G.Jang

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	5~6월, 연한노란색
높이	0.5~0.75m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Polygonatum*은 그리스어 poly(많은)와 gonu(마디)의 합성어로, 땅속줄기에 마디가 많은 것에서 유래했으며 등굴레속을 일컫는다.

비짜루과 등굴레속

용등굴레

Polygonatum involucratum
(Franch. & Sav.) Maxim.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	5~6월, 연두색
높이	0.2~0.6m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 용등굴레라는 이름은 『조선식물향명집』에서 처음 발견되는데, 꽃이 다른 등굴레보다 월등히 크거나 포에 싸인 꽃이 용을 연상시킨다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Polygonatum*은 그리스어 poly(많은)와 gonu(마디)의 합성어로, 땅속줄기에 마디가 많은 것에서 유래했으며 등굴레속을 일컫는다. 종소명 *involucratum*은 '총포가 있는'이라는 뜻으로 꽃에 큰 총포가 달리는 것에서 유래했다.





비짜루과 등굴레속

죽대

Polygonatum lasianthum Maxim.

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	5~6월, 흰색, 연두색
높이	0.3~0.7m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — ‘죽’(竹)과 ‘대’(대나무 또는 막대기)의 합성어로, 잎이 댓잎을 닮고 긴 막대기로 자라는데 대나무와 같이 마디가 있는 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Polygonatum*은 그리스어 poly(많은)와 gonu(마디)의 합성어로, 땅속줄기에 마디가 많은 것에서 유래했으며 등굴레속을 일컫는다. 종소명 *lasianthum*은 ‘긴 솜털이 있는 꽃의’라는 뜻이다.



비짜루과 등굴레속

등굴레

Polygonatum odoratum var. *pluriflorum* (Miq.) Ohwi

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	6~7월, 흰색, 연두색
높이	0.3~0.6m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종



국명 유래 — 『향약채취월령』의 차자(借字) 표기 ‘豆應仇羅’(등구레)가 그 어원으로, ‘등구’는 등글다는 뜻으로 열매가 둥근 모양과 약용하는 땅속줄기가 통통하여 둥근 것에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Polygonatum*은 그리스어 poly(많은)와 gonu(마디)의 합성어로, 땅속줄기에 마디가 많은 것에서 유래했으며 등굴레속을 일컫는다. 종소명 *odoratum*은 ‘향기가 나는’이라는 뜻이다.





초롱꽃과 잔대속

도라지모시대

Adenophora grandiflora Nakai

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리
꽃	8월, 보라색, 파란색, 흰색
높이	0.7m
광조건	양지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종



국명 유래 — 꽃이 도라지를 닮은 모시대라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Adenophora*는 그리스어 aden(샘, 분비선)과 phoreo(지탱하다, 지니다)의 합성어로, 식물체 전체에 유액을 내는 샘세포가 있는 것에서 유래했으며 잔대속을 일컫는다. 종소명 *grandiflora*는 '큰 꽃의'라는 뜻으로 잔대속 식물 중에서 상대적으로 꽃이 큰 것에서 유래했다.



초롱꽃과 잔대속

모시대

Adenophora remotiflora (Siebold & Zucc.) Miq.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	8~9월, 보라색, 흰색
높이	0.4~1m
광조건	양지, 반음지
토질	양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — ‘모시’와 ‘대’의 합성어로, 잎이 모시풀을 닮았고 대나무(또는 작대기)처럼 가늘고 길게 자란다는 뜻에서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Adenophora*는 그리스어 aden(샘, 분비선)과 phoreo(지탱하다, 지나다)의 합성어로, 식물체 전체에 유액을 내는 샘세포가 있는 것에서 유래했으며 잔대속을 일컫는다. 종소명 *remotiflora*는 ‘드문드문 달리는 꽃의’라는 뜻으로 꽃차례의 모양에서 유래했다.





초롱꽃과 초롱꽃속

초롱꽃

Campanula punctata Lam.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	6~8월, 흰색, 연두색
높이	0.4~1m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 사토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 초롱꽃이라는 이름은 꽃의 모양이 밤에 불을 밝히는 초롱(燈)을 닮았다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Campanula*는 라틴어 campana(종)에서 유래된 것으로, 꽃부리의 모양이 종을 닮았다고 하여 붙여졌으며 초롱꽃속을 일컫는다. 종소명 *punctata*는 '반점이 있는'이라는 뜻으로 꽃 안쪽에 짙은 반점이 있는 것에서 유래했다.

초롱꽃과 금강초롱꽃속

금강초롱꽃

Hanabusaya asiatica (Nakai) Nakai

취약(VU)

성상	여러해살이풀
자생 환경	고산지대 숲 가장자리
꽃	8~9월, 보라색, 흰색
높이	0.3~0.9m
광조건	반음지
토질	양토, 사토
번식	파종



국명 유래 — 금강산에서 발견되었고 꽃이 초롱꽃을 닮았다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Hanabusaya*는 나카이 다케노신(中井猛之進, 1882~1951)이 표본을 채집해 조선 식물 연구에 도움을 준 일본 외교관 하나부사 요시모토(花房義實, 1842~1917)를 기리는 뜻에서 부여한 것이며 금강초롱꽃속을 일컫는다. 종소명 *asiatica*는 '아시아의'라는 뜻이다.





콜치카과 애기나리속

윤판나물아재비

Disporum sessile (Thunb.) D. Don
ex Schult. & Schult. f.

약관심(LC)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	4~6월, 흰색, 연두색
높이	0.3~0.6m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 윤판나물아재비라는

이름은 윤판나물과 닮은

식물이라는 뜻에서 유래했다.

윤판나물이라는 이름도 있이나

주걱모양의 꽃잎이 윤판(輪板)처럼

생긴 데서 유래한 것으로 추정한다.

학명 유래 — 속명 *Disporum*은 그리스어 dis(둘)와 sproa(종자)의 합성어로, 씨방의 각 실에 2개의 밑씨가 있는 것에서 유래했으며 애기나리속을 일컫는다. 종소명 *sessile*는 '자루가 없는, 대가 없는'이라는 뜻이다.

콜치카과 애기나리속

애기나리

Disporum smilacinum A.Gray

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	4~5월, 흰색, 연두색
높이	0.4~0.5m
광조건	반음지, 음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종



국명 유래 — 애기나리라는 이름은 '애기'와 '나리'의 합성어로, 식물체가 작고 나리를 닮은 식물이라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Disporum*은 그리스어 dis(둘)와 sproa(종자)의 합성어로, 씨방의 각 실에 2개의 밑씨가 있는 것에서 유래했으며 애기나리속을 일컫는다. 종소명 *smilacinum*은 '*Smilax*(청미래덩굴속)'이라는 뜻으로 열매가 청미래덩굴속 식물과 닮은 것에서 유래했다.





콜치카과 애기나리속

윤판나물

Disporum uniflorum Baker

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	4~6월, 연두색, 노란색
높이	0.3~0.6m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목



학명 유래 — 속명 *Disporum*은 그리스어 dis(둘)와 sproa(종자)의 합성어로, 씨방의 각 실에 2개의 밑씨가 있는 것에서 유래했으며 애기나리속을 일컫는다.

콜치카과 애기나리속

큰애기나리

Disporum viridescens (Maxim.) Nakai

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속
꽃	5~6월, 흰색, 연두색
높이	0.3~0.7m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 큰애기나리라는 이름은 『조선식물향명집』에서 신칭한 것으로, 애기나리를 닮았으나 애기나리에 비해 식물체가 크다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Disporum*은 그리스어 dis(둘)와 sproa(종자)의 합성어로, 씨방의 각 실에 2개의 밑씨가 있는 것에서 유래했으며 애기나리속을 일컫는다. 종소명 *viridescens*는 '연한 녹색의'라는 뜻으로 꽃의 색깔에서 유래한 것으로 보인다.





콩과 고삼속

고삼

Sophora flavescens Aiton

약관심(IC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지
꽃	5~8월, 연두색, 노란색
높이	1m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 삽목



국명 유래 — 고삼이라는 이름은 한자어 고삼(苦蓼)에서 비롯된 것으로, 산삼처럼 생긴 뿌리가 괴로울 정도로 쓰다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Sophora*는 아랍어 sophera에서 유래한 것으로 린네(Carl von Linné, 1707~1787)가 일명 고두자(苦豆子, *S. alopecuroides*)에 전용한 것에서 비롯했으며 고삼속을 일컫는다. 종소명 *flavescens*는 '누른빛이 도는'이라는 뜻이다.

양귀비과 금낭화속

금낭화

Lamprocapnos spectabilis (L.)

T.Fukuhara

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 계곡 주변
꽃	5~6월, 분홍색, 자주색, 흰색
높이	0.4~0.5m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 삽목, 포기나누기



국명 유래 — 한자어 금낭화(錦囊花)에서 유래한 것으로, 꽃대에 여러 개의 꽃이 주렁주렁 달려 있는 모습이 비단으로 된 주머니와 같다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Lamprocapnos*는 그리스어 lampros(빛나는, 밝은)과 kapnos(연기)의 합성어로, 빛나는 연기와 같다는 뜻에서 유래했으며 금낭화속을 일컫는다. 종소명 *spectabilis*는 '장관의, 아름다운'이라는 뜻으로 꽃의 화려한 모습에서 유래한 것으로 보인다.



벼과 수크령속

수크령

Pennisetum alopecuroides (L.)
Spreng.

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	초지, 건조지
꽃	7~10월, 자주색
높이	0.3~0.8m
광조건	양지
토질	양토, 사토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 수크령이라는 이름은 그령을 암크령으로 한 것에 대응한 것으로, 식물체 전체와 꽃이삭의 모양이 훨씬 더 억세고 커서 수컷 같은 그령이라는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Pennisetum*은 라틴어 penna(깃털)와 seta(가시털)의 합성어로 소수(小穗)에 까락이 많음을 나타내며 수크령속을 일컫는다. 종소명 *alopecuroides*는 '*Alopecurus*(뚝새풀속)와 비슷한'이라는 뜻이다.



앵초과 참좁쌀풀속

까치수염

Lysimachia barystachys Bunge

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	6~8월, 흰색
높이	0.5~1m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 흰색으로 피는 꽃차례의 모양이 까치(鵲)와 수염(鬚)을 닮았다는 뜻에서 유래했다.

학명 유래 — 속명 *Lysimachia*는 이 속 식물을 발견한 마케도니아 리시마코스(Lysimachos) 왕의 이름에서 유래했다는 설과 그리스어 lysis(석방, 작별)와 mache(갈등, 불화)의 합성어인 lysimachos(갈등의 종료)에서 유래했다는 설이 있으며 참좁쌀풀속을 일컫는다. 종소명 *barystachys*는 '무거운 이삭을 가진'이라는 뜻으로 꽃차례의 모양에서 유래했다.





앵초과 참좁쌀풀속

큰까치수염

Lysimachia clethroides Duby

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 냇가 주변, 초지
꽃	6~7월, 흰색
높이	0.5~1m
광조건	양지, 반음지
토질	점토, 양토, 유기질토
번식	파종



국명 유래 — 까치수염보다 식물체가 전체적으로 크다는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Lysimachia*는 이 속 식물을 발견한 마케도니아 리시마코스(*Lysimachos*) 왕의 이름에서 유래했다는 설과 그리스어 *lysis*(석방, 작별)와 *mache*(갈등, 불화)의 합성어인 *lysismachos*(갈등의 종료)에서 유래했다는 설이 있으며 참좁쌀풀속을 일컫는다. 종소명 *clethroides*는 *Clethra*(매화오리나무속)와 비슷하다는 뜻으로 잎이 닮은 것에서 유래했다.

미나리아재비과 투구꽃속

세뿔투구꽃

Aconitum austrokoreense Koidz.

준위협(NT)

특산식물

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲속, 숲 가장자리
꽃	9월, 보라색
높이	0.6~0.8m
광조건	반음지
토질	양토, 유기질토
번식	파종, 포기나누기



학명 유래 — 속명 *Aconitum*은 그리스의 철학자 테오프라스토스(Theophrastos, B.C.371~B.C.287)가 유독성 식물에 사용한 이름인 Akoniton에서 유래했으며 투구꽃속을 일컫는다.



장미과 오이풀속

산오이풀

Sanguisorba hakusanensis Makino

약관심(LC)

성상	여러해살이풀
자생 환경	숲 가장자리, 초지
꽃	8~9월, 자주색
높이	0.4~0.8m
광조건	양지, 반음지
토질	양토
번식	파종, 포기나누기



국명 유래 — 산오이풀이라는 이름은 높은 산에서 자라고 앞에서 오이 냄새가 나는 풀이라는 뜻에서 붙여졌다.

학명 유래 — 속명 *Sanguisorba*는 라틴어 sanguis(피)와 sorbeo(흡수하다)의 합성어로 땅속줄기에 탄닌(tannin) 성분이 많아 지혈효과가 있기 때문에 붙여졌으며 오이풀속을 일컫는다. 종소명 *hakusanensis*는 일본 이시카와현의 '하쿠산(白山)에 분포하는'이라는 뜻으로 최초 발견지를 나타낸다.



국명 찾아보기

가는대나물	133	평의바람꽃	115
가는범꼬리	46	평의비름	84
가는오이풀	149	나도생강	27
감자난초	40	나도양지꽃	120
개맥문동	22	남바람꽃	113
개미취	128	냉초	45
개별꽃	104	노루귀	117
개정향풀	125	노루삼	48
갯기름나물	75	노루오줌	53
갯패랭이꽃	83	누린내풀	136
고려엉겅퀴	63	눈개승마	145
고본	72	눈갯썩부쟁이	91
고삼	171	늣둥굴레	159
곤달비	24	단풍터리풀	147
구절초	97	대나물	132
그령	138	도깨비부채	150
금강초롱꽃	166	도라지모시대	163
금평의다리	143	돌마타리	81
금낭화	172	동자꽃	103
긴산꼬리풀	43	두메부추	56
까치수염	174	등굴레	162
깽깽이풀	101	등근이질풀	109
꼬리풀	42	등골나물	79
꽃향유	31	딱지꽃	119
평의다리	140	뚝갈	131

마타리	130	석잠풀	34
매미꽃	111	섬갯쭉부쟁이	90
맥문동	21	섬기린초	87
맥문아재비	156	설앵초	112
모데미풀	118	섬바디	73
모시대	164	세바람꽃	116
목포용등굴레	157	세뿔투구꽃	176
뫓미나리	124	솔방울고랭이	134
무릇	20	솔채꽃	102
물매화	106	숨나물	100
미나리냉이	80	송장풀	32
방아풀	135	수리취	67
배초향	28	수크령	173
백선	52	숫잔대	26
별개미취	92	시호	123
범부채	110	실새풀	137
북방산비장이	66	애기나리	168
비짜루	126	약난초	38
뼈꼭채	65	어수리	74
산괴불주머니	41	영경취	62
산구절초	96	연잎평의다리	141
산꼬리풀	44	영아자	25
산달래	57	오이풀	148
산마늘	58	웅긋나물	78
산부추	60	왜승마	49
산오이풀	177	용담	107

용dung굴레	160	층층나무	30
울릉국화	98	층층잔대	129
울릉산마늘	61	칠보치마	37
윤판나물	169	큰개별꽃	105
윤판나물아재비	167	큰기린초	86
은평의다리	139	큰까치수염	175
은방울꽃	154	큰평의비름	85
자주평의다리	144	큰두루미꽃	23
자주쓴풀	108	큰애기나리	170
전주물꼬리풀	33	큰제비고깔	51
전호	122	터리풀	146
절굿대	64	털부처꽃	35
조개나물	29	토현삼	151
좀개미취	93	톱풀	77
좀평의다리	142	통dung굴레	158
주름제비란	39	포천구절초	99
죽대	161	풀숨대	155
쥐오줌풀	82	피뿌리풀	88
지리강활	70	한라구절초	95
참나물	76	한라부추	59
참당귀	71	해국	94
참여로	36	홀아비바람꽃	114
참좁쌀풀	47		
참취	127		
초롱꽃	165		
춧대승마	50		

학명 찾아보기

<i>Achillea alpina</i> L.	77	<i>Angelica tenuissima</i> Nakai	72
<i>Aconitum austrokoreense</i> Koidz.	176	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	122
<i>Actaea asiatica</i> H.Hara	48	<i>Apocynum lancifolium</i> Russanov	125
<i>Actaea japonica</i> Thunb.	49	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	145
<i>Actaea simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Prantl	50	<i>Asparagus schoberioides</i> Kunth	126
<i>Adenophora grandiflora</i> Nakai	163	<i>Aster arenarius</i> (Kitam.) Nemoto	90
<i>Adenophora remotiflora</i> (Siebold & Zucc.) Miq.	164	<i>Aster fastigiatus</i> Fisch.	78
<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC.	129	<i>Aster hayatae</i> H.Lév. & Vaniot	91
<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze	28	<i>Aster koraiensis</i> Nakai	92
<i>Ajuga multiflora</i> Bunge	29	<i>Aster maackii</i> Regel	93
<i>Allium dumebuchum</i> H.J.Choi	56	<i>Aster scaber</i> Thunb.	127
<i>Allium macrostemon</i> Bunge	57	<i>Aster spathulifolius</i> Maxim.	94
<i>Allium microdictyon</i> Prokh.	58	<i>Aster tataricus</i> L.f.	128
<i>Allium taquetii</i> H.Lév. & Vaniot	59	<i>Astilbe chinensis</i> (Maxim.) Franch. & Sav.	53
<i>Allium thunbergii</i> G.Don	60	<i>Asyneuma japonicum</i> (Miq.) Briq.	25
<i>Allium ulleungense</i> H.J.Choi & N.Friesen	61	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult.f.	20
<i>Anemone flaccida</i> F.Schmidt	113	<i>Bistorta alopecuroides</i> (Turcz. ex Kom.) Nakai	46
<i>Anemone koraiensis</i> Nakai	114	<i>Bupleurum komarovianum</i> Lincz.	123
<i>Anemone raddeana</i> Regel	115	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	137
<i>Anemone stolonifera</i> Maxim.	116	<i>Campanula punctata</i> Lam.	165
<i>Angelica amurensis</i> Schischk.	70	<i>Cardamine leucantha</i> (Tausch) O.E.Schulz	80
<i>Angelica gigas</i> Nakai	71		

<i>Caryopteris incana</i> (Thunb. ex Houtt.) Miq.	30	<i>Dystaenia takesimana</i> (Nakai) Kitag.	73
<i>Cirsium japonicum</i> var. <i>maackii</i> (Maxim.) Matsum.	62	<i>Echinops setifer</i> Iljin	64
<i>Cirsium setidens</i> (Dunn) Nakai	63	<i>Elsholtzia splendens</i> Nakai ex F.Maek.	31
<i>Convallaria keiskei</i> Miq.	154	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P.Beauv.	138
<i>Coreanomecon hylomeconoides</i> Nakai	111	<i>Eupatorium makinoi</i> var. <i>oppositi- folium</i> (Koidz.) Kawah. & Yahara	79
<i>Corydalis speciosa</i> Maxim.	41	<i>Filipendula glaberrima</i> Nakai	146
<i>Cremastra variabilis</i> (Blume) Nakai	38	<i>Filipendula palmata</i> (Pall.) Maxim.	147
<i>Delphinium maackianum</i> Regel	51	<i>Galearis camtschatica</i> (Cham.) X.H.Jin, Schuit. & W.T.Jin	39
<i>Dendranthema coreanum</i> (H.Lév. & Vaniot) Vorosch.	95	<i>Gentiana scabra</i> Bunge	107
<i>Dendranthema zawadskii</i> (Herbich) Tzvelev	96	<i>Geranium koreanum</i> Kom.	109
<i>Dendranthema zawadskii</i> var. <i>lati- loba</i> (Maxim.) Kitam.	97	<i>Gypsophila oldhamiana</i> Miq.	132
<i>Dendranthema zawadskii</i> var. <i>luci- da</i> (Nakai) Pak	98	<i>Gypsophila pacifica</i> Kom.	133
<i>Dendranthema zawadskii</i> var. <i>tenuisectum</i> (Nakai) Kitag.	99	<i>Hanabusaya asiatica</i> (Nakai) Nakai	166
<i>Dianthus japonicus</i> Thunb.	83	<i>Hepatica asiatica</i> Nakai	117
<i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz.	52	<i>Heracleum moellendorffii</i> Hance	74
<i>Disporum sessile</i> (Thunb.) D.Don ex Schult. & Schult.f.	167	<i>Hylotelephium erythrostictum</i> (Miq.) H.Ohba	84
<i>Disporum smilacinum</i> A.Gray	168	<i>Hylotelephium spectabile</i> (Bureau) H.Ohba	85
<i>Disporum uniflorum</i> Baker	169	<i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt & Mabb.	110
<i>Disporum viridescens</i> (Maxim.) Nakai	170		

<i>Isodon japonicus</i> (Burm.f.) H.Hara	135	<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.	40
<i>Jeffersonia dubia</i> (Maxim.) Benth. & Hook.f. ex Baker & Moore	101	<i>Ostericum sieboldii</i> (Miq.) Nakai	124
<i>Lamprocapnos spectabilis</i> (L.) T.Fukuhara	172	<i>Parnassia palustris</i> L.	106
<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.	100	<i>Patrinia rupestris</i> (Pall.) Juss.	81
<i>Leonurus macranthus</i> Maxim.	32	<i>Patrinia serratulifolia</i> Link	130
<i>Leuzea uniflora</i> (L.) Holub	65	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.	131
<i>Ligularia stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. & Koidz.	24	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	173
<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	21	<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb.	75
<i>Liriope spicata</i> (Thunb.) Lour.	22	<i>Phedimus aizoon</i> var. <i>latifolius</i> (Maxim.) H. Ohba	86
<i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb.	26	<i>Phedimus takesimensis</i> (Nakai) 't Hart	87
<i>Lychnis cognata</i> Maxim.	103	<i>Pimpinella brachycarpa</i> (Kom.) Nakai	76
<i>Lysimachia barystachys</i> Bunge	174	<i>Pogostemon yatabeanus</i> (Makino) Press	33
<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	175	<i>Polia japonica</i> Thunb.	27
<i>Lysimachia coreana</i> Nakai	47	<i>Polygonatum cryptanthum</i> H.Lév. & Vaniot	157
<i>Lythrum salicaria</i> L.	35	<i>Polygonatum inflatum</i> Kom.	158
<i>Maianthemum dilatatum</i> (A.W.Wood) A.Nelson & J.F.Macbr.	23	<i>Polygonatum infundiflorum</i> Y.S.Kim, B.U.Oh & C.G.Jang	159
<i>Maianthemum japonicum</i> (A.Gray) LaFrankie	155	<i>Polygonatum involucreatum</i> (Franch. & Sav.) Maxim.	160
<i>Megaleranthis saniculifolia</i> Ohwi	118	<i>Polygonatum lasianthum</i> Maxim.	161
<i>Metanarthecium luteoviride</i> Maxim.	37	<i>Polygonatum odoratum</i> var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi	162
<i>Ophiopogon jaburan</i> G.Lodd.	156		

<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	119	<i>Stellera chamaejasme</i> L.	88
<i>Primula farinosa</i> subsp. <i>modesta</i> var. <i>koreana</i> T.Yamaz.	112	<i>Swertia pseudochinensis</i> H.Hara	108
<i>Pseudolysimachion linariifolium</i> (Pall. ex Link) Holub	42	<i>Synurus deltooides</i> (Aiton) Nakai	67
<i>Pseudolysimachion longifolium</i> (L.) Opiz	43	<i>Thalictrum actaeifolium</i> var. <i>brevi- stylum</i> Nakai	139
<i>Pseudolysimachion rotundum</i> var. <i>subintegrum</i> (Nakai) T.Yamaz.	44	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> var. <i>sibiricum</i> Regel & Tiling	140
<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax	104	<i>Thalictrum coreanum</i> H.Lév.	141
<i>Pseudostellaria palibiniana</i> (Takeda) Ohwi	105	<i>Thalictrum minus</i> var. <i>hypoleucum</i> (Siebold & Zucc.) Miq.	142
<i>Rodgersia podophylla</i> A.Gray	150	<i>Thalictrum rochebruneum</i> Franch. & Sav.	143
<i>Sanguisorba hakusanensis</i> Makino	177	<i>Thalictrum uchiyamae</i> Nakai	144
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	148	<i>Tripora divaricata</i> (Maxim.) P.D. Cantino	136
<i>Sanguisorba</i> × <i>tenuifolia</i> Fisch. ex Link	149	<i>Valeriana fauriei</i> Briq.	82
<i>Scabiosa comosa</i> Fisch. ex Roem. & Schult.	102	<i>Veratrum nigrum</i> var. <i>ussuriense</i> O.Loes.	36
<i>Scirpus karuisawensis</i> Makino	134	<i>Veronicastrum sibiricum</i> (L.) Pennell	45
<i>Scrophularia koraiensis</i> Nakai	151	<i>Waldsteinia ternata</i> (Stephan) Fritsch	120
<i>Serratula coronata</i> L.	66		
<i>Sophora flavescens</i> Aiton	171		
<i>Stachys riederi</i> var. <i>japonica</i> (Miq.) H.Hara	34		

참고자료

식물 특성정보

- 국립수목원. 국가표준식물목록. <http://www.nature.go.kr/>
- 국립수목원. 국가생물종지식정보시스템. <http://www.nature.go.kr>
- Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO & Harvard University Herbaria. eFloras. <http://www.efloras.org/>

국명 및 학명 유래

- 조민제, 최동기, 최성호, 심미영, 지용주, 이웅. (2021). 『한국 식물 이름의 유래 ‘조선식물항명집’ 주해서』. 심플라이프
- Dave's Garden. Botanyary. <https://davesgarden.com/guides/botanyary/>
- Wikimedia Foundation. Wiktionary. <https://www.wiktionary.org/>

사진 제공

- 권우찬 - 꾀꾀이풀, 노루귀, 동자꽃, 산오이풀, 홀아비바람꽃
- 이기홍 - 노루오줌, 도깨비부채, 산오이풀, 층층잔대, 큰꿍의비름, 포천구절초

형태로 찾는 우리꽃 정원식물

발행일	2023년 12월 31일
발행처	국립수목원
발행인	국립수목원장
집필진	이경미, 박소현, 이문규, 주이슬, 안시내, 박효근, 정채연, 이주영, 강자우, 김현정, 김진우, 라희연, 배준규, 최 경, 정미애
식물검수	손동찬
디자인	품투필
인쇄	수디자인
사진	국립수목원, 권우찬, 이기홍
발간등록번호	11-1400119-000497-01
I S B N	979-11-92743-38-7 90520

국립수목원 2023

이 책에 실린 모든 글과 사진은 저작권법에 따라 보호받으며 무단복제나 전제를 금합니다.

형태로 찾는 우리꽃 정원식물

발간등록번호 11-1400119-000497-01

비매품/무료



ISBN 979-11-92743-38-7