

Patientens navn:	Dato:	Tid:	Avdeling:	
------------------	-------	------	-----------	--

Vær oppmerksom på pasientens smerteatferd relatert til muskulatur, ledd og skjelett under morgenstell. Observer pasienten før du starter mobilisering. Forklar forståelig det du vil gjøre. Led pasienten, og gjennomfør bevegelsene (1–5) med forsiktighet. Stopp bevegelsen om du observerer smerteatferd. Fyll ut skjemaet umiddelbart etter hver bevegelse:

Smerteatferd

hver observasjon:

relatert til smerte

Sett et eller flere kryss for

smertelyd, ansiktsuttrykk og

avvergereaksjon, som kan være





Skriker



Ansiktsuttrykk Avvergereaksjon Grimaserer Rynker pannen Strammer munnen Lukker øynene



Stivner Beskytter seg Skyver fra seg Endringer i pusten Krymper seg

Smerteintensitet

Basert på observert smerteatferd; tolk styrken av smerteintensitet og sett kryss på linjen 0-10

SETT GJERNE FLERE KRYSS I RUTEN(E) FOR DIN(E) OBSERVASJONER

1. Led til å åpne begge hender			0 ei	ingen	smerte	e, 10 er	verst te	enkelig	smerte				
2. Led til å strekke armene mot hodet		→	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Led til å bøye og strekke ankler, knær og hofteledd		→	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 10
4. Led til å snu seg i sengen til begge sider			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Led til å sette seg opp på sengekanten			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

APPENDIKS

Vær oppmerksom på pasientens smerteatferd, som kan være relatert til indre organer, hode og hud. Smerte kan oppstå på grunn av en sykdom, sår, infeksjon eller ulykker. Inkluder alle dine observasjoner fra i dag og de siste dagene (siste uken).

Smerteatferd

Bruk front- og baksiden av kroppstegningen aktivt. Sett kryss for dine observasjoner relatert til smerteatferd (smertelyd, ansiktsuttrykk og avvergereaksjon)

Smerteintensitet

Basert på observert smerteatferd; tolk styrken av smerteintensitet og sett kryss på linjen 0–10



