

(Container)

## FBN Clopyralid 360 SL Herbicide

|               |          |                  |
|---------------|----------|------------------|
| <b>GROUPE</b> | <b>4</b> | <b>HERBICIDE</b> |
|---------------|----------|------------------|

Pour supprimer les mauvaises herbes à feuilles larges vivaces et annuelles dans les grandes cultures, les plantations d'arbre de Noël, les pâturages, les grands pâturages, les cultures de légumes et de fruits et les terres non cultivées.

AGRICOLE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF : clopyralide: 360 g/L  
(sous forme de sel de monoéthanolamine)

Solution

N° D'HOMOLOGATION 33762

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES



POISON

**DANGER : IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU**

En cas d'urgence médicale (humains ou animaux), contacter Rocky Mountain Poison Control au 1-866-767-5041.

En cas d'urgence chimique (déversement, fuite, incendie ou accident), contacter CHEMTREC au 1-800-424-9300 (Amérique du Nord) ou au 1-703-527-3887 (international).

CONTENU NET: 1 L – Vrac

Farmer's Business Network Canada, Inc.  
PO Box 5607  
High River, Alberta  
Canada T1V 1M7

Information sur le produit: 1-844-200-FARM (3276)

**MISE EN GARDE**  
**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**  
**PEUT-ÊTRE NOCIF SI ABSORBÉ PAR LA PEAU.**  
**PEUT IRRITER LA PEAU**

## **COMBUSTIBLE**

Irritant sévère pour les yeux. NE PAS laisser entrer en contact avec les yeux.

Éviter tout contact avec la peau et les vêtements.

Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage et pendant les activités de réparation. Des lunettes de protection ou un écran facial sont requis pendant le mélange et le chargement. Des gants ne sont pas requis pendant les traitements à l'aide d'une rampe d'aspersion, mais il l'est pour le mélange, le chargement, le nettoyage et la réparation.

Pour les cultures agricoles, ne pas pénétrer ou permettre l'accès aux travailleurs dans les zones traitées durant le délai de sécurité de 12 heures. Pour les terres non agricole, NE PAS entrer ni laisser les travailleurs entrer dans les sites traités jusqu'à ce que le produit pulvérisé soit sec.

**APRÈS LA PULVÉRISATION OU À LA FIN DE LA JOURNÉE :** Prendre une douche immédiatement. Se laver à fond avec de l'eau et du savon avant de manger, de boire ou de fumer. Enlever les vêtements contaminés à la fin de la période de travail; les ranger et les laver à part avec de l'eau chaude et du savon avant de les remettre.

## **PREMIERS SOINS**

**Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.**

**En cas d'ingestion:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements:** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec les yeux:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'inhalation:** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

## **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

Il n'existe pas d'antidote spécifique. Donner des soins de soutien. Le médecin doit décider du traitement à administrer en fonction des réactions du patient.

## **PRODUIT CHIMIQUE AGRICOLE**

Ne pas expédier ni entreposer avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des médicaments ou des vêtements.

## **MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES**

Ce produit est TOXIQUE pour les végétaux terrestres non ciblés. Respecter les zones tampons prescrites sous la rubrique MODE D'EMPLOI.

Ce produit affiche des propriétés et des caractéristiques associées aux produits chimiques décelés dans l'eau souterraine. L'utilisation de ce produit chimique peut contaminer l'eau souterraine, particulièrement là où les sols sont perméables et la nappe phréatique est peu profonde.

Afin de réduire le ruissellement à partir des sites traités vers les habitats aquatiques, éviter d'appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compacté ou sur de l'argile.

Éviter d'appliquer ce produit lorsqu'on prévoit de fortes précipitations.

Le risque de contamination des milieux aquatiques par le ruissellement peut être réduit par l'aménagement d'une bande de végétation entre la zone traitée et la rive du plan d'eau.

### **ENTREPOSAGE**

Conserver le produit à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Conserver dans un endroit chauffé; si le produit est gelé, l'amener à la température ambiante et agiter avant l'utilisation.

### **ÉLIMINATION**

#### **Contenants recyclables:**

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Éliminer les rinçures conformément à la réglementation provinciale.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

#### **Contenants Réutilisables:**

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (distributeur ou détaillant).

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

**AVIS À L'UTILISATEUR:** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

(Booklet)

# FBN Clopyralid 360 SL

## Herbicide

|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| GROUPE | 4 | HERBICIDE |
|--------|---|-----------|

Pour supprimer les mauvaises herbes à feuilles larges vivaces et annuelles dans les grandes cultures, les plantations d'arbre de Noël, les pâturages, les grands pâturages, les cultures de légumes et de fruits et les terres non cultivées.

AGRICOLE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF: clopyralide: 360 g/L  
(sous forme de sel de monoéthanolamine)

Solution

N° D'HOMOLOGATION 33762 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES



POISON

**DANGER : IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU**

En cas d'urgence médicale (humains ou animaux), contacter Rocky Mountain Poison Control au 1-866-767-5041.

En cas d'urgence chimique (déversement, fuite, incendie ou accident), contacter CHEMTREC au 1-800-424-9300 (Amérique du Nord) ou au 1-703-527-3887 (international).

CONTENU NET: 1 L – Vrac

Farmer's Business Network Canada, Inc.  
PO Box 5607  
High River, Alberta  
Canada T1V 1M7

Information sur le produit: 1-844-200-FARM (3276)

**MISE EN GARDE**  
**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**  
**PEUT IRRITER LA PEAU**

**COMBUSTIBLE**

Irritant sévère pour les yeux. NE PAS laisser entrer en contact avec les yeux.

Éviter tout contact avec la peau et les vêtements.

Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage et pendant les activités de réparation. Des lunettes de protection ou un écran facial sont requis pendant le mélange et le chargement. Des gants ne sont pas requis pendant les traitements à l'aide d'une rampe d'aspersion, mais il l'est pour le mélange, le chargement, le nettoyage et la réparation.

Pour les cultures agricoles, ne pas pénétrer ou permettre l'accès aux travailleurs dans les zones traitées durant délai de sécurité de 12 heures. Pour les terres non agricole, NE PAS entrer ni laisser les travailleurs entrer dans les sites traités jusqu'à ce que le produit pulvérisé soit sec.

**APRÈS LA PULVÉRISATION OU À LA FIN DE LA JOURNÉE :** Prendre une douche immédiatement. Se laver à fond avec de l'eau et du savon avant de manger, de boire ou de fumer. Enlever les vêtements contaminés à la fin de la période de travail; les ranger et les laver à part avec de l'eau chaude et du savon avant de les remettre.

**PREMIERS SOINS**

**Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.**

**En cas d'ingestion:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements:** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec les yeux:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'inhalation:** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

Il n'existe pas d'antidote spécifique. Donner des soins de soutien. Le médecin doit décider du traitement à administrer en fonction des réactions du patient.

**PRODUIT CHIMIQUE AGRICOLE**

Ne pas expédier ni entreposer avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des médicaments ou des vêtements.

**MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES**

Ce produit est TOXIQUE pour les végétaux terrestres non ciblés. Respecter les zones tampons prescrites sous la rubrique MODE D'EMPLOI.

L'utilisation de ce produit chimique peut entraîner la contamination de l'eau souterraine, en particulier dans les sites où les sols sont perméables (par exemple, les sols sablonneux) et où la nappe phréatique est peu profonde.

Afin de réduire le ruissellement vers les habitats aquatiques à partir des sites traités, évaluer les caractéristiques et les conditions du site avant le traitement. Les caractéristiques et les conditions propices au ruissellement comprennent des pluies abondantes, une pente modérée à abrupte, un sol nu et mal drainé (par exemple, des sols compactés ou à texture fine, comme l'argile).

Éviter d'appliquer ce produit lorsqu'on prévoit de fortes précipitations.

Le risque de contamination des milieux aquatiques par le ruissellement peut être réduit par l'aménagement d'une bande de végétation entre la zone traitée et la rive du plan d'eau.

### **ENTREPOSAGE**

Conserver le produit à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Conserver dans un endroit chauffé; si le produit est gelé, l'amener à la température ambiante et agiter avant l'utilisation.

### **ÉLIMINATION**

#### **Contenants recyclables:**

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Éliminer les rinçures conformément à la réglementation provinciale.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

#### **Contenants Réutilisables:**

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (distributeur ou détaillant).

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

### **RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**

FBN Clopyralid 360 SL est un concentré liquide qui doit être dilué dans de l'eau. Il s'applique dans les cultures de colza (canola), de betterave à sucre, de rutabaga, sur les terres en jachère, dans les cultures de lin (y compris les variétés à basse teneur en acide linoléique), de blé (printemps), d'orge (printemps), d'avoine, de fraises, sur les graminées au stade de semis ou établies et destinées à la production de semence et de fourrage, sur les terres agricoles non cultivées, dans les plantations de sapins baumiers (arbres de Noël) et dans les cultures de bleuets en corymbes. FBN Clopyralid 360 SL est rapidement absorbé par les feuilles et les racines et se diffuse dans les plantes aussi bien vers le haut que vers le bas. Il est utilisé pour supprimer le chardon des champs, la renouée liseron, la matricaire inodore, le séneçon vulgaire et la luzerne spontanée. Il réprime en outre la croissance du laitron des champs en détruisant les parties aériennes.

## **MODE D'EMPLOI**

**Puisque ce produit n'est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les systèmes aquatiques, NE PAS l'utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatique.**

**NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets.**

## **CULTURES ET VÉGÉTATION**

Ne pas utiliser dans les serres.

### **Plantes sensibles**

Ne pas appliquer FBN Clopyralid 360 SL directement sur le tournesol, les légumineuses (telles que pois, haricots, lentilles ou luzerne), les fruits et légumes, les fleurs et autres plantes à feuilles larges que l'on désire protéger. Voir à ce que FBN Clopyralid 360 SL n'entre pas non plus en contact avec les plantes énumérées ci-dessus et prendre les précautions nécessaires pour que le brouillard de pulvérisation ne dérive pas vers ces plantes. Il pourrait rester des résidus de FBN Clopyralid 360 SL dans le sol la saison prochaine, ce qui entraverait alors la croissance des plantes sensibles.

Des précautions spéciales doivent être prises en cas d'application dans des zones non cultivées comme les bords de chemins, les pipelines et les voies ferrées où il pourrait y avoir de la végétation à conserver sensible. Ne pas appliquer sur, ou permettre la dérive vers, la végétation à conserver sensible comme la vesce ou le trèfle pouvant se trouver sur les berges.

### **Zones non ciblées**

Éviter de contaminer l'eau, les fossés d'irrigation ou les terres non ciblées par le traitement. Ne pas utiliser FBN Clopyralid 360 SL dans les zones suivantes : eaux stagnantes ou courantes, côtés internes ou fonds des fossés d'irrigation, endroits où l'eau de surface peut s'écouler vers les terres labourables, occupées ou destinées à être occupées par des cultures sensibles.

### **Rotation des cultures**

Les terres déjà traitées à FBN Clopyralid 360 SL peuvent êtreensemencées l'année suivante en blé, avoine, orge, seigle (mais non contre-ensemencées de légumineuses, trèfles ou luzerne), graminées fourragères, lin, colza (canola) ou moutarde; elles peuvent aussi être laissées en jachère d'été.

Au cours de l'année suivant le traitement, ne pas semer d'autres cultures que celles susmentionnées.

### **Mélange en réservoir**

Ce produit peut être mélangé avec un engrais, un supplément ou avec des produits antiparasitaires homologués, dont les étiquettes permettent aussi les mélanges en réservoir, à la condition que la totalité de chaque étiquette, y compris le mode d'emploi, les mises en garde, les restrictions, les précautions relatives à l'environnement et les zones tampons sans pulvérisation, soit suivie pour chaque produit. Lorsque les renseignements inscrits sur les étiquettes des produits d'association au mélange en réservoir divergent, il faut suivre le mode d'emploi le plus restrictif. Ne pas faire de mélanges en réservoir avec des produits contenant le même principe actif, à moins que ces produits soient recommandés spécifiquement sur cette étiquette.

Dans certains cas, les produits de lutte antiparasitaire mélangés en réservoir peuvent entraîner une activité biologique réduite ou des dommages accrus à la culture hôte. L'utilisateur devrait communiquer avec Farmer's Business Network Canada, Inc. au 1-844-200-FARM (3276) pour demander des renseignements avant d'appliquer tout mélange en réservoir qui n'est pas recommandé spécifiquement sur cette étiquette.

### **Pâturage et récolte pour la nourriture pour les animaux**

Il n'y a aucune restriction relativement au pâturage ou au fourrage traités à FBN Clopyralid 360 SL. Si c'est nécessaire, on peut faire brouter le bétail dans les zones traitées immédiatement après l'application.

### **Fumier et paille**

Les résidus d'herbicide accumulés dans la paille peuvent être nocifs pour certaines plantes sensibles. Il ne faut donc pas utiliser de la paille ou des résidus de cultures traitées comme compost ou paillis pour des plantes à feuilles larges sensibles. Si la paille ou les résidus sont utilisés comme litière ou comme nourriture pour les animaux, n'épandre ensuite ce fumier que dans les champs réservés aux cultures qui tolèrent le clopyralide.

Approved French Label

Sub. No. 2024-1202

2024-07-16

comme le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, les graminées fourragères, le colza (canola) ou le lin. Ne pas faire pousser de pois, de haricots, de lentilles, de pommes de terre, de tournesols ni d'autres cultures sensibles sur une terre qui a été recouverte au cours des 12 derniers mois de paille contenant des résidus de FBN Clopyralid 360 SL.

SPECIMEN



## ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION ET CONTENANTS

Appliquer seulement lorsque le potentiel de dérive hors du site à traiter est au minimum. Tenir compte de la vitesse et de la direction du vent, des inversions de température, du matériel d'application et des réglages du pulvérisateur.

Pour les applications de pulvérisateur terrestre:

Les traitements localisés avec l'équipement manuel ne requièrent pas une zone tampon. L'utilisation d'un pulvérisateur à faible hauteur muni d'écrans ou de cônes antidérive qui empêchent tout contact avec la culture, le fruit ou le feuillage.

Application à l'aide d'un pulvérisateur agricole : NE PAS appliquer pendant les périodes de calme plat ou lorsque les vents soufflent en rafales. NE PAS appliquer en gouttelettes de taille inférieure au calibre fin / moyenne / grossier de la classification l'American Society of Agricultural Engineers (ASAE S572.1). La rampe de pulvérisation doit être fixée à 60 cm au moins au-dessus de la culture ou du sol.

## NE PAS appliquer ce produit à l'aide d'un équipement de pulvérisation aérienne

### Pour réduire la dérive du brouillard de pulvérisation :

- Utiliser des buses à grand débit qui projettent la bouillie en grosses gouttelettes.
- Utiliser des jets à faible pression (200 à 275 kPa).
- Pulvériser la bouillie à une dose de 100 à 200 L/ha.
- Ne pas faire le traitement si la vitesse du vent dépasse 15 km/h.

### Nettoyage de l'équipement

L'équipement utilisé pour pulvériser FBN Clopyralid 360 SL doit être nettoyé à fond avant de servir à l'application d'autres pesticides sur des cultures sensibles. Pour connaître la marche à suivre détaillée pour le nettoyage de l'équipement de pulvérisation, communiquer avec le détaillant de FBN Clopyralid 360 SL.

## MODE D'APPLICATION

### Préparation de la bouillie de pulvérisation

Pour préparer la bouillie de pulvérisation, verser environ la moitié de la quantité d'eau voulue dans le réservoir du pulvérisateur puis, en agitant mécaniquement ou avec une conduite de retour en cuve, ajouter la quantité recommandée de FBN Clopyralid 360 SL. Bien mélanger le tout dans le réservoir. Ajouter ensuite l'herbicide dans le mélange. Continuer à agiter et ajouter le reste de l'eau.

### Taux d'application de la bouillie de pulvérisation

Appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,28 à 0,83 L/ha plus tout autre herbicide approuvé pour le mélange en réservoir à la dose recommandée dans suffisamment d'eau pour assurer une couverture complète (100 à 200 L/ha de bouillie de pulvérisation). Employer un pulvérisateur terrestre réglé à une pression de 200 à 275 kPa. Effectuer le traitement lorsque les mauvaises herbes sont jeunes et en pleine croissance, lorsque le chardon des champs se trouve entre le stade de la rosette et celui du prébourgeonnement et avant que les bourgeons ne soient violacés, et avant que la luzerne spontanée n'atteigne une hauteur de 5 à 50 cm.

Pour le traitement localisé de zones infestées de mauvaises herbes, mélanger la quantité nécessaire de FBN Clopyralid 360 SL dans 200 L d'eau et appliquer sur une superficie de 1000 m<sup>2</sup>. Se référer au tableau ci-dessous pour connaître la bonne quantité de FBN Clopyralid 360 SL à utiliser :

| Taux recommandée de FBN Clopyralid 360 SL<br>par<br>hectare | Quantité nécessaire de FBN Clopyralid 360 SL<br>pour traiter 1000 m <sup>2</sup> |
|---|--|
| 0,28 L  | 28 mL  |
| 0,42 L  | 42 mL  |
| 0,56 L  | 56 mL  |
| 0,83 L  | 83 mL  |

Conversions approximatives :

200 à 275 kPa = 30 à 40 lb/po<sup>2</sup>

100 à 200 L/ha = 10 à 20 gallons/acre

1 mètre carré = 1,2 verge carrée  
1 L/ha = 14 oz liq/acre

## MODE D'EMPLOI –FBN Clopyralid 360 SL appliqué seul ZONES CULTIVÉES ET NON CULTIVÉES

| Mauvaises herbes supprimées   | Taux*     |
|---|-----------|
| chardon des champs (parties érigées)<br>vesce (Vicia spp.)<br>trèfle alsike   | 0,42 L/ha |
| chardon des champs<br>matricaire inodore<br>renouée liseron<br>laiteron des champs (parties érigées)<br>sénéçon vulgaire<br>luzerne spontanée<br>petite herbe à poux<br>petite oseille (répression)<br>marguerite blanche (répression)<br>kudzu (pour répression à court terme des parties érigées) | 0,56 L/ha |
| chardon des champs (suppression tout au long de la saison avec réduction de la population l'année suivante)<br>kudzu (pour répression allant jusqu'à la saison complète des parties érigées)  | 0,83 L/ha |

### Stades des mauvaises herbes au moment de l'application

FBN Clopyralid 360 SL devrait être appliqué lorsque le chardon des champs, le laiteron des champs et la matricaire inodore sont le stade entre de la rosette et celui du prébourgeonnement. On obtient de meilleurs résultats quand le chardon des champs est en pleine croissance et que l'humidité du sol est telle qu'elle favorise une croissance rapide. FBN Clopyralid 360 SL risque d'être beaucoup moins efficace si le sol est sec et si les conditions sont défavorables à la croissance; il ne donnera pas non plus de bons résultats si le chardon des champs a atteint le stade où le bourgeon est violacé.

### Suppression du chardon des champs

Pour supprimer le chardon des champs (parties aériennes), appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,42 L/ha, ce qui est suffisant pour enrayer la croissance des parties aériennes pendant une période de 6 à 8 semaines. Une nouvelle repousse peut se produire à la fin de la saison, sans toutefois compromettre la récolte.

Pour supprimer la croissance des parties aériennes du chardon des champs pendant toute la saison, porter la dose de FBN Clopyralid 360 SL à 0,56 L/ha. Cette taux permettra généralement de supprimer le chardon des champs pendant toute la saison. Les rhizomes ne seront toutefois pas tous éliminés et une repousse peut se produire à la fin de la saison de croissance.

Pour supprimer la croissance des parties aériennes du chardon des champs pendant toute la saison de telle sorte que la population de cette mauvaise herbe sera aussi réduite l'année suivante, appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,83 L/ha. Cette taux permettra de supprimer le chardon des champs pendant toute la saison et de le réprimer pour la saison suivante; on réduit ainsi le nombre total de pousses de chardon des champs dans la zone traitée.

### Kudzu

Dans les zones non agricoles des terres agricoles, par ex. les zones de stockage, les bâtiments de ferme, le long des clôtures, il est requis de répéter les applications annuelles avec un volume de pulvérisation minimum de 200 L/ha pour réprimer cette vigne en raison de la repousse des tubercules et des collets et des nouvelles pousses de semences dormantes par suite de la perturbation du sol. Il peut être requis de répéter les applications annuelles avec un minimum de 100 L/ha d'eau dans les champs cultivés, y compris la jachère, où la présence de semences de kudzu est connue. On peut effectuer l'application au moyen d'un pulvérisateur à dos ou portatif pour les infestations mineures.

### COLZA (CANOLA) (Ouest canadien seulement)

À utiliser pour les variétés polonaises et argentines, y compris le colza (canola). FBN Clopyralid 360 SL doit être dilué dans de l'eau et appliqué lorsque le stade foliaire de la culture se situe entre 2 et 6 feuilles pour supprimer efficacement le chardon des champs, la matricaire inodore, le séneçon vulgaire, la renouée liseron, les parties aériennes du laitron des champs et la luzerne spontanée. Pour avoir des instructions portant uniquement sur la suppression du chardon des champs, se référer à la section intitulée «Suppression du chardon des champs».

### Mélanges en réservoir pour les cultures de canola

SE RÉFÉRER AUX ÉTIQUETTES DE CES HERBICIDES POUR CONNAÎTRE LES AUTRES MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES, LES TAUX (S'ILS NE SONT PAS INDICUÉS CI-DESSOUS), LE CALENDRIER D'APPLICATION, LES VOLUMES D'EAU ET LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION.

| Produit d'association   | Taux de FBN Clopyralid 360 SL | Taux du produit d'association                     | Mauvaises herbes supprimées additionnelles  |
|---|-------------------------------|---|---|
| Herbicide Poast Ultra Liquide Emulsifiable                                      | 0,42 - 0,83 L/ha              | 0,32 - 0,47 L/ha plus Adjuvant Merge 0,75-1,0L/ha | mauvaises herbes graminées annuelles, chardon des champs  |
| Herbicide Venture L   | 0,42 - 0,83 L/ha              | 0,6 - 2,0 L/ha                                    | mauvaises herbes graminées annuelles, chardon des champs  |
| Select Concentré Émulsifiable<br>Herbicide de Postlevée ou<br>FBN Clethodim 240 | 0,42 - 0,83 L/ha              | 0,19 L/ha plus Adjuvant Amigo à 0,5% v/v          | chardon des champs***, renouée liseron****, folle avoine, sétaire verte, orge spontanée, blé spontané, et avoine spontanée  |
| Odyssey Herbicide WDG*  | 0,42 - 0,56 L/ha              | 29 - 43 g/ha                                      | chardon des champs (FBN Clopyralid 360 SL à 0.42 L/ha fournira une suppression des parties épigées du chardon des champs durant 6-8 semaines, alors qu'un taux de 0,56 L/ha fournira une suppression des parties épigées tout au long de la saison) |

|   |           |           |  |
|---|-----------|-----------|--|
| VP480 Herbicide **  | 0,28 L/ha | 0,94 L/ha | Pour connaître les taux et le moment d'application pour les mauvaises herbes et les graminées annuelles, consulter l'étiquette du produit d'association.   |
| Roundup Transorb HC<br>Herbicide Liquide**                                  |           | 0,83 L/ha |  |
| Herbicide Liquide Roundup<br>WeatherMAX avec la<br>technologie Transorb 2** |           | 0,83 L/ha | Mauvaises herbes supprimées tout au long de la saison: chardon des champs (parties érigées tout au long de la saison), pissenlits <15 cm de diamètre (parties érigées tout au long de la saison), pissenlits >15 cm de diamètre (suppression), laiteron des champs (parties érigées tout au long de la saison), laiteron des champs (parties érigées tout au long de la saison), renouée liseron |

\* Variétés de canola Clearfield seulement – appliquer lorsque le canola Clearfield est au stade de 2 à 6 feuilles et que le chardon des champs est en croissance active.

\*\* Variétés de canola tolérant au glyphosate seulement – appliquer lorsque le canola est au stade de 2 à 6 feuilles. Utiliser 100 L/ha d'eau.

\*\*\*Chardon des champs – 0,42 L de FBN Clopyralid 360 SL/ha pour une suppression des parties érigées durant 6-8 semaines, 0,56 L de FBN Clopyralid 360 SL/ha pour une suppression tout au long de la saison, 0,83 L de FBN Clopyralid 360 SL/ha pour une suppression l'année suivante

\*\*\*\*Renouée liseron – 0,56 L de FBN Clopyralid 360 SL/ha pour une suppression tout au long de la saison

### Instructions pour le mélange

**Note 1 :** Lorsqu'on mélange en réservoir des formulations solubles dans l'eau comme FBN Clopyralid 360 SL avec des concentrés émulsifiables tels que l'herbicide Poast Ultra liquide émulsifiable, et Select concentré émulsifiable herbicide de postlevée ou FBN Clethodim 240, il faut commencer par verser FBN Clopyralid 360 SL dans le réservoir du pulvérisateur. Une fois que le réservoir est à moitié rempli d'eau, ajouter le concentré émulsifiable tout en versant le reste de l'eau.

**Note 2 :** Si le pulvérisateur a été utilisé auparavant pour appliquer des herbicide qui contiennent des herbicides 2,4-D ou MCPA, il faut que l'équipement de pulvérisation soit bien nettoyé avant de mélanger FBN Clopyralid 360 SL dans le réservoir de mélange. Des traces de contamination d'une solution de pulvérisation avec ces herbicides causeront des dommages au canola.

**Note 3:** Utiliser 100 L/ha d'eau. Choisir un filtre de 50 mailles (ou à mailles plus espacées). Remplir le réservoir du pulvérisateur aux trois quarts avec de l'eau. Ajouter la quantité requise de sacs solubles d'ODYSEY herbicide WDE directement dans le pulvérisateur par l'ouverture du réservoir. Agiter pendant au moins 10 minutes pour dissoudre l'herbicide. Une fois que l'herbicide est dissout, utiliser un dispositif de mesure calibré pour ajouter la quantité requise de FBN Clopyralid 360 SL tout en agitant la solution à pulvériser. Une fois que FBN Clopyralid 360 SL est dissout, continuer d'agiter et ajouter la quantité requise d'adjuvant Merge ou de surfactant non ionique et d'engrais. En cas de mousse excessive, un agent antimoussant à base de silicone peut être ajouté (ex. Halt). Continuer de remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau désiré. Si l'agitation est interrompue pendant plus de 5 minutes, remettre la solution à pulvériser en suspension en procédant à une agitation complète avant de recommencer à pulvériser le produit. Entre les charges de sacs hydrosolubles d'Odyssey herbicide WDE, inspecter les filtres à la buse et à l'intérieur du système, les rincer et les nettoyer si nécessaire. Après avoir pulvérisé les sacs hydrosolubles de l'Odyssey herbicide WDE, rincer à fond le réservoir, la rampe, les conduites et les filtres internes ou à la buse avec de l'eau propre pour éviter d'endommager d'autres cultures.

**LIN, y compris les variétés à basse teneur en acide linoléique (Ouest canadien seulement)**

Appliquer FBN Clopyralid 360 SL dans les cultures de lin lorsque la plante a atteint 5 à 10 cm de hauteur et que les mauvaises herbes sont en pleine croissance. Appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,56 à 0,83 L/ha pour supprimer le chardon des champs, le séneçon vulgaire, la matricaire inodore, la renouée liseron, le laiteron des champs (parties aériennes) et la luzerne spontanée.

Un taux de 0,83 L/ha permettra de supprimer le chardon des champs pour l'année suivante.

**Mélanges en réservoir pour les cultures de lin**

SE RÉFÉRER AUX ÉTIQUETTES DE CES HERBICIDES POUR CONNAÎTRE LES AUTRES MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES, LES TAUX (S'ILS NE SONT PAS INDICUÉS CI-DESSOUS), LE CALENDRIER D'APPLICATION, LES VOLUMES D'EAU ET LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION.

| Produit d'association   | Taux de FBN Clopyralid 360 SL | Taux du produit d'association   | Mauvaises herbes supprimées additionnelles  |
|---|-------------------------------|---|---|
| MCPA Ester ou MCPA Amine<br><br>MCPA Amine (500 g e.a./L)<br>MCPA Ester (500 g e.a./L)<br><br>MCPA Ester (600 g e.a./L) | 0,42 L/ha                     | 420 - 560 g e.a./ha<br><br>0,84 - 1,12 L/ha<br><br>0,7 - 0,93 L/ha              | Chardon des champs (suppression des parties érigées)<br>bourse-à-pasteur, séneçon vulgaire<br>petite herbe à poux, lampourde glouteron, pissenlit, tabouret des champs, chénopode blanc, sarrasin de Tartarie, matricaire inodore, renouée liseron, moutarde sauvage, canola spontané, amarante à racine rouge*, laiteron des champs (parties érigées), luzerne spontanée |
| Herbicide Poast Ultra Liquide Emulsifiable  | 0,42 - 0,83 L/ha              | 0,32 - 0,47 L/ha plus<br>Adjuvant Merge 0,75-1,0 L/ha                           | mauvaises herbes graminées annuelles, Chardon des champs  |
| Herbicide Poast Ultra Liquide Emulsifiable plus Ester MCPA  | 0,42 - 0,83 L/ha              | 0,32 - 0,47 L/ha plus<br>Adjuvant Merge 0,75-1,0 L/ha plus<br>420 - 560 g ai/ha | mauvaises herbes à feuilles larges, graminées annuelles, et certaines mauvaises herbes à feuilles larges vivaces  |
| Select Concentré Émulsifiable Herbicide de Postlevée ou FBN Clethodim 240   | 0,56 - 0,83 L/ha              | 0,19 L/ha +<br>Adjuvant Amigo à 0,5% v/v  | chardon des champs**, folle avoine, sétaires vertes, orge spontanée, blé spontané, avoine spontanée, et renouée liseron   |

|  |                  |   |   |
|--|------------------|---|---|
| Select<br>Concentré<br>Émulsifiable<br>Herbicide de<br>Postlevée ou<br>FBN Clethodim<br>240 plus<br>Ester MCPA | 0,21 - 0,28 L/ha | 0,19 L/ha<br>plus<br>Adjuvant Amigo<br>à 0,5 v/v<br>plus<br>420 - 560 g e.a./ha | Taux faible : 0,21 L/ha de FBN<br>Clopyralid 360 SL + 420 g<br>e.a./ha d'Ester MCPA – chardon<br>des champs (infestation faible),<br>folle avoine, sétaires verte,<br>céréales spontanées (blé, orge,<br>avoine).<br><br>Taux élevé : 0,28 L/ha de FBN<br>Clopyralid 360 SL + 560 g<br>e.a./ha d'Ester MCPA – chardon<br>des champs (infestation de<br>moyenne à élevée), folle avoine,<br>sétaires verte, amarante à racine<br>rouge, renouée, laituron<br>(potager et glabre) (parties<br>épigées), céréales spontanées<br>(blé, orge, avoine), canola<br>spontané, et<br>renouée liseron |
|--|------------------|---|---|

\*Se référer à l'étiquette de l'herbicide MCPA pour connaître les taux.

\*\*Chardon des champs – 0,56 L de FBN Clopyralid 360 SL/ha pour une suppression tout au long de la saison, 0,83 L de FBN Clopyralid 360 SL/ha pour une suppression qui se poursuit l'année suivante.

#### Instructions pour le mélange

**Note 1 :** Taux d'herbicide Ester MCPA de 420 g de matière active/ha ou plus, ou d'herbicide MCPA amine de 490 g de matière active/ha ou plus, peuvent retarder la maturité et ainsi diminuer le rendement.

**Note 2 :** Lorsqu'on utilise des herbicides de contact comme l'herbicide bromoxynil (qui endommagent les feuilles du chardon des champs), il faut appliquer FBN Clopyralid 360 SL de 7 à 14 jours avant ou 14 jours après l'utilisation de ces herbicides pour ainsi permettre au chardon des champs de récupérer et de reprendre sa croissance.

**Note 3 :** Verser la quantité nécessaire de FBN Clopyralid 360 SL dans un réservoir à moitié rempli d'eau et agiter. Ajouter la quantité requise d'herbicide Poast Ultra liquide émulsifiable et continuer à agiter. Verser la quantité de l'adjuvant Merge requise et rajouter ensuite de l'eau jusqu'à ce que réservoir soit rempli. Continuer à agiter.

**Note 4 :** Verser la quantité nécessaire de FBN Clopyralid 360 SL, puis de l'herbicide MCPA, dans le pulvérisateur à moitié rempli d'eau et agiter pendant 2 à 3 minutes. Ajouter l'herbicide Poast Ultra liquide émulsifiable, puis l'adjuvant Merge, et rajouter ensuite de l'eau jusqu'à ce qu'on obtienne le volume nécessaire. Agiter sans arrêt.

#### AVOINE (Ouest canadien seulement), BLÉ (PRINTEMPS) et ORGE (PRINTEMPS)

FBN Clopyralid 360 SL peut être utilisé dans les cultures de blé (printemps), d'orge (printemps) et d'avoine pour supprimer le chardon des champs, le séneçon vulgaire, le laituron des champs (parties aériennes), la renouée liseron, la matricaire inodore et la luzerne spontanée. Il faut appliquer ce FBN Clopyralid 360 SL lorsque le blé, l'orge et l'avoine sont entre le stade des trois feuilles et le stade de la feuille étendard et que les mauvaises herbes sont en pleine croissance. FBN Clopyralid 360 SL endommage les légumineuses telles que le trèfle et la luzerne ; par conséquent, les céréales ne doivent pas être contre-ensemencées de légumineuses. Se reporter à la section intitulée « Pâturage et récolte pour la nourriture pour les animaux » pour connaître les intervalles à respecter dans le cas des cultures immatures.

#### Taux d'utilisation

FBN Clopyralid 360 SL peut être appliqué tel quel dans les cultures de céréales pour supprimer le chardon des champs.

Approved French Label  
Sub. No. 2024-1202  
2024-07-16

Pour supprimer la croissance des parties érigées du chardon des champs, appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,42 L/ha ; l'herbicide agira pendant 6 à 8 semaines. La croissance peut reprendre à la fin de la saison sans toutefois compromettre la récolte.

Pour supprimer le chardon des champs pendant toute la saison, porter la dose de FBN Clopyralid 360 SL à 0,56 L/ha.

**Mélanges en réservoir pour les cultures d'avoine (Ouest canadien seulement), blé de printemps et orge**  
SE RÉFÉRER AUX ÉTIQUETTES DE CES HERBICIDES POUR CONNAÎTRE LES AUTRES MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES, LES TAUX (S'ILS NE SONT PAS INDIQUÉS CI-DESSOUS), LE CALENDRIER D'APPLICATION, LES VOLUMES D'EAU ET LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION.

**Les mélanges en réservoir suivants permettent de supprimer les mauvaises herbes à feuilles larges annuelles et vivaces indiquées sur les étiquettes des produits d'association ainsi que les mauvaises herbes indiquées dans la colonne des commentaires ci-dessous.**

SPECIMEN

| Produit d'association  | Cultures homologuées                                       | FBN Clopyralid 360 SL | Taux du produit d'association  | Mauvaises herbes additionnelles supprimées  |
|--|--|-----------------------|--|---|
| 2,4-D Ester ou 2,4-D Amine<br><br>2,4-D Amine (470 g e.a./L)<br><br>2,4-D Amine (564 g e.a./L)<br>2,4-D Ester (564 g e.a./L)<br><br>2,4-D Ester (660 g e.a./L) | blé de printemps<br>blé dur<br>orge de printemps           | 0,28 - 0,42 L/ha      | 420 - 560 g e.a./ha<br><br>0,9 - 1,2 L/ha<br><br>0,75 - 1,0 L/ha<br><br>0,64 – 0,85 L/ha | Chardon des champs (FBN Clopyralid 360 SL à 0,28 L/ha supprimera le chardon des champs durant 6 à 8 semaines et, à 0,42, fournira une suppression tout au long de la saison) NE PAS UTILISER SUR L'AVOINE |
| MCPA Ester ou MCPA Amine<br><br>MCPA Amine (500 g e.a./L)<br>MCPA Ester (500 g e.a./L)<br><br>MCPA Ester (600 g e.a./L)  | blé de printemps<br>blé dur<br>orge de printemps<br>avoine | 0,28 - 0,42 L/ha      | 420 - 560 g e.a./ha<br><br>0,84 - 1,12 L/ha<br><br>0,7 – 0,93 L/ha                       | Chardon des champs (FBN Clopyralid 360 SL à 0,28 L/ha supprimera le chardon des champs durant 6 à 8 semaines et, à 0,42, fournira une suppression tout au long de la saison)                              |
| MCPA Ester plus<br>Herbicide Achieve Liquide   | blé de printemps<br>blé dur<br>orge de printemps           | 0,21 - 0,28 L/ha      | 420 - 560 g e.a./ha plus<br>0,5 L/ha plus<br>Adjuvant Turbocharge 0,5% v/v               | sétaire verte, sétaire glauque, échinochloa pied-de-coq, ivraie de Perse, folle avoine<br>NE PAS UTILISER SUR L'AVOINE  |
|  |  |                       |  |   |
| MCPA Ester plus<br>Herbicide Axial 100 EC  | blé de printemps<br>orge de printemps                      | 0,21 - 0,28 L/ha      | 420 - 560 g e.a./ha plus<br>600 mL/ha plus<br>Adjuvant Adigor 700 mL/ha                  | folle avoine, sétaire verte, sétaire glauque, avoine spontanée, graines de l'alpiste des Canaries spontanée, panic millet<br>NE PAS UTILISER SUR L'AVOINE   |
|  |  |                       |  |   |
|  |  |                       |  |   |



|   |  |           |                                   |  |
|---|--|-----------|-----------------------------------|--|
|   |  |           |                                   |  |
|   |  |           |                                   |  |
| Florasulam<br>Herbicide<br>Concentré en<br>Suspension<br>plus<br>MCPA Ester | blé de<br>printemps<br>blé dur<br>orge de<br>printemps<br>avoine | 0,21 L/ha | 0,1 L/ha<br>plus<br>420 g e,a,/ha | chardon des champs,<br>canola spontané*, céréaiste<br>vulgaire, gaillet gratteron,<br>pissenlits (semis ; rosettes<br>hivernantes <15 cm),<br>sagesse-des-chirurgiens<br>(rosettes de printemps<br>seulement), ortie royale,<br>chénopode blanc,<br>amarante, céanothus<br>d'Amérique, bourse-à-<br>pasteur, renouée, laiteron<br>des champs (parties<br>épigées seulement)**,<br>laiteron potager, tabouret<br>des champs, érodium<br>cicutaire, renouée liseron,<br>et moutarde sauvage, et<br>suppression du pissenlit<br>(rosettes hivernantes >15<br>cm ; plantes matures)<br><br>*Y compris les variétés de<br>canola Roundup Ready,<br>Liberty-Link et Smart<br>tolérants aux herbicides<br>**Suppression seulement<br>constatée au moins 40<br>jours après le traitement |
|   |  |           |                                   |  |

|   |  |                                      |  |   |
|---|--|--------------------------------------|--|---|
| Florasulam<br>Herbicide<br>Concentré en<br>Suspension<br>plus<br>MCPA Ester<br>plus<br>Herbicide Axial 100 EC | blé de<br>printemps<br>orge de<br>printemps            | 0,21 L/ha                            | 0,1 L/ha<br>plus<br>420 g e.a./ha<br>plus<br>600 mL/ha<br><br>Plus<br>Adjuvant<br>Adigor<br>700mL/ha | folle avoine, sétaire verte*,<br>sétaire glauque, avoine<br>spontanée, graines de<br>l'alpiste des Canaries<br>spontanée, panic millet, et<br><br>échinochloa pied-de-coq**<br>*Répression seulement de<br>la sétaire verte.<br><br>**Une diminution de la<br>suppression de<br>l'échinochloa pied-de-coq<br>peut être constatée avec<br>ce mélange en réservoir.<br>NE PAS UTILISER SUR<br>L'AVOINE  |
| Herbicide<br>Starane™ II<br>plus<br>MCPA Ester  | blé de<br>printemps<br>blé dur<br>orge de<br>printemps | 0,21 L/ha<br><br>ou<br><br>0,28 L/ha | 0,31 L/ha<br>plus<br>420 g e.a./ha<br><br>0,41 L/ha<br>plus<br>560 g e.a./ha                         | Taux faible : gaillet<br>gratteron (1-4 verticilles),<br>chardon des champs<br>(infestations faibles), lin<br>spontané (1-12 cm),<br>sagesse-des-chirurgiens<br>(semis de printemps 2-4<br>feuilles), kochia ***,<br>chénopode blanc,<br>moutarde sauvage,<br>bourse-à-pasteur, tabouret<br>des champs, tournesol<br>spontané et répression de<br>l'érodium ciculaire (1 à 8<br>feuilles)<br><br>Taux élevé : gaillet<br>gratteron (1-4 verticilles),<br>sagesse-des-<br>chirurgiens**, kochia***,<br>chénopode blanc, bourse-<br>à-pasteur, tabouret des<br>champs, érodium<br>ciculaire(1 à 8 feuilles),<br>tournesol spontané, lin<br>spontané (1-12 cm),<br>moutarde sauvage, |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>sarrasin de Tartarie, renouée liseron (1 à 4 feuilles), chardon des champs * (infestations de moyennes à élevées), canola spontané, pissenlit ** séneçon vulgaire, mauve à feuilles rondes (1 à 6 feuille), amarante à racine rouge, ansérine de Russie, matricaire inodore, renouée, laiteron potager, laiteron des champs*, et suppression de la céréaste vulgaire ***, ortie royale (2 à 6 feuille)</p> <p>* Suppression tout au long de la saison, avec des repousses à l'automne (suppression des parties érigées).</p> <p>** rosettes de printemps seulement.</p> <p>*** Y compris les biotypes résistants aux herbicides du Groupe 2 qui inhibent l'enzyme ALS.</p> <p>NE PAS UTILISER SUR L'AVOINE</p> |
|--|--|--|--|---|

|  |  |                                      |  |   |
|--|--|--------------------------------------|--|---|
| Herbicide<br>Starane II<br>Plus<br>MCPA Ester<br>plus<br>Herbicide Achieve Liquide | blé de<br>printemps<br>blé dur<br>orge de<br>printemps | 0,21 L/ha<br><br>ou<br><br>0,28 L/ha | 0,31 L/ha<br>plus<br>420 g e.a./ha<br>plus<br>0,5 L/ha<br><br>or<br><br>0,41 L/ha<br>plus<br>560 g e.a./ha<br>plus<br>0,5 L/ha<br>plus<br>Adjuvant<br>Turbocharge<br>0,5 % v/v | plus sétaires verte, folle<br>avoine<br>NE PAS UTILISER SUR<br>L'AVOINE |
|  |  |                                      |  |   |
|  |  |                                      |  |   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Instructions pour le mélange**  
**Note 1:** Si un produit d'association nécessite l'ajout d'un adjuvant, ajouter l'adjuvant et le taux de dilution recommandés au mélange en réservoir.

### **TERRES EN JACHÈRE D'ÉTÉ ET TERRES AGRICOLES NON CULTIVÉES**

FBN Clopyralid 360 SL peut être appliqué sur les terres laissées en jachère d'été (une fois par an) et sur les terres agricoles non cultivées (autour des bâtiments agricoles, des aires de stockage, des clôtures, etc.) à raison de 0,83 L/ha pour la suppression du chardon des champs, de la matricaire inodore, du séneçon vulgaire, de la renouée liseron, des parties aériennes du laiteron des champs et de la luzerne spontanée. Procéder à la pulvérisation lorsque le chardon des champs est en pleine croissance et se trouve entre le stade de la rosette et celui du bourgeonnement.

### **GRAMINÉES DE SEMIS ET ÉTABLIES POUR LA PRODUCTION DE SEMENCES ET DE FOURRAGE (OUEST CANADIEN SEULEMENT)**

Y compris : pâturin des prés, brome inerme, alpiste roseau, fétuque rouge traçante, fétuque des prés, fétuque élevée, vulpin des prés, dactyle pelotonnée, élyme de l'Altaï, élyme de Russie, phléole des prés, agropyre à crête, agropyre intermédiaire, chiendent à tiges rudes, agropyre des rives pour la production de semences et de fourrage et agropyre élevé pour la production de fourrage seulement : Pour combattre les mauvaises herbes énumérées sur l'étiquette ainsi que le trèfle d'alsike, appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,42 à 0,83 L/ha dans 110 à 220 L/ha d'eau. Effectuer un traitement par an au moyen d'un pulvérisateur terrestre. Pour les semis de graminées, appliquer le produit au stade de 2 à 4 feuilles. Pour les graminées établies, appliquer au stade du gonflement, ou en automne après la récolte, ou au début du printemps. Consulter la section « Pâturage et récolte pour la nourriture pour animaux ».

### **PLANTATIONS D'ARBRES DE NOËL COMPOSÉES DE SAPINS BAUMIERS**

Pour supprimer la vesce (*Vicia spp.*), appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,42 L/ha mélangé dans 150 à 200 L/ha d'eau. Appliquer le produit directement sur les feuilles en utilisant un pulvérisateur hydraulique. Le traitement est plus efficace lorsque les tiges de la vesce ont de 10 à 15 cm de hauteur et que la plante n'a pas encore atteint la couronne de l'arbre. Éviter tout contact avec les deux tiers supérieurs de la couronne de l'arbre. Ne pas utiliser le produit sur les lits de semences, les plantes transplantées et lorsque le traitement se fait en hauteur (recouvrement entier de la plante).

### **BETTERAVES À SUCRE**

Pour supprimer le chardon des champs, appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,56 à 0,83 L/ha au moyen d'un pulvérisateur terrestre. Faire une pulvérisation foliaire généralisée ou en bande sur un rang. Lorsqu'on effectue un traitement en bande, il faut réduire la quantité de FBN Clopyralid 360 SL en proportion avec la largeur de la bande. FBN Clopyralid 360 SL doit être appliqué lorsque les betteraves à sucre sont entre le stade du cotylédon et celui de huit feuilles. Pour supprimer efficacement le chardon des champs, faire un traitement généralisé, c'est-à-dire pulvériser FBN Clopyralid 360 SL sur toute la surface infestée. Ne pas appliquer le produit au cours des 90 jours qui précèdent la récolte.

### **RUTABAGA**

Pour supprimer la petite herbe à poux, pulvériser FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,56 L/ha dans 200 à 300 L/ha d'eau au moyen d'un pulvérisateur à rampe. Appliquer en postlevée lorsque les plants ont 5 à 10 cm de hauteur. Si les plants sont plus gros, l'herbicide sera moins efficace. Ne faire qu'un seul traitement par année. Le délai d'attente avant la récolte est de 83 jours.

Le MODE D'EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne les utilisations décrites dans cette partie de l'étiquette, a été élaboré par des personnes autres que Farmer's Business Network Canada, Inc. dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Dans le cas de ces utilisations, Farmer's Business Network Canada, Inc. n'a pas complètement évalué la performance (efficacité) et/ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) du produit lorsqu'il est utilisé de la façon indiquée sur l'étiquette pour l'ensemble des conditions environnementales ou des variétés végétales. Avant d'appliquer le produit à grande échelle, l'utilisateur devrait faire un essai sur une surface réduite, dans les conditions du milieu et en suivant les pratiques courantes pour confirmer que le produit se prête à une application généralisée.

## MODE D'EMPLOI

**BLEUETS EN CORYMBES : Faire un traitement par année** en postlevée pour supprimer la vesce jargeau, le trèfle rouge et le trèfle blanc. Appliquer en pulvérisation dirigée (équipement au sol) ciblant les mauvaises herbes et loin des plantes (éviter tout contact avec le feuillage ou les parties ligneuses pour réduire le risque de dommages à la culture) ou comme un traitement localisé sous la verrière des plants de bleuets en corymbes. Les plantes sont plus sensibles au FBN Clopyralid 360 SL appliqué au printemps avant la floraison, avant et/ou pendant le cycle de croissance annuel de la culture, qu'après la floraison. Ne pas appliquer FBN Clopyralid 360 SL d'une semaine avant la floraison jusqu'à une semaine après la floraison.

Appliquer le produit à raison de 0,42 L/ha pour la vesce jargeau, et 0,83 L/ha pour le trèfle rouge et le trèfle blanc. Le délai d'attente avant récolte est de 45 jours.

**COLZA (CANOLA) - ONTARIO SEULEMENT** : Pour utilisation en Ontario dans les cultures de colza (canola) des cultivars suivants homologués au Canada : Cyclone, Ebony, Jewel, 46A65 et Hyola 401.

| Mauvaises herbes supprimées  | Taux                        | Une bouteille de 4,45 L traite | Pour des résultats optimaux  |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| chardon des champs<br>matricaire inodore<br>renouée liseron<br>laiteron des champs (parties aériennes)<br>sénéçon vulgaire | 0,42 L/ha<br>à<br>0,56 L/ha | 10,6 ha<br>à<br>7,9 ha         | 1. Appliquer lorsque les mauvaises herbes sont en pleine croissance<br><br>2. Pulvériser à raison de 100 à 200 L/ha pour assurer une couverture uniforme |

Faire un traitement par saison, en postlevée. Appliquer lorsque le stade foliaire du colza (canola) se situe entre 2 et 6 feuilles et que les mauvaises herbes sont en pleine croissance. Pulvériser l'herbicide lorsque le chardon des champs se trouve entre le stade de la rosette et celui du prébourgeonnement.

**POMMIERS FRUCTIFÈRES ET NON FRUCTIFÈRES** : Utiliser en traitement localisé sur les pommes portantes et non porteuses pour le contrôle des espèces de barbotte vivaces. Si on se sert d'une lance ou d'un pulvérisateur à dos pour traiter les petites infestations, appliquer FBN Clopyralid 360 SL à un taux de 56 mL par 1000 m<sup>2</sup> dans 200 L d'eau lorsque le pois sauvage vivace se trouve au début du stade de floraison. Si on sert d'un pulvérisateur à rampe pour traiter les infestations plus grandes, appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 560 mL par hectare dans 150-200 L d'eau. Éviter un contact de la bouillie de pulvérisation avec les branches d'arbre. Pour de meilleurs résultats, appliquer au début du printemps. Allouer au moins 30 jours entre l'application sur les mauvaises herbes et la récolte.

**CHOU, CHOU-FLEUR, BROCOLI, CHOU-RAVE (TRANSPLANTÉS), CHOU CHINOIS (TRANSPLANTÉ ET SEMÉ), RADIS DU JAPON, CHOU-MOUTARDE ÉPAIS («BOK-CHOÏ») ET BROCOLI CHINOIS (SEMÉS)** : Faire une application par année pour supprimer l'herbe à poux, la vesce jargeau, le sénéçon vulgaire, le chardon des champs et pour la répression de la petite oseille. Appliquer au sol seulement, après la transplantation.

**Taux** : appliquer à raison de 0,56 L/ha dans 300 L d'eau par ha.  
Le délai d'attente avant la récolte est de 30 jours.

**CANNEBERGE** : Faire **une ou deux applications par année**, pour supprimer la vesce jargeau.  
Appliquer à l'aide d'un équipement de type humecteur.

Les humectations peuvent être effectuées sous forme de traitement localisé. On peut utiliser à cet effet un applicateur ayant, par exemple, la forme d'un bâton de hockey. **La solution de traitement doit être appliquée en humectant le feuillage des mauvaises herbes qui s'étend au-dessus du couvert des plants de canneberges.** Les applications par humectation peuvent être faites à l'automne, au moins deux semaines après la récolte et après que les plantes ont pris leur couleur de dormance hivernale, ainsi qu'au printemps, avant le débourrement des bourgeons. Les traitements par humectation peuvent aussi être effectués après le débourrement des bourgeons des plants de canneberge (première levée (1 à 2 mm) du méristème terminal) pour supprimer les mauvaises herbes à levée tardive ou les mauvaises herbes ayant échappé aux précédentes mesures de suppression. **Éviter le contact de la solution de traitement avec le feuillage des plants de canneberge après le débourrement des bourgeons afin de ne pas endommager les plants.**

**Taux** : Appliquer une solution à 2 % de FBN Clopyralid 360 SL dilué dans l'eau (20 mL du produit par litre d'eau).  
Le délai à respecter avant la récolte est de 60 jours.

#### **NAVET**

Pour supprimer les mauvaises herbes indiquées sur l'étiquette, appliquer FBN Clopyralid 360 SL avec un pulvérisateur à rampe au taux de 0,42 -0,56 L/ha à environ 200 à 300 L ha d'eau. Appliquer sous forme de pulvérisation en postlevée lorsque les mauvaises herbes sont jeunes et en pleine croissance. Ne faire qu'un seul traitement par année. Intervalle avant récolte pour les racines de navet est de 30 jours et 15 jours pour les feuilles de navet.

**SUPPRESSION DES MAUVAISES HERBES DANS LES BRISE-VENT** : Pour supprimer le chardon des champs dans les brise-vent constitués des plantes suivantes : lilas vulgaire, saule à feuilles aiguës, épinette du Colorado, épinette blanche, shépherdie et cerisier de Virginie. Effectuer une application par année. Appliquer sur le chardon des champs lorsqu'il est entre le stade de la rosette et celui du prébourgeonnement, après l'émergence, application au sol seulement.

**Taux** : Appliquer le produit à raison de 0,83 L/ha.

#### **FRAISES (régénération)**

Pour supprimer la vesce jargeau et le chardon des champs et réprimer l'oseille et la marguerite blanche, appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,56 à 0,83 L/ha. Effectuer un traitement généralisé à l'aide d'un pulvérisateur à rampe calibré pour débiter un volume total de 150 à 200 L/ha. Pour supprimer le chardon des champs, se référer à la section « Suppression du chardon des champs ». Pour supprimer la vesce jargeau, appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,56 L/ha. Pour l'oseille et la marguerite blanche, appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,83 L/ha. Effectuer un seul traitement immédiatement après avoir récolté mais avant de tondre. Attendre au moins 7 à 10 jours avant de tondre. Ne pas appliquer FBN Clopyralid 360 SL après la mi-août, car il risque d'entraver le développement des stolons et la formation des bourgeons. Les applications tardives de FBN Clopyralid 360 SL risquent d'endommager les récoltes et ainsi d'en diminuer le rendement à la saison suivante.

Appliquer FBN Clopyralid 360 SL en été seulement comme traitement de régénération. Ne pas appliquer FBN Clopyralid 360 SL plus d'une fois par année.



Les variétés de fraises précoces, telles qu'Annapolis et Veestar, traitées à FBN Clopyralid 360 SL sont plus sujettes aux meurtrissures. De plus, l'herbicide risque d'être plus dommageable lorsque surviennent certaines agressions du milieu telles que sécheresse, inondation ou conditions hivernales rigoureuses.

**SUPPRESSION DE LA VESCE JARGEAU DANS LES CULTURES DE BLEUET NAIN DANS L'EST DU CANADA SEULEMENT**

Appliquer FBN Clopyralid 360 SL pour supprimer la vesce jargeau dans les cultures de bleuet nain.

**POUR TRAITEMENT LOCALISÉ SEULEMENT.** Si on se sert d'un pistolet ou d'un pulvérisateur à dos pour traiter les infestations mineures, appliquer l'herbicide FBN Clopyralid 360 SL à raison de 42 mL par 1 000 mètres carrés dans 200 L d'eau. Si on sert d'un pulvérisateur à rampe pour traiter des infestations plus importantes, appliquer 420 mL de FBN Clopyralid 360 SL par hectare dans 150-200 L d'eau. Effectuer une application par année, au cours de l'année de croissance végétative. Effectuer l'application en juin OU lorsque la vesce jargeau commence à être en fleurs. Les applications de FBN Clopyralid 360 SL peuvent causer des dommages aux cultures ayant comme conséquence un rendement réduit au cours de la saison suivant l'application. Délai avant récolte : 10 mois.

**SUPPRESSION DU CHARDON DES CHAMPS ET AUTRES MAUVAISES HERBES FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE DANS LES CULTURES DE PEUPLIER ET LEURS HYBRIDES**

Appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,83 L/ha pour supprimer le chardon des champs et d'autres mauvaises herbes figurant sur l'étiquette dans les cultures intensives à courte rotation nouvelles et établies de peuplier (*Populus*) et leurs hybrides. N'effectuer qu'une application par année. Appliquer sur le chardon des champs à l'étape rosette à préfloraison. Appliquer par voie terrestre seulement par pulvérisation générale ou par pulvérisation directe à la base de l'arbre. Des feuilles bombées et des tiges tordues peuvent se produire mais cela ne devrait pas nuire à la croissance.

**AVERTISSEMENT :** La tolérance au FBN Clopyralid 360 SL des clones/hybrides de peuplier varie. Les lésions observées comprennent : lésions sur les feuilles, bombement des feuilles, torsion des tiges, hauteur ou diamètre réduits. Puisque tous les clones/hybrides n'ont pas tous été testés pour leur tolérance, l'utilisation de ce produit doit se limiter à une petite zone de chaque clone/hybride pour confirmer leur tolérance avant d'adopter ce produit pour un usage plus général au champ.

**SUPPRESSION DES MAUVAISES HERBES EN POSTLEVÉE DANS LES CULTURES DE CONIFÈRES EN PLEINE-TERRE**

Pour supprimer les mauvaises herbes indiquées sur l'étiquette dans les plantations de conifères établis, y compris le sapin baumier, le sapin Fraser, l'épinette blanche, et le pin blanc, appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,42 à 0,56 litre de produit dans 150 à 300 litres d'eau par hectare en tant que pulvérisation dirigée. Appliquer en bandes de chaque côté des arbres en entrant en contact qu'avec les feuilles du bas seulement. Éviter le contact avec les deux tiers supérieurs de la couronne des arbres. Ne pas effectuer d'applications sur les lits de semences, sur les plants repiqués, ni d'applications par le dessus. Faire un traitement par saison.

Le FBN Clopyralid 360 SL a été testé sur le sapin baumier, le sapin Fraser, le pin blanc et l'épinette blanche. Le FBN Clopyralid 360 SL peut être appliqué sur d'autres conifères ne figurant pas sur la liste. Toutefois, leur tolérance au FBN Clopyralid 360 SL peut varier. La première application de FBN Clopyralid 360 SL sur tout conifère ne figurant pas dans la liste doit se limiter à une petite zone pour confirmer sa tolérance avant d'adopter ce produit pour un usage plus général au champ.

**FEUILLES LARGES, Y COMPRIS LA VESCE, DANS LE GROUPE DE CULTURES 12-09 (FRUITS À NOYAU)**

Pour supprimer les mauvaises herbes à feuilles larges, y compris la vesce, applique FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,42 à 0,83 litres de produit dans 150 à 300 litres d'eau par hectare. Si on se sert d'une lance ou d'un pulvérisateur à dos pour traiter les petites infestations, appliquer FBN Clopyralid 360 SL à un taux de 42 à 83 mL par 1000 m<sup>2</sup> dans 300 L d'eau lorsque la vesce se trouve au début du stade de floraison. Appliquer jusqu'au début du stade de floraison en tant que traitement localisé. Utiliser le taux le plus élevé en cas d'infestation grave ou pour obtenir une suppression résiduelle plus élevée. Éviter un contact de la bouillie de pulvérisation avec les branches d'arbre. Pour de meilleurs résultats, appliquer au début du printemps. Délai d'attente avant récolte : 30 jours.

SE RÉFÉRER À L'ÉTIQUETTE PRINCIPALE DE L'HERBICIDE FBN CLOPYRALID 360 SL POUR PLUS DE DÉTAILS ET DE DIRECTIVES, Y COMPRIS SUR LES RESTRICTIONS CONCERNANT LA CULTURE EN ROTATION, AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

**SYSTÈME IVM TRANSLINE™ (UTILISATION SUR TERRES NON CULTIVÉES)**

**POUR USAGE SEULEMENT DANS LES PROVINCES DES PRAIRIES, ET DANS L'INTÉRIEUR DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE (Y COMPRIS LA RÉGION DE LA RIVIÈRE DE LA PAIX), ET DANS LES RÉGIONS CENTRALES ET ATLANTIQUES DU CANADA SEULEMENT.**

On peut utiliser FBN Clopyralid 360 SL dans les zones non cultivées suivantes : emprises (hydro, voies ferrées, lignes de communication, pipelines) et endroits associés comme les stations, sites manufacturiers industriels, sites de stockage, terrains libres et bords de chemins, bases militaires et pelouses peu entretenues\*. Ce produit n'est pas homologué pour utilisation sur les pelouses fines ou celles très entretenues. Appliquer entre 0,42 et 0,83 L/ha selon la quantité des mauvaises herbes et le niveau de suppression du chardon des champs requis. Consulter le tableau Mauvaises herbes supprimées pour connaître la dose d'applications appropriée.

\*Pelouses peu entretenues qui peuvent contenir un mélange de gazon rustique, résistant à la sécheresse, à croissance lente et de taille courte, de la fétuque, diverses herbes hautes et espèces à feuilles larges résistantes à l'usure comme le trèfle. Les zones de pelouses peu entretenues comprennent aussi celles qui reçoivent peu ou pas d'applications de fertilisant, aucune irrigation et qui ne sont tondues ou coupées qu'à l'occasion. Ne comprend pas les pelouses fines ou très entretenues.

**MÉLANGES EN RÉSERVOIR**

FBN Clopyralid 360 SL peut être mélangé en réservoir avec le (amine ou ester) 2,4-D le MCPA (amine ou ester) pour supprimer d'autres mauvaises herbes à feuilles larges sur les bords des chemins et les terrains libres. FBN Clopyralid 360 SL peut être mélangé en réservoir avec la (amine) 2,4-D pour supprimer d'autres mauvaises herbes à feuilles larges dans les emprises (hydro, voies ferrées, lignes de communication, pipelines) et endroits associés comme les stations, les sites manufacturiers industriels et les sites de stockage. Lire et suivre les mises en garde et les modes d'emploi de chacune des étiquettes des produits associés du mélange et pour obtenir de l'information sur les mauvaises herbes supprimées et autres restrictions. Suivre les restrictions et les précautions les plus sévères de ces produits.

On peut mélanger en réservoir FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,42 à 0,83 L/ha aux herbicides 2,4-D ou MCPA au taux de 420 à 560 g d'ingrédient actif/ha. Ce mélange en réservoir permet de supprimer plusieurs mauvaises herbes dont les suivantes : chardon des champs, lampourde glouteron, petite herbe à poux, pissenlit, chénopode blanc, matricaire inodore, laitron des champs, bourse-à-pasteur, tabouret des champs, sarrasin de Tartarie, renouée liseron et moutarde des champs. Appliquer jusqu'à hauteur de 15 cm sur les mauvaises herbes annuelles à feuilles larges.

## GRANDS PÂTURAGES ET PÂTURAGES

Y compris : pâturin des prés, brome inerme, alpiste roseau, fétuque rouge traçante, fétuque des prés, fétuque élevée, vulpin des prés, dactyle pelotonné, élyme de l'Altaï, élyme de Russie, fléole des prés, agropyre à crête, agropyre intermédiaire, agropyre à chaumes rudes, agropyre de rivage, agropyre élevé.

Pour supprimer les mauvaises herbes indiquées sur l'étiquette en plus du trèfle alsike, appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,42 à 0,83 L/ha dans 110 à 120 L/ha d'eau. Effectuer une application par saison par pulvérisateur terrestre. Pour les semis, appliquer au stade de 2 à 4 feuilles. Pour les graminées établies, appliquer au stade épiage ou à l'automne après la récolte ou au début du printemps. Ne pas appliquer de mélanges en réservoir contenant du 2,4-D ou du MCPA.

Le MODE D'EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne les utilisations décrites dans cette partie de l'étiquette, a été élaboré par des personnes autres que Farmer's Business Network Canada, Inc. dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Dans le cas de ces utilisations, Farmer's Business Network Canada, Inc. n'a pas complètement évalué la performance (efficacité) et/ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) du produit lorsqu'il est utilisé de la façon indiquée sur l'étiquette pour l'ensemble des conditions environnementales ou des variétés végétales. Avant d'appliquer le produit à grande échelle, l'utilisateur devrait faire un essai sur une surface réduite, dans les conditions du milieu et en suivant les pratiques courantes pour confirmer que le produit se prête à une application généralisée.

### MODE D'EMPLOI

**POUR USAGE SEULEMENT DANS LES PROVINCES DES PRAIRIES, ET DANS L'INTÉRIEUR DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE (Y COMPRIS LA RÉGION DE LA RIVIÈRE DE LA PAIX), ET DANS LES RÉGIONS CENTRALES ET ATLANTIQUES DU CANADA SEULEMENT.**

**POUR SUPPRIMER LA CENTAURÉE MACULÉE ET LA CENTAURÉE DIFFUSE DANS LES ZONES NON CULTIVÉES** (emprises [hydro, voies ferrées, lignes de communication, pipelines] et endroits associés comme les stations, sites manufacturiers industriels, sites de stockage, bords de chemins, aéroports, bases militaires et pelouses peu entretenues\*) **DANS LES GRANDS PÂTURAGES, LES PÂTURAGES ET LES PEUPELEMENTS OU PLANTATIONS DE SAPINS BAUMIERS DE NOËL.**

\*Pelouses peu entretenues qui peuvent contenir un mélange de gazon rustique, résistant à la sécheresse, à croissance lente et de taille courte, de la fétuque, diverses herbes hautes et espèces à feuilles larges résistantes à l'usure comme le trèfle. Les zones de pelouses peu entretenues comprennent aussi celles qui reçoivent peu ou pas d'applications de fertilisant, aucune irrigation et qui ne sont tondues ou coupées qu'à l'occasion. Ne comprend pas les pelouses fines ou très entretenues.

#### Mauvaises herbes supprimées

Centaurée maculée et centaurée diffuse

#### Taux d'application

0,70 L/ha

Effectuer une application par année pour supprimer la centaurée maculée et la centaurée diffuse. Appliquer au printemps avant le stade du bourgeonnement des mauvaises herbes. Appliquer dans 100 - 200 L d'eau/ha. Appliquer sur les semis et sur les plantes établies.

### MODE D'EMPLOI

**POUR UTILISATION DANS L'EST DU CANADA SEULEMENT**

#### SUPPRESSION EN POSTLEVÉE DES MAUVAISES HERBES DANS LE BLÉ DURUM

Pour supprimer les mauvaises herbes figurant sur l'étiquette, appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,42 à 0,56 L de produit par hectare dans 100 à 200 litres d'eau par hectare. Appliquer une fois au cours

du stade 3 feuilles à feuille paniculaire en n'entrant en contact qu'avec les feuilles. Le délai à respecter avant la récolte est de 60 jours.

Pour supprimer la grande herbe à poux, de l'émergence jusqu'au stade 5 feuilles, appliquer FBN Clopyralid 360 SL à raison de 0,56 litre de produit par hectare dans 100 à 200 litres d'eau par hectare. Le délai à respecter avant la récolte est de 60 jours.

CONSULTER L'ÉTIQUETTE PRINCIPALE DE FBN Clopyralid 360 SL POUR DES DÉTAILS ET DES DIRECTIVES SUPPLÉMENTAIRES, Y COMPRIS AU SUJET DES RESTRICTIONS CONCERNANT LA ROTATION DES CULTURES, AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

## ZONES TAMPONS

Les traitements localisés à l'aide d'équipement portatif ne nécessitent pas de zone tampon.

Pour l'application sur des emprises, aucune zone tampon n'est requise pour protéger les milieux terrestres vulnérables. Toutefois, il faut recourir à la meilleure stratégie d'application possible qui réduit au minimum la dérive hors cible, en tenant compte des conditions météorologiques (par exemple, direction du vent ou un vent faible) et de l'équipement de pulvérisation (par exemple, pulvérisation de grosses gouttelettes, réduction au minimum de la hauteur de pulvérisation au-dessus du couvert végétal).

Il est nécessaire que les zones tampons précisées dans le tableau ci-dessous séparent le point d'application directe du produit et la lisière de l'habitat terrestre vulnérable le plus proche de ce point dans la direction du vent (par exemple, des prairies, des forêts, des terres à bois, des haies, des grands pâturages libres ou des zones arbustives).

| Méthode d'application  | Culture  | Zones tampons (en mètres) nécessaires à la protection des habitats terrestres |
|------------------------|--|---|
| Pulvérisateur agricole | Avoine, betterave à sucre, blé, bleuet géant, bleuet nain, brise-vent, brocoli, canola, chou, chou-fleur, fraise, graines d'alpiste des Canaries, graminées fourragères, lin, maïs de grande culture (hybride), orge, pâturages libres et pâturages de graminées, peupliers et leurs hybrides, plantations d'arbres de Noël, rutabaga, navet, épinard, sapin baumier, utilisations non agricoles, choux de Bruxelles | 2*  |
|                        | Groupe de culture 11-09 (fruits à pépins) et groupe de culture 12-09 (fruits à noyau)  | 3   |

\* Des zones tampons pour protéger les milieux terrestres vulnérables ne sont pas requises pour les emprises, notamment les ballasts de voies ferrées, les emprises de chemins de fer, les emprises hydroélectriques, les servitudes d'utilité, les routes et les terrains d'entraînement des bases militaires.

Lorsque les mélanges en cuve sont permis, consulter l'étiquette des produits d'association et respecter la zone tampon sans pulvérisation la plus grande (la plus restrictive) indiquée pour chacun des produits utilisés dans le mélange en cuve, puis appliquer en utilisant le calibre de gouttelettes le plus gros (selon la classification de l'ASAE) parmi ceux indiqués sur l'étiquette des produits d'association.

**Il est possible de modifier les zones tampons associés à ce produit selon les conditions météorologiques et la configuration du matériel de pulvérisation en utilisant le calculateur de zone tampon dans la section Pesticides du site Canada.ca.**

## RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE

Aux fins de la gestion de la résistance, il importe de noter que FBN Clopyralid 360 SL est un herbicide du groupe 4. Toute population de mauvaises herbes peut renfermer ou former des plantes naturellement résistantes à FBN Clopyralid 360 SL et à d'autres herbicides du groupe 4. Les biotypes résistants peuvent finir par dominer au sein de la population des mauvaises herbes si ces herbicides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut aussi exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition d'une résistance aux herbicides :

- Dans la mesure du possible, alterner FBN Clopyralid 360 SL ou les herbicides du même groupe 4 avec des herbicides qui appartiennent à d'autres groupes et qui suppriment les mêmes mauvaises herbes et ce, au cours d'une seule saison de croissance (applications séquentielles) ou entre les saisons de croissance.
- Utiliser, si cet emploi est permis, des mélanges en cuve contenant des herbicides provenant d'un groupe différent. Pour ralentir l'acquisition d'une résistance, le composé du mélange le moins susceptible de créer une résistance devrait supprimer la ou les mauvaises herbes ciblées aussi efficacement que le composé du mélange le plus susceptible de créer une résistance.
- Utiliser les herbicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée contre les mauvaises herbes qui privilégie le dépistage, la consultation de données antérieures sur l'utilisation des pesticides et la rotation des cultures, et qui permet l'intégration des techniques de labour (ou d'autres méthodes mécaniques de lutte), des pratiques culturales (par exemple, augmentation de la densité des semis, application d'engrais au moment propice et au moyen d'une méthode précise pour favoriser la croissance de la culture plutôt que celle des mauvaises herbes) ou biologiques (recours à des cultures ou à des variétés de végétaux qui entrent en compétition avec les mauvaises herbes) et d'autres pratiques de lutte.
- Après l'application d'herbicides, surveiller les populations de mauvaises herbes traitées pour y déceler les signes éventuels de l'acquisition d'une résistance (par exemple, une des espèces de mauvaises herbes indiquées sur l'étiquette n'a pas été supprimée). En présence de signes attestant une résistance potentielle, empêcher la production des graines des mauvaises herbes sur le site touché en utilisant, dans la mesure du possible, un autre herbicide appartenant à un groupe différent. Empêcher la propagation des mauvaises herbes résistantes d'un champ à l'autre en nettoyant le matériel de labour et de récolte avant le passage dans un autre champ et en utilisant des semences non contaminées.
- Faire analyser les graines de mauvaises herbes potentiellement résistantes par un laboratoire qualifié afin de confirmer leur résistance et d'opter pour un autre herbicide.
- Communiquer avec les spécialistes ou les conseillers agricoles certifiés de la région pour obtenir des recommandations supplémentaires sur une culture ou un biotype de mauvaise herbe précis pour ce qui est de la gestion de la résistance aux pesticides et de la lutte intégrée contre les mauvaises herbes.
- Pour obtenir davantage d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, communiquer avec Farmer's Business Network Canada, Inc. au 1-844-200-FARM (3276).

**AVIS À L'UTILISATEUR:** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

Tous les produits énumérés sont des marques déposées de leurs compagnies respectives.