

MUESTRA

Hidrametilnona

Grupo

20

Insecticida

Amdro® Pro

Cebo para hormigas coloradas

**MATA HORMIGAS COLORADAS IMPORTADAS Y NATIVAS,
así como otras hormigas
MATA A LA REINA ELIMINA EL HORMIGUERO**

Ingrediente activo:

hidrametilnona: tetrahydro-5,5-dimethyl-2(1H)-pyrimidinone(3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-etenil)-2-propenilideno) hidrazona 0.73%

Otros ingredientes: 99.27%

Total: 100.00%

N.º de reg. de EPA 241-322

N.º de est. de EPA

**MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN**

Si no entiende la etiqueta, pida a alguien que se la explique detalladamente.

Consulte toda la etiqueta para obtener información adicional sobre **primeros auxilios, precauciones, instrucciones de uso, condiciones de venta y garantía** y las restricciones específicas del estado en cuanto a cultivo o lugar de uso.

En caso de una emergencia que ponga en peligro la vida o los bienes y que involucre a este producto llame a cualquier hora del día o de la noche al 1-800-832-4357 (HELP).

Contenido neto:

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel o la ropa	<ul style="list-style-type: none"> • Quítese la ropa contaminada. • Enjuáguese inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llame a un centro de toxicología o a un médico para que le recomienden un tratamiento.
En caso de contacto con los ojos	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. • Si usa lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos; luego continúe enjuagándose los ojos. • Llame a un centro de toxicología o a un médico para que le recomienden un tratamiento.
En caso de ingestión	<ul style="list-style-type: none"> • Llame inmediatamente a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para que le recomienden un tratamiento. • Si la persona afectada puede tragar, pídale que beba a sorbos un vaso de agua. • NO induzca el vómito a menos que así lo indiquen el centro de control de intoxicaciones o el médico. • NO dé nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

NÚMERO DE LA LÍNEA DIRECTA

Cuando llame a un centro de toxicología o al médico, o cuando vaya a recibir tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede llamar a BASF Corporation al 1-800-832-4357 (HELP) para que le recomienden un tratamiento médico de emergencia.

Precauciones

Riesgos para los seres humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN. Es nocivo si se absorbe a través de la piel. Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Puede ser perjudicial si se ingiere.

Equipo de protección personal

Las personas que apliquen y manejen el producto deben usar:

- Camisa de manga larga y pantalones largos
- Guantes impermeables
- Zapatos y calcetines

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y el mantenimiento de los equipos de protección personal. Si no hay instrucciones para las prendas lavables, lávelas con detergente y agua caliente. Lave el equipo de protección personal aparte y manténgalo separado de otras prendas.

Declaración sobre controles de ingeniería

Cuando las personas que manejen el producto utilicen sistemas cerrados, cabinas confinadas o aeronaves de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma de Protección del Trabajador (Worker Protection Standard, WPS) para plaguicidas agrícolas [40 CFR 170.240(d)(4-6) de EE. UU.], los requisitos de equipo de protección personal para estas personas se pueden reducir o modificar según se especifica en la WPS.

RECOMENDACIONES PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO

Los usuarios deben:

- Lavarse las manos antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o usar el baño.
- Quitarse la ropa o el equipo de protección personal inmediatamente si se impregnan del pesticida. Luego, lavarse minuciosamente y ponerse ropa limpia.
- Quitarse el equipo de protección personal inmediatamente después de manipular este producto. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lavarse minuciosamente y ponerse ropa limpia lo antes posible.

Riesgos para el medio ambiente

Este producto es tóxico para peces y animales invertebrados acuáticos. **NO** lo aplique directamente en el agua, en áreas donde haya agua superficial, ni en áreas intermareales que se encuentren por debajo del nivel medio de pleamar. **NO** contamine el agua cuando deseche el agua de enjuague del lavado del equipo. **NO** aplique el producto cuando las condiciones climáticas favorezcan corrientes de aire desde las áreas a tratar.

Instrucciones de uso

Es una infracción a las leyes federales (EE. UU.) usar este producto de manera contraria a lo indicado en la etiqueta. **NO** aplique este producto por ningún método que no esté especificado en esta etiqueta.

NO aplique este producto de forma que pueda entrar en contacto con trabajadores u otras personas, de forma directa o por desplazamiento. Solo se permite la presencia del personal a cargo de la manipulación del producto en el área durante su aplicación, con protección. Para obtener información acerca de los requisitos específicos de su estado o tribu, consulte a la agencia responsable de la regulación de plaguicidas.

REQUISITOS DE USO AGRÍCOLA

Use este producto según lo indicado en la etiqueta y en cumplimiento de la Norma de Protección del Trabajador (40 CFR parte 170 de EE. UU.). Dicha norma contiene los requisitos de protección para trabajadores agrícolas en granjas, bosques, invernaderos y viveros, y manipuladores de plaguicidas agrícolas. La norma contiene los requisitos de capacitación, descontaminación, notificación y asistencia en emergencias. También contiene instrucciones específicas y excepciones relativas a las declaraciones de esta etiqueta sobre el uso de equipo de protección personal y el intervalo de acceso restringido. Los requisitos indicados en este recuadro corresponden solamente a los usos del producto cubiertos por la Norma de Protección del Trabajador (EE. UU.).

NO entre a las áreas tratadas ni permita el acceso de trabajadores a ellas durante el intervalo de acceso restringido de **12 horas**.

La Norma de Protección del Trabajador (EE. UU.) permite usar el equipo de protección personal exigido para el acceso anticipado a las áreas tratadas cuando ello implica el contacto con cualquier cosa que se haya tratado, como plantas, suelo o agua. Dicho equipo consiste en:

- Overol
- Guantes impermeables
- Zapatos y calcetines

REQUISITOS DE USO NO AGRÍCOLA

Los requisitos en este recuadro se aplican a los usos de este producto que **NO** están dentro del alcance de la Norma de Protección del Trabajador para plaguicidas agrícolas (40 CFR parte 170 de EE. UU.). Esa norma se aplica cuando este producto se utiliza para producir plantas agrícolas en granjas, bosques, viveros o invernaderos.

- Mantenga a las personas no protegidas fuera de la zona tratada durante las aplicaciones del producto.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

NO contamine el agua, los comestibles ni el alimento para animales al almacenar o desechar este producto. Se prohíbe desechar el producto al aire libre.

Almacenamiento del plaguicida

Almacene en un lugar fresco, seco y seguro y mantenga el recipiente herméticamente cerrado. Almacene el recipiente lejos de las mascotas. Este producto está formulado en un cebo de aceite. La exposición prolongada al aire puede hacer que el aceite se vuelva rancio y reducir así su atractivo como cebo. Use en un lapso de tres meses a partir de que se abra el recipiente.

Desecho del plaguicida

Los residuos resultantes del uso de este producto pueden desecharse en el lugar o en un centro aprobado para la eliminación de desechos.

(continúa)

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

(continuación)

Manejo del recipiente

(para recipientes de plástico)

Recipiente no rellenable. NO reutilice ni rellene este recipiente. Después de vaciar completamente el recipiente en el equipo de aplicación, ofrézcalo para su reciclaje, si está disponible; para reacondicionarlo, si corresponde o perforélo y deséchelo en un relleno sanitario, mediante incineración u otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales.

(para las bolsas de papel o plástico)

Recipiente no rellenable. NO reutilice ni rellene este recipiente. Después de vaciar completamente la bolsa en el equipo de aplicación, deseche la bolsa vacía en un relleno sanitario o por incineración o mediante otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales.

Información del producto

El **cebo para hormigas coloradas Amdro® Pro** es un cebo altamente atractivo para las hormigas coloradas importadas y nativas y para otras hormigas. Las obreras transportan el cebo dentro del montículo como alimento para la colonia. Comen el cebo, alimentan con este a la reina y se elimina el hormiguero. **Amdro Pro** comienza a matar las hormigas inmediatamente. Aproximadamente en una semana muere la reina, con lo que se destruye el hormiguero. Se puede obtener información adicional sobre hormigas en su servicio de extensión agrícola cooperativo.

Amdro Pro controla:

Hormigas coloradas importadas, hormiguitas de fuego, hormigas coloradas nativas y otras hormigas, como las hormigas cosechadoras, las hormigas cabezonas y las hormigas argentinas.

Manejo del desplazamiento

El aplicador es responsable de evitar el desplazamiento del producto del lugar de aplicación. La interacción de muchos factores relativos al equipo y las condiciones climáticas determina la posibilidad de desplazamiento del producto. El aplicador y el agricultor tienen la responsabilidad de considerar todos esos factores al tomar decisiones.

Algunos estados tienen reglas más estrictas que deben acatarse.

El aplicador debe conocer la información de la sección titulada **Advertencia sobre reducción del desplazamiento aéreo** y tomarla en cuenta.

Advertencia sobre reducción del desplazamiento aéreo

Altura de la aplicación

NO libere el plaguicida a una altura superior a 10 pies por encima de plantas más grandes a menos que se necesite una altura mayor por seguridad de la aeronave.

Ajuste de la franja

Cuando se hacen aplicaciones con viento cruzado, la franja se desplazará a favor del viento. Por lo tanto, en los bordes del campo en contra y a favor del viento, el aplicador debe compensar ese desplazamiento ajustando la trayectoria de la aeronave contra el viento. La distancia de ajuste de la franja debe aumentar al aumentar el potencial de desplazamiento (viento más fuerte, etc.).

Viento

El potencial de desplazamiento es el mínimo cuando la velocidad del viento es de aproximadamente de 2 a 10 millas por hora. Sin embargo, muchos factores —como el tipo de equipo— determinan el potencial de desplazamiento a cualquier velocidad.

NOTA: El terreno local puede influir en los patrones del viento. Cada aplicador debe conocer los patrones locales del viento y la manera en que esos patrones inciden en el desplazamiento.

Áreas sensibles

El plaguicida debe aplicarse solamente cuando es mínima la posibilidad de arrastre, por ejemplo cuando el viento sopla en sentido contrario, hacia áreas delicadas adyacentes (como las zonas residenciales, los cuerpos de agua, el hábitat conocido de especies amenazadas o en peligro de extinción y los cultivos no objetivo).

Manejo de la resistencia

Para el manejo de la resistencia, el **cebo para hormigas coloradas Amdro® Pro** contiene un insecticida del **Grupo 20**. Cualquier población de insectos puede contener individuos naturalmente resistentes a **Amdro Pro** y a otros insecticidas del **Grupo 20**. Los individuos resistentes pueden dominar la población de insectos si este grupo de insecticidas se aplica repetidamente en los mismos campos. Se deben seguir estrategias adecuadas de manejo de la resistencia.

Para retardar la resistencia al insecticida, tome las siguientes medidas:

- Rote el uso de **Amdro Pro** u otros insecticidas del **Grupo 20** dentro de una temporada de cultivo, o entre temporadas de cultivo, con grupos diferentes que controlan las mismas plagas.
- Utilice mezclas con insecticidas de un grupo diferente que sean igualmente eficaces en la plaga objetivo cuando se permita usarlas. **NO** use la misma mezcla repetidamente para la misma población de plagas. Tenga en cuenta todos los problemas conocidos de resistencia cruzada (para las plagas objetivo) entre los componentes individuales de una mezcla. Además, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones del Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticidas (IRAC):
 - Los insecticidas individuales seleccionados para su uso en mezclas deben ser altamente eficaces y aplicarse a las concentraciones a las que se registran individualmente para su uso contra la especie objetivo.
 - Las mezclas con componentes que tienen la misma clasificación de modo de acción del IRAC no se recomiendan para el manejo de la resistencia de los insectos.
 - Al utilizar mezclas, se debe tener en cuenta todos los problemas conocidos de resistencia cruzada entre los componentes individuales de las plagas objetivo.
 - Las mezclas se vuelven menos eficaces si ya se está desarrollando la resistencia a uno o a ambos ingredientes activos, pero comoquiera pueden brindar beneficios para el control de plagas.
 - Los beneficios del manejo de la resistencia de los insectos mediante una mezcla de insecticidas son mayores si los dos componentes tienen períodos similares de actividad insecticida residual. Las mezclas de insecticidas con períodos desiguales de actividad residual pueden ofrecer el beneficio de manejo de la resistencia en los insectos solamente durante el período en que ambos insecticidas están activos.

- Adopte un programa integrado de manejo de plagas para el uso de insecticidas que incluya exploración, utilice datos históricos relativos al uso de plaguicidas, rotación de cultivos, registro de aplicaciones y considere las prácticas culturales, biológicas y otras de control químico.
- Supervise la zona después de la aplicación para detectar la supervivencia imprevista de la plaga objetivo. Si el nivel de supervivencia sugiere que hay resistencia, consulte a su especialista universitario local o asesor certificado en control de plagas.
- Para obtener recomendaciones adicionales sobre el manejo de la resistencia a los plaguicidas o sobre el manejo integrado de plagas para el sitio específico y problemas con plagas en su zona, comuníquese con su especialista de extensión local o su asesor certificado en cultivos.
- Comuníquese con su representante local de BASF, especialista de extensión o asesor certificado en cultivos si sospecha que hay resistencia.

Instrucciones de aplicación

Usos en interiores

Amdro Pro puede aplicarse en viviendas, estructuras residenciales, comerciales y de otro tipo, y en las áreas no alimentarias ni de alimento para animales de establecimientos institucionales, de almacenamiento y comerciales, como tiendas de comestibles y supermercados, hoteles y moteles, hospitales y residencias de ancianos, escuelas, laboratorios, instalaciones informáticas, zonas de almacén de comestibles, alfombrillas, equipos de transporte, tiendas de mascotas o zoológicos, y en las áreas de productos no comestibles de plantas de carnes o avícolas. Las zonas no alimentarias pueden incluir cuartos de basura, lavabos, desagües del piso (a alfombrillas), entradas y vestíbulos, oficinas, vestuarios, salas de máquinas, salas de calderas, garajes, armarios de artículos de limpieza y almacenes (después del enlatado o embotellado).

En las viviendas se deben cubrir todas las superficies de preparación de alimentos y los utensilios durante el tratamiento o lavarlos bien antes de usarlos. Cubra o retire todos los alimentos expuestos.

Con un pulverizador o equipo similar, aplique el cebo **SOLAMENTE** en grietas y hendiduras o en otras zonas inaccesibles como cavidades estructurales, áticos sin terminar o huecos sanitarios. Aplique de 0.25 a 0.5 onzas en cada grieta, hendidura u otra zona inaccesible por la que entren hormigas a la estructura o donde aniden. Limpie todos los depósitos de cebo sueltos o sobrantes. Aplique uniformemente en áticos sin terminar y huecos sanitarios a una dosis de 0.25 onzas por 100 pies cuadrados solamente si el espacio está asegurado o es inaccesible para niños o animales domésticos.

Mantenga a las personas y a los animales domésticos fuera de la zona durante la aplicación.

Usos en exteriores

Amdro Pro puede aplicarse al aire libre en césped, zonas ajardinadas, campos de golf y otras zonas no agrícolas, como aeropuertos, bordes de carreteras, cementerios, terrenos comerciales, parques, terrenos escolares, zonas de pícnic, campos de atletismo y otras zonas recreativas, así como en terrenos alrededor de gallineros (excepto corrales y praderas) o corrales y otras zonas de concentración de animales. **NO** exponga los animales al granulado de **Amdro Pro**.

El **cebo para hormigas coloradas Amdro® Pro** puede aplicarse dentro y alrededor de plantas ornamentales y no ornamentales cultivadas en contenedores o en el campo, así como en cultivos de tepes (césped comercial). **Amdro Pro** también puede aplicarse alrededor de árboles frutales y de frutos secos no productivos. **NO** coseche comestibles ni alimento para animales de plantas no productoras de viveros durante el año siguiente a la aplicación.

NO haga pastar en el césped al ganado ni lo alimente con cortes de césped.

Aplíquelo cuando las hormigas buscan alimento activamente (por lo general, cuando la temperatura del suelo rebasa los 60° F [16° C]). Pruebe una pequeña cantidad de cebo cerca de un hormiguero de hormigas coloradas. Repita las aplicaciones según sea necesario.

Mantenga a las personas y a los animales domésticos fuera de la zona durante la aplicación.

Evite hacer aplicaciones si es probable que llueva durante las 24 horas siguientes a la aplicación, excepto cuando se aplique directamente junto a una estructura que esté permanentemente protegida de la lluvia por una cubierta, voladizo, toldo u otra estructura.

Evite aplicar granulado sobre superficies impermeables, excepto como tratamiento contra grietas y hendiduras.

Tabla 1. Instrucciones de aplicación para uso en exteriores		
Tratamiento	Concentración	Comentarios
Hormigueros individuales: Hormigas coloradas importadas Hormiguitas de fuego Hormigas coloradas nativas Hormigas cosechadoras Hormigas cabezonas Hormiga argentina	De 2 a 5 cucharadas al ras	<ul style="list-style-type: none">• Esparza el cebo de manera uniforme alrededor del montículo.• NO altere el montículo.• NO aplique más de 2.0 lb por acre.• NO contamine los utensilios de cocina con el uso o almacenamiento del producto.
Tratamiento por esparcimiento: Hormigas coloradas importadas Hormiguitas de fuego Hormigas coloradas nativas Hormigas cosechadoras	1.0 a 1.5 lb/acre (2.0 a 3.0 onzas/ 5000 pies cuadrados)	<ul style="list-style-type: none">• Esparza el cebo uniformemente al voleo con equipo terrestre (esparcidores de granulado) o aéreo.• NO haga más de cuatro aplicaciones por esparcimiento por año.• El intervalo mínimo para el refuerzo de la aplicación por esparcimiento es de 30 días.

(continúa)

Tabla 1. Instrucciones de aplicación para uso en exteriores (continúa)		
Tratamiento	Concentración	Comentarios
Tratamiento por esparcimiento: Hormigas cabezonas Hormiga argentina	1.0 a 2 lb/acre (2.0 a 4.0 onzas/ 5000 pies cuadrados)	<ul style="list-style-type: none">• Esparza el cebo uniformemente al voleo con equipo terrestre (esparcidores de granulado) o aéreo.• NO haga más de cuatro aplicaciones por esparcimiento por año.• El intervalo mínimo para el refuerzo de la aplicación por esparcimiento es de 30 días.

Forraje de pasto (pasturas y dehesas)

Zonas de uso para hormigas coloradas

Para el control de hormigas coloradas en el forraje de pasto (pasturas y dehesas), puede utilizarse **Amdro Pro** o una mezcla de **Amdro Pro** con **cebo profesional para hormigas coloradas Extinguish®** solamente en estos estados:

Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Misuri, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia

Es ilegal utilizar **Amdro Pro** en el forraje de pasto en estados ajenos a esta lista.

Aplique **Amdro Pro** en el forraje de pasto (pasturas y dehesas) para controlar las hormigas. Para el control de las hormigas coloradas, consulte la sección titulada **Zonas de uso para hormigas coloradas**. **NO** exceda la concentración máxima de aplicación de 8.0 lb por acre al año. **NO** haga más de 4 aplicaciones por año con un intervalo mínimo de 90 días entre aplicaciones. Consulte la **Tabla 1. Instrucciones de aplicación para uso en exteriores** para obtener información adicional.

NO corte ni enfarde el heno de pasturas y dehesas tratadas con **Amdro Pro** hasta 7 días después de la aplicación del cebo. Las restricciones de corte y enfardado de heno no proceden cuando las pasturas y dehesas tratadas se utilizan únicamente para mantener animales de compañía (por ejemplo, caballos, llamas). Dichos animales de compañía no pueden destinarse a alimento o pienso.

Amdro Pro mezclado con Extinguish

Aplique una mezcla de **Amdro Pro** y **Extinguish** para controlar las hormigas coloradas importadas en tierras no dedicadas a la agricultura y el forraje de pasto (pasturas y dehesas). Para el forraje de pasto (pasturas y dehesas) consulte la sección titulada **Zonas de uso para hormigas coloradas**. Estos productos no pueden mezclarse con ningún otro producto que tenga una etiqueta que prohíba dicha mezcla. Siempre lea y siga todas las instrucciones de la etiqueta cuando utilice plaguicidas solos o en combinaciones de mezcla en tanque o mezcla en tolva. Observe todas las condiciones, restricciones y precauciones que aparecen en las etiquetas de todos los productos. Para mezclas en tanque, se aplican las máximas restricciones en la etiqueta.

Tabla 2. Instrucciones de aplicación del cebo para hormigas coloradas Amdro® Pro mezclado con cebo profesional para hormigas coloradas Extinguish®		
Tratamiento	Concentración	Comentarios
Tratamiento por esparcimiento: Hormigas coloradas importadas	0.75 lb/acre de Amdro Pro mezclado con 0.75 lb/acre de Extinguish	<ul style="list-style-type: none"> • Mezcle bien los productos de cebo antes de la aplicación. • Esparza el cebo uniformemente con equipo terrestre (esparcidores de granulado) o aéreo. • NO haga más de cuatro aplicaciones por esparcimiento por año. • El intervalo mínimo para el refuerzo de la aplicación por esparcimiento es de 30 días.

Piña

Aplice **Amdro Pro** en los campos de piña y en tierras no cultivadas que rodean los campos de piña para controlar las hormigas.

Haga exploraciones para monitorear las poblaciones de hormigas antes y después de los tratamientos.

Las aplicaciones aéreas están prohibidas a una distancia menor de:

- 200 pies de acequias de riego, arroyos, estanques y vías públicas
- 1000 pies de zonas residenciales

NO haga aplicaciones si es probable que llueva en las 24 horas después de la aplicación.

NO exceda 6.0 lb de **Amdro Pro** por acre en un período de 12 meses.

NO coseche en los 30 días siguientes a la última aplicación.

NO alimente a los animales con cortes verdes de plantas (hojas y coronas).

Tabla 3. Instrucciones de aplicación a la piña		
Tratamiento	Concentración	Comentarios
Hormigueros individuales: Hormigas coloradas importadas Hormiguitas de fuego Hormigas coloradas nativas Hormigas cabezonas Hormiga argentina	5 cucharadas al ras	<ul style="list-style-type: none"> • Esparza el cebo de manera uniforme alrededor del montículo. • NO altere el montículo. • NO contamine los utensilios de cocina con el uso o almacenamiento del producto.

(continúa)

Tabla 3. Instrucciones de aplicación a la piña (continúa)		
Tratamiento	Concentración	Comentarios
Tratamiento por esparcimiento: Hormigas coloradas importadas Hormiguitas de fuego Hormigas coloradas nativas	1.0 a 1.5 lb/acre/aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Aplique el producto al voleo con equipos terrestres o aéreos (sólo helicópteros) utilizando esparcidores de disco o sopladores de turbina en todos los campos infestados. • Haga la primera aplicación aproximadamente 1 mes después de la siembra. • No haga más de 4 aplicaciones de Amdro Pro por período de 12 meses con intervalos de aplicación mínimos de 90 días.
Tratamiento por esparcimiento: Hormigas cabezonas Hormiga argentina	1.0 a 1.5 lb/acre/aplicación para infestaciones moderadas 1.5 a 3.0 lb/acre/aplicación para infestaciones más intensas	<ul style="list-style-type: none"> • Aplique el producto al voleo con equipos terrestres o aéreos (sólo helicópteros) utilizando esparcidores de disco o sopladores de turbina en todos los campos infestados. • Haga la primera aplicación aproximadamente 1 mes después de la siembra. • No haga más de 4 aplicaciones de Amdro Pro por período de 12 meses con intervalos de aplicación mínimos de 90 días.

Huertos de árboles de frutos tropicales y frutos secos

Amdro Pro puede aplicarse en huertos de árboles de frutos tropicales y frutos secos si es con estaciones de cebo. Los cultivos de frutos tropicales y frutos secos incluyen:

Caimito, acerola, pera roja, almendra, manzana de oro, atemoya, aguacate, plátano, palma areca, anona, zapote negro, bilimbina de Brasil, árbol del pan, zapote amarillo, algarrobo europeo, marañón, chirimoya, cítricos, coco, café, anón, dátil, durián, guayaba de Brasil, higo, ciruela del gobernador, mamey colorado, guayaba, ilama, garcinia, umbú, ciruela india, jaboticaba, árbol de yaca, jujube, longán, lichi, nuez de macadamia, mamey amarillo, zapote mamey, mango, mangostino, jagua, filodendro, papayuelo, naranjilla, ciruela de Natal, noni, olie, grosella, papaya, maracuyá, chirimoyo de la Florida, caqui, nuez de pili, pitahaya, granada, manzana de agua, nopal, pulasán, rambután, pomarroza, chicozapote,

santol, guanábana, mamoncillo, caimito, carambola, fruta del dragón, saramuyo, pitanga, tamarindo, manzana de java

Coloque el **cebo para hormigas coloradas Amdro® Pro** en las estaciones de cebo (consulte en las **Instrucciones de aplicación con estaciones de cebo** una lista de las estaciones de cebo correspondientes) que se han colocado en los cultivos de huerto de la lista y alrededor de estos. **NO** aplique **Amdro Pro** directamente al suelo alrededor de estos cultivos. **NO** lo aplique directamente a ninguna parte de la planta cultivada.

Aplique **Amdro Pro** para el control de las hormigas cabezonas, hormigas coloradas u hormiguitas de fuego.

Cuando se utilice para el control de las hormiguitas de fuego, aplique **Amdro Pro** en los huertos **solamente** durante los períodos de no fructificación de la temporada de cultivo para evitar la posible contaminación de la fruta. Retire las estaciones de cebo del huerto después de la floración pero antes de que aparezcan estructuras fructíferas en las plantas de cultivo. **NO** aplique **Amdro Pro** en los huertos cuando haya frutos en las plantas de cultivo.

Uvas y arándanos

Amdro Pro puede aplicarse en cultivos de uva y arándano si es con estaciones de cebo. Coloque el cebo **Amdro Pro** en las estaciones de cebo (consulte en las **Instrucciones de aplicación con estaciones de cebo** una lista de las estaciones de cebo correspondientes) que se han colocado alrededor de estos cultivos. **NO** aplique **Amdro Pro** directamente al suelo alrededor de estos cultivos. **NO** lo aplique directamente a ninguna parte de la planta cultivada.

Aplique **Amdro Pro** para el control de las hormigas cabezonas, hormigas coloradas u hormiguitas de fuego.

Cuando se utilice para el control de las hormiguitas de fuego, aplique **Amdro Pro** en cultivos **solamente** durante los períodos de no fructificación de la temporada de cultivo para evitar la posible contaminación de la fruta. Retire las estaciones de cebo de los cultivos después de la floración pero antes de que aparezcan estructuras fructíferas en las plantas de cultivo. **NO** aplique **Amdro Pro** en cultivos cuando haya frutos en las plantas de cultivo.

Instrucciones de aplicación con estaciones de cebo

Campos con hormigas que buscan alimento activamente

Consulte el **Cuadro de estaciones de cebo** para determinar la cantidad de **Amdro Pro** a depositar en las estaciones de cebo separadas a distancias diversas. Deposite la cantidad especificada de **Amdro Pro** en la estación de cebo según la separación entre las estaciones en el campo. Se pueden utilizar otros espaciamentos de las estaciones de cebo (por ejemplo, 8 x 8 pies, 22 x 22 pies, etc.) según el diseño del huerto, el espaciamento de los árboles o la preferencia del aplicador de mantener las estaciones de cebo alejadas de las zonas de tráfico intenso, carreteras o callejones. Vuelva a calcular la cantidad de **Amdro Pro** que debe colocar en la estación de cebo según el espaciado real de las estaciones utilizadas. **NO** exceda 1.5 lb de **Amdro Pro** por acre cuando se aplique en estaciones de cebo.

Después de un mínimo de 2 semanas, aleje las estaciones de cebo de la zona tratada hacia las zonas infestadas adyacentes. Coloque las estaciones de cebo a la distancia deseada y ponga la cantidad especificada de **Amdro Pro** en la estación. Sin embargo, si las hormigas siguen buscando alimento en forma activa dentro de las estaciones de cebo o alrededor de estas, deje las estaciones de cebo en su lugar

(y rellénelas según sea necesario solamente con las cantidades especificadas de **Amdro Pro**) hasta que la actividad de búsqueda de alimento sea mínima o haya cesado. No es necesario colocar las estaciones de cebo inmediatamente junto a los hormigueros.

A lo largo de los límites del campo (para evitar que las hormigas vuelvan a infestar el campo)

Coloque las estaciones de cebo en las zonas limítrofes de los campos a una distancia de entre 10 pies x 10 pies y 50 pies x 50 pies, según la configuración del huerto y la intensidad de la infestación de hormigas. Consulte el **Cuadro de estaciones de cebo** y deposite la cantidad especificada de **Amdro Pro** dentro de la estación según el espaciado de las estaciones. Supervise las estaciones cada 2 semanas y reemplace el **Amdro Pro** según sea necesario.

Reemplazo del cebo en las estaciones de cebo

Supervise las estaciones de cebo para determinar si hay hormigas presentes. Si no hay presencia de hormigas o el **Amdro Pro** ha permanecido en la estación de cebo durante más de 10 semanas, retire el **Amdro Pro** de la estación de cebo y distribúyalo uniformemente en las zonas no limítrofes con los cultivos. Vuelva a colocar la cantidad especificada (consulte el **Cuadro de estaciones de cebo**; la cantidad depende de la distancia entre las estaciones de cebo) de **Amdro Pro** nuevo en la estación de cebo y continúe controlando la actividad de las hormigas y el **Amdro Pro** a intervalos de 2 semanas, o retire la estación de cebo del lugar.

Amdro Pro se mantendrá eficaz hasta 10 semanas (o más) según las condiciones ambientales. Las condiciones excesivamente húmedas (humedad alta prolongada, lluvias frecuentes y prolongadas y niebla espesa) pueden reducir la eficacia de **Amdro Pro**. Monitoree la actividad de las hormigas dentro y alrededor de la estación de cebo y sustituya el cebo cuando sea necesario. Monitoree la actividad de las hormigas mediante métodos visuales o mecánicos (por ejemplo, trampas).

Estaciones de cebo

Se han probado varias estaciones de cebo que permiten que las hormigas se lleven el cebo (por ej., **Perimeter Patrol System Ant Bait**, **Drax® Liquidator™ Ant Bait**, **A.C.E. Station**, **Ants-No-More® Ant Bait**). Las estaciones de cebo que minimizan la exposición a la luz solar (de color oscuro) y a la humedad ayudarán a conservar la eficacia de **Amdro Pro**.

Cuadro de estaciones de cebo		
Distancia entre estaciones de cebo (pies x pies)	Amdro Pro (gramos) por estación de cebo	Amdro Pro (onzas) por estación de cebo
50 x 50	39.0	1.375
45 x 45	31.6	1.115
40 x 40	25.0	0.88
35 x 35	19.2	0.675
30 x 30	14.0	0.495
25 x 25	10.0	0.345
20 x 20	6.5	0.22
15 x 15	3.5	0.124
10 x 10	1.6	0.055

Condiciones de venta y garantía

Las **Instrucciones de uso** de este producto reflejan la opinión de expertos con base en el uso y las pruebas en el campo. Las instrucciones se consideran confiables si se siguen cuidadosamente. No obstante, es imposible eliminar todos los riesgos inherentes al uso de este producto. Es posible que se obtengan resultados ineficaces u otras consecuencias imprevistas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o el uso del producto de manera contraria a las indicaciones en su etiqueta, todo lo cual está fuera del control de BASF CORPORATION ("BASF") o el Vendedor. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el Comprador asumirá todos esos riesgos.

BASF garantiza que este producto cumple con la descripción química en la etiqueta y es razonablemente apto para los propósitos mencionados en la sección titulada **Instrucciones de uso**, sujeto a los riesgos inherentes antes mencionados.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE, BASF NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE APTITUD O COMERCIALIZACIÓN, NI OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE, EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE BASF, YA SEA POR VÍA CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O CUALQUIER OTRA, SE LIMITARÁ AL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE, BASF Y EL VENDEDOR RENUNCIAN A TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, EJEMPLARES, ESPECIALES O INDIRECTOS POR EL USO O EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO.

BASF y el Vendedor ofrecen este producto, y el Comprador y el Usuario lo aceptan, sujeto a las **Condiciones de venta y garantía** que anteceden, las cuales pueden modificarse solamente mediante contrato por escrito, firmado por un representante debidamente autorizado de BASF. PC309

***Amdro** es una marca registrada de Central Garden & Pet Company.*

***Siege** es una marca registrada de BASF.*

***Ants-No-More** es una marca comercial de Kness Mfg. Co., Inc.*

***Drax** es una marca registrada de Waterbury Companies, Inc.*

***Extinguish** es marca registrada de Wellmark International.*

© 2021 BASF Corporation
Todos los derechos reservados.

000241-00322.20210913.**NVA 2021-04-166-0171**
Con base en: NVA 2020-04-166-0050
Reemplaza a: NVA 2013-04-166-0200

BASF Corporation
26 Davis Drive
Research Triangle Park, NC 27709, EE. UU.


We create chemistry