



Horse & Pony

SPRAY

ACTIVE INGREDIENTS:	
Butoxypolypropylene glycol (CAS Registry No. 9003-13-8) . . .	10.00%
Permethrin (CAS Registry No. 52645-53-1)	0.50%
Piperonyl butoxide* (CAS Registry No. 51-03-6)	0.50%
Pyrethrins (CAS Registry No. 8003-34-7)	0.05%
OTHER INGREDIENTS:	88.95%
TOTAL 100.00%	

* (butylcarbityl)(6-propylpiperonyl) ether and related compounds.
This product contains petroleum distillates.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION



READ THE ENTIRE LABEL FIRST.
OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND
FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals
CAUTION: Harmful if absorbed through skin. Harmful if swallowed. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wear long-sleeved shirt and long pants, socks, shoes, and waterproof gloves. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals.

User Safety Recommendations

- Users should wash hands with plenty of soap and water before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.
- Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.
- Users should remove PPE immediately after handling this product. Wash the outside of gloves before removing. As soon as possible, wash thoroughly and change into clean clothing.

First Aid	
If on skin or on clothing:	<ul style="list-style-type: none">• Take off contaminated clothing.• Rinse skin immediately with plenty of water for 15 - 20 minutes.• Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If swallowed:	<ul style="list-style-type: none">• Immediately call a poison control center or doctor.• Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.• Do not give any liquid to the person.• Do not give anything by mouth to an unconscious person.
Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. You may also contact 1-877-800-5556 for emergency medical treatment information.	
Note to Physician: May pose an aspiration pneumonia hazard. Contains petroleum distillate.	

Environmental Hazards
This product is extremely toxic to aquatic organisms, including fish and invertebrates. Do not contaminate water when disposing of equipment, washwater, or rinsate. See Directions for Use for additional precautions and requirements.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.
Do not apply this product in a way that will contact workers or other persons, either directly or through drift. Only protected handlers may be in the area during application.

HOW TO APPLY:
Gordon's Horse and Pony Spray protects against biting flies and will impart a bright sheen to your animal's coat.

This product will provide short-term protection (3 to 14 days) depending upon the fly species.
This product may be applied as a fine mist with a sprayer or wiped on with a soft cloth. Read the entire label before application and refer to the chart for spray intervals and instructions.

The preferred application time is at the end of the day once the animal is ready to rest. If used during the day, allow this product to dry before turn-out of the horse. Avoid applying if you expect the animal to be outdoors during a heavy rain. Avoid making applications when rainfall is expected before the product has sufficient time to dry (minimum 4 hours).

TO PREVENT INJURY APPLY THIS PRODUCT ONLY AS SPECIFIED ON THIS LABEL. DO NOT WET THE ANIMAL'S SKIN.

The objective is to create a barrier on the hair that will both repel and kill biting flies. The product is intended as a preventative measure and is not intended to help an animal recover from existing sores, skin lesions or bites due to pests. If the animal has open sores, skin lesions, cuts, wounds, or irritated skin from pest infestations contact your veterinarian before using this product.
Avoid any direct contact between the product and the animal's skin, particularly when skin pores are open, such as after exercise or when the animal is perspiring heavily. Use extra care with young, old or sick animals. Also, use extra care with thin haired or light skinned animals such as Arabians and Palominos. Do not allow product to contact animal's eyes, nose, mouth, or sores during application.

USE RESTRICTIONS:
Do not contaminate feed or feeding utensils. Cover or remove feed before spraying. For use on horses only. Not for use on horses under six weeks of age or those intended for slaughter.

Do not apply more than 6.5 fl.oz. of product per application per animal [0.036 lb of butoxypolypropylene glycol per application per animal]. Do not apply more than 1 time per day. Do not apply within one day. Do not apply microencapsulated product to lactating or food animals.
Not for use in farm structures or buildings housing food producing animals or poultry, or in milk rooms. Do not apply this product with a sponge. For indoor use only. Not for use in outdoor residential misting systems. Only spray in a well ventilated area. Do not spray product when food is present.

Do not allow the product to enter any drain during or after application.
Do not allow to enter indoor or outdoor drains. *No permita la entrada a desagües internos o externos.*



APPLICATION METHOD:
Mist:

- Ready-To-Use: Use undiluted as a localized or spot treatment applied with mist/trigger sprayers.
- Apply this product to a clean coat. Brush animal to remove loose dust and dirt.
- Apply 3.25 to 6.5 fl.oz. of product per application per animal. Apply directly to face, neck, shoulders, flanks, back, legs and areas described in Table 1. Select the lower volume of product for low infestations and lower animal (horse) body weights.
- For initial treatments, apply daily for 2 or 3 days. As infestations decline, repeat the application at 14 to 21 day intervals if needed, if infestation persists, or if prescribed by veterinarian. The duration of activity may vary because of environmental conditions (e.g. rainfall) and management factors (husbandry, bathing or shampooing).
- Set the sprayer to the "Fine Mist" position; do not use coarse sprays. Do not make application in direct, hot sunlight.
- Use only for direct application to horses, indoors in close proximity to the stable or indoor premises (stables).
- Do not wet the animal's skin.
- Do not apply to areas where animal has no hair. Avoid direct contact with the animal's skin.
- After application, brush the coat for uniform coverage. Securely cover feedstuffs, troughs, bins, or other food and water receptacles while spraying.

Wipe-On:

- Ready-To-Use: Use undiluted as a localized or spot treatment as a wipe-on with an applicator mitt, or clean towel.
- Ready-To-Use: Use undiluted as a localized or spot treatment as a wipe-on with a towelette or other impregnated material.
- Apply this product to a clean coat. Brush animal to remove loose dust and dirt.
- Apply 3.25 to 6.5 fl.oz. of product per application per animal. Apply directly to face, neck, shoulders, flanks, back, legs, and areas described in Table 1. Select the lower volume of product for low infestations and lower animal (horse) body weights.
- For initial treatments, apply daily for 2 or 3 days. As infestations decline, repeat the application at 14 to 21 day intervals if needed, if infestation persists, or if prescribed by veterinarian. The duration of activity may vary because of environmental conditions (e.g. rainfall) and management factors (husbandry, bathing or shampooing).
- Use only for direct application to horses, indoors in close proximity to the stable or indoor premises (stables).
- Do not wet the animal's skin.
- Do not apply to areas where animal has no hair. Avoid direct contact with the animal's skin.
- Securely cover feedstuffs, troughs, bins, or other food and water receptacles while spraying.

Table 1. Application Instructions of Gordon's Horse and Pony Spray for direct applications as mist or wipe-On application to horses and ponies.

Treatment Method	Pest Controlled	Application rate, fl.oz. of product per adult animal	Retreatment interval, days	Instructions
Ready-To-Use Use undiluted as a localized or spot treatment.	Horse flies or deer flies	3.25 to 6.5 fl.oz. per application	14 to 21 days	Apply to head, neck, shoulders, flanks, legs, belly and croup (rump).
	Stable fly	3.25 to 6.5 fl.oz. per application	14 to 21 days	Stable flies bite chiefly about the legs. Apply to legs, ankles and belly
	Horn fly	3.25 to 6.5 fl.oz. per application	14 to 21 days	Horn flies hover over the backs, withers, and belly. Apply to withers, flanks and belly.
	Gnats	3.25 to 6.5 fl.oz. per application	14 to 21 days	Gnats hover about the eyes, ears, and nostrils. Treat face, ears, poll, jaw, and neck. Avoid contact with eyes and muzzle (mouth and nostrils).
	Face fly	3.25 to 6.5 fl.oz. per application	14 to 21 days	Face flies cluster on the head. Treat face, ears, poll, jaws and neck. Avoid contact with eyes and muzzle.

Whole Body Spray:

- Dilute concentrate with water for use as a whole body treatment for mosquitoes, ticks, and horse sucking louse (lice).
- Measure the proper amount of product, pour the product into the sprayer, and add the appropriate amount of water.
- Use a 1:4 ratio with water by mixing 1 gallon of product with 4 gallons of water (one gallon of product provides five gallons of spray solution). Apply 1 to 2 pints of spray emulsion per animal.
- Treat animal thoroughly or cover the entire surface area of the animal (See Table 1). Avoid contact with eyes and muzzle (mouth and nostrils).
- Repeat the application at 14 to 21 day intervals if needed, if infestation persists, or if prescribed by veterinarian.
- Use only for direct application to horses, indoors in close proximity to the stable or indoor premises (stables).

Table 2. Application Instructions of Gordon's Horse and Pony Spray for direct applications as whole body sprays to horses and ponies.

Treatment Method	Pest Controlled	Application rate, fl.oz. of product per adult animal	Retreatment interval, days	Instructions
Concentrate Diluted with water as whole body spray.	Mosquitoes	Use 1:4 dilution	14 to 21 days	Treat entire animal or apply for complete coverage.
	Horse sucking louse (lice)	Use 1:4 dilution	14 to 21 days	Lice are most common about the head, neck, and base of the tail. Even if few lice are found, treat entire body.
	Ticks	Use 1:4 dilution	14 to 21 days	Treat the animal thoroughly with 1 to 2 pints of spray applied per animal.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

PESTICIDE STORAGE: Store in original container in a locked storage area inaccessible to children or pets. To prevent cross-contamination during storage, keep separate from other pesticides, fertilizers, seeds, food, and feed.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for local disposal options. Do not pour or dispose down-the-drain or sewer.

LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER

The manufacturer warrants only that the chemical composition of this product conforms to the ingredient statement given on the label, and that the product is reasonably suited for the labeled use when applied according to the Directions for Use.

TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, THE MANUFACTURER NEITHER MAKES NOR INTENDS ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OF A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. This limited warranty does not extend to the use of the product inconsistent with label instructions, warnings or cautions. Any damages arising from a breach of the manufacturer's warranty shall be limited to direct damages, and shall not include indirect or consequential damages such as loss of profits or values, except as otherwise provided by law.

The terms of this Limited Warranty and Disclaimer cannot be varied by any written or verbal statements or agreements. No employee or agent of the seller is authorized to vary or exceed the terms of this Limited Warranty and Disclaimer in any manner.

967/10-2024 AP100424
EPA REG. NO. 2217-479



MANUFACTURED BY
PBI/GORDON CORPORATION
P.O. BOX 860350
SHAWNEE, KANSAS 66286
www.GordonsUSA.com

ATTENTION: This specimen label is provided for informational use only. This product may not yet be available for sale in your state or area. The information found in this label may differ from the information found on the product label you are using. Always follow the instructions for use and precautions on the label of the product you are using.



Horse & Pony

SPRAY

ACTIVE INGREDIENTS:	
Butoxypolypropylene glycol (CAS Registry No. 9003-13-8)	10.00%
Permethrin (CAS Registry No. 52645-53-1)	0.50%
Piperonyl butoxide* (CAS Registry No. 51-03-6)	0.50%
Pyrethrins (CAS Registry No. 8003-34-7)	0.05%
OTHER INGREDIENTS:	88.95%
TOTAL 100.00%	

* (butylcarbityl)(6-propylpiperonyl) ether and related compounds.
This product contains petroleum distillates.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN



LEA PRIMERO LA ETIQUETA COMPLETA.
CUMPLA TODAS LAS PRECAUCIONES Y SIGA
CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y animales domésticos
PRECAUCIÓN: Es dañino si se absorbe a través de la piel. Es dañino si se ingiere. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Use una camisa de manga larga, pantalones largos, calcetines, zapatos y guantes impermeables. El contacto prolongado o reiterado con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

Recomendaciones de seguridad para los usuarios

- Los usuarios deben lavarse las manos con abundante agua y jabón antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco o ir al baño.
- Los usuarios deben quitarse la ropa de inmediato si les entra pesticida. Luego, deben lavarse bien y ponerse ropa limpia.
- Los usuarios deben quitarse el equipo de protección personal inmediatamente después de manipular este producto. Lave el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lo antes posible, lávese bien y póngase ropa limpia.

Primeros auxilios	
Si entra en contacto con la piel o la ropa:	<ul style="list-style-type: none">• Quítese la ropa contaminada.• Enjuáguese la piel de inmediato con abundante agua durante 15 a 20 minutos.• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para que le recomienden un tratamiento.
Si se ingiere:	<ul style="list-style-type: none">• Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico.• No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico.• No le dé ningún líquido a la persona.• No le dé nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento.
Cuando llame o acuda a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener tratamiento, tenga a mano el recipiente o la etiqueta del producto. También puede llamar al 1-877-800-5556 para obtener información sobre el tratamiento médico de emergencia.	
Nota para el médico: Puede suponer un riesgo de neumonía por aspiración. Contiene destilado de petróleo.	

Riesgos ambientales
Este producto es muy tóxico para los organismos acuáticos, incluidos peces e invertebrados. No contamine el agua al desechar el equipo, el agua de lavado o el agua de enjuague. Consulte el Modo de empleo para conocer las precauciones y requisitos adicionales.

MODO DE EMPLEO

El uso de este producto de una forma distinta de la indicada en su etiqueta constituye una infracción de la ley federal.
No aplique este producto de tal manera que entre en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea directamente o por deriva. Solo el personal con equipo protector puede estar en la zona durante la aplicación del producto.

CÓMO APLICARLO:
Gordon's Horse and Pony Spray protege contra las picaduras de moscas y da brillo al pelaje de su animal.

Este producto proporcionará protección a corto plazo (de 3 a 14 días), según la especie de mosca.

Este producto se puede aplicar en forma de bruma fina con un pulverizador o se puede frotar con un paño suave. Lea toda la etiqueta antes de aplicarlo y consulte la tabla de intervalos de pulverización e instrucciones.

El momento de aplicación recomendado es al final del día, cuando el animal se dispone a descansar. Si se utiliza durante el día, deje que el producto se seque antes de sacar al caballo al aire libre. Evite aplicarlo si espera que el animal esté al aire libre durante una lluvia intensa. Evite aplicarlo si se prevé que lloverá antes de que el producto tenga tiempo suficiente para secarse (4 horas como mínimo).

PARA EVITAR LESIONES, APLIQUE EL PRODUCTO SOLO COMO SE ESPECIFICA EN ESTA ETIQUETA. NO MOJE LA PIEL DEL ANIMAL.

El objetivo es crear una barrera en el pelo que repela y mate a las moscas que pican. El producto está pensado como medida preventiva y no está destinado a ayudar al animal a recuperarse de las llagas, lesiones cutáneas o picaduras existentes a causa de las plagas. Si el animal tiene llagas abiertas, lesiones cutáneas, cortes, heridas o la piel irritada por infestaciones de plagas, comuníquese con el veterinario antes de utilizar este producto.

Evite cualquier contacto directo entre el producto y la piel del animal, especialmente cuando los poros de la piel estén abiertos, como después del ejercicio, o cuando el animal esté sudando mucho. Tenga especial cuidado con los animales jóvenes, viejos o enfermos. Asimismo, tenga especial cuidado con los animales de pelo fino o piel clara, como los árabes y los palominos. No permita que el producto entre en contacto con los ojos, la nariz, la boca o las llagas del animal durante la aplicación.

RESTRICCIONES DE USO:
No contamine el pienso ni los utensilios de alimentación. Cubra o retire el pienso antes de pulverizar. Para uso exclusivo en caballos. No lo utilice en caballos de menos de seis semanas de edad ni en los que están destinados al matadero.

No utilice más de 6.5 onzas líquidas de producto por aplicación por animal [0.036 lb de butoxi-polipropilenglicol por aplicación por animal]. No lo aplique más de 1 vez al día. No lo aplique en el plazo de un día. No aplique el producto microencapsulado a los animales lactantes o destinados a la producción de alimentos.

No lo utilice en estructuras de granjas o edificios que alberguen animales productores de alimentos o aves de corral, ni en salas de ordeño. No aplique este producto con esponja. Solo para uso en interiores. No lo utilice en sistemas de nebulización residenciales al aire libre. Pulverice únicamente en zonas bien ventiladas. No pulverice el producto en presencia de alimentos.

No permita que el producto entre en ningún desagüe durante la aplicación o después de esta.
No permita que entre en desagües interiores o exteriores.
No permita la entrada a desagües internos o externos.



MODO DE APLICACIÓN:
Con pulverizador:

- Listo para usar: utilícelo sin diluir como tratamiento localizado o puntual aplicado con pulverizadores de bruma o disparo.
- Aplique el producto sobre el pelaje limpio. Cepille al animal para eliminar el polvo y la suciedad.
- Aplique de 3.25 a 6.5 onzas líquidas de producto por aplicación por animal. Aplíquelo directamente en la cara, el cuello, los hombros, los flancos, la espalda, las patas y las zonas descritas en la Tabla 1. Seleccione el volumen más bajo de producto para las infestaciones bajas y los animales (caballos) con pesos corporales bajos.
- Para tratamientos iniciales, aplíquelo diariamente durante 2 o 3 días. A medida que disminuya la infestación, repita la aplicación a intervalos de 14 a 21 días si es necesario, si persiste la infestación o si lo prescribe el veterinario. La duración de la actividad puede variar debido a las condiciones ambientales (por ejemplo, la lluvia) y a los factores de gestión (la ganadería, el baño o el lavado con champú).
- Coloque el pulverizador en la posición "Fine Mist" (Bruma fina); no utilice pulverizaciones de rociado grueso. No aplique el producto bajo la luz solar directa y caliente.
- Utilícelo únicamente para su aplicación directa en caballos, puertas adentro cerca del establo o en instalaciones interiores (establos).
- No moje la piel del animal.
- No lo aplique en zonas donde el animal no tenga pelo. Evite el contacto directo con la piel del animal.
- Después de aplicarlo, cepille el pelaje para obtener una cobertura uniforme. Cubra bien los comederos, bebederos, cubetas u otros recipientes de alimento y agua mientras aplica el producto.

Con un paño:

- Listo para usar: utilícelo sin diluir como tratamiento localizado o puntual aplicado con una manopla o una toalla limpia.
- Listo para usar: utilícelo sin diluir como tratamiento localizado o puntual aplicado con una toallita u otro material impregnado.
- Aplique el producto sobre el pelaje limpio. Cepille al animal para eliminar el polvo y la suciedad.
- Aplique de 3.25 a 6.5 onzas líquidas de producto por aplicación por animal. Aplíquelo directamente en la cara, el cuello, los hombros, los flancos, la espalda, las patas y las zonas descritas en la Tabla 1. Seleccione el volumen más bajo de producto para las infestaciones bajas y los animales (caballos) con pesos corporales bajos.
- Para tratamientos iniciales, aplíquelo diariamente durante 2 o 3 días. A medida que disminuya la infestación, repita la aplicación a intervalos de 14 a 21 días si es necesario, si persiste la infestación o si lo prescribe el veterinario. La duración de la actividad puede variar debido a las condiciones ambientales (por ejemplo, la lluvia) y a los factores de gestión (la ganadería, el baño o el lavado con champú).
- Utilícelo únicamente para su aplicación directa en caballos, puertas adentro cerca del establo o en instalaciones interiores (establos).
- No moje la piel del animal.
- No lo aplique en zonas donde el animal no tenga pelo. Evite el contacto directo con la piel del animal.
- Cubra bien los comederos, bebederos, cubetas u otros recipientes de alimento y agua mientras aplica el producto.

Tabla 1. Instrucciones de aplicación de Gordon's Horse and Pony Spray para aplicaciones directas con pulverizador o con paño en caballos y ponis.

Método de tratamiento	Plaga controlada	Dosis de aplicación, onzas líquidas de producto por animal adulto	Intervalo entre tratamientos, días	Instrucciones
Listo para usar Utilícelo sin diluir como tratamiento localizado o puntual.	Tábanos o moscas del ciervo	De 3.25 a 6.5 onzas líquidas por aplicación	De 14 a 21 días	Aplicar en cabeza, cuello, hombros, flancos, patas, vientre y grupa.
	Mosca de los establos	De 3.25 a 6.5 onzas líquidas por aplicación	De 14 a 21 días	Las moscas de los establos pican sobre todo alrededor de las patas. Aplicar en patas, tobillos y vientre.
	Mosca de los cuernos	De 3.25 a 6.5 onzas líquidas por aplicación	De 14 a 21 días	Las moscas de los cuernos se posan sobre el lomo, la cruz y el vientre. Aplicar en cruz, flancos y vientre.
	Mosquitos	De 3.25 a 6.5 onzas líquidas por aplicación	De 14 a 21 días	Los mosquitos vuelan alrededor de los ojos, las orejas y las fosas nasales. Aplicar en cara, orejas, espacio entre las orejas, mandíbula y cuello. Evitar el contacto con los ojos y el hocico (boca y fosas nasales).
	Mosca de otoño	De 3.25 a 6.5 onzas líquidas por aplicación	De 14 a 21 días	Las moscas de otoño se agrupan en la cabeza. Aplicar en cara, orejas, espacio entre las orejas, mandíbula y cuello. Evitar el contacto con los ojos y el hocico.

Pulverizador para todo el cuerpo:

- Diluya el concentrado en agua para utilizarlo como tratamiento para todo el cuerpo contra los mosquitos, las garrapatas y los piojos de los caballos.
- Mida la cantidad adecuada de producto, viértalo en el pulverizador y agregue la cantidad apropiada de agua.
- Utilice una proporción de 1:4 con agua y mezcle 1 galón de producto con 4 galones de agua (con un galón de producto, se obtienen cinco galones de solución de pulverización). Aplique de 1 a 2 pintas de emulsión de pulverización por animal.
- Aplíquelo en todo el animal o cubra por completo la superficie del animal (consulte la Tabla 1). Evite el contacto con los ojos y el hocico (boca y fosas nasales).
- Repita la aplicación a intervalos de 14 a 21 días si es necesario, si persiste la infestación o si lo prescribe el veterinario.
- Utilícelo únicamente para su aplicación directa en caballos, puertas adentro cerca del establo o en instalaciones interiores (establos).

Tabla 2. Instrucciones de aplicación de Gordon's Horse and Pony Spray para aplicaciones directas como pulverizaciones para todo el cuerpo en caballos y ponis.

Método de tratamiento	Plaga controlada	Dosis de aplicación, onzas líquidas de producto por animal adulto	Intervalo entre tratamientos, días	Instrucciones
Concentrado Diluir con agua como pulverización para todo el cuerpo.	Mosquitos	Utilizar una dilución 1:4	De 14 a 21 días	Aplicar en todo el animal o cubrirlo por completo.
	Piojos de los caballos	Utilizar una dilución 1:4	De 14 a 21 días	Los piojos son más frecuentes en la cabeza, el cuello y la base de la cola. Aunque se encuentren pocos piojos, aplicar en todo el cuerpo.
	Garrapatas	Utilizar una dilución 1:4	De 14 a 21 días	Aplicar en todo el animal de 1 a 2 pintas de emulsión de pulverización por animal.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos ni los piensos con el almacenamiento o la eliminación del producto.

ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: almacene en el recipiente original en un lugar cerrado e inaccesible para niños o animales domésticos. Para evitar la contaminación cruzada durante el almacenamiento, manténgalo separado de otros pesticidas, fertilizantes, semillas, alimentos y piensos.

ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS Y MANIPULACIÓN DE RECIPIENTES: recipiente no reutilizable. No reutilice ni rellene este recipiente. **Si está vacío:** deposítelo en la basura u ofrézcalo para reciclaje, si está disponible esa opción. **Si está parcialmente lleno:** llame a su agencia local de residuos sólidos para conocer las opciones de eliminación locales. No lo vierta ni lo elimine por el desagüe o el alcantarillado.

GARANTÍA LIMITADA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El fabricante garantiza únicamente que la composición química de este producto se ajusta a la declaración de ingredientes que figura en la etiqueta y que el producto es razonablemente adecuado para el uso indicado en la etiqueta si se lo aplica de conformidad con el Modo de empleo.

EN LA MEDIDA EN QUE SEA COMPATIBLE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EL FABRICANTE NO OFRECE NI PRETENDE OFRECER NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUE QUEDA EXPRESAMENTE EXCLUIDA. Esta garantía limitada no se extiende al uso del producto que no se ajuste a las instrucciones, advertencias o precauciones de la etiqueta. Cualquier daño derivado del incumplimiento de la garantía del fabricante se limitará a los daños directos y no incluirá los daños indirectos o consecuentes, como la pérdida de beneficios o valores, salvo que la ley disponga lo contrario.

Los términos de esta Garantía limitada y exención de responsabilidad no pueden modificarse mediante declaraciones o acuerdos escritos o verbales. Ningún empleado ni agente del vendedor está autorizado a modificar o sobrepasar los términos de esta Garantía limitada y exención de responsabilidad de ninguna manera.

967/10-2024 AP100424
EPA REG. NO. 2217-479



MANUFACTURED BY
PBI/GORDON CORPORATION
P.O. BOX 860350
SHAWNEE, KANSAS 66286
www.GordonsUSA.com

ATENCIÓN: Esta etiqueta de espécimen se proporciona únicamente para uso informativo. Este producto puede no estar disponible aún para la venta en su estado o área. La información que aparece en esta etiqueta puede diferir de la que aparece en la etiqueta del producto que esté utilizando. Siga siempre las instrucciones de uso y las precauciones que figuran en la etiqueta del producto que esté utilizando.