



DO NOT USE ON CATS

ACTIVE INGREDIENT:

Permethrin 0.50%

INERT INGREDIENTS: 99.50%

TOTAL 100.00%

(3-phenoxyphenyl) methyl (+/-) cis/trans 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate. Cis/trans ratio: min. 35% (+/-) cis and max. 65% (+/-) trans.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION



**READ THE ENTIRE LABEL FIRST.
OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND
FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.**

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Wash thoroughly with soap and water after handling. Remove and wash contaminated clothing before reuse.



DO NOT USE ON CATS. May be toxic or potentially fatal if applied to or ingested by cats. Accidental application to cats and/or grooming a recently treated dog may result in tremors and/or uncoordinated muscle movements. If this occurs, immediate veterinary care should be provided.

User Safety Recommendations

- User should wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.
- User should remove clothing/PPE immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.
- Users should remove PPE immediately after handling this product. Wash outside of gloves before removing. As soon as possible, wash thoroughly and change into clean clothing.

User Safety Requirements

- Follow manufacturer's instructions for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions for washables exist, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other laundry.
- Discard clothing and other absorbent materials that have been drenched or heavily contaminated with this product's concentrate. Do not reuse them.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. For additional information in case of emergency, call toll free 1-877-800-5556.

Environmental Hazards

This pesticide is extremely toxic to aquatic organisms, including fish and invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. This pesticide is highly toxic to bees exposed to direct treatment on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds while bees are actively visiting the treatment area.

Physical Or Chemical Hazards

Do not apply this product in or on electrical equipment due to the possibility of shock hazard.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Affix trigger or pump sprayer to container for application. Do not transfer to another container.

For both indoor and outdoor use. Application of product on pets (dogs) must only be done indoors.

SHAKE WELL BEFORE USING

RESTRICTIONS:

- Except when applying to dogs (pets) or livestock, do not enter or allow adults, children, or pets to enter until sprays have dried.
- Do not apply this product in way that will contact workers or other persons either directly or through drift. Only protected handlers may be in the area during application.
- Not for broadcast use on indoor residential surfaces.
- For use as a surface spray: Do not allow adults, children, or pets to enter until sprays have dried.

Do not allow to enter indoor or outdoor drains. *No permita la entrada a desagües internos o externos.*



Indoor Application

For household pests. Not for use in Commercial Food/Feed Handling Establishments, Restaurants or Other Commercial Facilities.

For spot application only. Spray until surface is damp, but not to the point of run-off. Avoid excess application. Do not use as a space spray indoors. In the home, all food processing surfaces and utensils should be covered during treatment or thoroughly washed before use. Exposed food/feed should be covered or removed. Avoid contamination of feed and foodstuffs. Remove pets and birds and cover fish aquaria before surface applications.

SURFACE SPRAYING:

For 60-Day (Two Months) Control Of Cockroaches, Waterbugs, Palmetto Bugs, Scorpions, Millipedes, Centipedes, Sowbugs, Pillbugs, Ants, Silverfish, Firebrats, Spiders, Crickets, Clover Mites, Cheese Mites, Granary Weevils, Rice Weevils, Confused Flour Beetles, Rust Red Flour Beetles, Drugstore Beetles, Meal Worms, Grain Mites, and Cadelles: Direct the spray into hiding places, cracks and crevices, and behind shelves and drawers. For silverfish, spray bookcases. For ants, spray trails, nests and points of entry.

To Control Carpet Beetles: Spray edges of carpeting and under carpeting and rugs. Make localized application to floor and baseboards. Spray directly into cracks, crevices and infested areas of shelving. Repeat application every two (2) weeks.

To Control Bedbugs: Spray mattresses lightly, particularly around tufts and seams. Take beds apart and spray in all joints. Treat baseboards, moldings and floors. Repeat application every two (2) weeks.

To Control Fleas (Adults and Larvae) and Ticks, Including Ticks Which May Carry Lyme Disease (Adults and Larvae): Thoroughly spray infested areas, pet beds, resting quarters, nearby cracks and crevices, along and behind baseboards, moldings, window and door frames, and entire areas of floor and floor covering. Fresh bedding should be placed in animal quarters following treatment. Repeat application every two (2) weeks. Allow to dry thoroughly before allowing pets to contact treated areas.

To Control Clothes Moths: Remove any infested articles from storage, brush thoroughly, and air for several hours in sunlight, if possible. Apply spray liberally to empty chests, closets, bureaus and other storages directing the spray into cracks, joints and crevices. After airing, infested articles may be treated lightly, keeping nozzle at least three feet from fabric to avoid staining.

To Kill Lice and Louse Eggs: Spray in an inconspicuous area to test for possible staining or discoloration. Inspect again after drying, then proceed to spray entire area to be treated. Spray from a distance of 8 to 10 inches. Treat only those garments and parts of bedding, including mattresses and furniture that cannot be either laundered or dry cleaned. Allow all treated articles to dry thoroughly before use.

On Livestock

GOATS, SHEEP, CATTLE (Beef and Dairy), HOGS AND HORSES

To Control Horn Flies, Face Flies, House Flies, Mosquitoes and Gnats: Apply a light mist sufficient to wet the surface of the hair. For face flies, spray face and head, but do not spray into eyes.

To Control Stable Flies, Horse Flies and Deer Flies: Apply 2 fluid ounces per adult animal, sufficient to wet the hair thoroughly. Repeat treatment daily.

To Control Blood-Sucking Lice: Apply to the infested areas of the animal, using a stiff brush to get the spray to the base of the hair. Repeat every 3 weeks.

POULTRY AND POULTRY HOUSES

To Control Poultry Lice: Spray roosts, walls and nests or cages thoroughly. This should be followed by spraying over the birds with a fine mist.

To Control Bedbugs and Mites In Poultry Houses: Spray crevices of roost poles, cracks in walls, and cracks in nests where the bedbugs and mites hide.

On Dogs

To Control Fleas, Ticks, and Lice: Start spraying at the tail, moving the dispenser rapidly and making sure that the animal's entire body is covered, including the legs and underbody. While spraying, fluff the hair so that the spray will penetrate to the skin. Make sure spray wets thoroughly, but do not saturate animal. Do not spray into eyes or face. Avoid contact with genitalia. Use protective gloves or mitts when applying product. Repeat application every two weeks if necessary. DO NOT USE ON CATS OR KITTENS.

Do not use on dogs under twelve (12) weeks old. Consult a veterinarian before using this product on medicated, debilitated, aged, pregnant or nursing animals. Sensitivities may occur after using ANY pesticide product for pets. If signs of sensitivity occur, bathe your pet with mild soap and rinse with large amounts of water. If signs continue, consult a veterinarian immediately or call this Animal Poison Control Hotline, 1-800-345-4735.

Special animals: Consult a veterinarian or call this Animal Poison Control Hotline, 1-800-345-4735 before using this product on debilitated, aged, pregnant, nursing, or medicated animals.

Adverse reaction information: Sensitivities may occur after using ANY pesticide product for pets. If signs of sensitivity occur, bathe your pet with mild soap and rinse with large amounts of water. If signs continue, consult a veterinarian immediately, or call this Animal Poison Control Hotline, 1-800-345-4735.

Outdoor Application

Precautions and Restrictions (Outdoors)

- All outdoor spray applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses:
 1. Applications to pervious surfaces such as soil, lawn, turf, and other vegetation;
 2. Perimeter band treatments of 7 feet wide or less from the base of a man-made structure to pervious surfaces (e.g., soil, mulch, or lawn).
 3. Applications to underside of eaves, soffits, doors, or windows permanently protected from rainfall by a covering, overhand, awning, or other structure;
 4. Applications around potential exterior pest entry points into man-made structures such as doorways and windows, when limited to a band not to exceed one inch.
 5. Applications to vertical surfaces (such as the side of a man-made structure), directly above impervious surfaces (e.g., driveways, sidewalks, etc.) up to 2 feet above ground level.

6. Applications to vertical surfaces directly above pervious surfaces, such as soil, lawn, turf, mulch or other vegetation, only if the pervious surface does not drain into ditches, storm drains, gutters, or surface waters.

- Spot treatments must not exceed two square feet in size (for example, 2ft. by 1ft. or 4 ft. by 0.5 ft.).
- Treat surfaces to ensure thorough coverage but avoid runoff.
- Do not apply the product into fish pools, ponds, streams, or lakes.
- Do not apply directly into sewers or storm drains, or to any area like a drain or gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies, or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.
- Do not apply directly to impervious horizontal surfaces such as sidewalks, driveways, and patios except as a spot or crack-and-crevice treatment.
- Do not apply or irrigate to the point of run-off. Do not make applications during rain.
- Avoid making applications when rainfall is expected before the product has sufficient time to dry (minimum 4 hours). Rainfall within 24 hours after application may cause unintended runoff of pesticide application.
- Do not apply when the wind speed is greater than 15 mph.
- To treat insects harbored in voids and crack-and-crevices, applications must be made in such a manner to limit dripping and avoid runoff onto untreated structural surfaces and plants.
- Not for use in outdoor residential misting systems.
- For soil or foliar applications, do not apply by ground within 25 feet of lakes, reservoirs, rivers, permanent streams, marshes or natural ponds, estuaries and commercial fish farm ponds.
- Not for use on plants being grown for sale or other commercial use. Not for use in commercial greenhouses.

To Help Control Ticks, Including Ticks Which May Carry Lyme Disease (Perimeter Treatment): Use Gordon's Goat & Sheep Spray as a residual treatment to control Ticks including the Deer Tick (*Ixodes dammini*), Lone Star Tick (*Amblyomma americanum*), Brown Dog Tick (*Rhipicephalus sanguineus*), American Dog Tick (*Dermacentor variabilis*), and Western Black-legged Tick (*Ixodes pacificus*). For each area listed below, apply until surface is wet (approximately 1 gallon/750 to 1000 square feet.).

Treat around windows and doors, porches, screens, eaves, patios, garages, under stairways and in crawl spaces where these pests may enter. Treat a band of vegetation and leaf litter 6 to 7 feet wide around the outside of buildings to help control ticks occurring there. To help control ticks in outdoor activity areas, treat a band of vegetation and leaf litter 6 to 7 feet wide and adjacent to activity areas, especially where dense vegetation occurs.

FOR CONTROL OF GARDEN INSECTS:

For use on roses, dahlias, asters and other ornamentals to kill Japanese Beetles hit by spray as well as Whiteflies, Aphids, Exposed Thrips, Spiders, Red Mites, and Leafminers. May be used on plants as a multi-purpose spray in small gardens and for spot treatments of incipient insect infestations to prevent spreading in large garden areas.

May also be used on other plants such as African violets, asters, azaleas, begonias, camellias, carnations, chrysanthemums, dahlias, delphiniums, dogwoods, English Ivy, eunonymus, fuschia, geraniums, crassula, grape vines, Kentia palms, laurels, marigolds, rhododendrons, roses, rubber plants, snapdragons, stocks, wandering Jews and zinnias.

Effective when used as directed against Whiteflies, Aphids, Spider and Red Mites, Exposed Thrips, Lace Bugs, Japanese Beetles, Pavement Ants, Clover Mites and Armyworms.

When spraying plants, do not operate closer than 18 inches. Use sweeping motion. Be cautious about wetting tender foliage, young plants and new growth. Do not spray plants when temperatures exceed 90°F. Contact insects directly whenever possible. Repeat treatment application every two (2) weeks.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.

PESTICIDE STORAGE: Store upright at room temperature. Avoid exposure to extreme temperatures.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for local disposal options. Do not pour or dispose down-the-drain or sewer.

LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER

The manufacturer warrants only that the chemical composition of this product conforms to the ingredient statement given on the label, and that the product is reasonably suited for the labeled use when applied according to the Directions for Use.

TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, THE MANUFACTURER NEITHER MAKES NOR INTENDS ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. This limited warranty does not extend to the use of the product inconsistent with label instructions, warnings or cautions. These factors are beyond the control of the manufacturer or the seller. Any damages arising from a breach of the manufacturer's warranty shall be limited to direct damages, and shall not include indirect or consequential damages such as loss of profits or values, except as otherwise provided by law.

The terms of this Limited Warranty and Disclaimer cannot be varied by any written or verbal statements or agreements. No employee or agent of the seller is authorized to vary or exceed the terms of this Limited Warranty and Disclaimer in any manner.

763/10-2024 AP100924
EPA REG. NO. 2217-825



MANUFACTURED FOR
PBI/GORDON CORPORATION
P.O. BOX 860350
SHAWNEE, KANSAS 66286
www.GordonsUSA.com

ATTENTION: This specimen label is provided for informational use only. This product may not yet be available for sale in your state or area. The information found in this label may differ from the information found on the product label you are using. Always follow the instructions for use and precautions on the label of the product you are using.



NO UTILIZAR EN GATOS

ACTIVE INGREDIENT:	
Permethrin	0.50%
INERT INGREDIENTS:	
	99.50%
TOTAL 100.00%	

(3-phenoxyphenyl) methyl (+/-) cis/trans 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate. Cis/trans ratio: min. 35% (+/-) cis and max. 65% (+/-) trans.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN**



**LEA PRIMERO LA ETIQUETA COMPLETA.
CUMPLA TODAS LAS PRECAUCIONES Y SIGA
CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES.**

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y animales domésticos
PRECAUCIÓN: Lave con abundante agua y jabón después de manipular el producto. Quítese y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.



NO UTILIZAR EN GATOS. Puede ser tóxico o potencialmente mortal si se aplica a gatos o si ellos lo ingieren. La aplicación accidental en gatos o el acicalamiento de un perro recién tratado puede causar temblores o movimientos musculares descoordinados. Si esto ocurre, se debe proporcionar atención veterinaria de inmediato.

Recomendaciones de seguridad para los usuarios

- Los usuarios deben lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o ir al baño.
- Los usuarios deben quitarse la ropa y el equipo de protección personal inmediatamente si les entra pesticida. Luego, deben lavarse bien y ponerse ropa limpia.
- Los usuarios deben quitarse el equipo de protección personal inmediatamente después de manipular este producto. Deben lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lo antes posible, deben lavarse bien y ponerse ropa limpia.

Requisitos de seguridad para los usuarios

- Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y el mantenimiento del equipo de protección personal. En caso de que no existan instrucciones de lavado, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el equipo de protección personal separado de otra ropa.

- Deseche la ropa y otros materiales absorbentes que se hayan empapado o estén muy contaminados con el concentrado de este producto. No los reutilice.

Cuando llame o acuda a un centro de control de envenenamiento o a un médico para obtener tratamiento, tenga a mano el recipiente o a etiqueta del producto. Para obtener información adicional en caso de emergencia, llame al número gratuito 1-877-800-5556.

Riesgos ambientales

Este pesticida es extremadamente tóxico para los organismos acuáticos, incluidos peces e invertebrados. Para proteger el medioambiente, no permita que el pesticida ingrese en desagües pluviales, zanjas de drenaje, cunetas o aguas superficiales o se escurra hacia estos. La aplicación de este producto cuando se prevé buen tiempo y no se pronostican lluvias durante las próximas 24 horas ayudará a evitar que el viento o la lluvia soplen o arrastren el pesticida fuera del área de tratamiento. Este pesticida es altamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo sobre cultivos en floración o malezas. No aplique este producto ni permita que se esparza sobre cultivos en floración o malezas mientras las abejas estén visitando activamente el área de tratamiento.

Peligros físicos o químicos

No aplique este producto en equipos eléctricos o sobre estos debido al riesgo de descarga eléctrica.

MODO DE EMPLEO

El uso de este producto de una forma distinta de la indicada en su etiqueta constituye una infracción de la legislación federal.

Coloque un disparador o un pulverizador con bomba en el recipiente para aplicar el producto. No transfiera el producto a otro recipiente.

Para uso tanto en interiores como en exteriores. La aplicación del producto en mascotas (perros) solo debe realizarse en interiores.

AGITE BIEN ANTES DE USAR

RESTRICCIONES:

- Excepto cuando se aplique a perros (mascotas) o el ganado, no ingrese ni permita que otras personas adultas, niños ni mascotas ingresen en la zona donde realice el tratamiento hasta que el producto pulverizado se haya secado.
- No aplique este producto de tal manera que vaya a quedar en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea directamente o por deriva. Solo el personal con equipo protector puede estar en la zona durante la aplicación del producto.
- No usar para aplicaciones generales en superficies interiores residenciales.
- Para su uso como pulverización en superficie: no permita que personas adultas, niños ni mascotas ingresen en la zona tratada hasta que el producto pulverizado se haya secado.

Do not allow to enter indoor or outdoor drains. No permita la entrada a desagües internos o externos.



Aplicación en interiores

Para plagas en el hogar. No debe usarse en establecimientos comerciales de alimentos o manipulación de pienso, restaurantes ni otras instalaciones comerciales.

Solo deben hacerse aplicaciones localizadas. Pulverice el producto hasta que la superficie esté húmeda, pero no deje que el producto llegue a escurrirse. Evite aplicarlo en exceso. No use el producto para pulverización espacial en interiores. En el hogar, se deben cubrir todos los utensilios y las superficies en las que se manipulan alimentos durante el tratamiento, o deben lavarse bien antes de volver a usarlos. Los alimentos o el pienso que estén expuestos deben cubrirse o retirarse. Evite contaminar el pienso y los productos alimenticios. Retire a las mascotas y los pájaros y cubra las peceras antes de aplicar el producto en superficies.

PULVERIZACIÓN EN SUPERFICIE:

Para el control durante 60 días (dos meses) de cucarachas, cucarachas orientales, cucarachas americanas, escorpiones, milpiés, ciempiés, cochinillas de la humedad, hormigas, pececillos de plata, insectos de fuego, arañas, grillos, ácaros del trébol, ácaros del queso, gorgojos de los graneros, gorgojos del arroz, gorgojos confusos de la harina, gorgojos rojos de la harina, gorgojos de las farmacias, gusanos de la harina, ácaros de los granos y escarabajos cadelle: pulverice el producto en escondites, grietas y hendiduras, y detrás de estantes y cajones. Para los pececillos de plata, pulverice el producto en las bibliotecas. Para las hormigas, pulverice el producto en senderos, nidos y puntos de entrada.

Para el control de escarabajos de alfombra: pulverice el producto en los bordes de las alfombras y los tapetes y debajo de estos. También aplique el producto de manera localizada en pisos y zócalos. Pulverice directamente en grietas, hendiduras y áreas infestadas de estanterías. Repita la aplicación cada dos (2) semanas.

Para el control de chinches: pulverice un poco de producto sobre el colchón, especialmente en las costuras y las hendiduras. Desarme la cama y pulverice el producto en todas las juntas. Aplique el producto también en zócalos, molduras y pisos. Repita la aplicación cada dos (2) semanas.

Para el control de pulgas (adultas y larvas) y garrapatas, incluidas las garrapatas que pueden transmitir la enfermedad de Lyme, (adultas y larvas): pulverice completamente las áreas infestadas, las camas de las mascotas, las zonas de descanso, las grietas y hendiduras cercanas, a lo largo y detrás de los zócalos, molduras, marcos de ventanas y puertas, y áreas enteras del piso y su revestimiento. Después del tratamiento, se debe colocar ropa de cama nueva en las zonas de descanso de los animales. Repita la aplicación cada dos (2) semanas. Deje secar por completo la aplicación antes de permitir que las mascotas entren en contacto con las zonas tratadas.

Para el control de polillas: retire todos los artículos infestados del lugar donde estén guardados, cepíllelos bien y ventíllelos durante varias horas a la luz del sol, si es posible. Aplique la pulverización generosamente sobre arcones, armarios, cómodas y otras áreas de almacenamiento vacíos, dirigiendo el pulverizador hacia grietas, juntas y hendiduras. Después de ventilarlos, los artículos infestados pueden tratarse ligeramente manteniendo la boquilla al menos a tres pies de la tela para evitar manchas.

Para la eliminación de piojos y liendres: pulverice el producto en una zona discreta para probar si se producen manchas o decoloraciones. Vuelva a inspeccionar la zona una vez que se seque y, luego, pulverice el producto en toda la zona que desea tratar. Pulverice el producto a una distancia de 8 a 10 pulgadas. Aplique el tratamiento solo a las prendas y las partes de la cama, incluidos colchones y muebles, que no puedan lavarse ni limpiarse en seco. Deje que todos los artículos tratados se sequen bien antes de volver a usarlos.

Aplicación en ganado

CABRAS, OVEJAS, GANADO BOVINO (lechero o de carne), CERDOS Y CABALLOS

Para el control de moscas de los cuernos, moscas de la cara, moscas domésticas, mosquitos y jejenes: aplique una ligera bruma suficiente para humedecer la superficie del pelaje. Para combatir las moscas de la cara, pulverice el producto en la cara y la cabeza del animal, pero no en los ojos.

Para el control de moscas de establo, moscas de caballo y moscas de ciervo: aplique 2 onzas líquidas de producto por animal adulto, suficiente para mojar el pelaje. Repita el tratamiento diariamente.

Para el control de piojos chupadores de sangre: aplique en las zonas infestadas del animal utilizando un cepillo rígido para que la pulverización llegue a la base del pelaje. Repita cada 3 semanas.

AVES DE CORRAL Y GALLINEROS

Para el control de piojos de las gallinas: pulverice el producto hasta cubrir por completo nidos, paredes o jaulas. Luego, debe pulverizar el producto sobre las aves con una fina bruma.

Para el control de chinches y ácaros en los gallineros: pulverice el producto en hendiduras de los palos del nido, en grietas de las paredes y en grietas de los nidos donde se esconden las chinches y los ácaros.

Aplicación en perros

Para el control de pulgas, garrapatas y piojos: empiece pulverizando el producto desde la cola, mueva el pulverizador rápidamente y asegúrese de que todo el cuerpo del animal esté cubierto, incluidas las patas y la parte baja del cuerpo. Mientras pulveriza, esponje el pelo para que la pulverización penetre hasta la piel. Asegúrese de que la pulverización moje completamente al animal, pero no lo sature de producto. No aplique producto en los ojos ni la cara. Evite el contacto con los genitales. Use guantes o manoplas protectores cuando aplique el producto. Repita la aplicación cada dos semanas, si es necesario. NO UTILIZAR EN GATOS NI EN GATITOS.

No utilice en perros menores de doce (12) semanas. Consulte a un veterinario antes de usar este producto en animales medicados, debilitados, ancianos, preñados o que están lactando. Pueden ocurrir sensibilidades después de usar CUALQUIER producto pesticida para mascotas. Si aparecen signos de sensibilidad, bañe a su mascota con un jabón suave y enjuáguela con abundante agua. Si los síntomas persisten, consulte a un veterinario inmediatamente o llame a esta línea directa de control de envenenamiento para animales: 1-800-345-4735.

Aplicación en animales especiales: consulte a un veterinario o llame a esta línea directa de control de envenenamiento para animales: 1-800-345-4735 antes de usar este producto en animales medicados, debilitados, ancianos, preñados o que están lactando.

Información sobre reacciones adversas: pueden ocurrir sensibilidades después de usar CUALQUIER producto pesticida para mascotas. Si aparecen signos de sensibilidad, bañe a su mascota con un jabón suave y enjuáguela con abundante agua. Si los síntomas persisten, consulte a un veterinario inmediatamente o llame a esta línea directa de control de envenenamiento para animales: 1-800-345-4735.

Aplicación en exteriores

Precauciones y restricciones (exteriores)

- Todas las aplicaciones de pulverización al aire libre deben limitarse únicamente a tratamientos localizados o en grietas y hendiduras, a excepción de los siguientes usos permitidos:
 1. Aplicaciones a superficies permeables, como suelo, césped, grama y otro tipo de vegetación.
 2. Tratamientos de banda perimetral de 7 pies de ancho o menos desde la base de una estructura artificial hacia superficies permeables (*por ejemplo*, suelo, mantillo o césped).
 3. Aplicaciones en la parte inferior de aleros, sofitos, puertas o ventanas protegidas permanentemente de la lluvia por un revestimiento, voladizo, toldo u otra estructura.
 4. Aplicaciones alrededor de posibles puntos exteriores de entrada de plagas a estructuras artificiales, como puertas y ventanas, limitadas a una banda que no exceda una pulgada.
 5. Aplicaciones en superficies verticales (como el costado de una estructura artificial), directamente sobre superficies impermeables (*por ejemplo*, entradas de vehículos, aceras, etc.) hasta 2 pies sobre el nivel del piso.
 6. Aplicaciones en superficies verticales directamente sobre superficies permeables, como suelo, césped, grama, mantillo u otro tipo de vegetación, solo si la superficie permeable no drena hacia zanjas, desagües pluviales, canaletas o aguas superficiales.
- Los tratamientos localizados no deben exceder dos pies cuadrados en tamaño (*por ejemplo*, 2 pies por 1 pie o 4 pies por 0.5 pies).
- Trate las superficies para garantizar una cobertura completa, pero evite el escurrimiento.
- No aplique el producto en estanques, charcas, arroyos o lagos.
- No aplique directamente en alcantarillas ni desagües pluviales, ni en áreas como desagües o canaletas donde pueda ocurrir drenaje hacia alcantarillas, desagües pluviales, cuerpos de agua o hábitats acuáticos. No permita que el producto entre en ningún desagüe durante la aplicación o después de esta.
- No aplique directamente en superficies horizontales impermeables como aceras, entradas de vehículos y patios, excepto como tratamiento localizado o en grietas y hendiduras.
- No aplique ni riegue el producto hasta el punto de escurrimiento. No realice aplicaciones durante la lluvia.
- Evite aplicarlo cuando se prevean lluvias antes de que el producto tenga tiempo suficiente para secarse (4 horas como mínimo). La lluvia dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación puede causar escurrimiento no deseado de la aplicación del pesticida.
- No aplique el producto si la velocidad del viento es mayor de 15 millas/h.

- Para tratar insectos que se encuentran en vacíos, grietas y hendiduras, las aplicaciones se deben hacer de tal manera que se limite el goteo y se evite el escurrimiento sobre superficies estructurales no tratadas y plantas.
- No debe utilizarse en sistemas de nebulización residenciales al aire libre.
- Para aplicaciones en el suelo o las hojas, no aplique por tierra a menos de 25 pies de lagos, embalses, ríos, arroyos permanentes, pantanos o charcas naturales, estuarios y estanques de granjas de peces comerciales.
- No debe usarse en plantas que se están cultivando para la venta u otros fines comerciales. No debe usarse en invernaderos comerciales.

Para el control de garrapatas incluidas las garrapatas que pueden transmitir la enfermedad de Lyme (tratamiento del perímetro): use el producto de pulverización para cabras y ovejas de Gordon como tratamiento residual para controlar garrapatas, incluidas garrapatas de patas negras (*Ixodes dammini*), garrapatas estrella solitaria (*Amblyomma americanum*), garrapatas marrones del perro (*Rhipicephalus sanguineus*), garrapatas americanas del perro (*Dermacentor variabilis*) y garrapatas de patas negras del oeste (*Ixodes pacificus*). Para cada una de las áreas que se mencionan a continuación, debe aplicar producto hasta humedecer la superficie (aproximadamente 1 galón/de 750 a 1000 pies cuadrados).

Aplique el tratamiento alrededor de ventanas y puertas, porches, mosquiteros, aleros, patios, garajes, debajo de escaleras y en cámaras bajo la casa donde estas plagas pueden entrar. Aplique el tratamiento en una banda de acumulación de vegetación y hojarasca con un ancho de 6 a 7 pies alrededor del exterior de las construcciones para controlar las garrapatas que puedan estar en esa parte. Para controlar las garrapatas en zonas de actividades al aire libre, aplique el tratamiento en una banda de acumulación de vegetación y hojarasca con un ancho de 6 a 7 pies adyacente a las zonas de actividad, en especial donde hay mucha vegetación.

PARA EL CONTROL DE INSECTOS DE JARDÍN:

Para su uso en rosas, dalias, ásteres y otras plantas ornamentales para matar escarabajos japoneses que entren en contacto con el producto, además de moscas blancas, pulgones, arañuelas expuestas, arañas, ácaros rojos y minadores. Puede usarse en plantas como pulverización multipropósito en jardines pequeños y para tratamientos localizados de infestaciones incipientes de insectos, para evitar que se propaguen en jardines amplios.

También puede usarse en otras plantas, como violetas africanas, azaleas, begonias, camelias, claveles, crisantemos, delfinios, cornejos, hiedras comunes, boneteros, fucsias, geranios, crassulas, vides, kentias, laureles, caléndulas, rododendros, ficus, conejitos, alelíes, plantas Tradescantia zebrina y cinias.

El producto es efectivo cuando se usa según las instrucciones contra moscas blancas, pulgones, arañas y ácaros rojos, arañuelas expuestas, chinches de encaje, escarabajos japoneses, hormigas del azúcar, ácaros del trébol y gusanos cogolleros.

Pulverice el producto sobre las plantas a una distancia no menor de 18 pulgadas. Hágalo con movimientos de barrido. Evite aplicar demasiado producto en follaje, plantas o brotes nuevos. No pulverice el producto sobre las plantas cuando la temperatura sea superior a 90 °F. Apunte directamente a los insectos siempre que sea posible. Repita la aplicación del tratamiento cada dos (2) semanas.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos ni el pienso mediante el almacenamiento y la eliminación.

ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: almacene en posición vertical a temperatura ambiente. Evite la exposición a temperaturas extremas.

ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS Y MANIPULACIÓN DE RECIPIENTES: recipiente no reutilizable. No reutilice ni rellene este recipiente. **Si está vacío:** deposítelo en la basura u ofrézcalo para reciclaje, si está disponible esa opción. **Si está parcialmente lleno:** llame a su agencia local de residuos sólidos para conocer las opciones de eliminación locales. No lo vierta ni lo elimine por el desagüe o el alcantarillado.

GARANTÍA LIMITADA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El fabricante garantiza únicamente que la composición química de este producto se ajusta a la declaración de ingredientes que figura en la etiqueta y que el producto es razonablemente adecuado para el uso indicado en la etiqueta si se lo aplica de conformidad con el Modo de empleo.

DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA LEY APLICABLE, EL FABRICANTE NO CONCEDE NI TIENE LA INTENCIÓN DE CONCEDER NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS CUALES SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE. Esta garantía limitada no se extiende al uso del producto que no se ajuste a las instrucciones, advertencias o precauciones de la etiqueta. Estos factores exceden el control del fabricante o el vendedor. Cualquier daño derivado del incumplimiento de la garantía del fabricante se limitará a los daños directos y no incluirá los daños indirectos o consecuentes, como la pérdida de beneficios o valores, salvo que la legislación disponga lo contrario.

Los términos de esta Garantía limitada y exención de responsabilidad no pueden modificarse mediante declaraciones o acuerdos escritos o verbales. Ningún empleado ni agente del vendedor está autorizado a modificar o sobrepasar los términos de esta Garantía limitada y exención de responsabilidad de ninguna manera.

763/10-2024 AP100924
EPA REG. NO. 2217-825



MANUFACTURED FOR
PBI/GORDON CORPORATION
P.O. BOX 860350
SHAWNEE, KANSAS 66286
www.GordonsUSA.com

ATENCIÓN: Esta etiqueta de espécimen se proporciona únicamente para uso informativo. Este producto puede no estar disponible aún para su venta en su estado o zona. La información que aparece en esta etiqueta puede diferir de la que aparece en la etiqueta del producto que esté utilizando. Siga siempre las instrucciones de uso y las precauciones que figuran en la etiqueta del producto que esté usando.