



Brush Killer

FOR LARGE PROPERTY

Use this product only in accordance with its labeling and with the Worker Protection Standard, 40 CFR part 170.

ACTIVE INGREDIENTS:

Triclopyr, triethylamine salt	7.81%
2,4-D, diethanolamine salt	16.49%
Dicamba, dimethylamine salt	1.38%

OTHER INGREDIENTS: 74.32%

THIS PRODUCT CONTAINS:

0.50 lb 3,5,6-trichloro-2-pyridinyloxyacetic acid per gallon or 5.60%.
1.00 lb 2,4-dichlorophenoxyacetic acid equivalent per gallon or 11.17%.
0.10 lb 3,6-dichloro-o-anisic acid equivalent per gallon or 1.15%.

Isomer specific by AOAC Methods.

TOTAL 100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN WARNING - AVISO

Si Usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a Usted en detalle. (If you do not understand the label, find some one to explain it to you in detail.)



**READ THE ENTIRE LABEL FIRST.
OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND
FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.**

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

WARNING: Causes substantial but temporary eye injury. Do not get in eyes or on clothing. Harmful if swallowed. Avoid contact with skin.

Personal Protective Equipment (PPE)

Some materials that are chemical-resistant to this product are natural rubber. If you want more options, follow the instructions for category A on an EPA chemical-resistance category selection chart.

All mixers, loaders, applicators and other handlers must wear:

- protective eyewear,
- long-sleeved shirt and long pants,
- shoes and socks,
- chemical-resistant gloves (except for applicators using ground boom equipment) and
- chemical-resistant apron when mixing or loading, cleaning up spills or equipment, or otherwise exposed to the concentrate.

See engineering controls for additional requirements.

Engineering Control Statements

When handlers use closed systems or enclosed cabs in a manner that meets the requirements listed in the Worker Protection Standard (WPS) for agricultural pesticides 40 CFR 170.240 (d)(4-6), the handler PPE requirements may be reduced or modified as specified in the WPS.

User Safety Requirements

Follow manufacturer's instructions for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions for washables exist, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other laundry.

User Safety Recommendations

- Users should wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.
- Users should remove clothing/PPE immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing. If pesticide gets on skin, wash immediately with soap and water.
- Users should remove PPE immediately after handling this product. Wash the outside of gloves before removing. As soon as possible, wash thoroughly and change into clean clothing.

First Aid	
If in eyes:	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 - 20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If swallowed:	• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to by a poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.
If on skin or on clothing:	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15 - 20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If inhaled:	• Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. You may also contact 1-877-800-5556 for emergency medical information.	

Environmental Hazards

This pesticide is toxic to fish and aquatic invertebrates. Do not apply directly to water, to areas where surface water is present, or to intertidal areas below the mean high water mark. Drift and runoff may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas. Do not contaminate water when disposing of equipment wash waters or rinsate.

These chemicals (triclopyr, 2,4-D and dicamba) have properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of these chemicals in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. Application around a cistern or well may result in contamination of drinking water or groundwater.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Do not apply this product in a way that will contact workers or other persons, either directly or through drift. Only protected handlers may be in the area during application. For any requirements specific to your State or Tribe, consult the agency responsible for pesticide regulation.

Agricultural Use Requirements

Use this product only in accordance with its labeling and with the Worker Protection Standard, 40 CFR part 170.

This standard contains requirements for the protection of agricultural workers on farms, forests, nurseries, and greenhouses, and handlers of agricultural pesticides. It contains requirements for training, decontamination, notification, and emergency assistance. It also contains specific instructions and exceptions pertaining to the statements on this label about personal protective equipment and restricted-entry interval. The requirements in this box only apply to uses of this product that are covered by the Worker Protection Standard.

Do not enter or allow worker entry into treated areas during the restricted entry interval (REI) of 48 hours.

PPE required for early entry to treated areas that is permitted under the Worker Protection Standard and that involves contact with anything that has been treated, such as plants, soil, or water is:

- coveralls,
- chemical-resistant gloves made of any water-proof material,
- shoes plus socks and
- protective eyewear.

Non-Agricultural Use Requirements

The requirements in this box apply to uses of this product that are NOT within the scope of the Worker Protection Standard for agricultural pesticides (40 CFR Part 170). The WPS applies when this product is used to produce agricultural plants on farms, forests, nurseries, or greenhouses.

Reentry Statement: Do not enter or allow people (or pets) to enter the treated area until sprays have dried.

1. Product Description

Brush Killer For Large Property is a post emergent herbicide that enters plants through their leaves, woody stems, and cut surfaces. Once in the plant the product moves throughout the plant's vascular system. Visual symptoms such as wilting and yellowing appear in 1 to 3 weeks depending on environmental conditions and plant species. It is effective in controlling broadleaf weeds, woody plants, vines, and brush in pasture and rangeland including established grass pastures, rangeland, and perennial grasslands, Conservation Reserve Program (CRP) acres, non-crop land areas including fencerows, hedgerows, roadside ditches, rights-of-way, farmsteads, and other non-crop areas, and residential lawns, yards, and turfgrass.

2. For Best Results

- Within the rate ranges specified on this label, the lower rates can be used for young, actively growing, sensitive weed species. The higher rates can be used for less sensitive species, perennials, and conditions where control is difficult (dense weed stands, larger weeds, stress conditions such as drought or extreme temperatures).

- Spring and fall treatments are preferred to summer treatments.
- Foliar applications should be applied during warm weather when plants are actively growing. Do not apply this product when temperatures are above 85°F as some injury to desirable grasses or turf may be expected.
- Application under low moisture or dry soil conditions may reduce herbicide effectiveness. Wet foliage at the time of application may decrease control.
- Applications of this product are rainfast within 6 hours after application. For best results avoid watering or irrigation for 24 hours after application.
- Extreme growing conditions such as drought or cold temperatures prior to, at the time of, or following an application may reduce or delay control.
- Do not reseed pastures [or lawns] until at least three weeks after treatment.
- Do not use on newly seeded grasses until grass has established a good root system and is tillering.
- Direct spray on target plants and minimize loss of product through spray drift.

3. Precautions

- Do not enter or allow people (or pets) to enter treated area until sprays have dried.
- This product will kill or injure all broadleaf and woody plants contacted. Do not directly spray areas containing desirable broadleaf plant species including legumes (such as clover or alfalfa), unless injury or loss of the plants can be tolerated. Do not allow this product to come into direct contact with cotton, grapes, tobacco, vegetable crops, citrus, flowers, fruit or ornamental trees, or other desirable broadleaf plants.
- If a second application is needed, allow 30 days between applications before retreating.
- For ground application only. Aerial applications are not permitted. Do not apply this product through any type of irrigation system.
- Do not apply to any body of water such as lakes, streams, rivers, ponds, reservoirs, or estuaries (salt water bays). Do not apply to any shorelines (non-cropland sites adjacent to the edges of a body of water) of lakes, streams, rivers, ponds, reservoirs, or estuaries (salt water bays). Do not apply to wetlands (swamps, bogs, potholes, or marshes). Do not apply to agricultural irrigation water or on agricultural irrigation ditchbanks and canals. Do not apply to agricultural drainage water or on agricultural ditchbanks.

4. Spray Preparation

Mixing with Water: Add one-half the required amount of water to the spray tank, then add this product slowly with agitation, and complete filling the tank with water. Mix thoroughly and continue agitation while spraying. When this product is left standing for extended periods of time (4 to 5 hours), re-agitate to assure uniformity of the spray mixture.

Mixing with Liquid Fertilizer for Broadleaf Weed Control and Fertilization: This product may be tank mixed with Gordon's Liquid Lawn & Pasture Fertilizer 20-0-0 or Gordon's Triple 10 Liquid Fertilizer for weed control and fertilization of pastures and turfgrass. Using liquid fertilizers in applications to woody plants is not recommended as efficacy may be reduced. Mix and apply liquid fertilizers at rates recommended on the Gordon's product labels.

5. Application Rates for Treatment in Pastures, Rangeland, and Non-Cropland

Pastures and Rangelands are defined as established grass pastures, rangeland, and perennial grasslands including the Conservation Reserve Program (CRP). Pastures established with these grasses may be treated: bahiagrass, bermudagrass, bluegrass, brome, reed canarygrass, fescue, orchardgrass, ryegrass, timothy, and wheatgrass.

Non-croplands are defined as fencerows, hedgerows, roadside ditches, non-irrigation ditchbanks, rights-of-way, farmsteads, and other non-crop areas.

Table 1. Weeds Controlled

Annuals			
catchweed cocklebur, common crotan daisy, English eastern black nightshade Florida pusley fleabane, annual jimsonweed* knotweed kochia*	lettuce, wild lambsquarters, common mallow, common marestail (horseweed) Mexican prickly poppy morningglory* mustard, wild, tansy and yellow	nightshade pennycress, field pepperweed, Virginia pigweed, redroot, rough smooth, spiny puncturevine* ragweed, common and giant shepherd's purse	smartweed, Pennsylvania sneezeweed, bitter sowthistle, annual spiny amaranth sunflower, common velvetleaf* waterhemp wild carrot*
Biennials			
burdock, common cockle, white evening primrose Henbit*	Mullein, common* plantain, bracted poison hemlock ragwort, tansy	spotted knapweed starthistle, yellow sweetclover	thistle, bull, milk, musk, plumless and Scotch
Perennials			
absinth wormwood bindweed, field and hedge buttercup, tall* bracken fern* chickweed chicory clover, white dandelion dock, curly and broadleaf dogfennel	firewood hemp hoary alyssum* horsenettle* horsetail goatweed goldenrod ground ivy (creeping Charlie)* ironweed knapweed leafy spurge	lespedeza, sericea* lespedeza, common milkweed, common plantain, buckhorn poison ivy* poison oak* poison sumac* pokeweed ragweed, western smartweed, swamp Sowthistle Stinging nettle	thistle, Canada vetch vervain, blue white snakeroot wild violets* yarrow, common

*Use the spot treatment application method at high rates for improved performance when controlling or suppressing these weeds. May require more than one application for complete control.

5.1 Broadcast Application Rates for Weed Control



The broadcast application rate is 1.5 to 3.0 fl.oz. per 1000 sq.ft.. See Tables 2 and 3 for typical spray mix rate and how to select application rates. Spray equipment options include tow-behind or all terrain vehicle (ATV) sprayers with spray boom or spray bar. To calibrate your application equipment contact your sprayer manufacturer or consult your equipment owner's manual for speed and pressure settings required to deliver the spray solution at a

target volume of 1 gallon per 1,000 sq.ft.. See Section 5.4 for application restrictions.

Table 2. Typical Spray Mix Rate for Broadcast Applications

Area to Spray and Dilution Rate	
Application Rate	Rate per gallon Coverage area per gallon of mixed solution is 1,000 sq.ft.
Low Rate	1.5 fl.oz. per 1 gal of water
Mid Rate	2.5 fl.oz. per 1 gal of water
High Rate	3.0 fl.oz. per 1 gal of water

Calibrate sprayer to apply 1 gallon of spray solution per 1,000 sq.ft.. Contact your sprayer manufacturer or consult your equipment owner's manual for speed and pressure settings required to deliver target spray volume.

Table 3. How to Choose Broadcast Application Rate

Application Rate	Considerations
Low Rate	Annuals: Treat when plants are small (3 to 4 inches tall) actively growing. and/or Biennials: Apply when in the seedling to rosette stage and before the development of flower stalks. and/or Growing Conditions: Young, actively growing, sensitive weed species.
Mid Rate	Perennials: Use for dense vegetation, weeds beyond the appropriate growth stages, difficult to control (resistant) weed species. and/or Growing Conditions: Stress conditions such as drought and/or high temperatures.
High Rate	Difficult to control weeds: Apply to perennial weeds in bud to bloom stage with active growth. (Depending on plant growth stage and environmental conditions at the time of application regrowth may occur on hard-to-control species such as field bindweed, chicory, dogfennel, goldenrod, horsenettle, kudzu, milkweed, perennial sowthistle, leafy spurge, ground ivy (creeping Charlie), wild violets and Canada thistle. Biennial and perennial weeds may require a follow-up or spot treatment.) and/or Woody plants: The most favorable period for treatment is after the plants have fully leaved in the spring and continues into early summer, depending on temperature, soil moisture and other conditions. and/or Growing Conditions: Extreme stress conditions such as drought and/or extreme temperatures.

5.2 Spot Treatment Application Rates for Weed Control

The spot treatment application rate is 2 to 5 fl.oz. per gallon of water. Spray until leaves are thoroughly wet but not dripping. See Table 4 for how to choose application rates. Adjust sprayer nozzle to a coarse spray (low pressure, big droplet). Spray equipment options include all terrain vehicle (ATV) sprayers fitted with a spray wand or spray gun, backpack sprayers, and hand-operated or hand-held sprayers.



Depending on plant growth stage and environmental conditions at the time of application regrowth may occur on hard-to-control species such as field bindweed, chicory, dogfennel, goldenrod, horsenettle, kudzu, milkweed, perennial sowthistle, leafy spurge, and Canada thistle. Biennial and perennial weeds may require a follow-up treatment. See Section 5.4 for application restrictions.

Table 4. How to Choose Spot Treatment Application Rate

Amount of product per 1 gallon of water	Growing Conditions, Plant Stage
2.0 fl.oz.	Young, actively growing, sensitive weed species
3.0 fl.oz.	Dense weed stands, larger weeds
4.0 fl.oz.	Stress conditions such as drought or high temperatures
5.0 fl.oz.	Mature, dense weeds. Extreme stress conditions such as drought or extreme temperatures

5.3 Spot Treatment Application Rates for Control of Brush, Woody Plants and Vines

The spot treatment application rate is 2 to 5 fl.oz. per gallon of water. Spray brush, woody plants, and vines until foliage and green stems are thoroughly wet but not dripping. See Tables 5 and 6 for how to choose application rates and species controlled. Adjust sprayer nozzle to a coarse spray (low pressure, big droplet). Spray equipment options include all terrain vehicle (ATV) sprayers fitted with a spray wand or spray gun, backpack sprayers, and hand-operated or hand-held sprayers.



Spot treatments of brush, woody plants and vines should occur when plants are actively growing, in the full leaf stage in the spring to early summer and growing under favorable environmental conditions. (Depending on plant growth stage and environmental conditions at the time of application regrowth may occur on hard-to-control species requiring a follow-up treatment.) Delay mowing or clipping 2 days before or until 2 days after the application of this product. See Section 5.4 for application restrictions.

Table 5. Spot Treatment Application Rates	
Amount of product per 1 gallon of water	When to Use, Growing Conditions, Plant Stage
2.0 fl.oz.	Young, actively growing, easy to control species
3.0 fl.oz.	Mid size, actively growing, easy to control species
4.0 fl.oz.	Large plants or stress conditions such as drought or high temperatures
5.0 fl.oz.	Large, dense plant populations or hard to control species

Table 6. Brush, Woody Plants and Vines Controlled			
Species Controlled			
alder	<i>Ceanothus</i> spp.	poison ivy	tamarack
ash	cottonwood	poison oak	wax myrtle ¹
beech	dogwood	sassafras ¹	wild grape
birch	elderberry	scotch broom	wild roses
black locust	hawthorn	sumac (including	willow
boneset	honeysuckle	poison sumac)	
cascara	maples	sycamore	

¹Top growth control only

5.4 Restrictions for Applications to Pasture and Rangelands

Pastures and rangelands are defined as established grass pastures, rangeland, and perennial grasslands including the Conservation Reserve Program (CRP). Pastures established with these grasses may be treated: bahiagrass, bermudagrass, bluegrass, brome, reed canarygrass, fescue, orchardgrass, ryegrass, timothy, and wheatgrass.

Maximum Application Rates

Do not apply more than 8 pints of product per acre per application. Use one broadcast application per year (season). The maximum seasonal rate is 8 pints of product per acre per season.

Grazing and Slaughter Restrictions: Do not allow lactating dairy animals to graze treated areas until the next growing season following application of this product. Withdraw livestock from grazing treated grass or consumption of treated hay at least 3 days before slaughter. Except for lactating dairy animals and the slaughter restriction, there are no grazing restrictions for animals (including horses, cows, goats, and sheep).

Haying Restrictions: Do not cut hay for harvest within 14 days following application.

Prohibitions: Postemergent treatments of this product may injure or kill legumes including alfalfa, clovers, lespedezas, sweet clover, trefoils and vetches. Do not spray grass/legume mixtures unless injury or plant loss can be accepted [tolerated]. Do not use this product on newly seeded grasses including, but not limited to buffalograss, kleingrass, sideoats grama, and switchgrass. Do not use this product on forage sorghum, sudangrass, corn, and cereal grains (wheat). Do not reseed treated areas for three weeks after treatment.

5.5 Restrictions for Applications to Non-Croplands

Non-croplands are defined as fencerows, hedgerows, roadside ditches, non-irrigation ditchbanks, rights-of-way, farmsteads, and other non-crop areas.

Maximum Application Rates

Do not apply more than 8 pints of product per acre per application. The maximum number of broadcast applications per year is two per year with a minimum interval between applications of 30 days. Application to woody plants is limited to 1 application per year. The maximum seasonal rate is 16 pints of product per acre per season.

Prohibitions: Postemergent treatments of this product may injure or kill legumes including alfalfa, clovers, lespedezas, sweet clover, trefoils and vetches. Do not spray grass/legume mixtures unless injury or plant loss can be accepted [tolerated]. Do not use this product on newly seeded grasses including, but not limited to buffalograss, kleingrass, sideoats grama, and switchgrass. Applications to noncropland areas are not applicable to treatment of commercial timber or other plants being grown for sale or other commercial use, or for commercial seed production, or for research purposes. Do not reseed treated areas for three weeks after treatment.

6. Lawns, Yards, and Residential Turfgrass (including lawns around farm buildings)

Brush Killer For Large Property may be applied to cool season turfgrass (Kentucky bluegrass, annual bluegrass, perennial ryegrass, tall fescue, red or fine leaf fescues and mixtures of these species) and dormant warm season turfgrass (dormant hybrid

Bermudagrass, dormant common Bermudagrass, and dormant bahiagrass) for broadleaf weed control. Do not apply this product to St. Augustinegrass (including Floratam) bentgrass or newly seeded grass.

Delay application of this product to grass seedlings until after the second or third mowing. Treated areas may be reseeded 3 weeks after application. If dry conditions exist, a scheduled irrigation or watering 24 hours before and 24 hours after application is recommended. Delay mowing 2 days before and until 2 days after the application of this product. Fall applications provide improved control for emerged winter annuals and perennials such as henbit, chickweed, clover and ground ivy (creeping Charlie). Spot treatments during the summer may be appropriate for sparse infestations or as a follow-up treatment.


Turfgrass tolerance: Tolerant turf species listed on this label may exhibit temporary turf injury. The best tolerance occurs under optimal conditions for the turfgrass. Adverse environmental conditions may reduce the selectivity on the turfgrass. Injury may occur under marginal conditions (e.g. low temperatures and drought stress) or under extreme conditions (e.g. high temperatures and high humidity). To avoid turf injury use only on turfgrass that is reasonably free of stress, including diseases, insects, excess heat or cold, drought or excess rainfall/irrigation, improper mowing or improper applications of fertilizer and pesticides. Do not broadcast apply this product when temperatures are above 85°F; some injury can also be expected with spot treatments when air temperatures exceed 85°F.

Table 7. Broadleaf Weeds Controlled: This product will control or suppress the following broadleaf weeds.		
Aster, white heath & white prairie	Field oxeye-daisy (*creeping oxeye)	Poison ivy
Bedstraw	Filaree, whitemstern & redstem	Poison oak
Beggarweed, creeping	Ground ivy (creeping Charlie)**	Puncturevine**
Bindweed	Groundsel	Purple cudweed
Black medic	Hawkweed	Purslane
Broadleaf plantain	Healall	Ragweed
Buckhorn plantain	Henbit**	Red sorrel (*sheep sorrel)
Bull thistle	Knotweed	Shepherd's purse
Burdock, common	Lambsquarters	Speedwell (Veronica)
Buttercup, creeping**	Lawn burweed	Spurge**
Carpetweed	Lespedeza, common	Thistle
Catnip	Mallow, common	White clover (*Dutch clover, honeysuckle
Chickweed	Matchweed	clover, white trefoil, & purplewort)
Chicory	Mouseear chickweed	Wild carrot**
Cinquefoil	Mustard	Wild garlic
Clover	Nettle	Wild geranium
Curly dock	Old world diamond flower	Wild lettuce
Dandelion	Oxalis (*yellow woodsorrel & creeping woodsorrel)	Wild mustard
Dayflower	Parsley-piert	Wild onion
Deadnettle	Pennsylvania smartweed	Wild strawberry**
Dock	Pepperweed	Wild violets**
Dogfennel	Pigweed	Yarrow
False dandelion (*spotted catsear & common catsear)	Pineappleweed	Yellow rocket
Field bindweed (*morningglory & creeping jenny)	Plantain	

*Synonyms

**Use the spot treatment application method for improved performance when controlling or suppressing these weeds. May require more than one application for complete control.

6.1 Broadcast Application Rates



The broadcast application rate for Cool-Season Turfgrass (Kentucky bluegrass, annual bluegrass, perennial ryegrass, tall fescue, red or fine leaf fescues and mixtures of these species) is 2.4 to 3.0 fl.oz. per 1000 sq.ft. Do not apply to bentgrass or newly seeded grass. See Table 8 for typical spray mix rate.

The broadcast application rate for Warm Season Turfgrass (dormant hybrid Bermudagrass, dormant common Bermudagrass, and dormant bahiagrass) is 1.5 to 1.66 fl.oz. per 1000 sq.ft. Do not apply to St. Augustinegrass (including Floratam) or newly seeded grass. See Table 9 for typical spray mix rate.

Spray equipment options include tow-behind sprayers with spray boom or spray bar. To calibrate your application equipment contact your sprayer manufacturer or consult your equipment owner's manual for speed and pressure settings required to deliver the spray solution at a target volume of 1 gallon per 1,000 sq.ft.

Table 8. Broadcast Application Rates to Cool-Season Turfgrass (Kentucky bluegrass, annual bluegrass, perennial ryegrass, tall fescue, red or fine leaf fescues and mixtures of these species.)	
Area to Spray and Dilution Rate	
Application Rate	Rate per gallon Coverage area per gallon of mixed solution is 1,000 sq.ft.
Low Rate	2.4 fl.oz. per gal of water
High Rate	3.0 fl.oz. per gal of water
Sprayer must be calibrated to apply 1 gallon of spray solution per 1,000 sq.ft. Contact your sprayer manufacturer or consult your equipment owner's manual for speed and pressure settings required to deliver target spray volume.	

Table 9. Broadcast Application Rates to Warm-Season Turfgrass (Dormant Hybrid Bermudagrass, dormant common Bermudagrass, and dormant bahiagrass. Do not apply this product to St. Augustinegrass (including Floratam) bentgrass or newly seeded grass.)	
Area to Spray and Dilution Rate	
Application Rate	Rate per gallon Coverage area per gallon of mixed solution is 1,000 sq.ft.
Low Rate	1.5 fl.oz. per gal of water
High Rate	1.66 fl.oz. per gal of water
Sprayer must be calibrated to apply 1 gallon of spray solution per 1,000 sq.ft.. Contact your sprayer manufacturer or consult your equipment owner's manual for speed and pressure settings required to deliver target spray volume.	
Dormant turf: This product may be applied to fully dormant Bermudagrass, and fully dormant bahiagrass.	
Do not apply this product to warm-season turfgrass during spring green-up or in the fall during the transition period between active growth and dormancy.	

6.2 Spot Treatment Rates



The spot treatment application rate for Cool-Season Turfgrass (Kentucky bluegrass, annual bluegrass, perennial ryegrass, tall fescue, red or fine leaf fescues and mixtures of these species) is 3.0 fl.oz. per gallon of water per 1000 sq.ft. Do not apply to bentgrass or newly seeded grass.

The spot treatment application rate for Warm-Season Turfgrass (dormant hybrid Bermudagrass, dormant common Bermudagrass, and dormant bahiagrass) is 1.5 to 1.66 fl.oz. per gallon of water per 1000 sq.ft. Do not apply to St. Augustinegrass (including Floratam) or newly seeded grass.

Spray until leaves are thoroughly wet but not dripping. Adjust sprayer nozzle to a coarse spray (low pressure, big droplet). Spray equipment options include tank sprayers, pump-up sprayers, hand pump sprayers, back pack sprayers, and spot sprayers. Do not make spot treatments with hose-end sprayers.

6.3 Maximum Application Rates

Lawns, Yard and Residential Turfgrass: Do not apply more than 8 pints of product per acre [3.0 fl.oz. of product per 1000 sq.ft.] per application. The maximum number of applications per year is two. The maximum seasonal rate is 16 pints of product per acre [or 6.0 fl.oz. of product per 1000 sq.ft.] per season.

7. Spray Drift Management

A variety of factors including weather conditions (e.g., wind direction, wind speed, temperature, relative humidity) and method of ground application can influence pesticide drift. The applicator must evaluate all factors and make appropriate adjustments when applying this product.

Droplet Size

When applying sprays that contain 2,4-D as the sole active ingredient, or when applying sprays that contain 2,4-D mixed with active ingredients that require a Coarse or coarser spray, apply only as a Coarse or coarser spray (ASAE standard 572) or a volume mean diameter of 385 microns or greater for spinning atomizer nozzles.

When applying sprays that contain 2,4-D mixed with other active ingredients that require a Medium or more fine spray, apply only as a Medium or coarser spray (ASAE standard 572) or a volume mean diameter of 300 microns or greater for spinning atomizer nozzles.

Wind Speed

Do not apply at wind speeds greater than 15 mph. Only apply this product if the wind direction favors on-target deposition and there are not sensitive areas (including, but not limited to, bodies of water, known habitat for nontarget species, nontarget crops) within 250 feet downwind. If applying a Medium spray, leave one swath unsprayed at the downwind edge of the treated field.

Temperature Inversions

If applying at wind speeds less than 3 mph, the applicator must determine if: a) conditions of temperature inversion exist, or b) stable atmospheric conditions exist at or below nozzle height. Do not make applications into areas of temperature inversions or stable atmospheric conditions.

Susceptible Plants

Do not apply under circumstances where spray drift may occur to food, forage, or other plantings that might be damaged or crops thereof rendered unfit for sale, use or consumption. Susceptible crops include, but are not limited to, cotton, okra, flowers,

grapes (in growing stage), fruit trees (foliage), soybeans (vegetative stage), ornamentals, sunflowers, tomatoes, beans, and other vegetables, or tobacco. Small amounts of spray drift that might not be visible may injure susceptible broadleaf plants.

Other State and Local Requirements

Applicators must follow all state and local pesticide drift requirements regarding application of 2,4-D herbicides. Where states have more stringent regulations, they must be observed.

Equipment

All ground application equipment must be properly maintained and calibrated using appropriate carriers or surrogates. Additional requirements for ground boom application: Do not apply with a nozzle height greater than 4 feet above the crop canopy.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.

PESTICIDE STORAGE: Store in original container in a locked storage area inaccessible to children or pets. Keep from freezing.

PESTICIDE DISPOSAL: Pesticide wastes are acutely hazardous. Improper disposal of excess pesticide, spray mixture, or rinsate is a violation of Federal law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste Representative at the nearest EPA Regional Office for guidance.

CONTAINER HANDLING: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Triple rinse or pressure rinse container (or equivalent) promptly after emptying. Then offer for recycling, if available, or puncture and dispose of in a sanitary landfill, or by incineration, or, if allowed by state and local authorities, by burning. If burned, stay out of smoke.

Triple rinse as follows: Empty the remaining contents into application equipment or a mix tank and drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Fill the container 1/4 full with water and recap. Shake for 10 seconds. Pour rinsate into application equipment or a mix tank or store rinsate for later use or disposal. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Repeat this procedure two more times.

OR

Pressure rinse as follows: Empty the remaining contents into application equipment or a mix tank and continue to drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Hold container upside down over application equipment or mix tank or collect rinsate for later use or disposal. Insert pressure rinsing nozzle in the side of the container, and rinse at about 40 PSI for at least 30 seconds. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip.

LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER

FOR USE ONLY AS DIRECTED. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, THE MANUFACTURER NEITHER MAKES NOR INTENDS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, IN NO CASE SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR HANDLING OF THIS PRODUCT. If these terms are not acceptable, return this product unopened immediately to the point of purchase, and the purchase price will be refunded in full. The terms of this LIMITED WARRANTY STATEMENT cannot be varied by any written or verbal statements or agreements at the point of sale or elsewhere.



ATTENTION: This product can expose you to diethanolamine, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Gordon's® logo is a registered trademark of PBI-Gordon Corporation.

232/10-2025 AP062221
EPA REG. NO. 2217-950



MANUFACTURED BY
PBI/GORDON CORPORATION
P.O. BOX 860350
SHAWNEE, KANSAS 66286
www.GordonsUSA.com

ATTENTION: This specimen label is provided for informational use only. This product may not yet be available for sale in your state or area. The information found in this label may differ from the information found on the product label you are using. Always follow the instructions for use and precautions on the label of the product you are using.



Brush Killer

FOR LARGE PROPERTY

Use este producto solo como lo indica su etiqueta y con el Estándar para la Protección del Trabajador, 40 CFR Parte 170.

ACTIVE INGREDIENTS:

Triclopyr, triethylamine salt	7.81%
2,4-D, diethanolamine salt	16.49%
Dicamba, dimethylamine salt	1.38%
OTHER INGREDIENTS:	74.32%

THIS PRODUCT CONTAINS:

0.50 lb 3,5,6-trichloro-2-pyridinyloxyacetic acid per gallon or 5.60%.
1.00 lb 2,4-dichlorophenoxyacetic acid equivalent per gallon or 11.17%.
0.10 lb 3,6-dichloro-o-anisic acid equivalent per gallon or 1.15%.

Isomer specific by AOAC Methods.

TOTAL 100.00%

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

AVISO

Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien que se la explique en detalle.



LEA LA ETIQUETA COMPLETA PRIMERO.
CUMPLA CON TODAS LAS PRECAUCIONES Y
SIGA CON CUIDADO LAS INSTRUCCIONES.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y animales domésticos

AVISO: Causa lesiones oculares severas, aunque temporales. No permita que entre en contacto con los ojos ni la ropa. Dañino si se ingiere. Evite el contacto con la piel.

Equipo de protección personal (PPE)

Un material que es resistente a las sustancias químicas de este producto es el caucho natural. Si desea conocer más opciones, consulte las instrucciones de la categoría A en la tabla de categorías de resistencia química de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

Todas las personas que mezclen, carguen, apliquen y manipulen el producto deben usar:

- protección ocular;
- camisa de manga larga y pantalones largos;
- zapatos y calcetines;
- guantes resistentes a productos químicos (excepto para las personas encargadas de la aplicación que utilizan equipos de barra de pulverización terrestre); y
- delantal o mandil resistente a productos químicos cuando se mezcle o cargue el concentrado, se limpien derrames o se lave el equipo, o al exponerse de cualquier otro modo al herbicida.

Para obtener más información sobre los requisitos, consulte los controles de ingeniería.

Declaraciones sobre controles de ingeniería

Cuando las personas que manipulan este producto utilizan sistemas cerrados o cabinas cerradas de conformidad con los requisitos estipulados en el Estándar para la Protección del Trabajador (WPS, por sus siglas en inglés) relativos a los pesticidas agrícolas (40 CFR 170.240 [d][4-6]), es posible reducir o modificar los requisitos relativos al PPE de la persona, según lo especificado en el WPS.

Requisitos de seguridad para los usuarios

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y el mantenimiento del PPE. En caso de que no existan dichas instrucciones de lavado, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el PPE por separado del resto de la ropa.

Recomendaciones de seguridad para los usuarios

- Los usuarios deben lavarse bien con agua y jabón luego de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle o consumir tabaco.
- Los usuarios deben quitarse la ropa y el PPE de manera inmediata si les entra pesticida. Luego, deben lavarse bien y ponerse ropa limpia. Si el pesticida entra en contacto con la piel, deben lavarse la zona afectada de inmediato con abundante agua y jabón.
- Los usuarios deben quitarse el PPE inmediatamente después de manipular este producto. Deben lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Tan pronto como sea posible, deben lavarse bien y cambiarse a ropa limpia.

Primeros auxilios	
Si entra en contacto con los ojos:	• Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y cuidadosamente con agua, durante 15 a 20 minutos. • Si utiliza lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagando los ojos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para que le recomiende un tratamiento.
En caso de ingerir:	• Llame de inmediato a un centro de control de envenenamientos o a un médico para que le recomiende un tratamiento. • Si la persona puede tragar, haga que beba un vaso de agua despacio. • No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. • No administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.
Si entra en contacto con la piel o la ropa:	• Quite la ropa contaminada. • Enjuague la piel de inmediato con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para que le recomiende un tratamiento.
En caso de inhalación:	• Lleve a la persona a un lugar con aire fresco. • Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia y luego proporcione respiración artificial, de preferencia boca a boca si es posible. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para que le recomiende un tratamiento.
Cuando llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el recipiente o la etiqueta del producto. También puede llamar al 1-877-800-5556 para obtener información médica de emergencia.	

Riesgos ambientales

Este pesticida es tóxico para peces e invertebrados acuáticos. No aplique el producto directamente al agua, a zonas donde haya presencia de agua superficial ni a las zonas intermareales por debajo de la marca de pleamar media. La deriva y el escurrimiento pueden ser peligrosos para organismos acuáticos residentes en aguas contiguas a las superficies tratadas. No contamine el agua al desechar el agua de lavado o enjuague del equipo.

Estos productos químicos (triclopir, 2,4-D y dicamba) tienen propiedades y características asociadas con productos químicos detectados en aguas subterráneas. El uso de este producto químico en superficies con suelos permeables, en particular en donde la capa freática está a poca profundidad, puede contaminar las aguas subterráneas. La aplicación alrededor de una cisterna o un pozo puede causar la contaminación del agua potable o subterránea.

MODO DE EMPLEO

Utilizar este producto de una forma contraria a la indicada en su etiqueta constituye una infracción de la ley federal.

No aplique este producto de tal manera que entre en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea directamente o por deriva. Solo el personal con equipo protector puede estar en la zona durante la aplicación del producto. Para cualquier requisito específico de su estado o tribu, consulte con la agencia responsable de los reglamentos relativos a pesticidas.

Requisitos para el uso agrícola

Use este producto solo como lo indica su etiqueta y con el Estándar para la Protección del Trabajador, 40 CFR Parte 170.

Este estándar contiene los requisitos para la protección de los trabajadores agrícolas en granjas, bosques, viveros e invernaderos, y de las personas que manipulen pesticidas agrícolas. Contiene los requisitos para la capacitación, descontaminación, notificación y ayuda en caso de emergencia. Además, contiene las instrucciones específicas y las excepciones correspondientes a las declaraciones en esta etiqueta acerca del equipo protector personal e intervalo de entrada restringida. Los requisitos de este recuadro se aplican solo a los usos de este producto contemplados por el Estándar para la Protección del Trabajador.

No entre ni permita la entrada de trabajadores a las zonas tratadas durante el intervalo de entrada restringida (REI, por sus siglas en inglés) de 48 horas.

El equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) obligatorio para entrar temprano a las zonas tratadas según lo permitido por el Estándar para la Protección del Trabajador, que comprende el contacto con cualquier cosa que se haya tratado con el producto, tal como plantas, suelo o agua, debe ser el siguiente:

- overol
- guantes resistentes a productos químicos hechos de cualquier material impermeable,
- zapatos y calcetines; y
- protección ocular.

Requisitos para el uso no agrícola

Los requisitos de este recuadro se aplican a los usos de este producto que NO están dentro del ámbito del Estándar para la Protección del Trabajador para pesticidas agrícolas (40 CFR Parte 170). El Estándar de Protección del Trabajador se aplica cuando este producto se usa para tratar plantas agrícolas en granjas, bosques, viveros o invernaderos.

Declaración de reingreso: No ingrese ni permita que personas (o mascotas) ingresen a la zona tratada hasta que el producto rociado se haya secado.

1. Descripción del producto

Brush Killer For Large Property es un herbicida posemergente que penetra en las plantas a través de sus hojas, tallos leñosos y superficies cortadas. Una vez absorbido, el producto se distribuye por el sistema vascular de la planta. Los síntomas visuales, como marchitamiento y amarillamiento, suelen observarse en 1 a 3 semanas, según las condiciones ambientales y la especie tratada. Es eficaz para controlar malezas de hoja ancha, plantas leñosas, enredaderas y arbustos en pastizales y tierras de pastoreo, incluidos pastizales establecidos, agostaderos y praderas perennes; en áreas del programa de reserva de conservación (CRP, por sus siglas en inglés); en zonas no agrícolas como cercados, setos, zanjas de caminos, servidumbres de paso, predios rurales y otras áreas no destinadas a cultivos; y en jardines, patios y áreas residenciales con césped.

2. Para mejores resultados

- Dentro de los rangos de dosis indicados en esta etiqueta, las dosis más bajas son adecuadas para malezas jóvenes, en crecimiento activo y de mayor sensibilidad. Las dosis más altas pueden utilizarse para especies menos sensibles, plantas perennes y situaciones donde el control resulta difícil (matas densas, malezas más grandes, condiciones de estrés como sequía o temperaturas extremas).

- Son preferibles los tratamientos de primavera y otoño antes que los tratamientos de verano.
- Las aplicaciones foliares deben realizarse durante clima cálido cuando las plantas están en crecimiento activo. No aplique el producto cuando la temperatura supere los 85 °F, ya que podría ocasionar daños en céspedes deseables.
- La eficacia del herbicida puede verse reducida si el suelo está seco o si hay baja humedad. El follaje mojado en el momento de aplicación también puede disminuir el control.
- Las aplicaciones de este producto se vuelve resistente a la lluvia en el plazo de 6 horas después de ser aplicado. Para mejores resultados, evite regar o irrigar durante las 24 horas posteriores.
- Condiciones extremas de crecimiento, como sequía o bajas temperaturas antes, durante o después de la aplicación, pueden reducir o retrasar el control.
- No vuelva a sembrar pastizales (o céspedes) hasta al menos tres semanas después del tratamiento.
- No usar en céspedes recién sembrados hasta que hayan establecido un buen sistema radicular y estén brotando.
- Pulverice directamente sobre las plantas objetivo y minimice la pérdida de producto por deriva de la pulverización.

3. Precauciones

- No ingrese ni permita que personas (o mascotas) ingresen a la zona tratada hasta que el producto rociado se haya secado.
- Este producto matará o dañará todas las plantas de hoja ancha y leñosas que entren en contacto con él. No pulverice directamente áreas que contengan especies de hoja ancha deseables, incluidas leguminosas (como el trébol o la alfalfa), a menos que pueda tolerarse el daño o la pérdida de dichas plantas. Evite el contacto directo del producto con algodón, uvas, tabaco, cultivos de hortalizas, cítricos, flores, árboles frutales u ornamentales, y otras plantas de hoja ancha deseables.
- Si fuera necesaria una segunda aplicación, espere 30 días antes de repetir el tratamiento.
- Solo para aplicación terrestre. No se permiten las aplicaciones aéreas. No aplicar este producto a través de ningún tipo de sistema de riego.
- No aplicar en ninguna extensión de agua, como lagos, riachuelos, ríos, lagunas, embalses o estuarios (bahías de agua salada). No aplicar en ninguna línea costera (terrenos no agrícolas adyacentes a la orilla de una extensión de agua) de lagos, riachuelos, ríos, lagunas, embalses o estuarios (bahías de agua salada). No aplicar en terrenos pantanosos (fangales, turberas, baches o pantanos). No aplicar en aguas de irrigación agrícola o sobre zanjas y canales de irrigación agrícola. No aplicar en aguas de drenaje agrícola o sobre zanjas agrícolas.

4. Preparación del espray

Mezcla con agua: Añada la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque del pulverizador, luego añada este producto lentamente, agitándolo, y termine de llenar el tanque con agua. Mezclar completamente y continuar agitando durante la pulverización. Cuando este producto se deje reposar durante períodos prolongados (de 4 a 5 horas), agítelo nuevamente para asegurar la uniformidad de la mezcla de pulverización.

Mezcla con fertilizante líquido para el control de malezas de hoja ancha y fertilización: Este producto puede mezclarse en el tanque con Gordon's Liquid Lawn & Pasture Fertilizer 20-0-0 o con Gordon's Triple 10 Liquid Fertilizer para controlar malezas y fertilizar pastizales y céspedes. No se recomienda aplicar fertilizantes líquidos sobre plantas leñosas, ya que puede reducirse la eficacia del tratamiento. Mezcle y aplique los fertilizantes líquidos siguiendo las dosis indicadas en las etiquetas de los productos Gordon.

5. Dosis de aplicación para pastizales, agostaderos y zonas no agrícolas

Se consideran pastizales y agostaderos las áreas con césped establecidas, las zonas de pastoreo y las praderas perennes, incluidas las superficies comprendidas en el programa de reserva de conservación (CRP). Pueden tratarse pastizales establecidos con los siguientes céspedes: bahía, bermuda, azul, broma, alpiste, festuca, dátilo, raigrás, fleo de prados y pasto de trigo.

Las zonas no agrícolas incluyen cercados, setos, zanjas de caminos, zanjas de no irrigación, servidumbres de paso, predios rurales y otras zonas no agrícolas.

Tabla 1. Malezas controladas			
Anuales			
amor de hortelano cardo común sangre de dragón hiedra inglesa hierba mora oriental ipeacuana blanca erigeron anual estramonio* centidonia kochia* lechuga silvestre	cenizo común malva común erigero de Canadá (hierba carnícera) chicalote campanilla* mostaza silvestre de tanaceto y amarilla hierba mora berro de campo	lentejilla de campo, Virginia cochinilla de raíz roja, cochinilla áspera, cochinilla lisa, cochinilla espinosa abrojo* ambrosia común y gigante bolsa de pastor	persicaria mayor, Pennsylvania botón de plata amargo cerraja anual amaranto espinoso girasol común hoja terciopelo* amaranto acuático zanahoria silvestre*
Bienales			
bardana común coллеja blanca onagra ortiga mansa*	gordolobo común* llantén mayor cicutu sacapeos	centaurea maculosa centaurea amarilla meiloto	cardo borriquero, cardo mariano, cardo de almizcle, falso cardo negro y cardo escoses
Perennes			
ajeno absenta correhuela y correhuela mayor botón de oro* helecho águila* hierba gallinera achicoria trébol blanco diente de león lengua de vaca de hoja ancha y lengua de vaca rizada hinojo de perro	adelfilla cáñamo industrial berteroa incana* ortiga de Carolina* cola de caballo hierba de cabra solidago hiedra terrestre (creeping charlie)* vernonia centaurea lechetrezn frondosa lespedeza sericea*	lespedeza común algodoncillo llantén menor hiedra venenosa* roble venenoso* zumaque venenoso* hierba carmín ambrosia occidental persicaria de pantano cerraja ortiga mayor cardo canadiense	veza verbena azul raíz de serpiente blanca violeta silvestre* milenrama común
* Utilice el método de aplicación de tratamiento localizado en dosis elevadas para mejorar el rendimiento al controlar o suprimir estas malezas. Es posible que se requiera más de una aplicación para lograr un control completo.			

5.1 Dosis de aplicación general para el control de malezas



La dosis de aplicación general es de 1.5 a 3.0 onzas líquidas por cada 1000 pies cuadrados. Consulte las tablas 2 y 3 para conocer la dosis típica de mezcla de pulverización y cómo seleccionar las dosis de aplicación. Las opciones de equipo de pulverización incluyen pulverizadores remolcados o pulverizadores para vehículos todoterreno (ATV, por sus siglas en inglés) con barra pulverizadora o barra rociadora. Para calibrar el equipo, consulte al fabricante o revise el manual del pulverizador para conocer los ajustes de velocidad y presión necesarios para alcanzar un volumen

objetivo de 1 galón por cada 1000 pies cuadrados. Consulte la sección 5.4 para conocer las restricciones de aplicación.

Tabla 2. Dosis típica de mezcla de pulverización para aplicaciones generales	
Zona a pulverizar y dosis de disolución	
Dosis de aplicación	Dosis por galón La zona de cobertura por galón de solución mezclada es 1000 pies cuadrados
Dosis baja	1.5 onzas fluidas por 1 galón de agua
Dosis media	2.5 onzas fluidas por 1 galón de agua
Dosis alta	3.0 onzas fluidas por 1 galón de agua
Calibre el pulverizador para aplicar 1 galón de solución por cada 1000 pies cuadrados. Comuníquese con el fabricante del pulverizador o revise el manual del pulverizador para conocer los ajustes de velocidad y presión necesarios para alcanzar el volumen objetivo.	

Tabla 3. Cómo elegir la dosis de aplicación general	
Dosis de aplicación	Cosas a tener en cuenta
Dosis baja	Anuales: trate cuando las plantas son pequeñas (3 a 4 pulgadas de altura) en crecimiento activo. y/o Bienales: aplique cuando las plantas estén en la etapa de plántula a roseta y antes del desarrollo de los tallos florales. y/o Condiciones de crecimiento: especies de malezas jóvenes, en crecimiento activo y sensibles.
Dosis media	Perennes: utilice en vegetación densa, malezas más allá de los estadios de crecimiento apropiados o especies difíciles de controlar (resistentes). y/o Condiciones de crecimiento: condiciones de estrés como sequía o temperaturas altas.
Dosis alta	Malezas difíciles de controlar: aplique a malezas perennes en estado de capullo a floración y con crecimiento activo. (Dependiendo del estadio de crecimiento y de las condiciones ambientales al momento de la aplicación, puede haber rebrote en especies difíciles de controlar como correhuela, achicoria, hinojo de perro, vara de oro, ortiga de carolina, kudzu, algodoncillo, cerraja, euphorbia frondosa, hiedra terrestre (<i>creeping charlie</i>), violetas silvestres y cardo canadiense. Las malezas bienales y perennes podrían requerir un tratamiento de seguimiento o una aplicación localizada). y/o Plantas leñosas: el período más favorable para el tratamiento es después de que las plantas hayan desarrollado completamente el follaje en primavera y continúa hasta comienzos del verano, dependiendo de la temperatura, la humedad del suelo y otras condiciones. y/o Condiciones de crecimiento: condiciones de estrés extremo como sequía o temperaturas extremas.

5.2 Dosis de aplicación de tratamiento localizado para el control de malezas

La dosis de aplicación de tratamiento localizado es de 2 a 5 onzas líquidas por galón de agua. Pulverice hasta que las hojas estén completamente mojadas, pero sin que goteen. Consulte la tabla 4 para saber cómo elegir las dosis de aplicación. Ajuste la boquilla del pulverizador a un rociado grueso (baja presión, gotas grandes). Las opciones de equipos de pulverización incluyen pulverizadores para vehículos

todoterreno (ATV) equipados con una varilla o pistola pulverizadora, pulverizadores de mochila y pulverizadores manuales o portátiles.

Según el estadio de crecimiento y de las condiciones ambientales al momento de la aplicación, puede haber rebrote en especies difíciles de controlar como correhuela, achicoria, hinojo de perro, vara de oro, ortiga de carolina, kudzu, algodoncillo, cerraja, euphorbia frondosa y cardo canadiense. Las malezas bienales y perennes podrían requerir un tratamiento de seguimiento. Consulte la sección 5.4 para conocer las restricciones de aplicación.

Tabla 4. Cómo elegir la dosis de aplicación de tratamiento localizado.	
Cantidad de producto por cada 1 galón de agua	Condiciones de crecimiento, etapa de la planta
2.0 onzas líquidas	Especies de malezas jóvenes, en crecimiento activo y sensibles.
3.0 onzas líquidas	Matas densas, malezas más grandes.
4.0 onzas líquidas	Condiciones de estrés como sequía o temperaturas altas.
5.0 onzas líquidas	Malezas maduras, densas. Condiciones de estrés extremo como sequía y temperaturas extremas.

5.3 Dosis de aplicación de tratamiento localizado para el control de arbustos, plantas leñosas y enredaderas

La dosis de aplicación de tratamiento localizado es de 2 a 5 onzas líquidas por galón de agua. Pulverice arbustos, plantas leñosas y enredaderas hasta que el follaje y los tallos verdes queden completamente mojados, pero sin gotear. Consulte las tablas 5 y 6 para conocer cómo elegir las dosis de aplicación y las especies controladas. Ajuste la boquilla del pulverizador a un rociado grueso (baja presión, gotas grandes). Las opciones de equipos de pulverización incluyen pulverizadores para vehículos todoterreno (ATV) equipados con una varilla o pistola pulverizadora, pulverizadores de mochila y pulverizadores manuales o portátiles.



Los tratamientos localizados de arbustos, plantas leñosas y enredaderas deben realizarse cuando las plantas estén en crecimiento activo, en la etapa de follaje completo desde la primavera hasta comienzos del verano y bajo condiciones ambientales favorables. Según el estado de crecimiento y de las condiciones ambientales al momento de la aplicación, puede haber rebrote en especies difíciles de controlar y podrían requerir un tratamiento de seguimiento. Realice la poda o cortes 2 días antes o hasta 2 días después de la aplicación de este producto.

Consulte la sección 5.4 para conocer las restricciones de aplicación.

Tabla 5. Dosis de aplicación de tratamiento localizado	
Cantidad de producto por cada 1 galón de agua	Cuando utilizar, condiciones de crecimiento, etapa de la planta
2.0 onzas líquidas	Especies de malezas jóvenes, en crecimiento activo y fáciles de controlar
3.0 onzas líquidas	Especies medianas, en crecimiento activo y fáciles de controlar
4.0 onzas líquidas	Plantas grandes o condiciones de estrés como sequía y temperaturas altas
5.0 onzas líquidas	Plantaciones densas y extensas o especies difíciles de controlar

Tabla 6. Arbustos, plantas leñosas y enredaderas controladas			
Especies controladas			
aliso	lirio de california	hiedra venenosa	alerce tamarack
fresno	álamo	roble venenoso	mirto de cera ¹
haya	corniso	sasafrás ¹	uva silvestre
abedul	saúco	retama escocesa	rosa silvestre
acacia negra	espiño	zumaque (incluido	sauce
eupatorio	madreselva	zumaque venenoso)	
cáscara sagrada	acer	sicómoro	
¹ Control limitado al crecimiento en altura			

5.4 Restricciones de aplicación en pastizales y agostaderos

Se consideran pastizales y agostaderos las áreas con césped establecidas, las zonas de pastoreo y las praderas perennes, incluidas las superficies comprendidas en el programa de reserva de conservación (CRP). Pueden tratarse pastizales establecidos con los siguientes céspedes: bahía, bermuda, azul, broma, alpiste, festuca, dátilo, raigrás, fleo de prados y pasto de trigo.

Dosis máxima de aplicación

No aplique más de 8 pintas de producto por acre y aplicación. Solo debe realizarse una aplicación en cobertura total por año (temporada). La dosis estacional máxima es de 8 pintas de producto por acre y temporada.

Restricciones de pastoreo y matadero: no permita que los animales lecheros lactantes pasten en áreas tratadas hasta la siguiente temporada de crecimiento, después de la aplicación de este producto. Retire el ganado del pastoreo en césped tratado o del consumo de heno tratado al menos 3 días antes del matadero. Con excepción de los animales lecheros lactantes y de la restricción previa al matadero, no existen restricciones de pastoreo para animales (incluidos caballos, vacas, cabras y ovejas).

Restricciones para la cosecha de heno: no coseche heno en el plazo de los 14 días siguientes a la aplicación.

Prohibiciones: Los tratamientos posemergentes de este producto pueden dañar o matar a las leguminosas, incluidas alfalfa, tréboles, lespedezas, tréboles dulces y vezas. No pulverice mezclas de césped y leguminosas a menos que pueda aceptarse (tolerarse) el daño o pérdida de las plantas. No utilice este producto en céspedes recién sembrados, incluidas, entre otras, búfalo, klein, banderilla y varilla. No utilice este producto en sorgo forrajero, pasto de Sudán, maíz ni cereales (trigo). No vuelva a sembrar las áreas tratadas hasta pasadas tres semanas desde la aplicación.

5.5 Restricciones de aplicación en zonas no agrícolas

Las zonas no agrícolas incluyen cercados, setos, zanjas de caminos, zanjas de no irrigación, servidumbres de paso, predios rurales y otras zonas no agrícolas.

Dosis máxima de aplicación

No aplique más de 8 pintas de producto por acre y aplicación. El número máximo de aplicaciones generales es de dos por año con un intervalo de 30 días entre aplicaciones. En plantas leñosas, se limita a 1 aplicación por año. La dosis estacional máxima es de 16 pintas de producto por acre y temporada.

Prohibiciones: Los tratamientos posemergentes de este producto pueden dañar o matar a las leguminosas, incluidas alfalfa, tréboles, lespedezas, tréboles dulces y vezas. No pulverice mezclas de césped y leguminosas a menos que pueda aceptarse (tolerarse) el daño o pérdida de las plantas. No utilice este producto en céspedes recién sembrados, incluidas, entre otras, búfalo, klein, banderilla y varilla. Las aplicaciones a zonas no agrícolas no son aplicables para el tratamiento de madera comercial u otras plantas que se cultiven para la venta u otro uso comercial, o para la producción comercial de semillas, o con fines de investigación. No vuelva a sembrar las áreas tratadas hasta pasadas tres semanas desde la aplicación.

6. Jardines, patios y áreas residenciales con césped (incluidos los alrededores de edificaciones rurales)


Brush Killer For Large Property puede aplicarse sobre céspedes de estación fría (césped azul de Kentucky, césped azul anual, raigrás perenne, festuca alta, festucas rojas o de hoja fina y mezclas de estas especies) y sobre céspedes de estación cálida inactivo (césped bermuda híbrido inactivo, césped bermuda común inactivo y césped bahía inactivo) para el control de malezas de hoja ancha. No aplique este producto sobre césped San Agustín (incluido Floratam), agrostis ni sobre césped recién sembrado.

Retrase la aplicación de este producto a las plántulas de césped hasta después de la segunda o tercera poda. Las zonas tratadas pueden volver a sembrarse 3 semanas después de la aplicación. Si existen condiciones secas, se recomienda un riego programado o regar 24 horas antes y 24 horas después de la aplicación. Demore la poda 2 días antes y hasta 2 días después de la aplicación de este producto. Las aplicaciones otoñales mejoran el control de las plantas anuales y perennes de invierno emergentes, como ortiga mansa, la hierba gallinera, trébol y hiedra terrestre (creeping charlie). Los tratamientos localizados durante el verano pueden ser adecuados para infestaciones dispersas, o como tratamiento de seguimiento.

Tolerancia del césped: las especies de césped tolerantes que se indican en esta etiqueta pueden presentar una decoloración temporal en condiciones ambientales adversas. La mejor tolerancia se da bajo condiciones óptimas para el césped. Las condiciones ambientales adversas pueden reducir la selectividad en el césped. El daño puede ocurrir bajo condiciones marginales (como bajas temperaturas y estrés por sequía) o condiciones extremas (como altas temperaturas y alta humedad). Para evitar daños en el césped, utilícelo solo en céspedes que estén razonablemente libres de estrés, incluidas, enfermedades, insectos, exceso de calor o frío, sequía o exceso de lluvia o riego, poda inadecuada o aplicaciones inadecuadas de fertilizantes y pesticidas. No aplique este producto en general cuando las temperaturas estén por encima de los 85 °F; también se pueden producir daños con tratamientos localizados cuando las temperaturas del aire exceden los 85 °F.

Tabla 7. Malezas de hoja ancha controladas: este producto controlará o suprimirá las siguientes malezas de hoja ancha.		
Áster, brezo blanco y trébol blanco	Flores de Bach, tallo blanco y tallo rojo	Verdolaga
Gallo	Hiedra terrestre (creeping charlie)**	Ambrosia
Cadillo juancho rastrero	Senecio	Acedera roja (*acedera ovina)
Correhuela	Espiguilla	Bolsa de pastor
Mielga azafanada	Consuelda menor	Verónica
Llantén mayor	Ortiga mansa**	Euphorbia**
Llantén menor	Centidonia	Cardo
Cardo borriquero	Genizo	Trébol blanco (*trébol holandés, trébol madreselva, trébol blanco y hierba púrpura)
Bardana común	Soliva	Zanahoria silvestre**
Botón de oro rastrero**	Lepedeza común	Ajo silvestre
Anisillo	Malva común	Geranio silvestre
Hierba gatara	Hierba de San Nicolás	Lechuga silvestre
Hierba gallinera	Oreja de ratón	Mostaza silvestre
Achicoria	Mostaza	Cebolla silvestre
Cincoenrama leñosa	Ortiga	Fresa silvestre**
Trébol	Flor de diamante	Violetas silvestres**
Lengua de vaca rizada	Oxalis (*acedera amarilla y acedera rastrera)	Milenrama
Diente de león	Alquimila	Cohete amarillo
Flor de día	Persicaria mayor	
Ortiga muerta	Hierba de la pimienta	
Lengua de vaca	Cochinilla	
Hinojo de perro	Manzanilla silvestre	
Falso diente de león (*zarza moteada y zarza común)	Llantén	
Enredadera de campo	Hiedra venenosa	
(*campanilla y centella asiática)	Roble venenoso	
Margarita del campo	Abrojo**	
(*margarita rastrera)	Cudweed púrpura	
* Sinónimos.		
** Utilice el método de aplicación de tratamiento localizado para mejorar el rendimiento al controlar o suprimir estas malezas. Es posible que se requiera más de una aplicación para lograr un control completo.		

6.1 Dosis de aplicación general



La dosis de aplicación general para céspedes de estación fría (césped azul de Kentucky, césped azul anual, raigrás perenne, festuca alta, festucas rojas o de hoja fina y mezclas de estas especies) es de 2.4 a 3.0 onzas líquidas por cada 1000 pies cuadrados. No aplique este producto sobre césped agrostis ni sobre césped recién sembrado. Consulte la tabla 8 para conocer la dosis típica de mezcla de pulverización.

La dosis de aplicación general para céspedes de estación cálida inactivo (césped bermuda híbrido inactivo, césped bermuda común inactivo y césped bahía inactivo) es de 1.5 a 1.66 onzas líquidas. por cada 1000 pies cuadrados. No aplique este producto sobre césped San Agustín (incluido Floratam) ni sobre césped recién sembrado. Consulte la tabla 9 para conocer la dosis típica de mezcla de pulverización.

Las opciones de equipo de pulverización incluyen pulverizadores remolcados con barra pulverizadora o barra rociadora. Para calibrar el equipo, consulte al fabricante o revise el manual del pulverizador para conocer los ajustes de velocidad y presión necesarios para alcanzar un volumen objetivo de 1 galón por cada 1000 pies cuadrados.

Tabla 8 Dosis de aplicación general para céspedes de estación fría (césped azul de Kentucky, césped azul anual, raigrás perenne, festuca alta, festucas rojas o de hoja fina y mezclas de estas especies).	
Zona a pulverizar y dosis de disolución	
Dosis de aplicación	Dosis por galón La zona de cobertura por galón de solución mezclada es 1000 pies cuadrados
Dosis baja	2.4 onzas líquidas por galón de agua
Dosis alta	3.0 onzas líquidas por galón de agua
El pulverizador debe calibrarse para aplicar 1 galón de solución pulverizada por cada 1000 pies cuadrados. Consulte al fabricante o revise el manual del pulverizador para conocer los ajustes de velocidad y presión necesarios para alcanzar un volumen objetivo.	

Tabla 9 Dosis de aplicación general para céspedes de estación fría (césped bermuda híbrido inactivo, césped bermuda común inactivo y césped bahía inactivo. No aplique este producto sobre césped San Agustín [incluido Floratam], agrostis ni sobre césped recién sembrado).	
Zona a pulverizar y dosis de disolución	
Dosis de aplicación	Dosis por galón La zona de cobertura por galón de solución mezclada es 1000 pies cuadrados
Dosis baja	1.5 onzas líquidas por galón de agua
Dosis alta	1.66 onzas líquidas por galón de agua
El pulverizador debe calibrarse para aplicar 1 galón de solución pulverizada por cada 1000 pies cuadrados. Comuníquese con el fabricante del pulverizador o revise el manual del pulverizador para conocer los ajustes de velocidad y presión necesarios para alcanzar el volumen objetivo. Césped inactivo: este producto puede aplicarse en césped bermuda totalmente inactivo y césped bahía totalmente inactivo. No aplique este producto en céspedes de estaciones cálidas durante el reverdecer primaveral o en otoño durante el período de transición entre el crecimiento activo y el letargo.	

6.2 Dosis de tratamiento localizado



La dosis de tratamiento localizado para céspedes de estación fría (césped azul de Kentucky, césped azul anual, raigrás perenne, festuca alta, festucas rojas o de hoja fina y mezclas de estas especies) es de 3.0 onzas líquidas por galón de agua y por cada 1000 pies cuadrados. No aplique este producto sobre césped agrostis ni sobre césped recién sembrado.

La dosis de tratamiento localizado para céspedes de estación cálida inactivo (césped bermuda híbrido inactivo, césped bermuda común inactivo y césped bahía inactivo) es de 1.5 a 1.66 onzas líquidas por galón de agua y por cada 1000 pies cuadrados. No aplique este producto sobre césped San Agustín (incluido Floratam) ni sobre césped recién sembrado.

Pulverice hasta que las hojas estén completamente mojadas, pero sin que goteen. Ajuste la boquilla del pulverizador a un rociado grueso (baja presión, gotas grandes). Las opciones de equipos de pulverización incluyen pulverizadores de tanque, pulverizadores a presión manual, pulverizadores manuales de bombeo, pulverizadores de mochila y pulverizadores para tratamientos localizados. No realice tratamientos localizados con pulverizadores de manguera.

6.3 Dosis máxima de aplicación

Jardines, patios y áreas residenciales con césped: no aplique más de 8 pintas de producto por acre (3.0 onzas líquidas de producto por cada 1000 pies cuadrados) y aplicación. El número máximo de aplicaciones por año es dos. La dosis estacional máxima es de 16 pintas de producto por acre (o 6.0 onzas líquidas de producto por 1000 pies cuadrados) y temporal.

7. Gestión de la deriva de la pulverización

Una variedad de factores, incluso las condiciones climáticas (como el sentido y velocidad del viento, temperatura, humedad relativa) y el método de aplicación en el suelo, afectan la deriva del pesticida. La persona encargada de la aplicación deberá evaluar todos los factores y efectuar los ajustes que correspondan al aplicar este producto.

Tamaño de gotas

Cuando se aplican pulverizaciones que contienen 2,4-D como único ingrediente activo, o cuando se aplican pulverizaciones que contienen 2,4-D mezclado con ingredientes activos que necesitan una pulverización gruesa o superior, aplique solamente como una pulverización gruesa o superior (norma 572 de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Agrícolas y Biológicos [ASAE, por sus siglas en inglés]). o con un volumen con diámetro mediano de 385 micrones o superior, en el caso de boquillas atomizadoras giratorias.

Al aplicar pulverizaciones que contengan 2,4-D mezclado con otros ingredientes activos que necesitan una pulverización media o más fina, aplique solamente como una pulverización media o superior (norma 572 de la ASAE) o un diámetro medio de volumen de 300 micrones o superior para boquillas atomizadoras giratorias.

Velocidad del viento

No aplique el producto si la velocidad del viento es mayor que 15 millas/h. Aplique este producto únicamente si el sentido del viento favorece que se deposite sobre el objetivo y no hay zonas sensibles (incluidos, entre otros, cuerpos de agua, hábitats conocidos de especies que no se desea afectar, cultivos que no son el objetivo) a menos de 250 pies de distancia con viento a favor. Si aplica una pulverización media, deje una franja sin pulverizar en el borde a favor del viento del campo tratado.

Inversiones de temperatura

Si se aplica con vientos de menos de 3 millas/h, la persona encargada de la aplicación deberá determinar si: a) existen condiciones de inversión de temperatura, o b) si existen condiciones atmosféricas estables a la altura de las boquillas o debajo de ésta. No aplique el producto en zonas de inversión de temperatura o condiciones atmosféricas estables.

Plantas susceptibles

No aplique en circunstancias en las que pueda producirse una deriva de la pulverización sobre alimentos, forrajes u otras plantas que podrían sufrir daños, o que sus cultivos podrían dejar de ser aptos para la

venta, uso o consumo. Los cultivos susceptibles incluyen, entre otros, algodón, quimbombó, flores, uvas (en etapa de crecimiento), árboles frutales (foliaje), soya (etapa vegetativa), plantas ornamentales, girasoles, tomates, frijoles y otros vegetales, o tabaco. Pequeñas cantidades de deriva que podrían no ser visibles pueden dañar plantas de hoja ancha susceptibles.

Otros requisitos estatales y locales

Las personas que apliquen el producto deberán respetar todos los requisitos de deriva de pesticidas estatales y locales referentes a la aplicación de herbicidas 2,4-D. En los estados que tengan reglamentos más estrictos, es obligatorio respetarlos.

Equipo

A todo el equipo para aplicaciones terrestres se le debe dar mantenimiento y calibrarse de forma adecuada mediante portadoras o unidades sustitutas apropiadas. Requisitos adicionales para aplicación con barra de pulverización terrestre: No lo aplique con una altura de boquillas superior a los 4 pies por encima del dosel vegetal.

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

No contamine el agua, los alimentos o los piensos mediante el almacenamiento y la disposición.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacenar en el recipiente original en un lugar cerrado e inaccesible a niños o mascotas. Evite que se congele.

DISPOSICIÓN DEL PESTICIDA: Los residuos de pesticidas son muy peligrosos. La disposición inadecuada del exceso de pesticida, de la mezcla de pulverización o del agua de enjuague constituye una infracción de la legislación federal. Si estos residuos no pueden disponerse siguiendo las instrucciones de la etiqueta, póngase en contacto con la Agencia Estatal de Control de Pesticidas o Medioambiental, o con el Representante de Residuos Peligrosos de la Oficina Regional de la EPA más cercana para que le brinden orientación.

MANIPULACIÓN DEL RECIPIENTE: Envase no reutilizable. No reutilice ni rellene este envase. Realice un triple enjuague o enjuague a presión el envase (o equivalente) inmediatamente después de vaciarlo. Luego ofrézcalo para reciclaje, si está disponible, o perforélo y deséchelo en un vertedero sanitario o por incineración, o quémelo si las autoridades estatales y locales lo permiten. Si lo quema, manténgase alejado del humo.

Realice un triple enjuague de la siguiente manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla y deje escurrir durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Llene el recipiente a 1/4 de su capacidad con agua y vuelva a taparlo. Agite durante 10 segundos. Vierta el agua de enjuague en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla o almacene el agua de enjuague para su uso o eliminación posterior. Deje escurrir durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Repita este procedimiento dos veces más.

O

Enjuague a presión de la siguiente manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla y continúe drenando durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Mantenga el recipiente boca abajo sobre el equipo de aplicación o el tanque de mezcla o recoja el agua de enjuague para su uso o eliminación posterior. Inserte la boquilla de enjuague a presión en el lateral del recipiente y enjuague a aproximadamente 40 libras por pulgada cuadrada (PSI, por sus siglas en inglés) durante al menos 30 segundos. Deje escurrir durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear.

GARANTÍA LIMITADA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

PARA UTILIZAR SOLO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, EL FABRICANTE NO OFRECE NI PRETENDE OFRECER GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUE SE NIEGAN EXPRESAMENTE POR EL PRESENTE. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES RESULTANTES DEL USO O MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. Si estos términos no son aceptables, devuelva este producto sin abrir inmediatamente al punto de compra y se le reembolsará el precio de compra en su totalidad. Los términos de esta DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA no pueden modificarse mediante declaraciones ni acuerdos, escritos o verbales, en el punto de venta o en cualquier otro lugar.



ATENCIÓN: Este producto puede exponerlo a dietanolamina, sustancia reconocida por el Estado de California por ser cancerígena. Para ver más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

El logotipo de Gordon® es una marca comercial registrada de PBI-Gordon Corporation.

232/10-2025 AP062221
EPA REG. NO. 2217-950



MANUFACTURED BY
PBI/GORDON CORPORATION
P.O. BOX 860350
SHAWNEE, KANSAS 66286
www.GordonsUSA.com

ATENCIÓN: Esta etiqueta de espécimen se proporciona únicamente para uso informativo. Este producto puede no estar disponible aún para la venta en su estado o área. La información que aparece en esta etiqueta puede diferir de la que aparece en la etiqueta del producto que esté utilizando. Siga siempre las instrucciones de uso y las precauciones que figuran en la etiqueta del producto que esté usando.