

Glufosinato

Grupo

10

Herbicida

Finale[®] XL F-VM

Herbicide

Para el control no selectivo de posemergencia en paisajes industriales, producción de árboles y sitios donde es necesario controlar la vegetación invasiva

Ingrediente activo:

glufosinato de amonio* 24.50%**

Otros ingredientes: 75.50%

Total: 100.00%

*N.º CAS 77182-82-2

**Equivalente a 2.34 libras de ingrediente activo por galón estadounidense, formulado como concentrado soluble

N.º de reg. de EPA 7969-464

N.º de est. de EPA

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

WARNING/AVISO

Si no entiende la etiqueta, pida a alguien que se la explique detalladamente.

Lea toda la etiqueta para ver la información completa sobre **primeros auxilios, declaraciones de precaución, instrucciones de uso, condiciones de venta y garantía**, y las restricciones específicas del estado en cuanto a cultivo o sitio de uso.

En caso de una emergencia que ponga en peligro la vida o la propiedad y que involucre a este producto, llame en cualquier momento del día o de la noche al 1-800-832-4357 (HELP).

Contenido neto:

BASF Agricultural Solutions US LLC
2 TW Alexander Drive
Research Triangle Park, NC 27713

 **BASF**
We create chemistry

PRIMEROS AUXILIOS

Si entra en contacto con los ojos	• Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. • Si usa lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos; luego continúe enjuagándose los ojos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.
Si cae en la piel	• Quítese la ropa contaminada. • Enjuáguese inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.
Si se ingiere	• Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento. • Si la persona afectada puede tragar, pídale que beba a sorbos un vaso de agua. • NO induzca el vómito a menos que así lo indique el centro de control de envenenamientos o el médico. • NO administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

NÚMERO DE LA LÍNEA DIRECTA

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede ponerse en contacto con BASF Agricultural Solutions US LLC (de aquí en adelante, referida como "BASF") para pedir información sobre el tratamiento médico de emergencia: 1-800-832-4357 (HELP).

NOTA AL MÉDICO: Si se ingiere este producto, se debe hacer una intubación endotraqueal y un lavado gástrico lo antes posible, seguido de la administración de carbón vegetal y sulfato sódico. Además, llame de inmediato al 1-800-832-4357 (HELP) para obtener información adicional.

Declaraciones de precaución

Riesgos para los seres humanos y animales domésticos

AVISO. Causa lesiones importantes en los ojos, pero pasajeras. Dañino si se absorbe por la piel. Dañino si se ingiere. **NO** permita que caiga en los ojos, la piel o la ropa. El contacto prolongado o frecuentemente repetido con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Lávese con abundante agua y jabón luego de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o ir al baño. Quítese y lave la ropa contaminada antes de reutilizarla.

Equipo de protección personal

Los aplicadores y todas las personas que manipulen el producto deben utilizar:

- Camisa de manga larga y pantalones largos
- Guantes resistentes a productos químicos
- Zapatos y calcetines
- Protección para los ojos (gafas de protección, mascarilla protectora de cara o lentes de seguridad)

Deseche la ropa u otros materiales absorbentes que hayan sido empapados o muy contaminados con el concentrado de este producto. **NO** vuelva a utilizarlos. Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y el mantenimiento del equipo de protección personal. En caso de no existir dichas instrucciones de lavado, utilice detergente y agua caliente. Lave el equipo de protección personal aparte y manténgalo separado de otras prendas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

Los usuarios deben:

- Quitarse inmediatamente la ropa/equipo de protección personal si el pesticida penetra o ingresa a los mismos. Luego, lavarse muy bien y ponerse ropa limpia.
- Quitarse el equipo de protección personal inmediatamente después de manipular este producto. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Tan pronto sea posible, lavarse muy bien y ponerse ropa limpia.

Riesgos para el medio ambiente

NO lo aplique directamente a cuerpos de agua, en áreas donde haya aguas superficiales, o en áreas intermareales que se encuentren bajo el nivel de altura máxima promedio del agua. **NO** contamine cuerpos de agua cuando disponga de las aguas de lavado de equipo o aguas de enjuague. El glufosinato de amonio y su degradado tienen las propiedades y características asociadas con las sustancias químicas detectadas en aguas subterráneas. Este producto se puede filtrar a aguas subterráneas si es utilizado en áreas donde el suelo es permeable, especialmente en donde la tabla de agua está cercana a la superficie.

NOTIFICACIÓN SOBRE POLINIZADORES. Este producto contiene un herbicida. Siga todas las instrucciones y precauciones de la etiqueta para minimizar la posible exposición fuera de la zona objetivo y evitar efectos en plantas no objetivo cercanas al sitio de tratamiento que pueden servir como hábitat o alimento a los polinizadores.

Instrucciones de uso

Es una violación de la ley federal utilizar este producto de manera inconsistente con lo indicado en su etiqueta. Esta etiqueta debe estar en posesión del usuario durante la aplicación del producto.

NO aplique este producto de forma que pueda entrar en contacto con trabajadores u otras personas, ya sea de forma directa o mediante la deriva. Solo se permite la presencia en el área del personal a cargo de la manipulación del producto durante su aplicación, con la protección adecuada. Para obtener información acerca de los requisitos específicos de su estado o localidad, consulte a la agencia responsable de la regulación de pesticidas.

El herbicida Finale® XL F-VM no es apto para la venta, distribución ni uso en los condados de Nassau y Suffolk, estado de Nueva York.

REQUISITOS PARA USO AGRÍCOLA

Use este producto según lo indicado en la etiqueta y en cumplimiento con el Estándar para la Protección del Trabajador (40 CFR parte 170 de EE. UU.). Dicho estándar contiene los requisitos de protección para trabajadores agrícolas en granjas, bosques, invernaderos y viveros, y para los manipuladores de pesticidas agrícolas. Contiene los requisitos de capacitación, descontaminación, notificación y asistencia ante emergencias. También contiene instrucciones y excepciones específicas relativas a las declaraciones de esta etiqueta sobre el uso de equipo de protección personal y los intervalos de acceso restringido. Los requisitos indicados en este recuadro se aplican solamente a los usos de este producto cubiertos por el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola (EE. UU.).

NO entre a las áreas tratadas ni permita el ingreso de trabajadores a ellas durante el intervalo de acceso restringido (REI) de **12 horas**.

El Estándar para la Protección del Trabajador (EE. UU.) permite usar el equipo de protección personal exigido para el acceso anticipado a las áreas tratadas cuando ello implica el contacto con cualquier cosa que se haya tratado, como plantas, suelo o agua. Dicho equipo consiste en:

- Overol
- Guantes resistentes a productos químicos
- Zapatos y calcetines
- Protección para los ojos (gafas de protección, mascarilla protectora de cara o lentes de seguridad)

REQUISITOS DE USO NO AGRÍCOLA

Los requisitos en este recuadro corresponden a los usos de este producto que NO están dentro del alcance del Estándar para la Protección del Trabajador para pesticidas agrícolas (40 CFR parte 170 de EE. UU.). Dicho estándar se aplica cuando este producto se utiliza para cultivar plantas agrícolas en granjas, bosques, viveros o invernaderos. Las aplicaciones del producto para recortes y bordeados, zonas industriales, recreativas y públicas, y granjas no entran en el ámbito de aplicación del Estándar para la Protección del Trabajador.

NO ingrese a las zonas tratadas sin ropa de protección hasta que se haya secado el rociado.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

NO contamine el agua, los comestibles ni el alimento para animales al almacenar o desechar este producto. Se prohíbe desechar el producto al aire libre.

Almacenamiento de pesticidas

NO lo use ni almacene cerca de una fuente de calor o de llamas abiertas. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente y dentro de un lugar fresco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento no debe superar los 125 °F (52 °C). Si la temperatura de almacenamiento del herbicida **Finale® XL F-VM** a granel es inferior a 32 °F (0 °C), el material no debe bombearse hasta que su temperatura supere los 32 °F (0 °C). Proteja el producto de la luz solar directa.

(continúa)

ALMACENAMIENTO Y DESECHO (continúa)

Desecho de pesticidas

Los residuos resultantes del uso de este producto pueden desecharse en el lugar o en un centro aprobado para la eliminación de desechos. La eliminación inadecuada de pesticida sobrante, mezcla de aplicación o aguas de enjuague del lavado del equipo es una violación a la ley federal (EE. UU.). Si estos residuos no se pueden eliminar de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, comuníquese con el organismo regulador de pesticidas de su localidad o con el representante de Residuos Peligrosos en la oficina regional de la EPA más cercana para pedir información al respecto.

Manejo del envase

Envase no rellenable. NO reutilice ni rellene este envase.

Enjuague el envase tres veces o a presión (o su equivalente) de inmediato al vaciarlo; luego ofrézcalo para su reciclaje, si está disponible, o para reacondicionarlo, si corresponde, o perforélo y deséchelo en un área adecuada para desechos sanitarios o mediante otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales.

Enjuague tres veces los envases suficientemente pequeños como para agitarlos (con capacidad ≤ 5 galones [≤ 19 l]) de esta manera: Vacíe el contenido restante en el

equipo de aplicación o en un tanque de mezclar y drene durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Llene una cuarta parte del envase con agua y vuélvalo a tapar. Agítelo durante 10 segundos. Vierta la solución de enjuague en el equipo de aplicación o un tanque de mezclar, o almacene la solución de enjuague para su uso o eliminación posterior. Drene durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Repita este procedimiento dos veces más.

Enjuague tres veces los envases que sean demasiado grandes como para agitarlos (capacidad > 5 galones [> 19 l]) de esta manera: Vacíe el resto del contenido en el

equipo de aplicación o en un tanque de mezclar. Llene una cuarta parte del envase con agua. Vuelva a colocar los tapones y apriételos. Inclíne el envase hasta dejarlo de lado y ruédelo hacia atrás y hacia adelante, asegurándose de que dé por lo menos una vuelta completa. Haga esto durante 30 segundos. Enderece el envase sobre su extremo e inclínelo hacia atrás y hacia adelante varias veces. Vuelque el envase sobre el otro extremo e inclínelo hacia atrás y hacia adelante varias veces. Vacíe la solución de enjuague en el equipo de aplicación o un tanque de mezclar, o almacene la solución de enjuague para su uso o eliminación posterior. Repita este procedimiento dos veces más.

Enjuague a presión de esta manera: Vacíe lo que reste del contenido en el equipo de aplicación o en un tanque de mezclar y siga drenando durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Sostenga el envase hacia abajo sobre el equipo de aplicación o tanque de mezclar, o recolecte la solución de enjuague para usarla o desecharla posteriormente. Inserte la boquilla de enjuague a presión por un lado del envase y enjuague aproximadamente a 40 psi por lo menos durante 30 segundos. Drene durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear.

(continúa)

ALMACENAMIENTO Y DESECHO (continúa)

Manejo del envase (continúa)

Envase rellenable. Rellene este envase solo con pesticida. **NO** vuelva a utilizar el envase para otra finalidad. El triple enjuague del envase antes de desecharlo es responsabilidad de la persona que lo desecha. La limpieza del envase antes de rellenarlo es responsabilidad de quien lo rellena.

Haga el triple enjuague de esta manera: Para limpiar el envase antes de desecharlo, vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o el tanque de mezclar. Llene aproximadamente un 10% del envase con agua. Agítelo enérgicamente o haga recircular el agua con la bomba durante 2 minutos. Vierta o bombee el agua del enjuague dentro del equipo de aplicación o sistema de recolección de agua de enjuague. Repita este procedimiento de enjuague dos veces más.

Cuando se haya vaciado el envase, vuelva a ponerle la tapa y selle todas las aberturas efectuadas durante el uso; devuelva el envase al punto de compra o al lugar designado para ello. Este envase puede llenarse únicamente con un producto pesticida. Antes de rellenar el envase, inspecciónelo atentamente para detectar daños como grietas, punciones, abrasiones y desgastes de roscas o dispositivos de cierre. Antes de rellenar y de transportar el envase, verifique si hay fugas. **NO** transporte este recipiente si está dañado o tiene fugas. Si el envase está dañado, tiene fugas o es obsoleto, y no se devuelve al punto de compra o al lugar designado para ello, enjuague tres veces el envase vacío y ofrézcalo para su reciclaje, si está disponible, o deséchelo en cumplimiento de las normas estatales y locales.

En caso de emergencia

En caso de que este producto se derrame a gran escala, llame a:

- CHEMTREC 1-800-424-9300
- BASF 1-800-832-4357 (HELP)

En caso de emergencia médica con respecto a este producto, llame a:

- Su médico local para obtener tratamiento de inmediato
- Su centro de control de envenenamientos (hospital) local
- BASF 1-800-832-4357 (HELP)

Pasos a seguir si se produce un derrame o escape de material:

- Rodee y contenga el derrame con material inerte (arena, tierra, etc.) y transfiera el material de contención líquido y sólido a contenedores separados para su desecho.
- Quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón las zonas afectadas de la piel.
- Lave la ropa antes de volver a utilizarla.
- Mantenga el derrame alejado de sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua abiertos.

Sitios de uso

El herbicida **Finale® XL F-VM** puede aplicarse para el control de malezas emergentes en los siguientes lugares de uso; para más detalles, consulte la sección **Instrucciones específicas para el sitio de uso**:

- Zonas de pasto nativo
- Paisajes industriales
- Áreas de producción de coníferas y árboles de madera dura, viveros y plantaciones
- Manejo de la vegetación en zonas no agrícolas

Información del producto

Finale XL F-VM es un herbicida posemergente de amplio espectro que contiene el ingrediente activo glufosinato de amonio. **Finale XL F-VM** es un concentrado soluble en agua que se aplica como rociado foliar para controlar las malezas anuales y perennes de hoja ancha emergentes, así como las gramíneas y las juncias. **Finale XL F-VM** también controla muchas malezas invasoras y nocivas terrestres y costeras; también controla o suprime ciertas especies leñosas (matorrales, árboles y enredaderas), como las coníferas. **Finale XL F-VM** no es selectivo y daña gravemente o mata la vegetación verde con la que entra en contacto el rociado.

Modo de acción

El glufosinato de amonio, ingrediente activo del **Finale XL F-VM**, es un herbicida del **Grupo 10** y un potente inhibidor de la glutamina sintetasa.

Manejo de la resistencia a los herbicidas

Cualquier población de malezas puede contener o desarrollar plantas naturalmente resistentes a este producto. Las especies de malezas con biotipos resistentes pueden llegar a dominar la población si este herbicida se utiliza repetidamente en la misma zona o en años sucesivos como método principal de control de las especies objetivo. Se deben seguir estrategias adecuadas de manejo de la resistencia.

Para retrasar la resistencia a los herbicidas considere:

- Evitar el uso consecutivo de **Finale XL F-VM** u otros productos que contengan glufosinato en la misma especie de malezas a lo largo del tiempo.
- Utilizar mezclas en tanque o premezclas con herbicidas de diferentes grupos de sitios de acción objetivo, siempre y cuando los productos involucrados estén registrados para el mismo uso, tengan diferentes sitios de acción y ambos sean eficaces en la concentración de mezcla en tanque o premezcla sobre las malezas en cuestión.
- Basar el uso de herbicidas en un programa completo de control integrado de plagas que incluya métodos de cultivo y mecánicos para el control de malezas.
- Supervisar las poblaciones de malezas tratadas para detectar la pérdida de eficacia en el campo y controlar las evasiones con herbicidas alternativos eficaces o métodos mecánicos.
- Identificar las malezas presentes en la zona mediante prospección e historial de la zona y comprender su biología. El programa de control de malezas debe tener en cuenta todas las malezas presentes.
- Explorar las zonas antes de la aplicación para identificar las malezas presentes y su fase de crecimiento, y determinar si será eficaz la aplicación prevista.
- Explorar las zonas después de la aplicación para verificar la eficacia del tratamiento.

- Las malezas presuntamente resistentes a los herbicidas pueden identificarse por los siguientes indicadores:
 1. La falta de control de una especie de maleza normalmente controlada por el herbicida con la dosis aplicada, especialmente si se logra el control en malezas adyacentes;
 2. Una sección extendida de plantas no controladas de una especie en particular; y
 3. Plantas supervivientes mezcladas con individuos controlados de la misma especie.
- Si se sospecha de resistencia, trate las evasiones con un herbicida que tenga un modo de acción diferente o utilice métodos sin productos químicos para eliminar las evasiones, en la medida que sea factible, con el objetivo de evitar la producción adicional de semillas.
- Para obtener orientación adicional sobre el manejo de la resistencia a los pesticidas o sobre el manejo integrado de plagas para ciertas zonas o malezas específicas, comuníquese con su especialista de extensión agrícola local o su asesor certificado en cultivos.
- Informe todas las ocasiones en que este producto no haya desempeñado su función contra una especie de maleza en particular o notifique sobre una presunta resistencia a su especialista de extensión agrícola local, asesor certificado en cultivos, representante de BASF o proveedor de herbicida **Finale® XL F-VM**.

Instrucciones de aplicación

- Aplique **Finale XL F-VM** al follaje de malezas emergentes y especies leñosas (matorrales).
- Aplique **Finale XL F-VM** en una sola aplicación o en aplicaciones secuenciales.
- Para obtener los mejores resultados, aplique **Finale XL F-VM** bajo temperaturas cálidas, alta humedad y luz solar intensa.
- El control de las malezas puede reducirse cuando la aplicación se hace en presencia de rocío denso, niebla y neblina o lluvia, o cuando el producto se aplica a malezas sometidas a estrés debido a condiciones ambientales como sequía, temperaturas frías (inferiores a 50 °F/10 °C) o períodos prolongados de nubosidad.
- Aplique una concentración mayor de **Finale XL F-VM** para los tamaños de planta mencionados (véase la tabla **Concentraciones de uso**) cuando la cubierta vegetal sea densa o cuando las malezas crezcan bajo condiciones de estrés o temperaturas frescas (inferiores a 50 °F/10 °C).
- **Finale XL F-VM** es resistente a la lluvia entre 30 minutos y 4 horas después de la aplicación, dependiendo de las especies de malezas, la concentración de la aplicación y las condiciones ambientales.
- En condiciones de crecimiento activo, los síntomas de la aplicación de **Finale XL F-VM** en el material vegetal tratado aparecen entre 2 y 4 días después de la aplicación.
- El rebrote puede ocurrir bajo ciertas condiciones, como el estado de crecimiento de la maleza al momento de la aplicación, el uso de una concentración inferior a la especificada en la etiqueta o las condiciones ambientales.
- Las plantas se pueden trasplantar con seguridad a las zonas tratadas con **Finale XL F-VM** después de que se haya secado el rociado.
- **Finale XL F-VM** puede aplicarse con equipo aéreo o terrestre.

Métodos y equipos de aplicación

Utilice y configure el equipo de aplicación para el volumen de rociado y distribución exacta y uniforme de las microgotas de rociado sobre el área tratada, evitando así la deriva del rociado hacia zonas que no sean parte del objetivo. Mantenga la agitación continua durante el rociado con un sistema de agitación mecánica o por derivación. Evite los traslapes que aumenten las concentraciones por encima de las concentraciones de uso indicadas en la etiqueta.

Para obtener los mejores resultados, aplique **Finale XL F-VM** en volúmenes de rociado que garanticen una cobertura uniforme y completa de la vegetación objetivo.

Limpie bien el aspersor después de cada uso.

Aplicación terrestre

- **Aspersión al voleo, en banda o con barra.** Aplique **Finale XL F-VM** en un mínimo de 15 galones de agua por acre con una presión de aspersión no superior a la requerida para lograr la cobertura completa de las plantas objetivo.
- **Aspersión dirigida o en puntos localizados.** Aplique **Finale XL F-VM** con mochila, bomba o aspersor hidráulico a las malezas u otro follaje indeseable con la finalidad de rociar hasta mojar. Asegure una cobertura uniforme y completa, pero evite aplicar hasta el punto de escorrentía.
- **Recortes y bordeados.** Cuando rocíe **Finale XL F-VM** junto a plantas deseables, utilice un escudo de cartón, madera contrachapada o chapa metálica para evitar que el rociado entre en contacto con el follaje de las plantas deseables.
- **Recorte lateral.** Dirija la solución de rociado de **Finale XL F-VM** para cubrir completamente (rociar hasta mojar) solamente la parte de la planta que se desea controlar.
- **Aspersión al voleo para el control de matorrales.** Aplique **Finale XL F-VM** con equipo terrestre a un volumen de rociado según la altura y densidad del matorral (vea los párrafos siguientes).
 - Aplicación a matorrales de bajo volumen:** Aplique de 20 a 50 galones por acre cuando la altura del matorral sea menor de 6 pies y la cobertura del matorral sea inferior al 60% de la superficie.
 - Aplicación a matorrales de alto volumen:** Aplique de 50 a 100 galones por acre cuando rocíe vegetación de densidad media a alta.
- **Tratamientos de plantas individuales.** Aplique **Finale XL F-VM** utilizando un método de aplicación foliar selectivo dirigido a plantas individuales (por ejemplo, especies de malezas herbáceas o leñosas). El volumen de rociado de la aplicación debe ajustarse a la altura y densidad de la vegetación objetivo para asegurar una cobertura completa y uniforme de la planta objetivo. Pueden ser necesarios mayores volúmenes de rociado para la vegetación más alta o densa. Aplique tratamientos de plantas individuales con equipo de mochila o pistola hidráulica. Moje selectivamente todo el follaje de la planta objetivo, empezando por la parte superior de la planta y cubriendo todos los lados, pero **NO** empape la vegetación objetivo hasta el punto de que la solución de rociado se escurra. Para obtener los mejores resultados, aplique los tratamientos en plantas individuales con un aditivo (consulte la sección **Mezcla en tanque con otros productos y aditivos** para obtener más detalles).

Aplicación aérea

- **Aspersión al voleo.** Aplique el herbicida **Finale® XL F-VM** con un mínimo de 15 galones de agua por acre. El volumen de rociado por acre se determina mediante el equipo utilizado a fin de asegurar una cobertura completa de la vegetación objetivo.
- **Solo se debe aplicar con helicóptero.** Aplique **Finale XL F-VM** con un mínimo de 15 galones de agua por acre. El volumen de rociado por acre se determina según la altura y densidad de la vegetación objetivo y el equipo utilizado. Puede utilizarse un dispositivo o sistema de control de deriva cuando se aplique en áreas cercanas a plantas deseables (susceptibles).

Mitigación obligatoria de la deriva del rociado

Aplicaciones aéreas

- **NO** libere el rociado a una altura superior a 10 pies (3 m) por encima del follaje del cultivo, a menos que se necesite una altura superior de aplicación por la seguridad del piloto.
- La longitud de la barra de aspersión no debe exceder el 75% de la envergadura del ala ni el 90% del diámetro de la pala del rotor.
- Los aplicadores deben seleccionar boquillas que produzcan un tamaño mediano a grueso de microgota de aspersión (ASABE S572.1).
- Los aplicadores deben usar 1/2 hilera de desplazamiento contra el viento en el borde del campo a favor del viento.
- **NO** lo aplique cuando las velocidades del viento superen las 10 millas por hora en el sitio de aplicación.
- **NO** aplique el producto durante inversiones térmicas.

Aplicaciones terrestres

- Aplique con la boquilla a la altura recomendada por el fabricante, pero a no más de 4 pies (1.2 m) por encima del suelo o del follaje vegetal, a menos que el equipo de aplicación requiera otra cosa.
- Los aplicadores deben seleccionar boquillas que produzcan un tamaño mediano a grueso de microgota de aspersión (ASABE S572.1).
- **NO** lo aplique cuando las velocidades del viento superen las 10 millas por hora (16 km/h) en el sitio de aplicación.
- **NO** aplique el producto durante inversiones térmicas.

Advertencia sobre la deriva del producto

El aplicador es responsable de evitar la deriva del rociado fuera del sitio. Tenga en cuenta los lugares cercanos no objetivo y las condiciones ambientales.

Importancia del tamaño de la microgota

Una manera eficaz de reducir el potencial de deriva es aplicar microgotas grandes. Utilice las microgotas más grandes que brinden control de las plagas objetivo. Aunque aplicar microgotas más grandes reducirá la deriva del rociado, la posibilidad de deriva será mayor si las aplicaciones se hacen de manera incorrecta o bajo condiciones ambientales desfavorables.

Cómo controlar el tamaño de la microgota - Barra terrestre

Volumen. Aumentar el volumen del rociado para que se produzcan gotas más grandes reducirá su deriva. Utilice el mayor volumen de rociado que resulte práctico para la aplicación. Si se necesita un mayor volumen de rociado, considere utilizar una boquilla con caudal más alto.

Presión. Utilice la presión de rociado más baja recomendada para la boquilla con el fin de producir el volumen de rociado y el tamaño de microgota adecuados al objetivo.

Boquilla de aspersión. Utilice un tipo de boquilla diseñado para la aplicación prevista. Considere utilizar boquillas diseñadas para reducir la deriva.

Cómo controlar el tamaño de la microgota - Aplicación aérea

Ajuste las boquillas. Siga las recomendaciones de los fabricantes de las boquillas para configurarlas. En general, para reducir las gotas finas, oriente las boquillas en paralelo con la corriente de aire en el vuelo.

Altura de la barra - Barra terrestre

Utilice la altura más baja de la barra compatible con las boquillas de aspersión para lograr una cobertura completa y uniforme. La barra debe mantenerse a nivel con el follaje vegetal y tener un rebote mínimo.

Altura de liberación - Aplicación aérea

Las mayores alturas de liberación del rociado aumentarán el potencial de deriva.

Temperatura y humedad

Al aplicar el producto bajo condiciones cálidas y secas, utilice gotas de mayor tamaño para reducir los efectos de la evaporación.

Inversión térmica

El potencial de deriva es elevado durante inversiones térmicas. Las inversiones térmicas se caracterizan por el aumento de la temperatura con la altura y son comunes en las noches con nubosidad limitada y poco o nada de viento. La presencia de una inversión puede identificarse por la niebla sobre el suelo o por el movimiento de humo de una fuente terrestre o un generador de humo de aeronave. El humo que se acumula y se desplaza lateralmente en una nube concentrada (bajo condiciones de poco viento) indica una inversión, mientras que el humo que sube y se disipa rápidamente indica una buena mezcla de aire vertical. Evite hacer aplicaciones durante inversiones térmicas.

Viento

Por lo general, el potencial de deriva aumenta con la velocidad del viento. Evite hacer aplicaciones en condiciones de viento en ráfagas. Los aplicadores deben familiarizarse con los patrones del viento locales y del terreno que podrían afectar la deriva del rociado.

Aspersores con pantallas

Al colocar pantallas en la barra o en las boquillas individuales se puede reducir la deriva del rociado. Considere utilizar aspersores con pantalla. Revise que las pantallas no interfieran con el depósito uniforme del rociado sobre el área de aplicación.

Siga las restricciones para todos los usos en la etiqueta

- Se prohíbe el pastoreo de ganado en la vegetación tratada con **Finale XL F-VM** durante un año después del tratamiento.
- **NO** lo aplique directamente ni permita que la deriva entre en contacto con el tejido verde deseable, ni con la corteza verde, delgada o no callosa de la vegetación deseable.
- **NO** aplique este producto mediante ningún tipo de sistema de riego.

Sitio de uso	Método de aplicación	Concentración máxima en una sola aplicación	Concentración máxima de aplicación anual	Cantidad máxima de aplicaciones por año	Intervalo mínimo para nueva aplicación (días)
Zonas de pasto nativo, paisajes industriales, áreas de producción de coníferas y árboles de madera dura, viveros y plantaciones, control y manejo de la vegetación en zonas no agrícolas	Al voleo	82 fl oz/acre (1.5 lb de i.a./acre)	246 fl oz/acre (4.5 lb de i.a./acre)	3*	5
	Puntos localizados	3.2 fl oz por galón de aplicación (0.058 lb de i.a.)			

* Al utilizar la concentración máxima en una sola aplicación (para tratamientos en puntos localizados, **NO** haga más de 3 aplicaciones en puntos localizados [la misma zona de < 1000 sq ft] por año).

Mezcla en tanque con otros productos y aditivos

El usuario del producto es responsable de verificar que todos los productos en las mezclas estén registrados para el uso previsto. Lea y siga las restricciones y precauciones pertinentes, así como las instrucciones de uso en todas las etiquetas de los productos incluidos en el mezclado en tanque. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y las declaraciones de precaución más restrictivas de cada producto al mezclar en tanque.

El herbicida **Finale® XL F-VM** puede mezclarse en tanque o aplicarse secuencialmente con otros herbicidas registrados para usar en cualquier sitio de uso incluido en esta etiqueta. Consulte las etiquetas de los productos de mezclado en tanque para confirmar que los productos respectivos estén registrados para el uso previsto. Lea y siga las instrucciones específicas de mezcla en tanque que aparecen en esta etiqueta y en las etiquetas de los productos respectivos.

Finale XL F-VM puede mezclarse en tanque con uno o más herbicidas de preemergencia para el control residual de partes subterráneas emergentes de plantas reproductoras o semillas de malezas, así como del crecimiento vegetativo de plantas tratadas previamente.

Aditivos

La adición de un agente antiespumante no iónico puede reducir la formación de espuma, especialmente cuando se utiliza agua blanda.

Pueden utilizarse aditivos para controlar la deriva; lea y siga todas las instrucciones y precauciones especificadas en la etiqueta del aditivo para el control de la deriva.

Puede agregarse sulfato de amonio (AMS), aceite de semilla metilado (MSO) o surfactante no iónico (NIS) para aplicaciones foliares.

Para una actividad de quema óptima con **Finale XL F-VM** y para lograr un control constante de las malezas en las pautas de uso posemergente, puede utilizarse un sistema adyuvante que incluya cualquiera de los siguientes elementos:

Aditivo/Adyuvante	Concentración
AMS (apto para aspersión)	2 a 4 lb/acre
más uno de los siguientes	
Aceite de semilla metilado	1% volumen/volumen (v/v)
o bien	
Surfactante no iónico	0.25% v/v

Prueba de compatibilidad para mezclar en tanque con otros productos y aditivos

Antes de mezclar los componentes en tanque, siempre haga una prueba de compatibilidad en frasco.

1. En un frasco de vidrio transparente, agregue los componentes en el orden indicado.
2. Agregue la cantidad adecuada de herbicida en el siguiente orden: (a) producto seco autosuspensible, (b) polvo humedecible, (c) suspensiones acuosas, (d) autosuspensibles, (e) líquidos y (f) soluciones y concentrados emulsificables o líquidos. Agite o revuelva suavemente el frasco después de añadir cada elemento y mezcle bien.
3. Después de agregar todos los componentes, tape el frasco, cierre herméticamente la tapa y dele vuelta diez veces para mezclar.
4. Deje que la solución del frasco se asiente durante 15 minutos.
5. **Evalúe** la solución para determinar su homogeneidad y estabilidad. Revise si hay separación, copos grandes, precipitados, geles, una película aceitosa pesada en el frasco u otros indicios de incompatibilidad. Si los elementos de mezcla en tanque no son compatibles, **NO** utilice la mezcla en ninguna solución de rociado que podría obstruir las boquillas.

Orden de mezclado

Asegúrese de que cada componente se mezcle y suspenda completamente antes de agregar coadyuvantes al mezclado en tanque. Mantenga una agitación constante durante el mezclado y hasta finalizar el rociado.

1. Comience con el equipo calibrado y limpio.
2. Llene el tanque de rociado con agua hasta la mitad.
3. Inicie la agitación.
4. Si se mezcla el producto con un ingrediente autosuspensible o humedecible, prepare una lechada con la cantidad adecuada del producto en una pequeña cantidad de agua. Agregue la lechada al tanque de rociado.
5. Agregue sulfato de amonio (AMS) al tanque de rociado si es necesario.
6. Si se mezcla con un ingrediente líquido, agréguelo a continuación.
7. Termine de llenar el tanque de rociado con agua **antes de agregar Finale XL F-VM, ya que puede producirse espuma.**
8. Agregue **Finale XL F-VM** cuando el tanque esté lleno y continúe la agitación.
9. Si se produce espuma, utilice un **agente antiespumante** a base de silicona.

Si se deja asentar la mezcla de aplicación aunque sea por un breve lapso, se debe agitar bien el tanque para volver a suspender la mezcla antes de reanudar la aplicación. Mantenga una agitación constante durante el rociado.

Concentraciones de uso		
Tamaño de la maleza y fase de crecimiento	Concentración de herbicida Finale® XL F-VM para aplicación por aspersión al voleo (fl oz/acre)	Concentración de Finale XL F-VM para aspersión en puntos localizados (% de solución)
Malezas de < 3 pulgadas de diámetro o altura	27 a 41	0.4 a 0.6
Malezas de < 6 pulgadas de diámetro o altura, pastos en fase previa al brote	41 a 55	0.6 a 1.0
Malezas de ≥ 6 pulgadas de diámetro o altura, pastos brotados	55 a 82	1.0 a 1.25
Malezas de > 8 pulgadas de diámetro o altura	82	1.25
Matorral	27 a 82	0.4 a 1.25
Coníferas espontáneas	55	1.0

Concentración de Finale XL F-VM (fl oz/acre)	Concentración equivalente de glufosinato (lb de i.a./acre)
27	0.5
41	0.75
55	1.0
82	1.5
246	4.5

Dilución para aspersión en puntos localizados. Cantidad de **Finale XL F-VM** agregada al agua para preparar de 1 a 100 galones de solución para aspersión en puntos localizados en dosis de 0.4% a 2.5% de solución.

Porcentaje de solución deseado (v/v)	Volumen de solución para aspersión en puntos localizados				
	1 galón	10 galones	25 galones	50 galones	100 galones
	Cantidad de Finale XL F-VM				
0.4%	0.5 fl oz	5 fl oz	12.8 fl oz	0.8 cuarto de galón	0.4 galones
0.6%	0.75 fl oz	7.7 fl oz	19.2 fl oz	1.2 cuartos de galón	0.6 galones
0.8%	1.0 fl oz	10.25 fl oz	25.6 fl oz	1.6 cuartos de galón	0.8 galones
1.0%	1.25 fl oz	12.8 fl oz	32 fl oz	2 cuartos de galón	1 galón
1.25%	1.6 fl oz	16 fl oz	40 fl oz	2.5 cuartos de galón	1.25 galones
2.5%*	3.2 fl oz	32 fl oz	80 fl oz	5 cuartos de galón	2.5 galones

* Concentración de tratamiento en puntos localizados para aplicaciones de tratamiento de plantas individuales solamente.

Malezas controladas

Para el control posemergente de las malezas emergentes incluidas en las siguientes tablas, aplique **Finale XL F-VM** en las concentraciones para aplicaciones por aspersión al voleo o en puntos localizados, según el tamaño y estado de crecimiento de la maleza.

Malezas de hoja ancha controladas

Nombre común	Nombre científico
Correhuela	Convolvulus spp.
Polígono trepador o enredadera	Polygonum convolvulus
Duraznillo (mala mujer)	Solanum rostratum
Lampazo menor	Arctium minus
Hierba gallinera	Stellaria media
Trébol, blanco	Trifolium repens
Bardana común	Xanthium strumarium
Diente de león	Taraxacum officinale
Hoja del restrallo (lengua de vaca)	Rumex crispus
Cáñamo Canadá (apocino)	Apocynum cannabinum
Alfilerillo	Erodium cicutarium
Rama negra (mata negra)	Erigeron spp.
Vara de oro	Solidago spp.
Mijo de sol, de campo o maíz**	Buglossoides arvense
Ortiga mansa	Lamium amplexicaule
Cola de caballo de campo	Equisetum arvense
Estramonio	Datura stramonium
Pinillo (coquia)	Kochia scoparia
Quínoa común	Chenopodium spp.
Achicoria (lechuga silvestre)	Lactuca serriola
Malva de quesitos	Malva parviflora

(continúa)

Malezas de hoja ancha controladas (continúa)

Nombre común	Nombre científico
Pegajosa (coniza)	<i>Conyza canadensis</i>
Artemisa	<i>Artemisia vulgaris</i>
Candelaria	<i>Verbascum</i> spp.
Mostaza tanaceto (hierba de Santa Sofía)**	<i>Descurainia sophia</i>
Mostaza de campo	<i>Sinapis arvensis</i>
Ortiga	<i>Urtica</i> spp.
Hierba mora (solano)	<i>Solanum</i> spp.
Cebolla silvestre	<i>Allium canadense</i>
Carrasque de campo	<i>Thlaspi arvense</i>
Quelite, bledo rojo	<i>Amaranthus retroflexus</i>
Llantén	<i>Plantago</i> spp.
Hierba carmín	<i>Phytolacca americana</i>
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>
Altamisa	<i>Ambrosia</i> spp.
Mostacilla común	<i>Sisymbrium irio</i>
Hierba de Santa Bárbara	<i>Barbarea vulgaris</i>
Rosa silvestre**	<i>Rosa</i> spp.
Bolsa de pastor	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Poligonato de Pensilvania	<i>Polygonum pensylvanicum</i>
Lechuguilla común	<i>Sonchus oleraceus</i>
Ésula	<i>Euphorbia esula</i>
Cardo cundidor	<i>Cirsium arvense</i>
Cardo almizclero	<i>Carduus nutans</i>
Cardo ruso	<i>Salsola iberica</i>
Rábano silvestre	<i>Raphanus raphanistrum</i>
Yute chino u hoja terciopelo	<i>Abutilon theophrasti</i>
Verbena	<i>Verbena</i> spp.
Hierba del cáncer	<i>Acalypha virginica</i>
Áster de brezo	<i>Erigeron</i> spp.
Acedera	<i>Oxalis</i> spp.

Malezas del césped y juncias controladas

Nombre común	Nombre científico
Pasto bahía	<i>Paspalum notatum</i>
Cebada	<i>Hordeum</i> spp.
Zacate de agua, arroz silvestre	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Pasto bermuda o grama común**	<i>Cynodon dactylon</i>
Zacate azul, pasto de invierno	<i>Poa annua</i>
Espiguilla, pasto azul de Kentucky	<i>Poa pratensis</i>
Arabueyes, espiguilla	<i>Bromus tectorum</i>
Bromo inerme	<i>Bromus inermis</i>
Pasto alfombra	<i>Axonopus affinis</i>
Garranchuelo	<i>Digitaria</i> spp.

(continúa)

Malezas del césped y juncias controladas (continúa)

Nombre común	Nombre científico
Páspalo veloso	<i>Eriochloa acuminata</i>
Pasto miel	<i>Paspalum dilatatum</i>
Festuca	<i>Festuca</i> spp.
Mijo cola de zorro, gigante	<i>Setaria faberi</i>
Mijo cola de zorro, verde	<i>Setaria viridis</i>
Mijo cola de zorro, menor (perla)	<i>Setaria pumila</i>
Pata de gallina, zacate de guácana	<i>Eleusine indica</i>
Zacate guinea	<i>Urochloa maxima</i>
Sorgo de Alepo*	<i>Sorghum halepense</i>
Hierba hedionda	<i>Eragrostis</i> spp.
Juncia avellanada	<i>Cyperus</i> spp.
Falso mijo	<i>Panicum dichotomiflorum</i>
Zacate pará	<i>Urochloa mutica</i>
Gramma del norte	<i>Elymus repens</i>
Raigrás	<i>Lolium</i> spp.
Cardillo	<i>Cenchrus</i> spp.
Sorgo común	<i>Sorghum bicolor</i> spp. <i>arundinaceum</i>
Pasto bandera*	<i>Urochloa</i> spp.
Gitanilla	<i>Leptochloa</i> spp.
Amor seco	<i>Eragrostis cilianensis</i>
Cañota	<i>Panicum repens</i>
Pasto macho	<i>Paspalum urvillei</i>
Trigo harinero	<i>Triticum aestivum</i>
Avena silvestre	<i>Avena fatua</i>
Pasto de invierno	<i>Apera spica-venti</i>

* La concentración mínima en California para el control es de 41 fl oz por acre por aspersión o una solución al 0.6% de herbicida **Finale® XL F-VM** para aplicación en puntos localizados.

** La concentración mínima en California para el control es de 55 fl oz/acre por aspersión o una solución al 1.0% para aplicación en puntos localizados de **Finale XL F-VM** para malezas de < 6 pulgadas, y 82 fl oz/acre por aspersión o una solución al 1.25% para aplicación en puntos localizados de **Finale XL F-VM** para malezas de ≥ 6 pulgadas.

Especies suprimidas o controladas de matorrales^{1,2}

Nombre común	Nombre científico
Zarzamora	<i>Rubus</i> spp.
Cedro rojo occidental ²	<i>Thuja plicata</i>
Lila de California (ceanoto)	<i>Ceanothus integrerrimus</i>
Pino de Oregón ²	<i>Abies</i> spp.
Olmo ²	<i>Ulmus</i> spp.
Té de los Apalaches (acebo de pantano)	<i>Ilex</i> spp.
Avellano	<i>Corylus</i> spp.
Madreselva	<i>Lonicera</i> spp.

(continúa)

Especies suprimidas o controladas de matorrales^{1,2}

(continúa)

Nombre común	Nombre científico
Arándano silvestre	<i>Gaylussacia</i> spp.; <i>Vaccinium</i> spp.
Arce	<i>Acer</i> spp.
Rosa multiflora	<i>Rosa multiflora</i>
Roble ²	<i>Quercus</i> spp.
Pino ²	<i>Pinus</i> spp.
Hiedra venenosa	<i>Toxicodendron radicans</i>
Roble venenoso	<i>Toxicodendron toxicarium</i>
Cocolmea	<i>Smilax rotundifolia</i>
Zarzamora del salmón	<i>Rubus spectabilis</i>
Zumaque	<i>Rhus typhina</i>
Liquidámbar	<i>Liquidambar styraciflua</i>
Zarzamora dedal	<i>Rubus parviflorus</i>
Trompeta trepadora	<i>Campsis radicans</i>
Arce enredadera	<i>Acer circinatum</i>

¹ No apto para usarse en matorrales en California.

² **Aplique concentraciones más altas de herbicida Finale® XL F-VM:**

- para plantas leñosas difíciles de controlar, incluyendo el olmo, ciertos robles o cuando las superficies de las hojas de las plantas se hayan endurecido, o mezcle **Finale XL F-VM** en tanque con otros herbicidas registrados para el control de esas plantas leñosas.
- cuando las condiciones no son óptimas para una cobertura completa del rociado, incluso cuando el crecimiento de la maleza sea abundante o denso.

² **Aplique concentraciones más bajas de Finale XL F-VM cuando:**

- la especie objetivo sea una conífera.
- las condiciones de crecimiento de la vegetación permitan una cobertura uniforme del rociado.

Instrucciones específicas para el sitio de uso

Zonas de pasto nativo

Finale XL F-VM puede utilizarse para establecer y mantener zonas de pasto nativo y zonas naturales, incluidas zonas de manejo de fauna silvestre, aperturas para fauna silvestre, parcelas de alimentación de fauna silvestre, hábitats de fauna silvestre, zonas de restauración de hábitats y tierras de un programa de reserva de conservación federal (CRP).

Aplique **Finale XL F-VM** solamente como aplicación en puntos localizados o tratamiento de plantas individuales para el control selectivo de malezas en zonas de pasto nativo y césped no mejorado.

Paisajes industriales

Finale XL F-VM puede utilizarse para recortar (incluso lateralmente) y bordear paisajes industriales y fajas centrales ajardinadas de autopistas, intercambios de tránsito, terraplenes y zonas intermedias donde se han establecido plantas perennes. Cuando aplique el producto junto a plantas deseables, utilice un escudo de cartón, madera contrachapada u hoja de metal para evitar que el rociado entre en contacto con el follaje de las plantas deseables.

Finale XL F-VM puede aplicarse alrededor de árboles frutales y de frutos secos, enredaderas y arbustos no productivos cultivados en zonas industriales. Pueden aparecer frutos inmaduros o no comestibles y no están destinados a la cosecha ni al consumo.

Aplique **Finale XL F-VM** en posemergencia, de manera dirigida, como una aplicación por aspersión al voleo, en bandas o en puntos localizados, dirigida a las malezas emergentes, alrededor de árboles o arbustos leñosos.

NO aplique el producto sobre el follaje de vegetación deseable porque se producirán daños graves.

NO lo aplique directamente ni permita que la deriva del rociado entre en contacto con el tejido verde deseable, ni con la corteza verde, delgada o no callosa de la vegetación deseable porque se producirán daños severos.

Áreas de producción de coníferas y árboles de madera dura, viveros y plantaciones

Aplique el herbicida **Finale XL F-VM** para el control de coníferas espontáneas y otras plantas indeseables durante las operaciones de preparación del terreno antes de sembrar y establecer plantaciones de coníferas y árboles de madera dura, o como aplicación en el sotobosque por debajo de la copa de los árboles en plantaciones de coníferas y árboles de madera dura establecidos.

NO aplique **Finale XL F-VM** como aspersión al voleo sobre el follaje de los árboles deseados porque se producirán daños graves.

NO lo aplique directamente ni permita que la deriva del rociado entre en contacto con el tejido verde deseable o con la corteza verde, delgada o no callosa de árboles deseables, porque se producirán daños graves.

Aplicación para preparación del sitio. Aplique **Finale XL F-VM** por aspersión durante la preparación del terreno antes de plantar para controlar las coníferas espontáneas y otras plantas indeseables, y a fin de mejorar la neutralización con otras mezclas en tanque para la preparación del terreno. Se pueden cultivar plántulas de árboles en la zona tratada después del intervalo de acceso restringido de 12 horas.

Control de coníferas espontáneas. Para un mejor control de coníferas espontáneas, aplique **Finale XL F-VM** como aplicación foliar en primavera, verano y principios de otoño, cuando las plántulas de coníferas espontáneas estén en crecimiento activo. Las aplicaciones de mediados a finales de otoño a coníferas espontáneas cuyo crecimiento se está retardando pueden no lograr un control uniforme.

Aplicación al sotobosque en plantaciones establecidas. Aplique **Finale XL F-VM** en posemergencia dirigida, ya sea como aplicación total, en bandas o en puntos localizados, por debajo del dosel de plantaciones establecidas de coníferas o árboles de madera dura, para el control de malezas emergidas objetivo y/u otra vegetación indeseable.

Control y manejo de la vegetación en zonas no agrícolas

Aplice el herbicida **Finale® XL F-VM** para el control no selectivo de malezas y/o matorrales y/o alrededor de las siguientes zonas no agrícolas donde sea necesario controlar y/o manejar la vegetación para mantener los sitios:

Aeropuertos, aeródromos, terminales
Callejones
Campos deportivos
Zonas con suelo descubierto
Graneros
Franjas filtrantes
Playas (no apto para uso en California)
Campamentos
Canales (secos)
Cementerios
Emplazamientos comerciales, como centros comerciales, centros comerciales al aire libre y bajo techo, edificios de oficinas, plantas
Obras de construcción
Márgenes de acequias
Acequias (secas)
Autocines
Centros educativos
Zonas de granjas y ranchos (corrales, edificios y edificaciones anexas, entradas de vehículos, caminos, instalaciones, corrales, cimientos, patios de maquinaria o implementos, cortavientos, cortinas forestales, zonas sin cultivar, zonas de barbecho, zonas de escorrentía)
Cercamientos, vallas, alambradas limítrofes, cercas agrícolas
Cortafuegos, áreas de rehabilitación contra incendios
Áreas de almacenamiento de combustible
Instalaciones gubernamentales y militares, como bases, aeropuertos, polígonos de tiro (todos los tipos)
Instalaciones para almacenamiento de granos
Pacios y fosas de grava
Paisajes estructurales
Sitios, plantas y áreas industriales
Vertederos de basura
Instalaciones ganaderas
Aserraderos, patios de almacén
Plantas/sitios de fabricación
Minas (de todo tipo) y zonas de recuperación de minas
Obras municipales
Zonas naturales como parques (de cualquier jurisdicción)
Centrales nucleares
Edificios de oficinas
Zonas, carriles y lotes de estacionamiento
Senderos
Zonas pavimentadas
Ductos
Plantas/estaciones eléctricas (incluidos sitios de plantas nucleares)
Praderas
Prisiones y establecimientos penitenciarios
Terrenos de gestión privada y pública, como los terrenos de la Oficina de Manejo de Tierras, parques y bosques nacionales, terrenos y zonas de gestión pública
Estaciones o instalaciones de bombeo
Vías férreas, patios ferroviarios, cruces ferroviarios, líneas de vista ferroviaria y derechos de vía ferroviarios
Zonas recreativas y espacios abiertos, incluso áreas para acampar, parques, zonas de restauración, zonas de campamento o estacionamiento de vehículos recreativos, cotos de caza, zonas deportivas, caminos y senderos para vehículos todoterreno, zonas naturales, canchas de tenis

Refinerías
Centros vacacionales
Carreteras/costados de carreteras/autopistas, incluidas autopistas interestatales (federales, estatales, municipales y de condados), vías rápidas, autopistas de peaje, caminos de acceso, rampas de entrada/salida, plataformas, camellones, barandales, áreas de descanso y derechos de vía
Plantaciones sobre techos
Escuelas
Zonas de eliminación de aguas residuales
Aceras
Granjas productoras de césped
Parques solares
Complejos deportivos y de deportes de motor
Cobertizos y galpones
Parques de tanques (químicos, industriales, de petróleo, de agua)
Caminos, senderos y rutas de senderismo
Áreas de pastoreo con senderos rectos (solo cuando se utilicen tratamientos de plantas individuales según se describe a continuación)
Zonas de transición entre tierras altas y bajas (cuando están secas)
Edificios de servicios públicos, emplazamientos de plantas, subestaciones
Derechos de paso de servicios públicos (eléctricos, de tuberías, telefónicos)
Lotes baldíos
Pasos peatonales
Almacenes
Sitios de eliminación de desechos, terrenos baldíos
Torres de agua
Estructuras a la orilla del camino
Humedales (estacionalmente secos con áreas bajas que se inundan de manera intermitente, incluyendo planicies de inundación, deltas, marismas, pantanos y turberas, pero no aplicado sobre agua estancada)
Zonas de fauna silvestre (manejo, apertura, hábitats)
Parques eólicos, centrales eólicas

Aplice **Finale XL F-VM** como tratamiento de aspersión en banda o en puntos localizados para el control de malezas herbáceas y leñosas. Haga aplicaciones foliares en primavera, verano y a principios del otoño cuando crece activamente la vegetación no deseada. Es posible que las aplicaciones a mediados y finales del otoño en vegetación que crece lentamente no brinden un control constante.

Tratamientos de plantas individuales en áreas de pastoreo con senderos rectos. Aplice **Finale XL F-VM** únicamente como tratamiento de plantas individuales para el manejo de la vegetación en sitios no agrícolas, como senderos rectos, que atraviesan zonas utilizadas para el pastoreo de ganado. Dirija la aplicación únicamente a especies individuales indeseables de plantas herbáceas y leñosas (arbustos). Aplice **Finale XL F-VM** en concentraciones de 0.8% a 2.5% volumen/volumen.

Finale XL F-VM puede mezclarse en tanque con otros herbicidas registrados para el control de la maleza objetivo.

NO aplique como aspersión al voleo en áreas de pastoreo con senderos rectos. No hay restricciones de pastoreo donde se aplica **Finale XL F-VM** como tratamiento de plantas individuales para las especies indeseables.

Condiciones de venta y garantía

Las **Instrucciones de uso** de este producto reflejan la opinión de expertos con base en el uso y las pruebas de campo. Las instrucciones se consideran confiables si se siguen cuidadosamente. No obstante, es imposible eliminar todos los riesgos inherentes al uso de este producto. Podrían suceder daños, ineficacia u otras consecuencias inesperadas en los cultivos debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o el uso del producto de manera contraria a lo indicado en la etiqueta, todo lo cual está fuera del control de BASF Agricultural Solutions US LLC ("BASF") o el Vendedor. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el Comprador asumirá todos esos riesgos.

BASF garantiza que este producto cumple con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente apto para los propósitos mencionados en la sección **Instrucciones de uso**, sujeto a los riesgos inherentes antedichos.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE, BASF NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE APTITUD NI COMERCIALIZABILIDAD, NI OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE, EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE BASF, YA SEA POR VÍA CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O CUALQUIER OTRA, SE LIMITARÁ AL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE, BASF Y EL VENDEDOR RENUNCIAN A TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES, EJEMPLARES, ESPECIALES O INDIRECTOS RESULTANTES DEL USO O EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO.

BASF y el Vendedor ofrecen este producto, y el Comprador y el Usuario lo aceptan, sujeto a las **Condiciones de venta y Garantía** antes indicadas, las cuales pueden modificarse solamente mediante un acuerdo por escrito, firmado por un representante debidamente autorizado de BASF.

1108

***Finale** es una marca registrada de BASF.*

© 2024 BASF Agricultural Solutions US LLC
Todos los derechos reservados.

007969-00464.20241011.**NVA 2024-04-0640-0288**

Con base en: NVA 2021-04-640-0099

Reemplaza a: NVA 2023-04-0640-0022

BASF Agricultural Solutions US LLC
2 TW Alexander Drive
Research Triangle Park, NC 27713


We create chemistry