

Container label

|               |           |                  |
|---------------|-----------|------------------|
| <b>GROUPE</b> | <b>22</b> | <b>HERBICIDE</b> |
|---------------|-----------|------------------|

WinField<sup>MD</sup> Diquat 240

SOLUTION

USAGE COMMERCIAL (AGRICOLE)

Pour défaner les pommes de terre, dessécher les légumineuses à grains, les oléagineux et les légumineuses fourragères cultivées pour les semences, supprimer les mauvaises herbes dans les cultures potagères et les grandes cultures, supprimer la spargoute dans les champs d'avoine, désherber les terres non cultivées (emprises – couloirs de transport ou de services publics, aéroports, terres incultes, décharges publiques et parcs industriels).

PRINCIPE ACTIF : Ions de diquat 240 g par litre (présent sous forme de dibromure)

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

**AVERTISSEMENT**



**POISON**

**ATTENTION : IRRITANT POUR LA PEAU ET LES YEUX**

N° D'HOMOLOGATION : 35429      *LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES*

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : POUR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES  
SOINS MÉDICAUX D'URGENCE, COMPOSER LE 1 877 496-3329.

EN CAS DE DÉVERSEMENT, DE FUITE, D'INCENDIE, D'EXPOSITION OU D'ACCIDENT,  
CONTACTER CHEMTREC AU 1 800 424-9300 (24 H).

CONTENU NET : 120L, 500L, 1000L

Enregistré par :  
Winfield Solutions, LLC  
P.O. Box 64589  
St. Paul, MN 55164-0589 ~ États-Unis

Distribué par :  
WinField United Canada, ULC  
101-302 Wellman Lane  
Saskatoon, SK S7T 0J1 ~ Canada  
1-888-975-4769

AVERTISSEMENT! \*NOCIF OU FATAL SI INGÉRÉ. NOCIF SI INHALÉ; ÉVITER D'INHALER/RESPIRER LES POUSSIÈRES, LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION, ETC.

\*PROVOQUE DE GRAVES BLESSURES AUX YEUX ET DES IRRITATIONS CUTANÉES.

\*ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX, LA PEAU OU LES VÊTEMENTS.

\* NE JAMAIS TRANSFÉRER DANS D'AUTRES CONTENANTS. \* GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.

## AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

## PREMIERS SOINS

Emporter le contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**En cas d'ingestion**, appeler un centre antipoison ou un médecin **IMMÉDIATEMENT** pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec les yeux**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements**, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer **IMMÉDIATEMENT** la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'inhalation**, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

## RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

**Pour être efficace, le traitement en cas d'ingestion du produit doit être administré IMMÉDIATEMENT.** **En cas d'ingestion**, administrer une suspension adsorbante, par exemple du charbon activé (100 g pour les adultes ou 2 g/kg de poids corporel pour les enfants) ou de la bentonite (100 à 150 g pour adultes ou 2 g/kg de poids corporel pour les enfants), mélangée à un purgatif (MgSO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ou mannitol). Maintenir et surveiller quotidiennement l'équilibre hydrique et électrolytique. Envisager une hémodialyse ou une perfusion sanguine au moyen d'une colonne de charbon.

**En cas de contact avec les yeux**, administrer un traitement symptomatique à l'aide d'antibiotiques et de stéroïdes, au besoin. Les symptômes peuvent apparaître peu à peu. Des dommages graves peuvent être causés par un contact apparemment insignifiant et le rétablissement peut être retardé. La supervision médicale devrait se poursuivre jusqu'à guérison.

complète.

L'emploi d'oxygène d'appoint est contre-indiqué. Ne pas administrer d'oxygène d'appoint à moins que le patient ne développe une hypoxémie grave.

## **MISES EN GARDE**

**LE DIQUAT PEUT POSER UN RISQUE POUR LA SANTÉ SI L'ON S'Y EXPOSE À L'EXCÈS. POUR RÉDUIRE L'EXPOSITION AU PRODUIT, SE CONFORMER AUX DIRECTIVES ET AUX MISES EN GARDE.**

NE PAS mettre en contact avec la peau ou les vêtements. NE PAS mettre en contact avec les yeux. Porter une combinaison résistant aux produits chimiques au-dessus d'un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de protection, des chaussettes, des chaussures résistant aux produits chimiques et un respirateur durant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage et la réparation. Un casque protecteur résistant aux produits chimiques doit être porté lors d'une application sur frondaison. L'exposition aux pesticides se fait le plus souvent par absorption cutanée, surtout lors du mélange et du chargement du produit concentré. Pour empêcher les gouttes de liquide de couler le long du gant et sur les bras, rouler l'extrémité du bord du gant.

Les utilisateurs devraient enlever leur équipement de protection individuelle tout de suite après avoir manipulé le produit. Laver l'extérieur des gants avant de les enlever. Dès que possible, se laver soigneusement et mettre des vêtements propres. **ENLEVER IMMÉDIATEMENT LES VÊTEMENTS CONTAMINÉS.** Laver les vêtements contaminés séparément des autres vêtements avant de les porter à nouveau. Jeter les vêtements et les matières absorbantes détrempées ou fortement contaminées par le produit concentré. Ne pas les réutiliser.

Ne pas manger, boire, fumer ni appliquer des cosmétiques dans les zones où il y a un risque d'exposition à ce produit. Se laver les mains et le visage avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Ranger et laver tous les vêtements de protection séparément des vêtements de la maison.

Ne pas contaminer les aliments de consommation humaine ou animale ni les sources d'approvisionnement en eau potable ou d'irrigation, les lacs, les cours d'eau et les étangs.

NE PAS retourner ni permettre à des travailleurs de retourner dans les zones traitées dans les 24 heures suivant le traitement (toutes les utilisations agricoles). Pour toutes les autres utilisations terrestres, NE PAS retourner ni permettre à des travailleurs de retourner dans les zones traitées dans les 12 heures suivant le traitement.

## **MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES**

TOUTE DÉRIVE DE CE PRODUIT EN DEHORS DU CHAMP PEUT ENDOMMAGER LES CULTURES, PLANTATIONS BRISE-VENT, PLANTES ORNEMENTALES, PELOUSES, PÂTURAGES, ABRIS FAUNIQUE, MARÉCAGES ET AUTRES VÉGÉTAUX UTILES.

**TOXIQUE** pour les organismes aquatiques et les plantes terrestres non ciblées. Observer les

zones tampons de pulvérisation spécifiées à la section MODE D'EMPLOI.

Afin de réduire le ruissellement à partir des sites traités vers les habitats aquatiques, éviter d'appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compacté ou sur de l'argile.

Éviter d'appliquer ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues.

La contamination des habitats aquatiques par ruissellement peut être réduite par l'aménagement d'une bande de végétation filtrante entre le site traité et le bord du plan d'eau.

On peut consulter d'autres renseignements dans la section sur l'Atténuation du ruissellement du site Web Canada.ca.

### **ENTREPOSAGE**

Conserver dans le contenant d'origine hermétiquement fermé, en lieu sûr et hors de la portée des enfants. Entreposer ce produit à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

Entreposer à plus de 0°C. Si le produit s'est cristallisé parce qu'il a été entreposé à une température inférieure à cette température, le laisser se réchauffer à la température ambiante et l'agiter légèrement jusqu'à ce qu'il se reconstitue.

### **ÉLIMINATION**

Pour tout renseignement concernant l'élimination de produit non utilisé et dont on veut se départir, s'adresser au titulaire ou à l'organisme de réglementation provincial ou territorial. S'adresser au titulaire et à l'organisme de réglementation provincial ou territorial en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

### **ÉLIMINATION DES CONTENANTS RECYCLABLES :**

NE PAS utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus proche. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant vide trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant vide rincé inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale ou territoriale.

### **CONTENANTS REMPLIS PAR LE DISTRIBUTEUR OU PAR LE DÉTAILLANT À L'INTENTION DE L'UTILISATEUR :**

En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. NE PAS utiliser ce contenant à d'autres fins.



Brochure

**GROUPE 22 HERBICIDE**

WinField<sup>MD</sup> Diquat 240

SOLUTION

USAGE COMMERCIAL (AGRICOLE)

Pour défaner les pommes de terre, dessécher les légumineuses à grains, les oléagineux et les légumineuses fourragères cultivées pour les semences, supprimer les mauvaises herbes dans les cultures potagères et les grandes cultures, supprimer la spargoute dans les champs d'avoine, désherber les terres non cultivées (emprises – couloirs de transport ou de services publics, aéroports, terres incultes, décharges publiques et parcs industriels).

PRINCIPE ACTIF : Ions de diquat 240 g par litre (présent sous forme de dibromure)

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

**AVERTISSEMENT**



**POISON**

**ATTENTION : IRRITANT POUR LA PEAU ET LES YEUX**

N° D'HOMOLOGATION : 35429      *LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES*

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : POUR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES  
SOINS MÉDICAUX D'URGENCE, COMPOSER LE 1 877 496-3329.

EN CAS DE DÉVERSEMENT, DE FUITE, D'INCENDIE, D'EXPOSITION OU D'ACCIDENT,  
CONTACTER CHEMTREC AU 1 800 424-9300 (24 H).

CONTENU NET : 120L, 500L, 1000L

Enregistré par :  
Winfield Solutions, LLC  
P.O. Box 64589  
St. Paul, MN 55164-0589 ~ États-Unis

Distribué par :

WinField United Canada, ULC  
101-302 Wellman Lane  
Saskatoon, SK S7T 0J1 ~ Canada  
1-888-975-4769

**AVERTISSEMENT! \*NOCIF OU FATAL SI INGÉRÉ. NOCIF SI INHALÉ; ÉVITER D'INHALER/RESPIRER LES POUSSIÈRES, LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION, ETC. \*PROVOQUE DE GRAVES BLESSURES AUX YEUX ET DES IRRITATIONS CUTANÉES.**

**\*ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX, LA PEAU OU LES VÊTEMENTS.  
\* NE JAMAIS TRANSFÉRER DANS D'AUTRES CONTENANTS. \* GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.**

### **AVIS À L'UTILISATEUR**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

### **PREMIERS SOINS**

Emporter le contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**En cas d'ingestion**, appeler un centre antipoison ou un médecin **IMMÉDIATEMENT** pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec les yeux**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements**, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer **IMMÉDIATEMENT** la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'inhalation**, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

### **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

**Pour être efficace, le traitement en cas d'ingestion du produit doit être administrer IMMÉDIATEMENT.** **En cas d'ingestion**, administrer une suspension adsorbante, par exemple du charbon activé (100 g pour les adultes ou 2 g/kg de poids corporel pour les enfants) ou de la bentonite (100 à 150 g pour adultes ou 2 g/kg de poids corporel pour les enfants), mélangée à un purgatif (MgSO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ou mannitol). Maintenir et surveiller quotidiennement l'équilibre hydrique et électrolytique. Envisager une hémodialyse ou une perfusion sanguine au moyen d'une colonne de charbon.

**En cas de contact avec les yeux**, administrer un traitement symptomatique à l'aide d'antibiotiques et de stéroïdes, au besoin. Les symptômes peuvent apparaître peu à peu. Des dommages graves peuvent être causés par un contact apparemment insignifiant et le rétablissement peut être retardé. La supervision médicale devrait se poursuivre jusqu'à guérison complète.

L'emploi d'oxygène d'appoint est contre-indiqué. Ne pas administrer d'oxygène d'appoint à moins que le patient ne développe une hypoxémie grave.

## **MISES EN GARDE**

**LE DIQUAT PEUT POSER UN RISQUE POUR LA SANTÉ SI L'ON S'Y EXPOSE À L'EXCÈS. POUR RÉDUIRE L'EXPOSITION AU PRODUIT, SE CONFORMER AUX DIRECTIVES ET AUX MISES EN GARDE.**

NE PAS mettre en contact avec la peau ou les vêtements. NE PAS mettre en contact avec les yeux. Porter une combinaison résistant aux produits chimiques au-dessus d'un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de protection, des chaussettes, des chaussures résistant aux produits chimiques et un respirateur durant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage et la réparation. Un casque protecteur résistant aux produits chimiques doit être porté lors d'une application sur frondaison. L'exposition aux pesticides se fait le plus souvent par absorption cutanée, surtout lors du mélange et du chargement du produit concentré. Pour empêcher les gouttes de liquide de couler le long du gant et sur les bras, rouler l'extrémité du bord du gant.

Les utilisateurs devraient enlever leur équipement de protection individuelle tout de suite après avoir manipulé le produit. Laver l'extérieur des gants avant de les enlever. Dès que possible, se laver soigneusement et mettre des vêtements propres. **ENLEVER IMMÉDIATEMENT LES VÊTEMENTS CONTAMINÉS.** Laver les vêtements contaminés séparément des autres vêtements avant de les porter à nouveau. Jeter les vêtements et les matières absorbantes détrempées ou fortement contaminées par le produit concentré. Ne pas les réutiliser.

Ne pas manger, boire, fumer ni appliquer des cosmétiques dans les zones où il y a un risque d'exposition à ce produit. Se laver les mains et le visage avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Ranger et laver tous les vêtements de protection séparément des vêtements de la maison.

Ne pas contaminer les aliments de consommation humaine ou animale ni les sources d'approvisionnement en eau potable ou d'irrigation, les lacs, les cours d'eau et les étangs.

NE PAS retourner ni permettre à des travailleurs de retourner dans les zones traitées dans les 24 heures suivant le traitement (toutes les utilisations agricoles). Pour toutes les autres utilisations terrestres, NE PAS retourner ni permettre à des travailleurs de retourner dans les zones traitées dans les 12 heures suivant le traitement.

## **MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES**

TOUTE DÉRIVE DE CE PRODUIT EN DEHORS DU CHAMP PEUT ENDOMMAGER LES CULTURES, PLANTATIONS BRISE-VENT, PLANTES ORNEMENTALES, PELOUSES, PÂTURAGES, ABRIS FAUNIQUE, MARÉCAGES ET AUTRES VÉGÉTAUX UTILES. **TOXIQUE** pour les organismes aquatiques et les plantes terrestres non ciblées. Observer les zones tampons de pulvérisation spécifiées à la section MODE D'EMPLOI.

Afin de réduire le ruissellement à partir des sites traités vers les habitats aquatiques, éviter d'appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compacté ou sur de l'argile.

Éviter d'appliquer ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues.

La contamination des habitats aquatiques par ruissellement peut être réduite par l'aménagement d'une bande de végétation filtrante entre le site traité et le bord du plan d'eau.

On peut consulter d'autres renseignements dans la section sur l'Atténuation du ruissellement du site Web Canada.ca.

## **ENTREPOSAGE**

Conserver dans le contenant d'origine hermétiquement fermé, en lieu sûr et hors de la portée des enfants. Entreposer ce produit à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

Entreposer à plus de 0°C. Si le produit s'est cristallisé parce qu'il a été entreposé à une température inférieure à cette température, le laisser se réchauffer à la température ambiante et l'agiter légèrement jusqu'à ce qu'il se reconstitue.

## **ÉLIMINATION**

Pour tout renseignement concernant l'élimination de produit non utilisé et dont on veut se départir, s'adresser au titulaire ou à l'organisme de réglementation provincial ou territorial. S'adresser au titulaire et à l'organisme de réglementation provincial ou territorial en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

## **ÉLIMINATION DES RECYCLABLES :**

NE PAS utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus proche. Avant d'aller y porter le contenant:

1. Rincer le contenant vide trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant vide rincé inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale ou territoriale.

## **CONTENANTS REMPLIS PAR LE DISTRIBUTEUR OU PAR LE DÉTAILLANT À L'INTENTION DE L'UTILISATEUR**

En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. NE PAS utiliser ce contenant à d'autres fins.

## RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

L'Herbicide WinField Diquat 240 est un herbicide non volatil à action rapide. Il est inactivé au contact du sol et n'a donc aucun effet résiduel. Son effet herbicide varie selon l'espèce de mauvaise herbe; plusieurs applications peuvent être requises contre certaines mauvaises herbes vivaces. Habituellement, une seule application suffit pour détruire les mauvaises herbes annuelles.

L'Herbicide WinField Diquat 240 n'a aucun effet sur la germination des graines des cultures dont on prévoit vendre les semences.

L'Herbicide WinField Diquat 240 s'applique facilement au moyen d'un pulvérisateur à volume faible ou élevé. Les appareils aériens à volume très faible ou ultra faible, comme les buses à atomiseurs rotatoires telles que MICRONAIR, ne sont pas recommandés. Pour un résultat optimal, utiliser des buses à jet plat ou à jet conique creux. Toujours utiliser le volume d'eau recommandé. Il est essentiel de couvrir complètement le feuillage. NE PAS UTILISER DE BRUMISATEURS.

L'Herbicide WinField Diquat 240 est rapidement absorbé par les plantes, et la pluie qui tombe peu après l'application ne diminue pas l'efficacité du traitement. L'EFFICACITÉ DU TRAITEMENT PEUT ÊTRE AMÉLIORÉE SI L'APPLICATION SE FAIT PAR TEMPS NUAGEUX OU JUSTE AVANT OU PENDANT LA NOIRCEUR.

Utiliser de l'eau propre (non trouble) pour la pulvérisation d'Herbicide WinField Diquat 240. Les eaux boueuses diminuent l'efficacité d'Herbicide WinField Diquat 240.

L'UTILISATEUR DOIT ÊTRE CONSCIENT QUE CE PRODUIT ACCÉLÈRE LE DESSÈCHEMENT NATUREL DES CULTURES. EN CAS D'INTEMPÉRIES (PLUIE ABONDANTE, GRÊLE OU GRAND VENT), LES DOMMAGES AUX CULTURES POURRAIENT ÊTRE AGGRAVÉS. NOTEZ QUE CERTAINES CULTURES SONT PLUS FRAGILES QUE D'AUTRES.

Les résidus de récolte (fanés de pois, tiges de luzerne) peuvent être utilisés comme aliment pour le bétail.

## RÉCOLTE

L'utilisation d'Herbicide WinField Diquat 240 facilite le moissonnage-battage direct de plusieurs grandes cultures, y compris les lentilles, les pois, le canola, la moutarde et les légumineuses. Les producteurs qui désirent mettre une culture desséchée en andains doivent attendre que la culture soit suffisamment sèche pour permettre le ramassage et le battage immédiatement après l'andainage. Le fait de retarder le battage d'une culture desséchée après l'andainage peut augmenter l'éclatement et la perte de graines.

La plupart des cultures peuvent normalement être récoltées de 4 à 10 jours après le dessèchement. Par contre, des intempéries comme une pluie abondante, de basses températures et une forte humidité peuvent ralentir le dessèchement des plantes et favoriser le maintien d'une humidité élevée dans les graines, ce qui peut nécessiter le report du début de la récolte à plus de 10 jours après le traitement. Lorsque de telles conditions sont présentes après l'usage d'Herbicide WinField Diquat 240, commencer à récolter lorsque la végétation est sèche et que l'humidité des

graines permet une récolte efficace. Pour réduire les pertes de rendement et de qualité, récolter la culture desséchée aussitôt que l'humidité des graines convient pour la récolte.

## **NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR APRÈS L'USAGE**

Il importe de nettoyer à fond l'équipement après la pulvérisation. Utiliser un agent mouillant (par exemple AGRAL® 90 à raison de 60 mL par 100 L d'eau ou LI 700 à raison de 100 mL par 100 L d'eau), vidanger et pulvériser, puis rincer à fond avec de l'eau propre. Dans la mesure du possible, remplir l'équipement d'eau propre et laisser reposer pendant la nuit. Vider la cuve avant de l'entreposer ou de l'utiliser pour d'autres substances.

## **MODE D'EMPLOI**

Puisque ce produit n'est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les systèmes aquatiques, **NE PAS** l'utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatique.

**NE PAS** contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets.

Consulter le tableau suivant pour un sommaire des taux, des volumes et du stade de croissance pour les applications terrestre et aérienne d'Herbicide WinField Diquat 240. Le tableau fournit des renseignements opérationnels. Pour de plus amples renseignements avant le traitement, consulter la section CULTURES - REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES. On peut faire l'application terrestre au moyen de tout pulvérisateur à rampe ordinaire.

N'utiliser le produit que lorsque le risque de dérive vers des secteurs d'habitation et d'activité humaine, comme des maisons, des chalets, des écoles et des parcs, est minime. Tenir compte des conditions météorologiques (p. ex. vitesse et direction du vent, inversion de température), de l'équipement de pulvérisation et du réglage du pulvérisateur au moment du traitement.

Pour les applications aériennes, les préposés au mélange et au chargement doivent utiliser des systèmes en circuit fermé.

Application par pulvérisateur agricole: NE PAS appliquer lorsque la vitesse du vent est inférieure à 1 km/heure. Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales. NE PAS appliquer avec des pulvérisations plus fines que le calibre moyen de la classification de l'American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) S572 (572.1 à 572.3). La hauteur de la rampe doit être de 60 cm ou moins au-dessus de la culture ou du sol.

Application par aéronef à pilotage conventionnel: NE PAS appliquer lorsque la vitesse du vent est inférieure à 1 km/heure. Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales. Les conditions suggérées pour effectuer une bonne application aérienne sont une **température** de moins de 25°C, une **humidité** supérieure à 50 %. NE PAS appliquer lorsque la vitesse du **vent** est supérieure à 9km/h à la hauteur de vol sur le site de l'application. NE PAS appliquer avec des pulvérisations plus fines que le calibre moyen de la classification de l'American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) S572 (572.1 à 572.3). Pour éviter la dérive du brouillard de pulvérisation, utiliser des buses à jet plat ou à jet conique creux à une pression se situant entre 150 et 200 kPa, orientées vers l'arrière à un angle de 150 à 180°. Réduire la dérive

causée par les turbulences créées en bout d'aile de l'aéronef. L'espacement des buses le long de la rampe d'aspersion NE DOIT PAS dépasser 65 % de l'envergure des ailes ou du rotor.

Dans le cas de l'application dans des emprises, aucune zone tampon de pulvérisation n'est requise pour protéger les habitats terrestres sensibles. Toutefois, il faut recourir à la meilleure stratégie d'application possible pour réduire la dérive hors cible, en tenant compte des conditions météorologiques (par exemple la direction du vent ou un vent faible) et de l'équipement de pulvérisation (par exemple tailles de gouttelettes plus grossières, réduire la hauteur de pulvérisation au-dessus du couvert végétal). Les préposés à l'application doivent cependant respecter les zones tampons de pulvérisation prescrites pour la protection des habitats aquatiques sensibles.

Utiliser LI 700 un agent mouillant et adjuvant, à raison de 2,5 L par 1000 L (0,25%) de mélange de pulvérisation ou AGRAL 90, des agents mouillant et adjuvant, à raison de 1 L pour 1000 L de mélange de pulvérisation, à moins d'indication contraire.

BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI.

### **Zones tampons de pulvérisation**

Les zones tampons de pulvérisation spécifiées dans le tableau ci-dessous sont requises entre le point d'application directe et la bordure sous le vent la plus rapprochée des habitats terrestres sensibles (tels que les prairies, les zones forestières, les plantations brise-vent, les boisés, les haies, les zones riveraines et les arbustes), des habitats d'eau douce sensibles (comme les lacs, les rivières, les marécages, les étangs, les fondrières des prairies, les criques, les marais, les ruisseaux, les réservoirs et les terres humides) et les habitats estuariens/marins.

| <b>Méthode d'épandage</b> | <b>Culture</b>                                                                                                                        | <b>Zones tampons de pulvérisation (mètres) requises pour la protection d'un :</b> |                    |                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                           |                                                                                                                                       | <b>Habitat aquatique d'une profondeur de :</b>                                    |                    | <b>Habitat terrestre</b> |
|                           |                                                                                                                                       | <b>Moins de 1 m</b>                                                               | <b>Plus de 1 m</b> |                          |
| Pulvérisateur agricole    | Haricots, canola, lin, lentilles, moutarde, pois, tournesol, légumineuses fourragères cultivées pour les semences, lupins blancs doux | 5                                                                                 | 3                  | 3                        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                   |             |     |     |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|
|          | Légumes et grandes cultures, fruits, zones non cultivées (y compris emprises <sup>1</sup> – corridors de transport ou de services publics, aéroports, terres incultes, décharges publiques et parcs industriels), pommes de terre |             | 10  | 5   | 5   |
| Aérienne | Haricots, légumineuses fourragères cultivées pour les semences                                                                                                                                                                    | Avion       | 150 | 80  | 90  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   | Hélicoptère | 100 | 55  | 70  |
|          | Pommes de terre                                                                                                                                                                                                                   | Avion       | 200 | 100 | 100 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                   | Hélicoptère | 125 | 65  | 80  |

<sup>1</sup> Lorsqu'on pulvérise ce produit dans une emprise, des zones tampons de pulvérisation pour la protection des habitats terrestres ne sont pas requises.

Lorsque les mélanges en cuve sont permis, consulter l'étiquette des produits d'association et respecter la zone tampon de pulvérisation la plus grande (la plus restrictive) indiquée pour chacun des produits utilisés dans le mélange en cuve, puis appliquer en utilisant le calibre de gouttelettes le plus gros (selon la classification de l'ASABE) parmi ceux indiqués sur l'étiquette des produits d'association.

Il est possible de modifier les zones tampons de pulvérisation associées à ce produit pour les technologies d'application conventionnelles selon les conditions météorologiques et la configuration du matériel de pulvérisation en utilisant le calculateur de zone tampon de pulvérisation dans la section Atténuation de la dérive du site Web Canada.ca.

## APPLICATION TERRESTRE

On peut faire une application terrestre au moyen de tout pulvérisateur ordinaire à rampe.

## APPLICATION AÉRIENNE

### Instructions génériques concernant l'épandage aérien - Mode d'emploi

Épandre seulement avec un équipement aéronautique réglé et étalonné pour être utilisé dans les

conditions atmosphériques de la région et selon les taux et directives figurant sur l'étiquette.

Les précautions à prendre ainsi que les directives et taux d'épandage à respecter sont propres au produit. Lire attentivement l'étiquette et s'assurer de bien la comprendre avant d'ouvrir le contenant. N'utiliser que les quantités spécifiées pour l'épandage aérien qui sont indiquées sur l'étiquette. Si, pour l'utilisation prévue du produit, aucun taux d'épandage aérien ne figure sur l'étiquette, on ne peut utiliser ce produit, et ce, quel que soit le type d'appareil aérien disponible.

S'assurer que l'épandage est uniforme. Afin d'éviter que le produit ne soit épandu de façon non uniforme (épandage en bandes, irrégulier ou double), utiliser des marqueurs appropriés.

### **Mises en garde concernant l'utilisation**

Épandre seulement quand les conditions météorologiques à l'endroit traité permettent une couverture complète et uniforme de la culture visée. Les conditions favorables spécifiques à l'épandage aérien décrites dans le *Guide national d'apprentissage - Application de pesticides par aéronef*, élaboré par le Comité fédéral, provincial et territorial sur la lutte antiparasitaire et les pesticides, doivent être présentes.

### **Mises en garde concernant l'opérateur antiparasitaire**

Ne pas permettre au pilote de mélanger les produits chimiques qui seront embarqués à bord de l'appareil. Il doit charger les produits chimiques pré-mélangés contenus dans un système fermé.

Il est préférable que le pilote puisse établir une communication à chaque emplacement traité au moment de l'épandage.

Le personnel au sol de même que les personnes qui s'occupent des mélanges et du chargement doivent porter une combinaison résistant aux produits chimiques par-dessus un chandail à manches longues et un pantalon long, des gants et des chaussures résistant aux produits chimiques, des lunettes de protection et un appareil respiratoire pendant le mélange, le chargement, l'application du produit, et le nettoyage et l'équipement. Porter un chapeau résistant aux produits chimiques pendant l'application par voie aérienne.

Tout le personnel doit se laver les mains et le visage à grande eau avant de manger et de boire. Les vêtements protecteurs, le cockpit de l'avion et les cabines des véhicules doivent être décontaminés régulièrement.

### **Mises en garde propres au produit**

Lire attentivement l'étiquette au complet et bien la comprendre avant d'ouvrir le contenant. Pour toute question, appeler WinField United Canada, ULC en composant le 1-888-975-4769. Pour obtenir des conseils techniques, contacter le distributeur ou un conseiller agricole provincial ou territorial.

L'épandage de ce produit spécifique doit répondre aux exigences suivantes.

Volume : Appliquer la quantité spécifiée avec un volume de pulvérisation minimal de 45 litres par

hectare pour un aéronef à pilotage conventionnel.

Consulter la section sur les MISE EN GARDE ENVIRONNEMENTALES pour de plus amples renseignements.

### **Mélange en cuve**

Ce produit peut être mélangé avec un engrais, un supplément ou avec des produits antiparasitaires homologués, dont les étiquettes permettent aussi les mélanges en cuve, à la condition que la totalité de chaque étiquette, y compris le mode d'emploi, les mises en garde, les restrictions, les précautions relatives à l'environnement et les zones tampons de pulvérisation, soit suivie pour chaque produit. Lorsque les renseignements inscrits sur les étiquettes des produits d'association divergent, il faut suivre le mode d'emploi le plus restrictif. Ne pas effectuer de mélanges en cuve avec des produits contenant le même principe actif, à moins que ces produits soient recommandés spécifiquement sur cette étiquette.

Dans certains cas, le mélange de produits antiparasitaires en cuve peut entraîner une diminution de l'efficacité antiparasitaire ou une augmentation des dommages à la culture hôte. L'utilisateur devrait communiquer avec WinField United Canada, ULC au 1-888-975-4769 pour demander des renseignements avant d'appliquer tout mélange en cuve qui n'est pas recommandé spécifiquement sur cette étiquette.

## **MISE EN GARDE ENVIRONNEMENTALES**

L'APPLICATION AÉRIENNE N'EST PAS RECOMMANDÉE DANS LES ENDROITS OÙ LES MARÉCAGES, OU TOUT AUTRE HABITAT FAUNIQUE, PEUVENT ÊTRE TOUCHÉS PAR LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. ÉVITER QUE LE PRODUIT NE DÉRIVE VERS DES CHAMPS CULTIVÉS ADJACENTS OU DES ABRIS FAUNIQUE. ÉVITER LA PULVÉRISATION HORS CIBLE OU LA DÉRIVE VERS LES TERRAINS MARÉCAGEUX.

ÉTANT DONNÉ QUE L'HERBICIDE PEUT NUIRE AUX HABITATS DES OISEAUX MIGRATEURS ET D'AUTRES ESPÈCES SAUVAGES, NE PAS FAIRE D'APPLICATION AÉRIENNE DANS LES CHAMPS OÙ DES MARÉCAGES OU TOUT AUTRE HABITAT FAUNIQUE PEUVENT ÊTRE TOUCHÉS PAR LA PULVÉRISATION OU LA DÉRIVE, Y COMPRIS LES TERRAINS MARÉCAGEUX ET LES BORDS SECS DES TERRAINS MARÉCAGEUX DE L'OUEST DU CANADA. UTILISER UN PULVÉRISATEUR TERRESTRE ET LAISSER UNE BORDURE TAMPON DE 15 MÈTRES AUTOUR DE TOUS LES MARÉCAGES.

Appliquer lorsque les conditions météorologiques ne favorisent pas la dérive. Les conditions suggérées pour effectuer une bonne application aérienne sont une **température** de moins de 25 °C, une **humidité** supérieure à 50 % et une vitesse de **vent** de 3,5 à 9 km/h à l'altitude de vol au-dessus du site à traiter. Ne pas appliquer lorsqu'une inversion de température est possible (p. ex., en soirée lorsque de l'air chaud s'élève au-dessus de la culture ou le matin, lorsque le soleil réchauffe le sol et que l'air s'élève au-dessus du champ). Pour éviter la dérive du jet pulvérisé, utiliser des buses à jet plat ou à jet conique creux à une pression se situant entre 150 et 200 kPa, tournées vers l'arrière à un angle de 150 à 180°.

## **TABLEAU 1**

| CULTURE                                                                       | TAUX<br>(L/ha) | MÉTHODE<br>D'APPLICATION | VOLUME<br>D'APPLICATION<br>(L/ha) | ÉTAT DE LA<br>CULTURE                                                                | REMARQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grandes cultures                                                              |                |                          |                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Haricots<br>blancs et<br>rouges,<br>soja et<br>haricots<br>Adzuki             | 1,25-1,7       | Terrestre                | 225-550                           | Feuillage pleinement<br>développé, peu de<br>mauvaises herbes<br>(culture normale)   | Pulvériser lorsque 80 - 90<br>% des feuilles de haricots<br>sont tombées et au moins<br>80 % des gousses sont<br>jaunes. La coloration des<br>gousses est utilisée pour<br>déterminer le moment du<br>traitement que lorsqu'on<br>s'attend à une forte<br>repousse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                               | 1,7-2,1        | Aérienne                 | au moins 45                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                               | 1,7            | Terrestre                | 225-550                           | Population dense<br>et/ou beaucoup de<br>mauvaises herbes<br>et/ou forte repousse    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                               | 2,3            | Aérienne                 | au moins 45                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Canola                                                                        | 1,25-1,7       | Terrestre                | 225-550                           | Feuillage pleinement<br>développé, peu de<br>mauvaises herbes<br>(culture normale)   | Pulvériser lorsque 80- 90<br>% des graines ont changé<br>de couleur (vert à brun).<br>Commencer à<br>moissonner dans les 14<br>jours suivant<br>l'application.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                               | 1,7            | Aérienne                 | au moins 45                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                               | 1,7            | Terrestre                | 225-550                           | Feuillage très dense<br>et/ou beaucoup de<br>mauvaises herbes                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                               | 2,3            | Aérienne                 | au moins 45                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pois<br>chiches                                                               | 1,25-1,7       | Terrestre                | 225-550                           | Feuillage pleinement<br>développé, peu de<br>mauvaises herbes<br>(culture normale)   | Pour le type Desi, appliquer<br>au moment où l'andainage<br>début normalement, lorsque<br>la majorité des plants sont<br>jaunes, que la plupart des<br>gousses sont mûres et que les<br>graines sont passées du vert<br>au jaune ou au brun. La<br>partie supérieure de la plante<br>peut être encore verte.<br><br>Pour le type Kabuli,<br>appliquer lorsque la majorité<br>des plants et des gousses sont<br>mûrs et secs, que les graines<br>sont passées du vert au blanc<br>ou à l'ocre et qu'elles se<br>détachent des gousses. Le<br>dessèchement est moins<br>complet avec le type Kabuli<br>en raison de l'épaisseur de<br>l'enveloppe des gousses. |
|                                                                               | 1,7            | Aérienne                 | au moins 45                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                               | 1,7            | Terrestre                | 225-550                           | Population dense<br>et/ou beaucoup<br>de mauvaises<br>herbes et/ou forte<br>repousse |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                               |                |                          |                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lin (y compris<br>les variétés à<br>basse teneur en<br>acide<br>linoléinique) | 1,25-1,7       | Terrestre                | 225-550                           | Feuillage pleinement<br>développé, peu de<br>mauvaises herbes<br>(culture normale)   | Pulvériser lorsque 75 % des<br>capsules ont change de<br>couleur. Commencer à<br>récolter lorsque le lin est sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                               | 1,7            | Aérienne                 | au moins 45                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                               | 1,7            | Terrestre                | 225-550                           | Feuillage très dense<br>et/ou beaucoup de<br>mauvaises herbes                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                               | 2,3            | Aérienne                 | au moins 45                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Légumi-neuses<br>de semence<br>(luzerne, lotier,<br>trèfle rouge et           | 1,7-2,7        | Terrestre                | 225-550                           | Feuillage pleinement<br>développé et/ou<br>beaucoup de<br>mauvaises herbes           | Seulement pour la<br>production de semences.<br>Appliquer lorsque la majorité<br>des gousses sont mûres mais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                               | 1,7-2,7        | Aérienne                 | au moins 45                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                      |            |                       |                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| blanc)                               | 2,7<br>2,7 | Terrestre<br>Aérienne | 225-550<br>au moins 45 | Feuillage très dense et/ou beaucoup de mauvaises herbes et/ou avec repousse | avant qu'elles n'éclatent. Pour éviter que les gousses éclatent et perdent leurs graines, l'intervalle entre la pulvérisation et la récolte ne doit pas dépasser 7 jours.                                                   |
| Lentilles                            | 1,25-1,7   | Terrestre             | 225-550                | Feuillage pleinement développé, peu de mauvaises herbes (culture normale)   | Appliquer l'Herbicide WinField Diquat 240 au moment où l'andainage s'effectue normalement. Les gousses inférieures sont jaune brunâtre et elles font du bruit quand on les remue.                                           |
|                                      | 1,7        | Aérienne              | au moins 45            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | 1,7        | Terrestre             | 225-550                | Feuillage très dense et/ou beaucoup de mauvaises herbes                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | 2,3        | Aérienne              | au moins 45            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| Moutarde (condimentaire seulement)   | 1,25-1,7   | Terrestre             | 225-550                | Feuillage pleinement développé, peu de mauvaises herbes (culture normale)   | Pulvériser lorsque 75 % des graines ont changé de couleur (vert à brun).<br><br>Commencer à moissonner dans les 14 jours suivant le traitement.                                                                             |
|                                      | 1,7        | Aérienne              | au moins 45            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | 1,7        | Terrestre             | 225-550                | Feuillage très dense et/ou beaucoup de mauvaises herbes                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | 2,3        | Aérienne              | au moins 45            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| Avoine – pour supprimer la spargoute | 0,9        | Terrestre             | 225-335                | Spargoute moins de 8 cm de hauteur                                          | Ne pas utiliser d'agents mouillants, adjuvants ou adhésifs.<br><br>Appliquer lorsque l'avoine atteint 8-15 cm de hauteur.<br><br>NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.                                                        |
|                                      | 1,25       | Terrestre             | 225-335                | Spargoute plus de 8 cm de hauteur                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| Pois secs ou de plein champ          | 1,25-1,7   | Terrestre             | 225-550                | Feuillage pleinement développé, peu de mauvaises herbes (culture normale)   | Appliquer l'Herbicide WinField Diquat 240 lorsque la plupart des gousses inférieures sont mûres et sèches et que les graines se détachent facilement. Les grains des gousses moins mûres se brisent lorsqu'on les comprime. |
|                                      | 1,7        | Aérienne              | au moins 45            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | 1,7<br>2,3 | Terrestre<br>Aérienne | 225-550<br>au moins 45 | Feuillage très dense et/ou beaucoup de mauvaises herbes.                    |                                                                                                                                                                                                                             |

| CULTURE                    | TAUX (L/ha) | MÉTHODE D'APPLICATION | VOLUME D'APPLICATION (L/ha) | ÉTAT DE LA CULTURE                                                                    | REMARQUES                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grandes cultures</b>    |             |                       |                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pommes de terre (défanage) | 3,5         | Terrestre             | 550-1100                    | Beaucoup de fanes ou de mauvaises herbes                                              | NE PAS appliquer sur des pommes de terre affectées par la sécheresse (voir les notes supplémentaires sur le défanage des pommes de terre).<br><br>L'usage d'AGRAL 90 ou LI 700 est déconseillé pour cette culture, sauf tel qu'indiqué. |
|                            | 1,7-2,3     | Terrestre             | 550-1100                    | Peu de fanes, peu de mauvaises herbes ou beaucoup de fanes et au début de la maturité |                                                                                                                                                                                                                                         |

|                             |                          |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 1,25-2,3<br>plus<br>1,25 | Terrestre                 | 550-1100                                                                                                                                                                                | Beaucoup de fanes<br>ou peu de fanes et<br>beaucoup de<br>mauvaises herbes<br>(Est du Canada<br>seulement) | Appliquer de nouveau de 4 à 6<br>jours après la première<br>application, au temps normal<br>pour le défanage.                                                       |
|                             | 1,7-2,3<br>plus<br>1,25  | Aérienne                  | au moins 45                                                                                                                                                                             | Toutes<br>conditions des<br>parties aérienne.<br>Aucune<br>restriction<br>géographique.                    | Utiliser le taux la plus forte<br>à première application si les<br>fanés sont très denses et<br>immatures. On peut ajouter<br>un fongicide.                         |
|                             | 1,25                     | Terrestre                 | 550-1100<br>(ajouter AGRAL 90 1<br>L pour 1000 L de<br>mélange de<br>pulvérisation ou LI 700<br>2,5 L pour 1000 L de<br>mélange de<br>pulvérisation dans les<br>provinces des Prairies) | Fanes matures,<br>peu ou pas de<br>mauvaises herbes                                                        | À taux de 1,25 L, il faudra<br>peut-être plus que 10-14 jours<br>avant que le défanage ne soit<br>complet.<br><br>Ne pas utiliser taux de 1,25 L<br>en C.-B.        |
| Lupin blanc<br>doux         | 2,3                      | Terrestre                 | 225-550                                                                                                                                                                                 | Feuillage<br>pleinement<br>développé, peu de<br>mauvaises herbes<br>(culture normale)                      | Traiter lorsque les gousses<br>sont brunes et que les graines<br>internes (endosperme)<br>coupées sont jaunes.<br><br>NE PAS APPLIQUER PAR<br>VOIE AÉRIENNE.        |
| Tournesol                   | 1,25-1,7<br><br>1,7      | Terrestre<br><br>Aérienne | 225-550<br><br>au moins 45                                                                                                                                                              | Feuillage<br>pleinement<br>développé, peu de<br>mauvaises herbes<br>(culture normale)                      | Traiter lorsque les graines<br>atteignent la maturité (20- 50<br>% d'humidité dans la graine et<br>la gousse).<br>Récolter de 15 à 20 jours<br>après le traitement. |
|                             | 1,7<br><br>2,3           | Terrestre<br><br>Aérienne | 225-550<br><br>au moins 45                                                                                                                                                              | Feuillage très<br>dense et/ou<br>beaucoup de<br>mauvaises herbes                                           |                                                                                                                                                                     |
| Légumes et grandes cultures |                          |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |
| Sol rassis                  | 2,3                      | Terrestre                 | au moins 300                                                                                                                                                                            | Petites mauvaises<br>herbes (3-5 cm de<br>hauteur)                                                         | Sol rassis - Avant la levée de la<br>culture, après la levée des<br>mauvaises herbes.                                                                               |
|                             | 4,6                      | Terrestre                 | au moins 300                                                                                                                                                                            | Grandes mauvaises<br>herbes (plus de 5 cm<br>de hauteur)                                                   | Traiter les mauvaises herbes<br>levées avant ou après le semis,<br>mais 3 jours avant la levée de<br>la culture.<br><br>NE PAS APPLIQUER PAR<br>VOIE AÉRIENNE.      |
| Légumes                     |                          |                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                             |         |           |          |  |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désherbage entre les rangs                                                                                                                                  | 2,3-4,6 | Terrestre | 900-1100 |  | NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.                                                                                                                                   |
| <b>Fruits</b>                                                                                                                                               |         |           |          |  |                                                                                                                                                                       |
| Répression des graminées vivaces sous les pommiers                                                                                                          | 4,6     | Terrestre | 225-675  |  | NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.                                                                                                                                   |
| <b>Terres non cultivées (emprises – couloirs de transport ou de services publics, aéroports, terres incultes, décharges publiques et parcs industriels)</b> |         |           |          |  |                                                                                                                                                                       |
| Désherbage des terres non cultivées                                                                                                                         | 2,3-4,6 | Terrestre | 550-1100 |  | Utiliser les taux et les volumes d'eau les plus élevés si les mauvaises herbes sont très denses. Mouiller à fond le feuillage.<br>NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE. |

## CULTURES - REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES

### Haricots

#### Haricots blancs, haricots rouges, soja et haricots Adzuki

L'application terrestre permet d'utiliser une plus grande quantité d'eau et d'obtenir une meilleure couverture. On peut aussi procéder par application aérienne au moyen d'un appareil capable d'assurer une application uniforme. Pulvériser lorsque 80 à 90% des feuilles de haricots sont tombées naturellement et qu'au moins 80% des gousses sont jaunes. Les années de repousse excessive, se fier uniquement à la coloration des gousses pour déterminer le moment du traitement avec l'Herbicide WinField Diquat 240. Le dessèchement des mauvaises herbes est complet en une semaine. CE TRAITEMENT NE FAIT PAS MÛRIR LES HARICOTS ET NE DIMINUE PAS LEUR TENEUR EN EAU. Arracher les plants de haricots ou battre les haricots lorsqu'on juge qu'ils sont prêts. Souvent, on peut battre les haricots secs et les haricots Adzuki le jour même de l'arrachage, mais cela dépend de la condition des haricots.

L'Herbicide WinField Diquat 240, lorsqu'il est appliqué sur des haricots affectés par une sécheresse prolongée, procure un dessèchement plus lent et moins efficace comparativement aux applications effectuées dans des conditions de croissance normales. En présence d'un stress causé par une sécheresse prolongée avant le traitement, utiliser la plus forte taux recommandée d'Herbicide WinField Diquat 240 sur les haricots de même que le plus grand volume d'eau recommandé afin d'obtenir une efficacité optimale.

### Canola

L'Herbicide WinField Diquat 240 ne doit être utilisé que pour le canola de semence ou commercial pour faciliter la récolte des cultures versées. La vitesse à laquelle les gousses et les

tiges se dessècheront variera selon la couverture du brouillard de pulvérisation, les conditions environnementales et le stade de croissance des plants à l'application; cependant, les gousses et des tiges se dessècheront de 7 à 10 jours après l'application.

Utiliser un applicateur terrestre pour faciliter l'emploi de grands volumes d'eau et pour assurer une meilleure couverture du feuillage. On peut procéder par application aérienne au moyen d'un appareil capable d'assurer une application uniforme. Appliquer lorsque 80 à 90% des graines ont changé de couleur (du vert au brun); l'application d'Herbicide WinField Diquat 240 avant ce stade peut augmenter fortement le pourcentage de graines vertes dans l'échantillon.

Débuter la récolte dès que la culture est prête car d'importantes pertes de rendement peuvent survenir dans les champs de canola desséchés, plus particulièrement dans les variétés Argentine, en raison de la chute et de l'éclatement des gousses. La perte de rendement peut être plus importante si la récolte de la culture desséchée est retardée ou si les conditions météorologiques sont défavorables (vents forts, fortes pluies, etc.).

La germination des semences n'est pas affectée par le dessèchement provoqué par l'Herbicide WinField Diquat 240.

### **Pois chiches**

Ce traitement ne fait pas mûrir les pois chiches. Comme les andains de pois chiches sont exposés à des pertes dues au vent, on recommande de récolter la culture sur pied. Il est essentiel de traiter au moment opportun pour prévenir les pertes de rendement et de qualité dues au défanage précoce. Il faut donc bien surveiller la culture afin de déterminer le stade d'application approprié. L'application d'Herbicide WinField Diquat 240 peut fragiliser la petite tige qui relie la gousse à la plante et de ce fait entraîner une perte de gousses accrue. Le moissonnage-battage peut commencer de 4 à 7 jours après l'application. Il pourrait se révéler avantageux de récolter et d'entreposer séparément les pois chiches provenant des zones du champ dont le mûrissement a été tardif. L'utilisation du plus grand volume d'eau recommandé permet d'obtenir une couverture plus complète.

Pour le type Desi, appliquer au moment où l'andainage débute normalement, lorsque la majorité des plants sont jaunes, que la plupart des gousses sont mûres et que les graines sont passées du vert au jaune ou au brun. La partie supérieure de la plante peut être encore verte.

Pour le type Kabuli, appliquer lorsque la majorité des plants et des gousses sont mûres et secs, que les graines sont passées du vert au blanc ou à l'ocre et qu'elles se détachent des gousses. Le dessèchement est moins complet dans le type Kabuli en raison de l'épaisseur de l'enveloppe des gousses.

Utiliser un applicateur terrestre pour faciliter l'emploi de grands volumes d'eau et pour obtenir une meilleure couverture du feuillage. On peut procéder par application aérienne si l'appareil est capable d'assurer une application uniforme.

La germination des semences n'est pas affectée par le dessèchement provoqué par l'Herbicide WinField Diquat 240.

## **Lin (y compris les variétés à basse teneur en acide linoléique)**

L'Herbicide WinField Diquat 240 est un défoliant efficace qui facilite la récolte du lin (y compris les variétés à basse teneur en acide linoléique). Le dessèchement réduit le délai entre la maturité et la récolte, réduit les dommages à l'équipement de récolte, accélère la récolte, diminue l'humidité des graines et élimine le besoin d'andainage.

Appliquer lorsque 75 % des capsules ont changé de couleur (période normale de l'andainage) mais pas avant ce stade. Commencer la récolte lorsque les graines sont sèches.

Utiliser un applicateur terrestre pour faciliter l'emploi de grands volumes d'eau et pour obtenir une meilleure couverture du feuillage.

On peut procéder par application aérienne si la culture est trop dense ou si le sol trop mou pour l'emploi d'un pulvérisateur à rampe. S'assurer que l'appareil est capable d'assurer une application uniforme.

La germination des semences n'est pas affectée par le dessèchement provoqué par l'Herbicide WinField Diquat 240.

## **Fruits**

### **Répression des graminées vivaces sous les pommiers**

Voir le Tableau 1 pour les taux.

NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.

## **Légumineuses**

### **Luzerne, lotier, trèfle rouge, trèfle blanc de semence**

Pour empêcher les gousses d'éclater et de perdre leurs graines, le délai entre l'application et la récolte ne doit pas dépasser 7 jours. NOTE – 1) Le lotier affecté par une sécheresse ou une maladie peut être endommagé s'il est traité avec l'Herbicide WinField Diquat 240. 2) Ne pas utiliser l'Herbicide WinField Diquat 240 lorsqu'on a utilisé un herbicide résiduel sur les légumineuses au cours des 12 derniers mois.

Un applicateur terrestre facilite l'emploi de grands volumes d'eau et assure une meilleure couverture du feuillage. On peut procéder par application aérienne si la culture est trop dense ou si le sol est trop mou pour l'emploi d'un pulvérisateur à rampe. S'assurer que l'appareil est capable d'assurer une application uniforme.

## **Lentilles**

Appliquer l'Herbicide WinField Diquat 240 au moment où l'andainage s'effectue normalement, lorsque les gousses inférieures sont d'un jaune brunâtre et qu'elles font du bruit quand on les remue. Utiliser un applicateur terrestre pour faciliter l'emploi de grands volumes d'eau et pour

assurer une meilleure couverture du feuillage. On peut procéder par application aérienne si la culture est trop dense ou si le sol est trop mou pour l'emploi d'un pulvérisateur à rampe.

L'Herbicide WinField Diquat 240, lorsqu'il est appliqué sur des lentilles affectées par une sécheresse prolongée, la pluie, des températures fraîches et une humidité élevée provoque un dessèchement plus lent et moins efficace comparativement aux applications effectuées dans des conditions de croissance normales. Si de telles conditions sont présentes avant le traitement, utiliser la plus forte taux recommandée d'Herbicide WinField Diquat 240 sur les lentilles de même que le plus grand volume d'eau recommandé afin d'obtenir une efficacité optimale. Il faut également s'attendre à des retards pour la récolte.

### **Moutarde (condimentaire seulement)**

Appliquer lorsque 75 % des graines ont changé de couleur (du vert au brun). Ne pas appliquer lorsque la culture n'est pas mûre ou lorsqu'elle a dépassé le stade de maturité recommandé. Commencer à récolter dans les 14 jours suivant l'application. **NOTE** – Les gousses des cultures sur pied peuvent tomber et éclater lorsqu'il vente fort.

Une application terrestre permet d'utiliser une plus grande quantité d'eau et, ainsi, d'obtenir une meilleure couverture. On peut procéder par application aérienne si la culture est trop dense ou si le sol est trop mou pour l'emploi d'un pulvérisateur à rampe. Utiliser un appareil conçu pour assurer une application uniforme.

**Terres non cultivées (emprises – couloirs de transport ou de services publics, aéroports, terres incultes, décharges publiques et parcs industriels)**

### **Désherbage des terrains non cultivés**

Pour la destruction des parties aériennes des mauvaises herbes, l'Herbicide WinField Diquat 240 agit rapidement sur les mauvaises herbes et graminées quand on le pulvérise sur le feuillage. On peut mélanger l'Herbicide WinField Diquat 240 à certains stérilisants de sol pour détruire immédiatement les parties aériennes et obtenir une stérilisation prolongée. L'emploi d'Herbicide WinField Diquat 240 avec des stérilisants doit être fondé sur des essais préalables et sur les recommandations de l'étiquette de l'herbicide résiduel.

**NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.**

### **Avoine – suppression de la spargoute**

Lorsqu'on fait une application terrestre tel que recommandé dans le Tableau 1, l'Herbicide WinField Diquat 240 détruit la spargoute par contact et dessèche temporairement les feuilles d'avoine exposées. Toutefois, les plants d'avoine se rétabliront rapidement. Ne pas utiliser d'agent tensioactif.

**NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.**

### **Pois**

Ce traitement ne fait pas mûrir les pois. Comme les andains de pois chiches sont fortement exposés à des pertes dues au vent, on recommande de récolter la culture sur pied. Est essentiel de traiter au moment opportun pour prévenir les pertes de rendement dues au défanage précoce : il faut donc bien surveiller les cultures. Commencer à récolter lorsque les pois sont secs.

L'Herbicide WinField Diquat 240, lorsqu'il est appliqué sur des pois affectés par une sécheresse prolongée, procure un dessèchement plus lent et moins efficace comparativement aux applications effectuées dans des conditions de croissance normales. En présence d'un stress causé par une sécheresse prolongée avant le traitement, utiliser la plus forte taux recommandée d'Herbicide WinField Diquat 240 sur les pois de même que le plus grand volume d'eau recommandé afin d'obtenir une efficacité optimale.

Avec les variétés indéterminées, appliquer l'Herbicide WinField Diquat 240 lorsque les gousses inférieures de la plupart des plants sont mûres, sèches, transparentes et ratatinées, et lorsque les pois se détachent à l'intérieur des gousses. Les gousses du milieu doivent être quelque peu ratatinées et doivent avoir l'aspect du cuir, et les pois doivent fendre lorsqu'ils sont comprimés. Le défanage dessèche les gousses supérieures et toute partie verte de la plante, ne laissant ainsi que des pois de la plus haute qualité dans les gousses inférieures et du milieu.

Avec les variétés déterminées, appliquer l'Herbicide WinField Diquat 240 lorsque les gousses supérieures et du milieu sont quelque peu ratatinées et ont l'aspect du cuir, et lorsque les pois fendent lorsqu'ils sont comprimés. Les gousses du milieu inférieur et du bas sont mûres et sèches, transparentes et ratatinées, et les pois se détachent à l'intérieur des gousses.

Utiliser un applicateur terrestre pour faciliter l'emploi de grands volumes d'eau et pour assurer une meilleure couverture du feuillage. On peut procéder par application aérienne si la culture est trop dense ou si le sol est trop mou pour l'emploi d'un pulvérisateur à rampe. S'assurer que l'appareil est capable de fournir une application uniforme.

### **Pommes de terre – défanage**

**Il est déconseillé d'ajouter AGRAL 90 ou LI 700 à la bouillie, sauf dans les provinces des Prairies.**

L'Herbicide WinField Diquat 240 détruit efficacement les fanes des pommes de terre de semence et de table. La dessiccation du feuillage est rapide (3-4 jours), alors que la destruction des tiges est plus graduelle (10-14 jours), ce qui procure des conditions proches d'une maturation naturelle. Appliqué aux taux recommandés, l'Herbicide WinField Diquat 240 détruit aussi les mauvaises herbes présentes au moment de la récolte, qui s'en trouve ainsi facilitée et accélérée. Le fait d'arrêter la croissance des fanes des pommes de terre réduit considérablement le risque de pourriture des tubercules.

Pulvériser au moins deux semaines avant la récolte. On obtient de meilleurs résultats après la période de croissance, quand la peau est suffisamment ferme. Les résultats risquent d'être médiocres si on traite les plants en croissance active. NOTE – La croissance active des plants de pommes de terre peut continuer tard dans la saison dans une section ou dans tout le champ si la croissance a été retardée pour une raison ou pour une autre pendant la saison végétative. Ne pas appliquer l'Herbicide WinField Diquat 240 pendant des périodes de conditions climatiques

extrêmes. Ne pas appliquer l'Herbicide WinField Diquat 240 pendant une sécheresse, particulièrement quand le sol est si sec que les fanes flétrissent durant la journée. Après une sécheresse, attendre au moins trois jours après que le sol a été très bien mouillé par la pluie ou l'irrigation avant de traiter. Lorsque les conditions sont extrêmement humides, particulièrement si le sol est gorgé d'eau et que des colonies algales sont présentes dans le sol (révélant l'humidité excessive du sol), attendre que le sol s'assèche et qu'il soit dans un état s'apparentant aux conditions de récolte. Ne pas utiliser l'Herbicide WinField Diquat 240 si les fanes ont été endommagées par un rotobatteur ou tout autre équipement mécanique de ce genre. Ne pas utiliser d'agent mouillant, d'adjuvant ou d'adhésif, sauf pour le taux de 1,25 L recommandée dans les provinces des Prairies. Utiliser 1100 L/ha d'eau lorsque les fanes ou les mauvaises herbes sont très denses.

### **Lupins blancs doux**

Appliquer l'Herbicide WinField Diquat 240 une fois par saison pour défaner avant la récolte. Traiter quand les gousses sont brunes et que la graine à l'intérieur (endosperme) est jaune quand on la coupe. Attendre au moins 7 jours avant de récolter. Ne pas ajouter d'agent dispersif, mouillant ou adhésif à la solution de pulvérisation. Appliquer avec un équipement terrestre seulement. Les applications terrestres peuvent être faites avec n'importe quel type de pulvérisateur à rampe. NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.

### **Tournesol**

L'Herbicide WinField Diquat 240 est un défanant efficace qui facilite la récolte des graines de tournesol destinées à la semence, à la production d'huile et à la confiserie. Si on dispose d'un applicateur terrestre de grande hauteur, ce type d'application facilite l'emploi d'importants volumes d'eau et procure une meilleure couverture du feuillage. On peut procéder par application aérienne si la culture est trop dense ou si le sol est trop mou pour l'emploi d'un pulvérisateur à rampe. Ne pas appliquer lorsque la culture n'est pas mûre.

Récolter de 15 à 20 jours après l'application.

### **Légumes et grandes cultures**

#### **Sol rassis - Avant la levée de la culture, après la levée des mauvaises herbes**

Pour supprimer les mauvaises herbes dans les haricots (tous genres), betteraves, carottes, choux et crucifères, maïs, oignons, pois, concombres, pommes de terre, soja et navets, travailler le terrain au moins deux à quatre semaines avant le semis pour stimuler la croissance des mauvaises herbes. Semer sans retravailler le terrain, en dérangeant le moins possible le sol.

Au moyen d'un pulvérisateur terrestre, appliquer 2,3 à 4,6 L d'Herbicide WinField Diquat 240 (2,3 L pour les petites mauvaises herbes qui ont 3 à 5 cm de hauteur, et 4,6 L pour les plus grandes) dans 300 L ou plus d'eau à l'hectare pour détruire les mauvaises herbes levées avant ou après le semis, mais trois jours avant la levée de la culture.

NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.

## Légumes

### Désherbage chimique dirigé entre les rangs de légumes

Pour éliminer les mauvaises herbes entre les rangs après la levée de la culture et des mauvaises herbes, utiliser un équipement de protection et des jets adéquats de manière à protéger la culture de la solution pulvérisée.

NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.

#### AVIS À L'UTILISATEUR : LIRE CE QUI SUIT AVANT D'APPLIQUER CE PRODUIT POUR L'USAGE SPÉCIAL INDIQUÉ

Le MODE D'EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne les utilisations décrites dans cette partie de l'étiquette, a été élaboré par des personnes autres que WinField United Canada, ULC dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Dans le cas de ces utilisations, WinField United Canada, ULC n'a pas complètement évalué la performance (efficacité) et(ou) la tolérance des cultures (phytotoxicité) du produit lorsqu'il est utilisé de la façon indiquée sur l'étiquette pour l'ensemble des conditions environnementales ou des variétés végétales. Avant d'appliquer le produit à grande échelle, l'utilisateur devrait faire un essai sur une surface réduite, dans les conditions du milieu et en suivant les pratiques courantes pour confirmer que le produit se prête à une application généralisée.

#### FÉVEROLE À PETITS GRAINS

| TAUX<br>(L/ha) | MÉTHODE<br>D'APPLICATION | VOLUME<br>D'APPLICATION<br>(L/ha) | ÉTAT DE LA<br>CULTURE | REMARQUES |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|
|----------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|

|            |           |             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,25 – 1,7 | Terrestre | 225-550     | Utiliser les taux les plus fortes dans les cultures à couvert végétal dense ou fortement infestées de mauvaises herbes. | Effectuer un seul traitement pour défaner la culture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,7 – 2,3  | Aérienne  | Au moins 45 |                                                                                                                         | <p>Appliquer lorsque la majorité des plants sont mûrs et secs. Les cosses doivent être pleines, et les cosses du bas doivent être de couleur bronze ou noire.</p> <p>Pour les applications terrestres ou aériennes, utiliser AGRAL 90 comme agent mouillant et adjuvant à raison de 1 L par 1000 L de mélange à pulvériser ou LI 700 2,5 L pour 1000 L de mélange de pulvérisation.</p> <p>Respecter un intervalle avant la récolte de 4 à 10 jours. La pression du pulvérisateur doit être augmentée avec les pulvérisateurs à grand dégagement (de 90 à 100 psi) pour assurer une couverture adéquate de la partie inférieure de la tige avec l'Herbicide WinField Diquat 240. L'application terrestre facilitera l'utilisation de volumes d'eau plus élevés et assurera une couverture plus complète. L'application aérienne peut être effectuée avec un appareil adapté pour assurer une couverture uniforme de la culture. Les mauvaises herbes fanent au bout d'une semaine. CE TRAITEMENT N'AMÈNE PAS LES HARICOTS À MATURITÉ NI N'ABAISSÉ L'HUMIDITÉ DES HARICOTS. L'Herbicide WinField Diquat 240 appliqué sur des haricots subissant une sécheresse prolongée donnera un défanage plus lent et moins efficace comparativement aux traitements effectués dans des conditions de croissance normales. Si une sécheresse prolongée a lieu avant le traitement, utiliser le taux la plus élevée d'Herbicide WinField Diquat 240 homologuée pour les haricots ainsi que le volume d'eau homologué le plus élevé pour obtenir un résultat optimal. Le choix du moment du traitement est très important, car un défanage prématuré entraînera des pertes de rendement; les cultures doivent être surveillées attentivement.</p> |

### Recommandations sur la gestion de la résistance

Aux fins de la gestion de la résistance, il import de noter que l'HERBICIDE WINFIELD DIQUAT 240 est un herbicide du groupe 22. Toute population de mauvaises herbes peut renfermer ou former des plantes naturellement résistantes à l'HERBICIDE WINFIELD DIQUAT 240 et à d'autres herbicides du groupe 22. Les biotypes résistants peuvent finir par dominer au sein de la population des mauvaises herbes si ces herbicides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut aussi exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il

est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

### **Pour retarder l'acquisition d'une résistance aux herbicides :**

Dans la mesure du possible, alterner l'Herbicide WinField Diquat 240 ou les herbicides du même groupe 22 avec des herbicides qui appartiennent à d'autres groupes et qui suppriment les mêmes mauvaises herbes et ce, au cours d'une seule saison de croissance (applications séquentielles) ou entre les saisons de croissance.

Utiliser, si cet emploi est permis, des mélanges en cuve contenant des herbicides provenant d'un groupe différent. Pour ralentir l'acquisition d'une résistance, le composé du mélange le moins susceptible de créer une résistance devrait supprimer la ou les mauvaises herbes ciblées aussi efficacement que le composé du mélange le plus susceptible de créer une résistance.

Utiliser les herbicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée contre les mauvaises herbes qui privilégie le dépistage, la consultation de données antérieures sur l'utilisation des pesticides et la rotation des cultures, et qui permet l'intégration des techniques de labour (ou d'autres méthodes mécaniques de lutte), des pratiques culturales (par exemple, augmentation de la densité des semis, application d'engrais au moment propice et au moyen d'une méthode précise pour favoriser la croissance de la culture plutôt que celle des mauvaises herbes) ou biologiques (recours à des cultures ou à des variétés de végétaux qui entrent en compétition avec les mauvaises herbes) et d'autres pratiques de lutte.

Après l'application d'herbicides, surveiller les populations de mauvaises herbes traitées pour y déceler les signes éventuels de l'acquisition d'une résistance (par exemple, une des espèces de mauvaises herbes indiquées sur l'étiquette n'a pas été supprimée). En présence de signes attestant une résistance potentielle, empêcher la production des graines des mauvaises herbes sur le site touché en utilisant, dans la mesure du possible, un autre herbicide appartenant à un groupe différent. Empêcher la propagation des mauvaises herbes résistantes d'un champ à l'autre en nettoyant le matériel de labour et de récolte avant le passage dans un autre champ et en utilisant des semences non contaminées.

Faire analyser les graines de mauvaises herbes potentiellement résistantes par un laboratoire qualifié afin de confirmer leur résistance et d'opter pour un autre herbicide.

Communiquer avec les spécialistes ou les conseillers agricoles certifiés de la région pour obtenir des recommandations supplémentaires sur une culture ou un biotype de mauvaise herbe précis pour ce qui est de la gestion de la résistance aux pesticides et de la lutte intégrée contre les mauvaises herbes.

Pour obtenir davantage d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, communiquer avec WinField United Canada, ULC à 1-888-975-4769.