

AZOXISTROBINA	GRUPO 11	FUNGICIDA
DIFENOCONAZOL	GRUPO 3	FUNGICIDA



Contiene difenoconazol y azoxistrobina, los ingredientes activos utilizados en Quadris Top® SBX.

INGREDIENTES ACTIVOS:	(% por peso)
Azoxistrobina*	19.8%
Difenoconazol**	19.8%
OTROS INGREDIENTES:	60.4%
TOTAL:	100.0%

*No. CAS 131860-33-8

**No. CAS 119446-68-3

RADIUS ESQ se ha formulado como un líquido concentrado en suspensión, que contiene 1.88 lb de azoxistrobina, como ingrediente activo, y 1.88 lb de difenoconazol, como ingrediente activo, por galón (225 g de cada uno por litro).

N.º de reg. de EPA: 91234-141

MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ADVERTENCIA

Si no entiende la información de la etiqueta, pida a alguien que se la explique detalladamente.

Vea las precauciones adicionales más abajo.

PRIMEROS AUXILIOS	
En caso de ingestión:	▪ Llame inmediatamente a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para que le recomiende un tratamiento. ▪ Si la persona afectada puede tragar, pídale que beba a sorbos un vaso de agua. ▪ No induzca el vómito a menos que así lo indique el centro de control de intoxicaciones o el médico. ▪ No dé nada por la boca a una persona que esté inconsciente.
NÚMERO TELEFÓNICO DIRECTO	
Cuando llame al centro de control de intoxicaciones o al médico, o cuando vaya a recibir el tratamiento, tenga a la mano el recipiente o la etiqueta del producto. También puede llamar a SafetyCall al 1-844-685-9173 para pedir información sobre el tratamiento médico de emergencia.	

En caso de emergencia química:

derrame, fuga, incendio, exposición o accidente,
llame a CHEMTREC, de día o de noche

Dentro de los EE. UU. y Canadá: 1-800-424-9300 o +1-703-527-3887 (se aceptan llamadas por cobrar)

RADIUS ESQ™ no es fabricado ni distribuido por Syngenta Crop Protection, LLC, vendedor de Quadris Top® SBX.



PRECAUCIONES

Peligros para los seres humanos y los animales domésticos

ADVERTENCIA

Puede ser letal si se ingiere. Lávese minuciosamente con jabón y agua después de manejar el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o usar el baño.

Equipo de protección personal

Los aplicadores y todas las personas que manipulen el producto deben usar:

- Camisas de manga larga y pantalones largos
- Zapatos y calcetines
- Guantes impermeables

Deseche la ropa u otros materiales absorbentes que se hayan impregnado o contaminado masivamente con el concentrado de este producto. NO vuelva a utilizarlos.

REQUISITOS PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y el mantenimiento del equipo de protección personal. Si no existen instrucciones para la ropa lavable, lave con detergente y agua caliente. Lave el equipo de protección personal aparte y manténgalo separado de otras prendas.

CONTROLES DE INGENIERÍA

Cuando las personas que manejan el producto utilicen sistemas cerrados, cabinas confinadas o aeronaves de una manera que cumpla con los requisitos establecidos en la Norma de Protección del Trabajador (Worker Protection Standard, WPS) para pesticidas agrícolas [40 CFR 170.240 (d)(4-6)], los requisitos en cuanto a equipos de protección personal de estas personas pueden reducirse o modificarse según lo especificado en la WPS.

RECOMENDACIONES PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO

Los usuarios deben:

- Lávese las manos antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o ir al baño.
- Si el pesticida se introduce en la ropa o el equipo de protección personal, quitárselo inmediatamente. Luego, lavarse minuciosamente y ponerse ropa limpia.
- Quitarse inmediatamente el equipo de protección personal después de manipular este producto. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lavarse minuciosamente y ponerse ropa limpia lo antes posible.

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Difenoconazol es tóxico para los peces, los mamíferos y los animales invertebrados acuáticos. El acarreo y el escurrimiento de este producto en las aguas adyacentes a las áreas tratadas pueden ser peligrosos para los organismos estuarinos/marinos.

Azoxistrobina es tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos de agua dulce y estuarina/marina. Azoxistrobina puede ser persistente durante varios meses o más.

No descargue los efluentes que contengan este producto en lagos, arroyos, lagunas, estuarios, océanos u otras masas acuáticas a menos que se sigan los requisitos establecidos en un permiso de descarga de National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) y que se haya enviado una notificación por escrito a las autoridades correspondientes antes de la descarga del efluente. No descargue los efluentes que contengan este producto en sistemas de alcantarillado sin antes haber notificado a las autoridades locales encargadas de la planta de tratamiento de aguas residuales. Para guiarse, comuníquese con la compañía suministradora de agua en su zona o la oficina regional de protección ambiental.

Para usos terrestres: No lo use directamente en el agua o en áreas en las que haya agua superficial, ni en áreas intermareales que se encuentren por debajo del nivel medio de pleamar. Si este producto se filtra o escurre a aguas adyacentes a las áreas tratadas, puede representar un peligro para los organismos acuáticos. No contamine el agua cuando deseche el agua de lavado o la resultante del enjuague del equipo.

Notificación sobre el agua subterránea

Se sabe que en ciertas condiciones la azoxistrobina y un producto degradado de la azoxistrobina se lixivian a través del suelo hasta el agua subterránea como resultado del uso según la etiqueta. Este producto químico puede lixiviarse hasta el agua subterránea si se utiliza en áreas en las que el suelo es permeable, particularmente donde la capa freática es poco profunda.

Notificación sobre el agua superficial

Este producto puede afectar el agua superficial debido al escurrimiento del agua de lluvia. Esto se aplica especialmente a los suelos con drenaje deficiente y los suelos con agua subterránea a poca profundidad. Este producto se clasifica como de alto potencial para alcanzar el agua superficial por escurrimiento por varios meses o más después de su aplicación. Las barreras vegetales niveladas, bien mantenidas y situadas entre las áreas de aplicación de este producto, así como las masas de agua superficial como estanques, arroyos y manantiales reducirán la carga potencial de la azoxistrobina y un producto degradado de la azoxistrobina procedentes del agua de escurrimiento y los sedimentos. Se pueden reducir los escurrimientos de este producto evitando su aplicación 48 horas antes de que se espere que llueva o que se riegue. Notifique inmediatamente a las autoridades estatales o federales y a Atticus, LLC si observa cualquier efecto ambiental adverso debido al uso de este producto.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS

No lo mezcle ni permita que entre en contacto con agentes oxidantes, ya que puede ocurrir una reacción química peligrosa.

INSTRUCCIONES DE USO

El uso de este producto de manera incongruente con la indicada en la etiqueta constituye una infracción de la ley federal (EE. UU.).

No aplique este producto de forma que pueda entrar en contacto con los trabajadores o demás personas, de forma directa o a través de filtraciones. Solo se permite la presencia del personal a cargo de la manipulación del producto en el área durante su aplicación (con la correcta protección). Para obtener información acerca de los requisitos específicos a su estado o tribu, consulte a la agencia responsable de la regulación de pesticidas.

REQUISITOS DE USO AGRÍCOLA

Use este producto según lo indicado en la etiqueta y en cumplimiento de la Norma de Protección del Trabajador (40 CFR parte 170 de EE. UU.). Dicha norma contiene los requisitos de protección para trabajadores agrícolas en granjas, bosques, invernaderos y viveros, como así también operadores de pesticidas agrícolas. La norma contiene los requisitos sobre capacitación, descontaminación, notificación y asistencia en emergencias. Asimismo, contiene instrucciones específicas y excepciones relativas a las declaraciones de esta etiqueta sobre el uso de equipo de protección personal y el intervalo de entrada restringida. Los requisitos indicados en este recuadro se aplican solamente a los usos del producto cubiertos por la Norma de Protección del Trabajador (*Worker Protection Standard*).

No entre a las áreas tratadas ni permita la entrada de trabajadores a ellas durante el intervalo de entrada restringida de 12 horas.

La Norma de Protección del Trabajador permite usar el equipo de protección personal exigido para la entrada anticipada a las áreas tratadas cuando ello implica el contacto con cualquier cosa que se haya tratado, como plantas, suelo o agua. Dicho equipo consiste en:

- Overoles
- Guantes resistentes a productos químicos hechos de cualquier material impermeable como cloruro de polivinilo, caucho de nitrilo o caucho de butilo
- Zapatos y calcetines

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

RADIUS ESQ es un producto de amplio espectro que contiene dos fungicidas. Tiene propiedades preventivas, sistémicas y curativas, por lo cual se recomienda para el control de muchas enfermedades vegetales importantes. **RADIUS ESQ** proporciona un excelente control de enfermedades para muchas manchas de la hoja y mildiús polvorosos. **RADIUS ESQ** se aplica como aspersión foliar y puede usarse en aspersiones en bloque, alternadas o programas de mezcla en tanque con otros productos para la protección de cultivos. Todas las aplicaciones deben hacerse de acuerdo con las instrucciones de uso que se indican a continuación.

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE USO

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE ESTA ETIQUETA PUEDE SER CAUSA DE LESIONES EN LOS CULTIVOS, CONTROL DEFICIENTE DE LAS ENFERMEDADES O DEPÓSITO DE RESIDUOS ILEGALES.



ATENCIÓN

RADIUS ESQ es extremadamente fitotóxico para ciertas variedades de manzanas.

EVITE EL ACARREO DEL ROCIADO. Hay que extremar las precauciones para evitar daños en los manzanos (y en la fruta).

NO rocíe **RADIUS ESQ** donde el acarreo del rociado puede llegar a manzanos.

NO aplique por rociado cuando las condiciones favorezcan el acarreo fuera del área de aplicación. Las condiciones que pueden contribuir al acarreo incluyen la inversión térmica, la velocidad y dirección del viento, las combinaciones de boquilla y presión de los aspersores, el tamaño de la microgota de rociado, etc. Para consultar sobre pautas de prevención del acarreo del rociado en su zona, comuníquese con su agente de extensión estatal.

NO utilice equipos de aspersión que se hayan utilizado previamente para aplicar **RADIUS ESQ** para tratar manzanos. Incluso las cantidades ínfimas pueden causar una fitotoxicidad inaceptable a ciertas variedades de manzanos y manzanos silvestres.

EL APLICADOR TIENE LA RESPONSABILIDAD DE EVITAR EL ACARREO DE LA ASPERSIÓN.

INFORMACIÓN SOBRE EL USO

Aplicación: Se necesita una cobertura completa para lograr un buen control de la enfermedad. No prepare más solución de aspersión que la necesaria para la aplicación. Evite la superposición de las franjas de aspersión porque se podría dañar el cultivo.

Adyuvantes: Cuando se va a usar un adyuvante con este producto, se recomienda usar uno que cumpla las normas del programa de certificación de la Asociación de Productores y Distribuidores de Químicos (Chemical Producers and Distributors Association).

Uso de adyuvantes: Bajo ciertas condiciones climáticas (particularmente altas temperaturas), **RADIUS ESQ** en combinación con altas dosis de aditivos o adyuvantes a base de silicona o que contengan aceite (petróleo o cultivos), puede causar daños al cultivo. No superar el 0.125% de adyuvante (v/v). Para obtener más información sobre aditivos o adyuvantes, consulte a un representante de Atticus, LLC.

Una mezcla con dimetoato en el tanque puede causar daños a los cultivos.

En el caso de tomates frescos para el mercado, no utilice adyuvantes ni mezcle **RADIUS ESQ** con ningún producto concentrado emulsionable.

Eficacia: Bajo ciertas condiciones que conducen a períodos de infección prolongados, utilice otro fungicida registrado para aplicaciones adicionales si ya se ha utilizado la cantidad máxima de **RADIUS ESQ**. Si hay cepas resistentes a los fungicidas del Grupo 3 o Grupo 11 presentes, puede disminuir la eficacia para tratar ciertas enfermedades. Pueden necesitarse las dosis más altas de la gama de dosis o los intervalos de aspersión más cortos en condiciones de fuerte presión de infección, con variedades muy susceptibles, o cuando las condiciones ambientales son propicias para la enfermedad.

Manejo integrado de plagas: **RADIUS ESQ** debe integrarse en una estrategia general del manejo de enfermedades y plagas siempre que se requiera usar un fungicida. Hay que seguir las prácticas culturales que se sepa que reducen el desarrollo de la enfermedad. Consulte con sus autoridades agrícolas locales sobre estrategias adicionales para el manejo integrado de plagas en su zona. **RADIUS ESQ** puede utilizarse en los programas estatales de asesoramiento de extensión agrícola (pronóstico de enfermedades) que recomiendan el tiempo preciso de aplicación en función de los factores ambientales que favorecen el desarrollo de la enfermedad.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

AZOXISTROBINA	GRUPO	11	FUNGICIDA
DIFENOCONAZOL	GRUPO	3	FUNGICIDA

Para el manejo de la resistencia, tenga en cuenta que **RADIUS ESQ** contiene tanto azoxistrobina, un fungicida a base de estrobilurinas del Grupo 11, como difenoconazol, un fungicida a base de triazoles del Grupo 3. Cualquier población de hongos puede contener cepas naturalmente resistentes a uno o ambos ingredientes activos de **RADIUS ESQ**, así como a otros fungicidas del Grupo 11 o del Grupo 3. Con el tiempo puede producirse una pérdida gradual o total del control de la plaga si dichos fungicidas se utilizan repetidamente en los mismos campos. Deben seguirse las estrategias apropiadas de manejo de la resistencia.

Como parte de la estrategia de manejo de la resistencia:

- Aplique, como máximo, 4 aspersiones durante un ciclo de cultivo.
- No haga más de 2 aplicaciones secuenciales a menos que se indique otra cosa en la sección del cultivo.
- Rote la aplicación de **RADIUS ESQ** u otros fungicidas del Grupo 3 y del Grupo 11 dentro de una secuencia de temporada de cultivo con diferentes grupos de insecticidas que controlan los mismos patógenos.
- Use mezclas de tanque con fungicidas de un grupo diferente que sean igualmente efectivos en la plaga objetivo cuando se permita dicho uso. Utilice al menos la dosis mínima de aplicación indicada por el fabricante.
- Adopte un programa de manejo integrado de enfermedades para el uso de fungicidas que incluya exploración, que aplique información histórica relacionada con el uso de pesticidas, la rotación de cultivos y que considere la resistencia de la planta huésped, el impacto de las condiciones ambientales en el desarrollo de la enfermedad, los umbrales de la enfermedad, así como prácticas de control culturales, biológicas y otras prácticas de control químico.
- Donde sea posible, utilice modelos de predicción de enfermedades para programar eficazmente las aplicaciones de fungicidas. Tenga presente que el uso de modelos de predicción en sí mismo no es suficiente para manejar la resistencia.
- Monitoree el desarrollo de resistencia en las poblaciones de hongos tratadas.
- Comuníquese con su especialista de extensión local o asesor certificado en cultivos para obtener recomendaciones adicionales sobre el manejo de resistencia a los pesticidas o el manejo integrado de plagas para sus cultivos y patógenos específicos.
- Para obtener información o para reportar una presunta resistencia, llame a Atticus, LLC al 984-465-4754. También puede comunicarse con su distribuidor de pesticidas o con un especialista en extensión universitaria para informar sobre la resistencia.

Cultivos rotatorios: Para consultar las restricciones de rotación de cultivos, vea la siguiente tabla:

Cultivos rotatorios	Tiempo de siembra desde la última aplicación de RADIUS ESQ
Bayas de crecimiento bajo subgrupo 13-07G Hortalizas de hoja del género brassica (col) grupo 5 Hortalizas de bulbo, cebolla de bulbo subgrupo 3-07A y cebolla verde subgrupo 3-07B Zanahorias Chicharos Frutas cítricas grupo 10-10 Algodón subgrupo 20C Hortalizas cucurbitáceas grupo 9 Frutas pequeñas de enredaderas subgrupo 13-07F (excepto kiwi peludo) Hortalizas de fruto grupo 8-10 Guayaba Papaya Ocra o quimbombó Pimiento Papas Arroz Frijol de soya Frutas con hueso grupo 12-12 Fresas Remolacha de azúcar Tomates Frutos secos grupo 14-12 Hortalizas de tubérculo y cormo subgrupo 1C Berro de agua o mastuerzo de agua Arroz silvestre	0 días
Cereales (trigo, cebada, avena, centeno, triticale) Hortalizas de raíz y tubérculo grupo 1 (excepto Zanahoria, remolacha de azúcar y hortalizas de tubérculo y cormo subgrupo 1C)	30 días
Alforfón o trigo sarraceno Mijo	365 días
Todo otro cultivo destinado a producto alimenticio y forraje	60 días

Tolerancia de cultivos: Se ha comprobado que la tolerancia de la planta es aceptable para todos los cultivos de la etiqueta; no obstante, no se han probado todas las posibles combinaciones de mezcla en tanque bajo todas las condiciones. Cuando sea posible, se recomienda probar la combinación en una pequeña porción del cultivo a tratar para asegurarse de que no se genere una respuesta fitotóxica como resultado de la aplicación. Consulte la sección titulada PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE USO con respecto a la fitotoxicidad para el manzano.

Uso en invernaderos: Para el manejo de la resistencia, no utilice **RADIUS ESQ** en la producción de trasplantes.

Manejo del acarreo del rociado: Para evitar el acarreo del rociado, no aplique el producto cuando las condiciones favorezcan el acarreo fuera del área a tratar. La interacción de muchos equipos y los factores climáticos determinan el potencial de acarreo de la aspersión. EL APLICADOR Y EL AGRICULTOR SON RESPONSABLES DE EVITAR EL ACARREO DEL ROCIADO EN EL SITIO DE APLICACIÓN.

MÉTODOS DE MEZCLADO Y APLICACIÓN

Equipo de aspersión

Boquillas

- Equipe los aspersores con boquillas que produzcan una aplicación exacta y uniforme.
- Las boquillas deben ser del mismo tamaño y estar uniformemente espaciadas a lo largo de la barra de aspersión.
- Calibre el aspersor antes de usarlo.
- Se sugiere utilizar mallas para proteger la bomba y prevenir la obstrucción de las boquillas.
- Las mallas deben instalarse del lado de succión de la bomba y ser de calibre 16 o más grueso.
- No instale una malla en la tubería de recirculación.
- Instale mallas de calibre 50 o más grueso entre la bomba y la barra de aspersión, y donde sea necesario, en las boquillas.
- Consulte las recomendaciones del fabricante de la boquilla.

Bomba

- Utilice una bomba con capacidad para:
 - o Mantener una presión de 35-40 PSI en las boquillas.
 - o Generar suficiente agitación en el tanque para mantener la mezcla en suspensión; eso requiere la recirculación del 10% del contenido del tanque cada minuto.
- Para la agitación, utilice un agitador de chorro o un tubo de inyección de líquido.
- No inyecte aire.

Para obtener más información sobre el equipo de aspersión y la calibración, consulte las recomendaciones del fabricante del aspersor y de su estado. Para conocer las instrucciones locales específicas y los programas de aspersión, consulte las recomendaciones agrícolas estatales vigentes.

Instrucciones de mezclado

- **RADIUS ESQ** es una formulación como concentrado en suspensión (SC).
- No prepare más mezcla de aspersión que la necesaria para su aplicación inmediata.
- Antes de usar este producto limpie bien el equipo de aspersión.
- Agite la solución de aspersión antes y durante la aplicación.
- Enjuague a fondo el tanque de aspersión con agua limpia después de cada día de uso y elimine el enjuague de pesticidas mediante su aplicación a una zona ya tratada.



RADIUS ESQ solo (no como mezcla en tanque)

- Añada de 1/2 a 2/3 de la cantidad de agua necesaria al tanque de aspersión o de mezcla.
- Con el agitador en funcionamiento, agregue **RADIUS ESQ** al tanque.
- Continúe la agitación mientras agrega el resto del agua.
- Comience la aplicación de la solución de aspersión después de que **RADIUS ESQ** se haya dispersado totalmente en el agua de la mezcla.
- Mantenga la agitación hasta que toda la mezcla se haya aplicado.

RADIUS ESQ + mezclas en tanque: **RADIUS ESQ** es habitualmente compatible con todos los coadyuvantes de mezclado en tanque incluidos en esta etiqueta. Para evaluar la compatibilidad física de **RADIUS ESQ** con otros productos, haga una prueba en frasco. Utilice un frasco con capacidad para un cuarto de galón (0.95 L) y agregue las cantidades proporcionales de los productos a un cuarto de galón de agua. Añada primero los polvos solubles y los productos granulares dispersables en agua, luego los líquidos con capacidad de fluir y, por último, los concentrados emulsionables. Después de mezclarlo completamente, deje reposar la mezcla por al menos 5 minutos. Si la combinación permanece mezclada o puede volver a mezclarse fácilmente, es físicamente compatible. Una vez comprobada la compatibilidad, utilice el mismo procedimiento para agregar los ingredientes necesarios al tanque de aspersión.

Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos estén registrados para el uso previsto. Lea y siga las restricciones y limitaciones aplicables, así como las instrucciones de uso en todas las etiquetas de los productos involucrados en el mezclado en tanque. Los usuarios deben seguir lo más restrictivo en materia de instrucciones de uso y precauciones de cada producto en la mezcla en tanque.

Mezclado en el tanque de aspersión

- Agregue de 1/2 a 2/3 de la cantidad de agua necesaria al tanque de aspersión o de mezcla.
- Con el agitador en funcionamiento, agregue los coadyuvantes de mezclado al tanque en el mismo orden indicado anteriormente.
- Permita que el material se disuelva y disperse completamente en el agua de la mezcla. Continúe la agitación mientras agrega el resto del agua y **RADIUS ESQ** al tanque de aspersión.
- Permita que **RADIUS ESQ** se disperse completamente.
- Rocíe la mezcla con el agitador en funcionamiento.
- Observe todas las instrucciones de uso, cultivos/sitios, dosis de uso, relaciones de dilución, precauciones y limitaciones que figuran en la etiqueta del producto de mezclado en tanque.
- No se debe exceder la dosis de la etiqueta y deben seguirse las precauciones y limitaciones más restrictivas de la etiqueta.
- Este producto no debe mezclarse con ningún producto que prohíba dicha mezcla.
- Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos estén registrados para el uso previsto. Lea y siga las restricciones y limitaciones aplicables, así como las instrucciones de uso en todas las etiquetas de los productos involucrados en el mezclado en tanque. Los usuarios deben seguir lo más restrictivo en materia de instrucciones de uso y precauciones de cada producto en la mezcla en tanque.

Instrucciones de aplicación

RADIUS ESQ puede aplicarse con todos los tipos de equipos de aspersión utilizados habitualmente para realizar aplicaciones terrestres y aéreas. Es esencial el ajuste y la calibración adecuados del equipo de aspersión para conseguir una buena penetración y cobertura del follaje para un buen control de la enfermedad.

Aplicación de forma terrestre

- A menos que se especifique otra cosa, aplique, como mínimo 10 galones de agua por acre (38 L por cada 4046 m²).
- No aplique el producto mediante ningún sistema de aspersión de volumen ultrabajo.
- Se necesita una cobertura completa para lograr un buen control de la enfermedad.

Aplicación aérea

- Utilícelo en cultivos donde solo se indican las aplicaciones aéreas.
- Se necesita una cobertura completa para lograr un buen control de la enfermedad.
- A menos que se especifique otra cosa, aplique, como mínimo 5 galones de agua por acre (19 L por cada 4046 m²).
- Evite la aplicación en condiciones en las que no se pueda obtener una cobertura uniforme o cuando pueda producirse un acarreo excesivo de la aspersión.
- No aplique directamente sobre humanos o animales.
- No aplique el producto mediante ningún sistema de aspersión de volumen ultrabajo.

ATENCIÓN

RADIUS ESQ es extremadamente fitotóxico para ciertas variedades de manzanas.

EVITE EL ACARREO DEL ROCIADO. Hay que extremar las precauciones para evitar daños en los manzanos (y en la fruta).

NO rocíe **RADIUS ESQ** donde el acarreo del rociado puede llegar a manzanos.

NO aplique por rociado cuando las condiciones favorezcan el acarreo fuera del área a aplicación.

Las condiciones que pueden contribuir al acarreo incluyen la inversión térmica, la velocidad y dirección del viento, las combinaciones de boquilla y presión de los aspersores, el tamaño de la microgota de rociado, etc. Para consultar sobre pautas de prevención del acarreo del rociado en su zona, comuníquese con su agente de extensión estatal.

NO utilice equipos de aspersión que se hayan utilizado previamente para aplicar **RADIUS ESQ** para tratar manzanos. Incluso las cantidades ínfimas pueden causar una fitotoxicidad inaceptable a ciertas variedades de manzanos y manzanos silvestres.

EL APLICADOR TIENE LA RESPONSABILIDAD DE EVITAR EL ACARREO DE LA ASPERSIÓN.

Aplicación mediante sistemas de riego (Irrigación química)

- Úselo solamente en los cultivos para los cuales se especifica la irrigación química en esta etiqueta.
- Aplique este producto solamente mediante sistemas de riego de pivote central, de aspersores fijos, portátiles (manuales) o móviles sobre ruedas. No aplique este producto mediante ningún otro tipo de sistema de riego.
- Podrían ocurrir lesiones de cultivos, ineficacia en la aplicación o el depósito de residuos de pesticidas ilegales en el cultivo debido a la distribución no uniforme del agua tratada.
- Aplique a razón de 0.1-0.25 pulgadas/acre (3-6 mm por cada 4046 m²). El uso excesivo de agua puede reducir la eficacia.
- Si tiene preguntas sobre la calibración, debe comunicarse con los especialistas del servicio de extensión estatal, los fabricantes del equipo u otros expertos.
- No conecte un sistema de riego (incluidos los sistemas de invernadero) utilizado para la aplicación de pesticidas a un sistema público de abastecimiento de agua, a menos que existan los dispositivos de seguridad indicados en la etiqueta del pesticida para los sistemas públicos de abastecimiento de agua.
- Una persona que conozca el sistema de irrigación química y sea responsable de su funcionamiento, o que actúe bajo la supervisión de la persona responsable, apagará el sistema y realizará los ajustes necesarios, si surgiera la necesidad.



Instrucciones de funcionamiento

1. El sistema debe contener una válvula de retención funcional, una válvula de alivio de vacío y un desagüe de baja presión ubicados adecuadamente en la tubería de riego para evitar la contaminación de la fuente de agua por refluo.
2. La tubería de agua del pesticida debe estar provista de una válvula de retención funcional, automática y de cierre rápido para evitar que el líquido vuelva a la bomba de inyección.
3. La tubería de inyección de pesticidas también debe incluir una válvula de solenoide funcional, normalmente cerrada, ubicada en el lado de admisión de la bomba de inyección, y debe estar conectada al enclavamiento del sistema para evitar que se extraiga líquido del tanque de abastecimiento de productos químicos cuando el sistema de riego se apague automáticamente o manualmente.
4. El sistema debe contener controles de enclavamiento funcionales para apagar automáticamente la bomba de inyección de pesticidas cuando se detenga el motor de la bomba de agua.
5. La tubería de riego o la bomba de agua debe incluir un presostato funcional que detenga el motor de la bomba de agua cuando la presión del agua disminuya hasta el punto en que se vea afectada negativamente la distribución del pesticida.
6. Los sistemas deben utilizar una bomba dosificadora, como una bomba de inyección de desplazamiento positivo (por ejemplo, una bomba de diafragma), diseñada eficazmente y construida con materiales compatibles con los pesticidas y capaz de equiparse con un enclavamiento de sistema.
7. No aplique el producto cuando la velocidad del viento favorezca el acarreo fuera del área a tratar.

Equipo de riego de pivote central

Notas: (1) Utilícelo solamente con sistemas de impulso que proveen una distribución uniforme del agua. (2) No utilice cañones terminales al hacer irrigación química con **RADIUS ESQ** mediante sistemas de pivote central debido a resultados no uniformes en la aplicación.

- Determine el tamaño del área a tratar.
- Determine el tiempo necesario para aplicar de 1/8 a 1/2 pulgada (3-13 mm) de agua sobre la zona a tratar cuando el sistema y el equipo de inyección funcionan a las presiones normales recomendadas por su fabricante. Cuando se aplique **RADIUS ESQ** mediante un equipo de riego, utilice el menor volumen de agua posible mientras mantiene una distribución uniforme. Haga funcionar el sistema al 80-95% a la capacidad nominal indicada por el fabricante.
- Determine el rendimiento de la bomba de inyección, utilizando agua solamente, cuando funciona a la presión normal de la tubería.
- Determine la cantidad de **RADIUS ESQ** necesaria para tratar el área cubierta por el sistema de riego.
- Añada la cantidad necesaria de **RADIUS ESQ** y suficiente agua para cumplir los requisitos de tiempo de inyección al tanque de la solución.
- Asegúrese de que el sistema esté completamente cargado con agua antes de comenzar la inyección de la solución de **RADIUS ESQ**. Programe la inyección para que dure, al menos, el tiempo necesario para llevar el sistema a la presión máxima.
- Mantenga una agitación constante en el tanque de la solución durante el período de inyección.
- Mantenga el sistema en funcionamiento hasta que la solución de **RADIUS ESQ** haya salido de la cabeza del aspersor.

Sistema de riego de aspersores fijos, portátil (manual) y móvil sobre ruedas

- Determine la superficie cubierta por los aspersores.
- Llene con agua el tanque de la solución del inyector y ajuste el caudal para utilizar el contenido en un intervalo de 20 a 30 minutos. Cuando se aplique **RADIUS ESQ** mediante un equipo de riego, utilice el menor volumen de agua posible mientras mantiene una distribución uniforme.
- Determine la cantidad de **RADIUS ESQ** necesaria para tratar el área cubierta por el sistema de riego.
- Añada la cantidad necesaria de **RADIUS ESQ** en la misma cantidad de agua utilizada para calibrar el período de inyección.
- Haga que el sistema funcione a la misma presión e intervalo de tiempo establecidos durante la calibración.
- Cuando haya terminado el tratamiento, detenga el sistema de inyección. Mantenga el sistema en funcionamiento hasta que la solución de **RADIUS ESQ** haya salido de la cabeza del último aspersor.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

1. Por sistema público de abastecimiento de agua se entiende un sistema de suministro al público de agua corriente para el consumo humano si dicho sistema tiene al menos 15 conexiones de servicio o sirve regularmente a un promedio de al menos 25 individuos diariamente al menos 60 días al año.
2. Los sistemas de irrigación química conectados a los sistemas públicos de abastecimiento de agua deben contener una zona de presión reducida funcional, un dispositivo antirretorno o su equivalente funcional en la tubería de abastecimiento de agua aguas arriba del punto de inyección del pesticida. Como alternativa a la zona de presión reducida, el agua del sistema público de abastecimiento de agua debe descargarse en un depósito de reserva antes de la inyección del pesticida. Entre el extremo de salida de la tubería de llenado y el borde superior o de desborde del depósito de reserva deberá haber una interrupción física completa (espacio de aire) de al menos dos veces el diámetro interior de la tubería de llenado.
3. La tubería de agua del pesticida debe estar provista de una válvula de retención funcional, automática y de cierre rápido para evitar que el líquido vuelva a la bomba de inyección.
4. La tubería de inyección de pesticidas debe estar provista de una válvula de solenoide funcional, normalmente cerrada, ubicada en el lado de admisión de la bomba de inyección, y debe estar conectada al enclavamiento del sistema para evitar que se extraiga líquido del tanque de abastecimiento de productos químicos cuando el sistema de riego se apague automáticamente o manualmente.
5. El sistema debe contener controles de enclavamiento funcionales para apagar automáticamente la bomba de inyección de pesticidas cuando se detenga el motor de la bomba de agua, o en los casos en que no haya bomba de agua, cuando la presión del agua disminuya hasta el punto en que se vea afectada negativamente la distribución del pesticida.
6. Los sistemas deben utilizar una bomba dosificadora, como una bomba de inyección de desplazamiento positivo (por ejemplo, una bomba de diafragma), diseñada eficazmente y construida con materiales compatibles con los pesticidas y capaz de equiparse con un enclavamiento de sistema.
7. No aplique el producto cuando la velocidad del viento favorezca el acarreo fuera del área a tratar.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE USO

Cultivo	Enfermedades objetivo	Dosis de uso (oz liq. de producto/acre)	Observaciones
Frijol de soya	Tizón aéreo (<i>Rhizoctonia solani</i>) Mancha de la hoja por Alternaria (<i>Alternaria</i> spp.) Antracnosis (<i>Colletotrichum truncatum</i>) Mancha parda (<i>Septoria glycines</i>) Tizón y mancha de la hoja por Cercospora (<i>C. kikuchii</i>) Mancha ojo de rana (<i>Cercospora sojina</i>) Tizón de la vaina y el tallo (<i>Diaporthe phaseolorum</i>) Mildiú polvoroso (<i>Microsphaera diffusa</i>) Roya (<i>Phakopsora</i> spp.)	7.0-7.5	Comience las aplicaciones antes de la aparición de la enfermedad cuando las condiciones son propicias para la misma. Aplique RADIUS ESQ en un programa de 7 a 10 días, haciendo no más de 2 aplicaciones secuenciales antes de alternar con otro fungicida con un modo de acción diferente. Se recomienda el agregado de un adyuvante de tipo que facilita la dispersión o penetración, como un tensioactivo no iónico o un concentrado o mezcla oleoso para cultivos. Si es alto el nivel de presión de la enfermedad, utilice el intervalo más corto y la dosis más alta.

Aplicación: Para obtener resultados óptimos, hay que utilizar un volumen de agua suficiente para lograr una cobertura completa. **RADIUS ESQ** puede aplicarse por aspersión terrestre, irrigación química o aplicación aérea. En el caso de aplicaciones aéreas, aplique agua a razón de al menos 2 galones por acre (8 L cada 4046 m²). Para la irrigación química, aplique agua a razón de 0.1-0.25 pulgadas/acre (3-6 mm por cada 4046 m²). La irrigación química con exceso de agua puede causar una disminución de la eficacia.

Restricciones específicas de uso:

1. No aplique más de 14.8 oz liq./acre/año (438 ml/4046 m²/año) de **RADIUS ESQ**.
2. No aplique más de 0.22 lb i.a./acre/año (100 g i.a./4046 m²/año) de productos que contengan difenoconazol.
3. No aplique más de 1.5 lb i.a./acre/año (680 g/4046 m²/año) de productos que contengan azoxistrobina.
4. No alimente el ganado con heno, forraje y ensilado de soya.
5. No aplique este producto dentro de los 14 días previos a la cosecha (intervalo precosecha de 14 días).

TABLA DE CONVERSIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE RADIUS ESQ PARA USO ALIMENTARIO

Oz liq. de producto/acre	Lb i.a. de azoxistrobina	Lb i.a. de difenoconazol
4.5	0.067	0.067
5.6	0.082	0.082
6.5	0.096	0.096
7.0	0.103	0.103
7.5	0.110	0.110
7.7	0.113	0.113
8.0	0.118	0.118
8.3	0.122	0.122
8.5	0.125	0.125
14.8	0.217	0.217
23	0.338	0.338
26	0.382	0.382
30	0.441	0.441
31	0.455	0.455
34	0.499	0.499

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos ni el forraje al almacenar o desechar este producto.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacene el producto en un recipiente herméticamente cerrado, en un lugar fresco y seco. Almacene el producto en su envase original y fuera del alcance de los niños, preferiblemente en un lugar cerrado bajo llave.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA: Los residuos resultantes del uso de este producto se deben desechar en la misma localidad o en un centro aprobado para la eliminación de desechos. La eliminación inadecuada del exceso de pesticida, mezcla de rociado o agua resultante del enjuague del equipo constituye una violación de la ley federal (EE. UU.). Si estos residuos no se pueden eliminar de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, comuníquese con su Agencia Estatal de Pesticidas o de Control Ambiental o con el representante de Residuos Peligrosos en la oficina regional de la EPA (EE. UU.) más cercana para pedir información al respecto.

MANEJO DEL RECIPIENTE:

Para recipientes de plástico de ≤ 5 galones (19 L): Recipiente no rellenable: No reutilice ni rellene este recipiente. Enjuague el recipiente tres veces (o su equivalente) tan pronto como se haya vaciado. Hacer el triple enjuague de esta manera: Vacíe lo que reste del contenido en el equipo de la aplicación o en un tanque de mezclado y drene durante 10 segundos después de que el flujo comience a escurrir. Llene una cuarta (1/4) parte del recipiente con agua y vuélvalo a tapar. Agite durante 10 segundos. Vierta la solución de enjuague en el equipo de aplicación o un tanque de mezclado, o almacene la solución de enjuague para su uso o desecho posterior. Drene durante 10 segundos después de que el flujo comience a escurrir. Repita este procedimiento dos veces más. Luego ofrezca el recipiente para su reciclaje (si está disponible) o perfórelo y deséchelo en un relleno sanitario o por incineración.

Para recipientes de plástico de > 5 galones (19 L): Recipiente no rellenable. No reutilice ni rellene este recipiente. Enjuague el recipiente tres veces (o su equivalente) tan pronto como se haya vaciado. Hacer el triple enjuague de esta manera: Vacíe el resto del contenido en el equipo de aplicación o en un tanque de mezclado. Llene una cuarta (1/4) parte del recipiente con agua. Vuelva a colocar y apretar los tapones. Incline el recipiente hasta dejarlo de lado y ruédelo hacia atrás y hacia adelante, asegurando que dé por lo menos una vuelta completa. Haga esto durante 30 segundos. Enderece el recipiente sobre su extremo e inclínelo hacia atrás y hacia adelante varias veces. Vuelque el recipiente sobre el otro extremo e inclínelo hacia atrás y hacia adelante varias veces. Vacíe la solución de enjuague en el equipo de aplicación o un tanque de mezclado, o almacene la solución de enjuague para su uso o desecho posterior. Repita este procedimiento dos veces más. Luego ofrezca el recipiente para su reciclaje (si está disponible) o perfórelo y deséchelo en un relleno sanitario o por incineración.

LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

IMPORTANTE: LEA ANTES DE USAR. Antes de usar este producto, lea totalmente las instrucciones de uso, las condiciones de garantía y las limitaciones de responsabilidad. Si estos términos y condiciones no son aceptables, devuelva inmediatamente el producto con el envase sin abrir. Al utilizar este producto, el usuario o comprador acepta la siguiente exención de garantías y limitaciones de responsabilidad.

CONDICIONES: Las instrucciones de uso de este producto se consideran adecuadas y hay que seguirlas cuidadosamente. No obstante, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este producto. Podrían ocurrir ineficacia, lesiones y otras consecuencias imprevistas para los cultivos debido a factores tales como las maneras de uso o aplicación (incluido el mal uso), la presencia de otros materiales, las condiciones climáticas y otros factores desconocidos, los cuales todos están fuera del control de Atticus, LLC. El comprador o el usuario asumirá todos esos riesgos.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS: En la medida en que sea compatible con la ley aplicable, ATTICUS, LLC no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad, de idoneidad para un fin determinado ni de otro tipo, que se extienda más allá de las declaraciones en esta etiqueta. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** En la medida en que sea compatible con la ley aplicable, ni Atticus, LLC, ni el fabricante ni el vendedor serán responsables de ningún daño indirecto, especial, incidental o consecuente que resulte del uso, manejo, aplicación, almacenamiento o desecho de este producto. En la medida en que sea compatible con la ley aplicable, el recurso exclusivo del usuario o comprador por todas y cada una de las pérdidas, lesiones o daños resultantes del uso, el manejo, la aplicación o el almacenamiento de este producto, ya sea por responsabilidad contractual, garantía, responsabilidad extracontractual, negligencia, responsabilidad objetiva o de otro tipo, no superará el precio de compra pagado.

RADIUS ESQ™ es una marca comercial de Atticus, LLC.

Quadris Top® SBX es una marca registrada de Syngenta Group Company.

20190823b

