

TRITICONAZOL	GRUPO	3	FUNGICIDA
PIRACLOSTROBINA	GRUPO	11	FUNGICIDA

Pillar® G

Intrinsic® Brand Fungicide

Para el control de enfermedades y la salud de plantas en céspedes

Ingredientes activos:

piraclostrobina 0.38%
 triticonazol 0.43%

Otros ingredientes: 99.19%

Total: 100.00%

0.0038 lb de piraclostrobina y 0.0043 lb de triticonazol en 1 lb de fungicida marca **Pillar® G Intrinsic®**

N.º de reg. de EPA 7969-304

N.º de est. de EPA

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN

Si no entiende la etiqueta, pida a alguien que se la explique detalladamente.

Consulte en el interior la información completa sobre **primeros auxilios, precauciones, instrucciones de uso y condiciones de venta y garantía.**

En caso de una emergencia que ponga en peligro la vida o los bienes y que involucre a este producto, llame en cualquier momento del día o la noche al 1-800-832-4357 (HELP).

Contenido neto:

PRIMEROS AUXILIOS

Si cae en la piel o la ropa	• Quítese la ropa contaminada. • Enjuáguese inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.
Si se ingiere	• Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento. • Si la persona puede tragar, haga que tome pequeños sorbos de agua. • NO induzca el vómito, a menos que así lo indique el centro de control de envenenamientos o el médico. • NO administre nada por vía oral a una persona inconsciente.
Si entra en contacto con los ojos	• Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y cuidadosamente con agua durante 15 a 20 minutos. • Si usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos; luego continúe enjuagándose los ojos. • Llame a un centro de control de envenenamientos para consejo de tratamiento.
Si es inhalado	• Traslade a la persona a un lugar con aire fresco. • Si la persona no está respirando, llame al 911, a su número local de emergencias o a una ambulancia. Luego proceda a dar respiración artificial, preferiblemente de boca a boca, si es posible. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.

NÚMERO TELEFÓNICO DIRECTO

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede ponerse en contacto con BASF Agricultural Solutions US LLC (de aquí en adelante, referida como "BASF") para pedir información sobre el tratamiento médico de emergencia: 1-800-832-4357 (HELP).

Declaraciones de precaución

Riesgos para los seres humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN. Dañino si se absorbe por la piel. Dañino si se ingiere. Causa irritación moderada en los ojos. No permita que caiga en los ojos, la piel o la ropa. Use camisa de manga larga, pantalones, calcetines, zapatos, guantes y lentes o gafas protectoras.

Equipo de protección personal

Los aplicadores y todas las personas que manipulen el producto deben utilizar:

- Camisa de manga larga y pantalones largos
- Guantes impermeables
- Zapatos y calcetines
- Lentes o gafas protectoras

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y el mantenimiento del equipo de protección personal. En caso de no existir dichas instrucciones de lavado, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el equipo de protección personal separadamente de otra ropa para lavar.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

Los usuarios deben:

- Lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o ir al baño.
- Quitarse inmediatamente la ropa o el equipo de protección personal si el pesticida penetra o ingresa a los mismos. Luego, lavarse muy bien y ponerse ropa limpia.
- Quitarse inmediatamente el equipo de protección personal después de manipular este producto. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lavarse muy bien y ponerse ropa limpia lo antes posible.

Riesgos para el medio ambiente

Este pesticida es tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. **NO** lo aplique directamente a cuerpos de agua, en áreas donde haya aguas superficiales o en áreas intermareales que se encuentren bajo el nivel de altura máxima promedio del agua. **NO** contamine cuerpos de agua cuando elimine las aguas de lavado de equipo o aguas de enjuague.

Notificación sobre el agua subterránea

Se sabe que la piraclostrobina puede filtrarse a aguas subterráneas bajo ciertas condiciones como resultado del uso según la etiqueta. Este producto químico se puede filtrar a aguas subterráneas si es utilizado en áreas donde el suelo es permeable, especialmente en donde la tabla de agua está cercana a la superficie.

Notificación sobre aguas superficiales

Este producto puede impactar la calidad de cuerpos de agua superficiales debido a escorrentías de aguas pluviales. Esto es especialmente notable en suelos con poco drenaje y suelos con una tabla de agua que está cercana a la superficie. Este producto se clasifica con alto potencial de llegar al agua superficial mediante la escorrentía por varios meses o más después de su aplicación. Una franja vegetal de protección o zona de amortiguamiento, nivelada y bien mantenida, entre las áreas donde este producto es utilizado y cuerpos de agua superficiales, incluidos lagos (lagunas), ríos y manantiales, reducirá el posible movimiento de residuos de piraclostrobina provenientes de aguas de escorrentía y sedimentos. Se pueden reducir considerablemente las escorrentías de este producto evitando su aplicación cuando esté pronosticada lluvia o irrigación dentro de 48 horas. Las prácticas eficaces de control de la erosión reducirán la contribución de este producto a la contaminación de las aguas superficiales.

Instrucciones de uso

Es una violación de la ley federal (EE. UU.) utilizar este producto de manera inconsistente con lo indicado en su etiqueta. El usuario debe tener esta etiqueta consigo al momento de aplicar el pesticida.

NO aplique este producto de manera que pueda entrar en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea de forma directa o mediante la deriva. Solo se permite la presencia en el área del personal a cargo de la manipulación del producto durante su aplicación, con la protección adecuada. Para obtener información acerca de los requisitos específicos de su estado o localidad, consulte a la agencia responsable de la regulación de pesticidas.

Respete todas las precauciones y limitaciones en esta etiqueta y las etiquetas de los productos utilizados en combinación con el fungicida marca **Pillar® G Intrinsic®**. El uso de **Pillar G Intrinsic** de manera contraria a las indicaciones en esta etiqueta puede causar daños a cultivos, animales o personas. Mantenga los recipientes cerrados para evitar derrames y contaminación.

A menos que se indique otra cosa en las etiquetas complementarias, se deben seguir todas las instrucciones, restricciones, precauciones y **condiciones de venta y garantía**.

REQUISITOS DE USO AGRÍCOLA

Use este producto solamente según lo indicado en la etiqueta y en cumplimiento con el Estándar para la Protección del Trabajador (40 CFR parte 170 de EE. UU.). Dicho estándar contiene los requisitos de protección para trabajadores agrícolas en granjas, bosques, invernaderos y viveros, y para los manipuladores de pesticidas agrícolas. Contiene los requisitos de capacitación, descontaminación, notificación y asistencia ante emergencias. Asimismo, contiene instrucciones específicas y excepciones relativas a las declaraciones de esta etiqueta sobre el uso de equipo de protección personal y el intervalo de acceso restringido. Los requisitos indicados en este recuadro se aplican solamente a los usos de este producto que están cubiertos por el Estándar para la Protección del Trabajador (EE. UU.).

NO entre a las áreas tratadas ni permita el ingreso de trabajadores a ellas durante el intervalo de acceso restringido de **12 horas**.

El Estándar para la Protección del Trabajador (EE. UU.) permite usar el equipo de protección personal exigido para el acceso anticipado a las áreas tratadas cuando ello implica el contacto con cualquier cosa que se haya tratado, como plantas, suelo o agua. Dicho equipo consiste en:

- Overol
- Guantes resistentes a productos químicos (fabricados con cualquier material impermeable)
- Zapatos y calcetines
- Lentes o gafas protectoras

REQUISITOS DE USO NO AGRÍCOLA

Los requisitos en este recuadro corresponden a los usos de este producto que **NO** están cubiertos por el Estándar para la Protección del Trabajador para pesticidas agrícolas (40 CFR parte 170 de EE. UU.). Dicho estándar se aplica cuando este producto se utiliza para cultivar plantas agrícolas en granjas, bosques, viveros o invernaderos.

NO ingrese ni permita la entrada de otras personas al área tratada hasta que se haya asentado el polvo.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

NO contamine agua, comida ni forrajes mediante el almacenamiento o desecho. Se prohíbe desechar el producto al aire libre.

Almacenamiento de pesticidas

NO lo almacene a temperaturas mayores de 120 °F (49 °C). Almacene el producto en los recipientes originales y manténgalos cerrados. Almacénelo en un lugar fresco y seco.

Desecho de pesticidas

Los residuos resultantes del uso de este producto pueden desecharse en el sitio en cuestión o en un centro aprobado para la eliminación de desechos.

Manipulación de recipientes (para recipientes de plástico)

Recipiente no rellenable. NO reutilice ni rellene este recipiente. Después de vaciar completamente el recipiente en el equipo de aplicación, ofrézcalo para su reciclaje, si está disponible, o para reacondicionarlo, si corresponde, o perforélo y deséchelo en un área adecuada para desechos sanitarios, o por incineración, o por otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales.

(para bolsas de papel o plástico)

Recipiente no rellenable. NO reutilice ni rellene este recipiente. Después de vaciar completamente el recipiente en el equipo de aplicación, deseche la bolsa vacía en un área adecuada para desechos sanitarios, o por incineración, o bien mediante otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales.

En caso de emergencia

En caso de un derrame a gran escala de este producto, llame a:

- CHEMTREC 1-800-424-9300
- BASF 1-800-832-4357 (HELP)

En caso de emergencia médica con respecto a este producto, llame a:

- Su médico local para obtener tratamiento de inmediato
- Su centro de control de envenenamientos (hospital) local
- BASF 1-800-832-4357 (HELP)

Pasos a dar si se produce un derrame o escape de este material:

- Rodee y contenga el derrame con material inerte (arena, tierra, etc.) y transfiera el material de contención líquido y sólido a contenedores separados para su desecho.
- Quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón las zonas afectadas de la piel.
- Lave la ropa antes de volver a utilizarla.
- Mantenga el derrame alejado de alcantarillas y cuerpos de agua abiertos.

Información del producto

Aplique **Pillar G Intrinsic** al césped como fungicida preventivo de amplio espectro para el control de numerosas enfermedades importantes del césped. Las aplicaciones preventivas optimizan el control de las enfermedades y pueden mejorar la salud de las plantas.

Pillar G Intrinsic contiene piraclostrobina, el ingrediente activo del fungicida **Insignia®**, y triticonazol, el ingrediente activo del fungicida **Trinity®**. Este producto combinado, con dos modos de acción, es una excelente herramienta para el manejo de la resistencia.

Información sobre la aplicación

El fungicida marca **Pillar® G Intrinsic®** es un fungicida de amplio espectro usado para el control de diversas enfermedades importantes en el césped. Aplique **Pillar G Intrinsic** con equipo esparcidor comúnmente utilizado para aplicaciones terrestres. A fin de controlar la enfermedad es esencial calibrar adecuadamente el equipo para lograr una buena cobertura. Aplique **Pillar G Intrinsic** de manera preventiva. **NO** exceda la concentración de aplicación especificada en la etiqueta ni deje de cumplir las restricciones de uso indicadas en la sección **Restricciones y limitaciones**.

Sitios de uso

Césped

Utilice **Pillar G Intrinsic** para el control de enfermedades en los siguientes sitios de uso con césped:

- campos de golf
- céspedes institucionales, comerciales y residenciales
- granjas productoras de césped
- parques
- áreas recreativas, incluyendo campos atléticos
- cementerios

Especies de césped tolerantes

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Hierba fina, colonial | • Grama ciempiés |
| • Hierba fina, rastrera | • Dicondra |
| • Pasto bermuda o grama común | • Festuca fina |
| | • Festuca alta |
| • Pasto bermuda híbrido | • Grama de agua, césped del mar |
| • Zcate azul, pasto de invierno (<i>Poa annua</i>) | • Raigrás, anual |
| • Espiguilla | • Raigrás, perenne |
| • Gamilla, cervuno (<i>Poa trivialis</i>) | • Pasto de San Agustín o gramón |
| • Grama de olor | • Zoysia |

Debido a la variabilidad entre las especies de césped y las técnicas de aplicación, ni el fabricante ni el vendedor han determinado si **Pillar G Intrinsic** puede utilizarse con seguridad en todo tipo de césped bajo todas las condiciones. Por lo tanto, el usuario debe determinar si **Pillar G Intrinsic** puede utilizarse sin riesgos antes de su uso a gran escala. Aplique la concentración de uso especificada de **Pillar G Intrinsic** en una pequeña zona de prueba bajo las condiciones que se espera encontrar. Supervise si hay efecto adverso durante un período de 14 días después de la aplicación. **NO** utilice el producto en variedades ultraenanas de pasto bermuda.

Cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, Pillar G Intrinsic es eficaz para el control de las siguientes enfermedades:

- | | |
|---|--|
| • Antracnosis | • Mancha rosa |
| • Mancha necrótica de la hierba fina | • Moho rosa de la nieve |
| • Deterioro del pasto bermuda | • Moho polvoroso |
| • Mancha café | • Plaga de pythium |
| • Mancha anular café (mancha de Waitea) | • Disfunción de la raíz por pythium |
| • Mancha dólar | • Tizón rápido |
| • Anillo de hada | • Hilo rojo |
| • Mancha por fusarium | • Mancha de la hoja o la vaina por rhizoctonia |
| • Mancha gris de la hoja | • Roya |
| • Moho gris de la nieve | • Mancha de verano |
| • Mancha grande | • Mancha total |
| • Mancha de las hojas | • Panoja local (moho veloso) |
| • Mal de pie del césped | • Mancha de zoysia |
| • Anillo necrótico | |

Manejo de la resistencia

Pillar G Intrinsic contiene tanto piraclostrobina, un **inhibidor externo de quinona (QoI) del Grupo 11**, como triticonazol, un **inhibidor de la desmetilación (DMI) del Grupo 3**. Cualquier población de hongos puede contener individuos naturalmente resistentes a **Pillar G Intrinsic** y a otros fungicidas del **Grupo 11** o del **Grupo 3**. Con el tiempo puede producirse una pérdida gradual o total del control de la plaga si dichos fungicidas se utilizan repetidamente en las mismas zonas. Se deben seguir estrategias adecuadas de manejo de la resistencia.

Para retardar la resistencia al fungicida, tome una o más de las medidas siguientes:

- Rote la aplicación de **Pillar G Intrinsic** u otros fungicidas del **Grupo 11** y del **Grupo 3** dentro de una secuencia de temporada de cultivo con diferentes grupos que controlan los mismos patógenos.
- Utilice productos fungicidas o mezclas en tanque de diferentes grupos que sean igualmente eficaces contra la plaga objetivo, cuando dicho uso esté permitido. Utilice al menos la concentración mínima de aplicación que figure en la etiqueta del fabricante.
- Adopte un programa de manejo integrado de enfermedades para el uso de fungicidas que incluya exploración, que utilice información histórica relacionada con el uso de pesticidas y que considere la resistencia de la planta huésped, el impacto de las condiciones ambientales en el desarrollo de la enfermedad, los umbrales de la enfermedad, así como prácticas de control de cultivo, biológicas y otras prácticas de control químico.
- Siempre que sea posible, utilice modelos de predicción de enfermedades para programar eficazmente las aplicaciones de fungicida. Tenga en cuenta que el uso de modelos de predicción por sí solo no es suficiente para manejar la resistencia.
- Monitoree las poblaciones de hongos tratadas para detectar el desarrollo de resistencia.
- Comuníquese con su especialista de extensión agrícola local para obtener recomendaciones adicionales sobre el manejo de resistencia a los pesticidas o el manejo integrado de plagas para sus cultivos y patógenos específicos.
- Para obtener información adicional o informar sobre una presunta resistencia, comuníquese con un representante de BASF local. También puede comunicarse con su distribuidor de pesticidas o con el especialista de extensión agrícola de su universidad para informar sobre la resistencia.

Restricciones y limitaciones

- **Concentración máxima de uso por temporada.** **NO** aplique más de un total de 15 lb/1000 sq ft de fungicida marca **Pillar® G Intrinsic®** por año.
- Consulte las instrucciones de aplicación del fungicida marca **Pillar® G Intrinsic®** en la sección de instrucciones para **césped** a fin de conocer los intervalos de aplicación secuenciales de **Pillar G Intrinsic**.
- **NO** lo use en cultivos destinados a alimentación o forraje.
- **NO** utilice este producto para formular ni reformular ningún otro producto pesticida.

Instrucciones de aplicación en céspedes del fungicida marca **Pillar® G Intrinsic®**

Aplique **Pillar G Intrinsic** a una concentración de uso de 3.0 lb de producto/1000 sq ft (131 lb de producto/acre) en un intervalo de 14 a 28 días para las siguientes enfermedades. **NO** realice más de 5 aplicaciones por año con la concentración de uso de 3.0 lb de producto/1000 sq ft (131 lb de producto/acre). Las aplicaciones realizadas para controlar enfermedades de la raíz y transmitidas por el suelo, tales como anillo de hada, disfunción radical por *Pythium*, mancha de verano y mancha total, requerirán riego adicional para hacer que el producto penetre en el suelo.

Enfermedad <i>Patógeno</i>	Intervalo de aplicación (días)	Comentarios
Antracnosis <i>Colletotrichum graminicola</i>	14 a 28	Usar preventivamente. Comience las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables para la infección por hongos, antes de que se desarrollen los síntomas de la enfermedad.
Mancha necrótica de la hierba fina <i>Ophiosphaerella agrostis</i>	14 a 28	Usar preventivamente. Comience las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables para la infección por hongos, antes de que se desarrollen los síntomas de la enfermedad.
Deterioro del pasto bermuda <i>Gaeumannomyces graminis</i> var. <i>graminis</i>	28	Contribuye a controlar el deterioro del pasto bermuda cuando se integra a prácticas de cultivo adecuadas, como elevar la altura del corte de césped, fertilización apropiada y aireación del núcleo. Haga una aplicación en la primavera después del reverdecimiento, y una segunda aplicación en el otoño cuando las temperaturas del aire permanezcan por encima de los 80 °F (27 °C) y la humedad sea del 75% o superior.
Mancha café <i>Rhizoctonia solani</i>	14 a 28	Aplíquelo cuando las condiciones favorezcan el desarrollo de la enfermedad.
Mancha anular café <i>Rhizoctonia circinata</i> var. <i>circinata</i> también conocida como mancha de Waitea	14 a 28	Aplique el producto cuando el desarrollo temprano del anillo amarillo sea sintomático. Suministre un breve ciclo de riego directamente después del tratamiento para que el fungicida penetre la cubierta de pasto muerto.
Mancha dólar <i>Sclerotinia homoeocarpa</i>	14 a 28	Aplíquelo cuando las condiciones favorezcan el desarrollo de la enfermedad. Los síntomas del anillo pueden tardar de 2 a 3 semanas en desaparecer después de la aplicación. Para obtener un resultado óptimo, aplique un agente humectante de suelo al área de tratamiento prevista antes de aplicar Pillar G Intrinsic .
Anillo de hada Diversos hongos <i>Basidiomycete</i>	14 a 28	Aplíquelo tan pronto como sea posible después del desarrollo del síntoma del anillo de hada. Los síntomas del anillo de hada pueden tardar de 2 a 3 semanas en desaparecer después de la aplicación. Para obtener un resultado óptimo, aplique un agente humectante de suelo al área de tratamiento prevista antes de aplicar Pillar G Intrinsic .
Mancha por fusarium (Moho rosa de la nieve) <i>Microdochium nivale</i>	28	Realice 1 aplicación a fines del otoño, justo antes de que lo cubra la nieve. Para un control óptimo bajo presión severa de la enfermedad, realice una aplicación de fungicida Trinity® , fungicida marca Insignia® SC Intrinsic® o fungicida Insignia® 14 días antes de la aplicación de Pillar G Intrinsic .
Mancha gris de la hoja <i>Pyricularia grisea</i>	14 a 28	Usar preventivamente. Comience las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables para la infección por hongos, antes de que se desarrollen los síntomas de la enfermedad.
Moho nivoso gris/tizón de tifus <i>Typhula</i> spp.	28	Realice 1 aplicación a fines del otoño, justo antes de que lo cubra la nieve. Para un control óptimo bajo presión severa de la enfermedad, realice una aplicación de fungicida marca Trinity , Insignia® SC Intrinsic® o Insignia 14 días antes de la aplicación de Pillar G Intrinsic .

(continúa)

Instrucciones de aplicación en céspedes del fungicida marca **Pillar® G Intrinsic®** (continúa)

Enfermedad <i>Patógeno</i>	Intervalo de aplicación (días)	Comentarios
Mancha grande <i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2LP	14 a 28	Realice 1 a 2 aplicaciones en otoño cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad; repita en primavera antes y después del reverdecimiento.
Mancha de las hojas <i>Bipolaris</i> spp., <i>Drechslera</i> spp., <i>Exserohilum</i> spp.	14 a 28	Aplíquelo cuando las condiciones favorezcan el desarrollo de la enfermedad.
Mancha borrosa <i>Drechslera poae</i>	14 a 28	Aplíquelo cuando las condiciones favorezcan el desarrollo de la enfermedad.
Anillo necrótico <i>Leptosphaeria korrae</i>	28	Aplíquelo cuando las temperaturas del suelo lleguen a 60 °F a inicios de la primavera hasta el verano y continúe a intervalos de 28 días en condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Aplique riego adicional después de la aplicación.
Mancha rosa <i>Limonomycetes roseipellis</i>	14 a 28	Aplíquelo cuando las condiciones sean favorables para que se desarrolle la enfermedad, cuando las temperaturas nocturnas estén entre 60 y 70 °F (16 y 21 °C) y en periodos con mayor caída de lluvia.
Moho rosa de la nieve (Mancha de fusarium) <i>Microdochium nivale</i>	28	Realice 1 aplicación a fines del otoño, justo antes de que lo cubra la nieve. Para un control óptimo bajo presión severa de la enfermedad, realice una aplicación de fungicida Trinity® , fungicida marca Insignia® SC Intrinsic® o fungicida Insignia® 14 días antes de la aplicación de Pillar G Intrinsic .
Moho polvoroso <i>Blumeria graminis</i>	14 a 28	Usar preventivamente. Comience las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables para la infección por hongos, antes de que se desarrollen los síntomas de la enfermedad.
Plaga de pythium <i>Pythium aphanidermatum</i> , <i>Pythium</i> spp.	14	Usar preventivamente. Comience las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables para la infección por hongos, usualmente en condiciones prolongadas de humedad. Para lograr el mejor control, aplíquelo antes de que se desarrollen síntomas de la enfermedad.
Disfunción de la raíz de pythium <i>Pythium volutum</i> spp., <i>Pythium</i> spp.	14	Usar preventivamente. Comience las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables para la infección por hongos, antes de que se desarrollen los síntomas de la enfermedad. NO aplique de manera secuencial más de dos fungicidas basados en estrobilurina antes de alternar a un modo de acción diferente.
Tizón rápido <i>Labyrinthula terrestris</i>	14 a 28	Aplíquelo cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad, lo cual ocurre normalmente en céspedes estresados por salinidad. Ocurre con mayor frecuencia en céspedes de estación fría utilizados bajo condiciones de sobresiembra. Inicie las aplicaciones en otoño y continúe con aplicaciones en primavera según sea necesario. NO aplique de manera secuencial más de dos fungicidas basados en estrobilurina antes de alternar a un modo de acción diferente.
Hilo rojo <i>Laetisaria fuciformis</i>	14 a 28	Aplíquelo cuando las condiciones favorezcan el desarrollo de la enfermedad.
Mancha de la hoja o la vaina por rhizoctonia <i>R. oryzae</i> , <i>R. zea</i>	28	Aplíquelo cuando las condiciones favorezcan el desarrollo de la enfermedad. La infección por rhizoctonia puede producirse en condiciones cálidas y húmedas, en césped tanto de temporada fría como cálida. Esta enfermedad se ha asociado con manchas secas localizadas y pueden aparecer síntomas de anillo necrótico (pardo). El uso de un agente humectante puede ayudar en la recuperación de manchas secas.
Roya <i>Puccinia</i> spp.	14 a 28	Aplíquelo cuando las condiciones favorezcan el desarrollo de la enfermedad.

(continúa)

Instrucciones de aplicación en céspedes del fungicida marca **Pillar® G Intrinsic®** (continúa)

Enfermedad <i>Patógeno</i>	Intervalo de aplicación (días)	Comentarios
Mancha de verano <i>Magnaporthe poae</i>	28	Aplicarlo cuando las condiciones favorezcan el desarrollo de la enfermedad. Inicie las aplicaciones en primavera cuando las temperaturas del suelo alcancen de 60° a 70° F (16° a 21° C) a una profundidad del suelo de 2 pulgadas (5 cm), o según las recomendaciones locales. Repita la aplicación con intervalos de 28 días.
Mancha total <i>Gaeumannomyces graminis</i> var. <i>avenae</i>	28	Comience las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables para la infección por hongos, antes de que se desarrollen los síntomas de la enfermedad. Realice 2 aplicaciones en otoño y aplicaciones subsiguientes en primavera, dependiendo de las condiciones locales.
Panoja local (moho vellosa) <i>Sclerophthora macrospora</i>	14 a 28	Usar preventivamente. Comience las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables para la infección por hongos, antes de que se desarrollen los síntomas de la enfermedad.
Mancha de zoysia <i>Rhizoctonia solani</i> AG2-2LP	14 a 28	Realice 1 a 2 aplicaciones en otoño cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad; repita en primavera antes y después del reverdecimiento. Usar preventivamente. Comience las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables para la infección por hongos, antes de que se desarrollen los síntomas de la enfermedad.

Instrucciones de aplicación para **Pillar G Intrinsic**

Pillar G Intrinsic está formulado como un fungicida granulado seco de amplio espectro que debe aplicarse al voleo con un equipo esparcidor utilizado comúnmente para aplicaciones terrestres. Es esencial lograr una cobertura uniforme de acuerdo con la concentración indicada en la etiqueta para el control de enfermedades. La calibración adecuada del equipo esparcidor es esencial antes de realizar aplicaciones de **Pillar G Intrinsic**.

Aplicarlo con un equipo esparcidor correctamente calibrado para lograr una distribución uniforme. Verifique la aplicación de forma rutinaria para determinar la correcta calibración. Evite los traslapes que aumenten las concentraciones por encima de las dosis especificadas.

Ajustes sugeridos del esparcidor para el césped

Para aplicar la concentración indicada en la etiqueta de 3.0 lb de producto/1000 sq ft (131 lb de producto/acre) y lograr una distribución adecuada del producto, calibre el esparcidor de acuerdo con los ajustes sugeridos en la siguiente tabla. Los ajustes de calibración en la siguiente tabla se basan en una sola pasada, con el ancho determinado mediante estimación visual de una distribución uniforme. Si aplica en dos direcciones, calibre el equipo para distribuir la mitad del producto en cada pasada. **NO** realice más de 5 aplicaciones por año con la concentración de uso de 3.0 lb de producto/1000 sq ft (131 lb de producto/acre).

Esparcidor	Velocidad de avance (mph)	Ancho de cobertura (pies)	Ajuste del esparcidor
Earthway® EV-N-SPRED® Commercial 2150	3	8	18
Lesco® Commercial Plus™ Rotary 80 LB	3	9	12
Scotts® Professional SS-2 Drop*	3	3	3.5
Scotts® Turfbuilder® EdgeGuard® DLX (modelo de uso doméstico)	3	6	4.5
The Andersons® SR-2000™ Professional Rotary	3	9	K
* BASF no recomienda el uso de esparcidores por gravedad.			

Condiciones de venta y garantía

Las **Instrucciones de uso** de este producto reflejan la opinión de expertos con base en el uso y las pruebas de campo. Las instrucciones se consideran confiables si se siguen cuidadosamente. No obstante, es imposible eliminar todos los riesgos inherentes al uso de este producto. Podrían suceder daños, ineficacia u otras consecuencias inesperadas en los cultivos debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o el uso del producto de manera contraria a lo indicado en la etiqueta, todo lo cual está fuera del control de BASF Agricultural Solutions US LLC ("BASF") o el Vendedor. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el Comprador asumirá todos esos riesgos.

BASF garantiza que este producto cumple con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente apto para los propósitos mencionados en la sección **Instrucciones de uso**, sujeto a los riesgos inherentes antedichos.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE, BASF NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE APTITUD NI COMERCIALIZABILIDAD, NI OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE, EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE BASF, YA SEA POR VÍA CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O CUALQUIER OTRA, SE LIMITARÁ AL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE, BASF Y EL VENDEADOR RENUNCIAN A TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES, EJEMPLARES, ESPECIALES O INDIRECTOS RESULTANTES DEL USO O EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO.

BASF y el Vendedor ofrecen este producto, y el Comprador y el Usuario lo aceptan, sujeto a las **Condiciones de venta y garantía** antes indicadas, las cuales pueden modificarse solamente mediante un acuerdo por escrito, firmado por un representante debidamente autorizado de BASF.

1108

Insignia, Intrinsic, Pillar y Trinity son marcas registradas de BASF.

The Andersons es una marca registrada y SR-2000 es una marca comercial de The Andersons, Inc.

Earthway y EV-N-SPRED son marcas registradas de Earthway Products, Inc.

Lesco es una marca registrada y Commercial Plus es una marca comercial de LESCO, Inc.

EdgeGuard, Scotts y Turfbuilder son marcas registradas de The Scotts Company LLC.

© 2025 BASF Agricultural Solutions US LLC
Todos los derechos reservados.

007969-00304.20250509.NVA 2025-04-0363-0115
Con base en: NVA 2020-04-363-0249
Reemplaza a: NVA 2024-04-0363-0083

BASF Agricultural Solutions US LLC
2 TW Alexander Drive
Research Triangle Park, NC 27713


We create chemistry