

Basagran® T&O

Herbicide

Herbicida de posemergencia

Para el control de malezas de hoja ancha y juncias en céspedes y plantas ornamentales, así como en otros sitios no agrícolas que se indican en las instrucciones de uso

Ingrediente activo:

Sal de sodio de bentazón 44.0%

Otros ingredientes: 56.0%

Total: 100%

Formulado como líquido soluble

Equivalente a 4 libras por galón (479 gramos/litro) de bentazón [3-(1-metiletil)-1*H*-2,1,3-benzotiadiazina-4(3*H*)-ona 2,2-dióxido]

N.º de reg. de EPA 7969-326

N.º de est. de EPA

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN

Si no entiende la etiqueta, pida a alguien que se la explique detalladamente.

Consulte en el folleto adjunto la información completa sobre **primeros auxilios, declaraciones de precaución, instrucciones de uso, condiciones de venta y garantía**, y las restricciones específicas del estado en cuanto a cultivos o sitios de uso.

En caso de una emergencia que ponga en peligro la vida o la propiedad y que involucre a este producto, llame en cualquier momento del día o de la noche al 1-800-832-4357 (HELP).

Contenido neto:

PRIMEROS AUXILIOS

Si se ingiere	• Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento. • Si la persona puede tragar, haga que tome pequeños sorbos de agua. • NO induzca el vómito, a menos que así lo indique el centro de control de envenenamientos o el médico. • NO administre nada por vía oral a una persona inconsciente.
Si cae en la piel o la ropa	• Quítese la ropa contaminada. • Enjuáguese inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.
Si entra en contacto con los ojos	• Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y cuidadosamente con agua durante 15 a 20 minutos. • Si usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos; luego continúe enjuagándose los ojos. • Llame a un centro de control de envenenamientos para consejo de tratamiento.

NÚMERO TELEFÓNICO DIRECTO

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede ponerse en contacto con BASF Agricultural Solutions US LLC (de aquí en adelante, referida como "BASF") para pedir información sobre el tratamiento médico de emergencia: 1-800-832-4357 (HELP).

Declaraciones de precaución

Riesgos para los seres humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN. Este producto es perjudicial si se ingiere o absorbe por la piel. Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

Equipo de protección personal

Los aplicadores y todas las personas que manipulen el producto deben utilizar:

- Camisa de manga larga y pantalones largos
- Guantes impermeables
- Zapatos y calcetines

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y el mantenimiento del equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés). En caso de no existir dichas instrucciones de lavado, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el equipo de protección personal separadamente de otra ropa para lavar.

Controles de ingeniería

Cuando los manipuladores del producto utilicen sistemas cerrados, cabinas confinadas o aeronaves de una manera que se cumpla con los requisitos establecidos en el Estándar para la Protección del Trabajador (WPS, por sus siglas en inglés) para pesticidas agrícolas [40 CFR 170.240(d)(4-6)], los requisitos en cuanto al PPE de estas personas pueden reducirse o modificarse según lo especificado en el WPS.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

Los usuarios deben:

- Lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o ir al baño.
- Quitarse inmediatamente la ropa/PPE si el pesticida penetra o ingresa a los mismos. Luego, lavarse muy bien y ponerse ropa limpia.
- Quitarse inmediatamente el PPE después de manipular este producto. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lavarse muy bien y ponerse ropa limpia lo antes posible.

Riesgos para el medio ambiente

Para usos terrestres, **NO** lo aplique directamente a cuerpos de agua, en áreas donde haya aguas superficiales o en áreas intermareales que se encuentren bajo el nivel de altura máxima promedio del agua. **NO** contamine cuerpos de agua cuando elimine las aguas de lavado de equipo o aguas de enjuague. Se sabe que el bentazón puede filtrarse a aguas subterráneas bajo ciertas condiciones como resultado del uso según la etiqueta. El uso de este producto químico en áreas donde el suelo es permeable, especialmente en donde la tabla de agua está cercana a la superficie, puede causar la contaminación de aguas subterráneas.

El bentazón puede afectar especies vegetales no objetivo fuera del área de tratamiento. Para limitar los efectos adversos sobre plantas no objetivo, el aplicador debe evitar rociar el producto cuando el viento pueda propiciar la deriva del bentazón fuera del sitio de aplicación en dirección a zonas como áreas boscosas, zonas ribereñas, humedales y áreas que sirvan como hábitat para especies animales deseables o protegidas. **NO** lo aplique por vía aérea si hay especies de cultivos sensibles (como algodón, remolacha azucarera, girasol u ocra) a menos de 200 pies (61 m) de distancia.

NOTIFICACIÓN: Es una violación a la ley federal (EE. UU.) usar cualquier pesticida de una manera que cause la muerte o que modifique adversamente el hábitat de una especie en peligro de extinción.

Declaración sobre agentes polinizadores. Si llega a áreas que no son parte del objetivo, este producto puede tener un impacto negativo en el forraje y el hábitat de los agentes polinizadores locales, como la mariposa monarca (y sus larvas), los pájaros o los murciélagos. Siga las instrucciones de la etiqueta para minimizar la deriva del rociado a fin de proteger los agentes polinizadores.

Instrucciones de uso

Es una violación a las leyes federales (EE. UU.) usar este producto de manera inconsistente con lo indicado en su etiqueta. El usuario debe tener esta etiqueta consigo al momento de aplicar el herbicida.

NO aplique este producto de manera que pueda entrar en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea de forma directa o mediante la deriva. Solo se permite la presencia en el área del personal a cargo de la manipulación del producto durante su aplicación, con la protección adecuada. Para obtener información acerca de los requisitos específicos de su estado o localidad, consulte a la agencia responsable de la regulación de pesticidas.

REQUISITOS DE USO AGRÍCOLA

Use este producto solamente según lo indicado en la etiqueta y en cumplimiento con el Estándar para la Protección del Trabajador (40 CFR parte 170 de EE. UU.). Dicho estándar contiene los requisitos de protección para trabajadores agrícolas en granjas, bosques, invernaderos y viveros, y para los manipuladores de pesticidas agrícolas. Contiene los requisitos de capacitación, descontaminación, notificación y asistencia ante emergencias. Asimismo, contiene instrucciones específicas y excepciones relativas a las declaraciones de esta etiqueta sobre el uso de equipo de protección personal (PPE) y el intervalo de acceso restringido. Los requisitos indicados en este recuadro se aplican solamente a los usos de este producto que están cubiertos por el Estándar para la Protección del Trabajador (EE. UU.).

NO entre a las áreas tratadas ni permita el ingreso de trabajadores a ellas durante el intervalo de acceso restringido de **48 horas**.

El Estándar para la Protección del Trabajador (EE. UU.) permite usar el PPE exigido para el acceso anticipado a las áreas tratadas cuando ello implica el contacto con cualquier cosa que se haya tratado, como plantas, suelo o agua. Dicho equipo consiste en:

- Overol
- Guantes impermeables
- Zapatos y calcetines

REQUISITOS DE USO NO AGRÍCOLA

Los requisitos en este recuadro corresponden a los usos de este producto que **NO** están cubiertos por el Estándar para la Protección del Trabajador para pesticidas agrícolas (40 CFR parte 170 de EE. UU.). Dicho estándar se aplica cuando este producto se utiliza para cultivar plantas agrícolas en granjas, viveros o invernaderos.

Para usos laborales no contemplados por el estándar WPS:

NO ingrese ni permita la entrada de otras personas al área tratada hasta que se haya secado el rociado.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

NO contamine agua, comida ni forrajes mediante el almacenamiento o desecho.

Almacenamiento de pesticidas

NO permita que se congele este producto.

Desecho de pesticidas

Los residuos resultantes del uso de este producto pueden desecharse en el sitio en cuestión o en un centro aprobado para la eliminación de desechos.

Manipulación de recipientes

Recipiente no rellenable. NO reutilice ni rellene este recipiente. Enjuague tres veces o enjuague a presión (o su equivalente) de inmediato después de vaciarlo; luego ofrézcalo para su reciclaje (si está disponible) o para reacondicionarlo (si corresponde), o perfórelo y deséchelo en un área adecuada para desechos sanitarios, o incinerélo o deséchelo mediante otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales.

Enjuague tres veces los recipientes que sean suficientemente pequeños como para agitarlos (con capacidad ≤ 5 galones [≤ 19 L]) de esta manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o un tanque de mezclar, y drene por 10 segundos después de que el flujo empiece a gotear. Llene el recipiente una cuarta parte con agua y vuélvalo a tapar. Agítelo durante 10 segundos. Vierta la solución de enjuague en el equipo de aplicación o en un tanque de mezclar, o almacene el enjuague para su uso o desecho posterior. Drene durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Repita este procedimiento dos veces más.

Enjuague a presión siguiendo estas indicaciones:

Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o un tanque de mezclar y drene por 10 segundos después de que el flujo empiece a gotear. Mantenga el recipiente boca abajo sobre el equipo de aplicación o un tanque de mezclar, o recolecte el enjuague para su uso o eliminación posterior. Inserte la boquilla de enjuague a presión en el lado del recipiente y enjuague aproximadamente a 40 psi por lo menos durante 30 segundos. Drene durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear.

En caso de emergencia

En caso de que este producto se derrame a gran escala, llame a:

- CHEMTREC 1-800-424-9300
- BASF 1-800-832-4357 (HELP)

En caso de emergencia médica con respecto a este producto, llame a:

- Su médico local para obtener tratamiento de inmediato
- Su centro de control de envenenamientos (hospital) local
- BASF 1-800-832-4357 (HELP)

Información del producto

Basagran® T&O es un herbicida de tratamiento posemergente para el control selectivo de malezas de hoja ancha, juncias anuales y juncia avellanada o chufa, en los siguientes sitios de uso:

- Césped establecido
- Plantas ornamentales
- Viveros
- Sitios no agrícolas, bordes de carreteras y derechos de vía

Consulte las secciones sobre **Información específica para el sitio de uso** para conocer las instrucciones y restricciones particulares de aplicación para cada sitio.

Aplique **Basagran T&O** en posemergencia a malezas en crecimiento activo bajo condiciones adecuadas de humedad del suelo. Si la humedad del suelo no es adecuada para el crecimiento activo de las malezas, riegue antes de aplicar **Basagran T&O**. Las malezas que crecen bajo condiciones de sequía generalmente no se controlan de manera satisfactoria.

Basagran T&O no controla las malezas gramíneas.

Basagran T&O es eficaz principalmente por la actividad de contacto; por lo tanto, hay que cubrir totalmente las malezas con el rociado.

La lluvia o el riego con aspersores elevados durante las 8 horas siguientes a la aplicación puede reducir la eficacia de **Basagran T&O**.

Si mezcla **Basagran T&O** con otros pesticidas (fungicidas, herbicidas, insecticidas o acaricidas), aditivos o fertilizantes, puede producirse incompatibilidad física, disminuirse el control de las malezas o dañarse el césped y/o las plantas ornamentales.

Modo de acción

El bentazón, ingrediente activo en **Basagran T&O**, es un herbicida del **Grupo 6** (WSSA) que pertenece a la clase química de la benzotiadiazinona. **Basagran T&O** inhibe la fotosíntesis en el sitio B del fotosistema II, lo que produce síntomas de clorosis que progresan a necrosis y al control de las malezas emergidas.

Manejo de la resistencia a los herbicidas

Basagran T&O es un herbicida del **Grupo 6**. Cualquier población de malezas puede contener o desarrollar individuos naturalmente resistentes a **Basagran T&O** y a otros herbicidas del **Grupo 6**. Las especies de malezas con resistencia a herbicidas del **Grupo 6**, con el tiempo, pueden dominar la población de malezas si los herbicidas del **Grupo 6** se utilizan repetidamente en la misma zona o en años sucesivos como método principal de control de las especies objetivo. Esto podría causar pérdida parcial o total del control de esas especies con **Basagran T&O** u otros herbicidas del **Grupo 6**.

Para retrasar la resistencia a los herbicidas considere:

- Evitar el uso consecutivo de **Basagran T&O** u otros herbicidas del **Grupo 6** que tengan un sitio de acción objetivo similar en la misma especie de malezas.
- Utilizar mezclas en tanque o premezclas con herbicidas de diferentes grupos de sitios de acción objetivo, siempre y cuando los productos involucrados estén registrados para el mismo uso, tengan diferentes sitios de acción y ambos sean eficaces en la concentración de mezcla en tanque o premezcla sobre las malezas en cuestión.

- Basar el uso de herbicidas en un programa completo de control integrado de plagas que incluya métodos de cultivo y mecánicos.
- Supervisar las poblaciones de malezas tratadas para detectar la pérdida de eficacia en el campo y controlar las evasiones con herbicidas alternativos eficaces o métodos mecánicos.
- Identificar las malezas en el campo mediante la exploración y el historial del campo, y comprender su biología. El programa de control de malezas debe tener en cuenta todas las malezas presentes.
- Explorar los campos antes de la aplicación a fin de identificar las especies de malezas presentes y su fase de crecimiento para determinar si será eficaz la aplicación prevista.
- Explorar los campos después de la aplicación para verificar la eficacia del tratamiento.
- Es posible identificar las supuestas malezas resistentes al herbicida mediante estos indicadores:
 1. No se controla una especie de maleza normalmente controlada por el herbicida con la concentración aplicada, especialmente si se logra el control en malezas adyacentes;
 2. Una sección extendida de plantas no controladas de una especie de maleza en particular y
 3. Plantas sobrevivientes mezcladas con individuos controlados de la misma especie.
- Si se sospecha de resistencia, trate las evasiones de malezas con un herbicida que tenga un modo de acción diferente o utilice métodos sin productos químicos para eliminar las evasiones, en la medida que sea factible, con el objetivo de evitar la producción adicional de semillas.
- Informe a un representante local de BASF sobre cualquier ocasión donde este producto no haya desempeñado su función contra una especie de maleza en particular.
- Comuníquese con su especialista de extensión agrícola local y/o el fabricante del producto para consultar las indicaciones sobre manejo de la resistencia a los herbicidas o sobre el manejo integrado de malezas para cultivos específicos y biotipos resistentes de malezas.

Equipo aspersor

Aplique **Basagran T&O** con aspersores manuales de bombeo, mochilas aspersoras o aspersores tipo manguera.

Volumen de agua. Utilice un volumen mínimo de agua de 1 galón por 1000 sq ft (40 galones/acre) y una presión mínima de aspersión de 40 psi (medida en la barra rociadora, no en la bomba ni en la tubería). Cuando el follaje o la población de malezas sea densa, aumente el volumen de agua al equivalente de 2.5 galones por 1000 sq ft.

Las boquillas deben fijarse para rociar a no más de 20 pulgadas (51 cm) por encima del objetivo de aspersión (por ejemplo, la parte superior del follaje de la maleza).

Instrucciones especiales para aplicación terrestre

- **NO** utilice boquillas de inundación, de cámara de turbulencia ni aplicadores de microgota controlada (CDA).

Restricciones para el manejo de la deriva del rociado

Aplicaciones aéreas

- Al hacer aplicaciones aéreas, **NO** libere el rociado a una altura superior a 10 pies (3 m) por encima del follaje del cultivo, a menos que se necesite una altura superior de aplicación por seguridad del piloto.
- Los aplicadores deben seleccionar boquillas que suministren un tamaño de microgotas mediano o más grueso conforme a la norma S641 de ANSI/ASABE (Mayo de 2018).
- Cuando realice aplicaciones aéreas, la barra rociadora debe montarse en la aeronave para minimizar la deriva causada por los torbellinos del extremo de las alas o del rotor. La longitud de la barra rociadora no debe exceder el 75% de la envergadura del ala ni el 90% del diámetro de las palas del rotor.
- Cuando realice aplicaciones aéreas, los aplicadores deben usar 1/2 pasada de desplazamiento contra el viento en el borde del campo a favor del viento.
- Las boquillas deben orientarse de manera que el rociado se dirija hacia la parte de atrás de la aeronave.
- **NO** aplique el producto cuando las velocidades del viento superen las 10 millas por hora (16 km/h) en el sitio de aplicación.
- **NO** aplique el producto durante inversiones térmicas.

Aplicaciones con barra terrestre

- Para aplicaciones con barra rociadora terrestre, aplique con una altura de boquilla de no más de 4 pies (1.2 m) sobre el suelo o el dosel del cultivo.
- Los aplicadores deben seleccionar boquillas que suministren un tamaño de microgotas mediano o más grueso conforme a la norma S572.3 de ANSI/ASAE (Febrero de 2020).
- **NO** aplique el producto cuando las velocidades del viento superen las 10 millas por hora (16 km/h) en el sitio de aplicación.
- **NO** aplique el producto durante inversiones térmicas.

Notificación sobre el manejo de la deriva del producto

El aplicador es responsable de evitar la deriva del rociado en el sitio de aplicación, especialmente hacia áreas no objetivo. La interacción de muchos factores relativos al equipo y las condiciones climáticas determina la posibilidad de deriva del rociado. Al tomar decisiones sobre la aplicación, el aplicador es responsable de considerar todos estos factores.

Importancia del tamaño de la microgota

La forma más eficaz de reducir el potencial de deriva es aplicar las microgotas más grandes que proporcionen suficiente cobertura y control. La presencia de especies sensibles en las proximidades, las condiciones ambientales y la presión de la plaga pueden afectar a la forma en que un aplicador equilibra el control de la deriva y la cobertura. LA APLICACIÓN DE GOTAS MÁS GRANDES REDUCE EL POTENCIAL DE DERIVA, PERO NO LO EVITARÁ SI LAS APLICACIONES SE HACEN DE FORMA INCORRECTA O EN CONDICIONES AMBIENTALES DESFAVORABLES. Consulte las secciones **Viento, Temperatura y humedad** e **Inversiones térmicas** de esta etiqueta.

Cómo controlar el tamaño de la microgota - Barra terrestre

- **Volumen:** Utilice boquillas de alto caudal para aplicar el mayor volumen práctico de rociado. Las boquillas de mayor caudal volumétrico producen microgotas más grandes.
- **Presión:** Utilice las presiones de aplicación más bajas recomendadas para la boquilla. La presión más alta reduce el tamaño de la gota y no mejora la penetración en la cubierta vegetal. CUANDO SE NECESITEN CAUDALES MÁS ELEVADOS, UTILICE UNA BOQUILLA DE MAYOR CAPACIDAD EN LUGAR DE AUMENTAR LA PRESIÓN.
- **Tipo de boquilla:** Utilice un tipo de boquilla diseñado para la aplicación prevista. En la mayoría de los tipos de boquilla, los ángulos de rociado más estrechos producen microgotas más grandes. Considere utilizar boquillas que produzcan baja deriva.

Cómo controlar el tamaño de la microgota - Aplicación aérea

- **Cantidad de boquillas:** Utilice la cantidad mínima de boquillas con el mayor caudal volumétrico que proporcione una cobertura uniforme.
- **Orientación de la boquilla:** Al orientar las boquillas de modo que el rociado se libere hacia atrás en paralelo a la corriente de aire, se producirán microgotas más grandes que con otras orientaciones. EL APLICADOR ES RESPONSABLE DE EVITAR LA DERIVA DEL ROCIADO.
- **Tipo de boquilla:** Las boquillas de chorro sólido (como las de disco y núcleo con la placa deflectora removida) que estén orientadas directamente hacia atrás producen microgotas más grandes que otros tipos de boquilla.
- **Longitud de la barra rociadora:** Las barras más largas aumentan el potencial de deriva. Por lo tanto, se recomienda usar una longitud de barra más corta.
- **Altura de aplicación:** Las aplicaciones a una altura mayor de 10 pies (3 m) por encima del dosel aumentan el potencial de deriva del rociado.

Altura de la barra rociadora

La colocación de la barra rociadora a la altura más baja indicada en la etiqueta (si se especifica) que provee una cobertura uniforme reduce la exposición de las gotas a la evaporación y al viento. En el caso de equipo terrestre, la barra rociadora debe mantenerse a nivel y con rebote mínimo.

Viento

El potencial de deriva aumenta a velocidades de viento inferiores a 3 millas por hora (5 km/h) (debido al potencial de inversión) o superiores a 10 millas por hora (16 km/h). Sin embargo, muchos factores (como el tamaño de la gota y el tipo de equipo) determinan el potencial de deriva a cualquier velocidad de viento dada. EVITE LAS APLICACIONES DURANTE CONDICIONES CON RÁFAGAS DE VIENTO O SIN VIENTO.

Nota: El terreno local puede influir en los patrones del viento. Cada aplicador debe estar familiarizado con los patrones del viento local y debe conocer cómo estos patrones inciden en la deriva del rociado.

Temperatura y humedad

Al realizar aplicaciones en condiciones atmosféricas cálidas y secas, configure el equipo para producir microgotas más grandes a fin de reducir los efectos de la evaporación.

Inversión térmica

El potencial de deriva es alto durante inversiones térmicas. Las inversiones térmicas restringen la mezcla de aire vertical, por lo que las gotas pequeñas suspendidas permanecen cerca del suelo y se mueven de manera lateral en una nube concentrada. Las inversiones térmicas se caracterizan por el aumento de la temperatura con la altura y son comunes en las noches con nubosidad limitada y poco o nada de viento. Comienzan a formarse desde la puesta del sol y generalmente continúan hasta la mañana siguiente. Su presencia puede manifestarse en forma de niebla sobre el suelo; sin embargo, si no hay niebla, las inversiones también pueden identificarse por el movimiento de humo proveniente de una fuente terrestre o un generador de humo de aeronave. El humo que se acumula y se desplaza lateralmente en una nube concentrada (bajo condiciones de poco viento) indica una inversión, mientras que el humo que sube y se disipa rápidamente indica una buena mezcla de aire vertical.

Aspersores con pantallas

Colocar pantallas en la barra rociadora o en las boquillas individuales puede reducir los efectos del viento. Sin embargo, es responsabilidad del aplicador verificar que las pantallas protectoras eviten la deriva y que no interfieran con el depósito uniforme del producto.

Prevención de escorrentías

Para proteger el medio ambiente, **NO** permita que el pesticida entre o sea descargado en desagües pluviales, zanjas de drenaje, cunetas o cuerpos de agua superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté tranquilo y sin lluvia pronosticada en las próximas 24 horas ayudará a asegurar que el pesticida no será llevado fuera del área tratada debido a viento o lluvia. Lavar el equipo de aplicación dentro del área de tratamiento ayudará a evitar escorrentías hacia cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

Cómo limpiar el equipo aspersor

Limpie completamente el aspersor antes de aplicar el **herbicida Basagran® T&O**, especialmente si el herbicida utilizado previamente tiene el potencial de dañar el césped o las plantas ornamentales.

Instrucciones de mezclado para la aplicación

Llene el tanque de rociado totalmente limpio con 1/2 a 2/3 partes de agua limpia. Inicie la agitación. Agregue **Basagran T&O** y permita que los componentes se mezclen completamente. Agregue el concentrado de aceite y el volumen restante de agua. Mantenga una agitación constante durante la aplicación.

Mezcle únicamente la cantidad de solución de rociado necesaria para un solo uso. Utilice una mezcla de rociado nueva con cada aplicación.

Concentración de aplicación

Aplice **Basagran T&O** a las concentraciones de uso indicadas en la **Tabla 1** más un concentrado de aceite.

Tabla 1. Concentraciones de aplicación^{1,2} para Basagran T&O

Área de aspersión	Concentración de uso ³ de Basagran T&O (fl oz)		Agua como vehículo de aspersión (galones)
	Baja	Alta	
1000 sq ft	0.55	0.75	1 a 2
1 acre	24	32	40 a 80

¹ El uso de estas concentraciones para aplicaciones por aspersión en puntos localizados sobre malezas individuales puede resultar en una dosis excesiva y posible daño al césped o a las plantas ornamentales.

² Las concentraciones de aplicación dependen del tamaño de las especies de maleza objetivo; consulte la **Tabla 2** para ver las **Malezas controladas**.

³ La concentración baja equivale a 0.73 lb de bentazón/acre. La concentración alta equivale a 1.0 lb de bentazón/acre.

Adición de concentrado de aceite

Debe agregarse un concentrado de aceite no fitotóxico al tanque de rociado para un control óptimo de las malezas. **NO** aplique el concentrado de aceite en una mezcla en tanque con **Basagran T&O** sobre la parte superior de plantas ornamentales. El concentrado de aceite debe contener una base de aceite de petróleo o de aceite vegetal [como aceite de semilla metilado (MSO) o concentrado de aceite agrícola (COC)] y debe cumplir con todos los siguientes criterios:

- Que no sea fitotóxico
- Contener solamente ingredientes exentos por la EPA
- Que brinde una buena calidad de mezclado en la prueba en frasco (vea los párrafos siguientes)
- Exitoso en la experiencia local

La composición exacta de los productos adecuados variará; sin embargo, los concentrados de aceite de petróleo o aceite vegetal deben contener emulsionantes para producir una mezcla de buena calidad. Los aceites vegetales altamente refinados tienen mayor rendimiento que los aceites vegetales sin refinar. Para determinar la idoneidad de los concentrados de aceite con **Basagran T&O**, realice la siguiente prueba en frasco.

Prueba de compatibilidad con concentrado de aceite

Antes de mezclar los componentes, siempre haga una prueba de compatibilidad en frasco. Solo use agua de la fuente prevista a la temperatura de la fuente. Para lograr un volumen de rociado de 1 galón por 1000 sq ft, utilice 6-2/3 tazas (1600 ml) de agua. Para otros volúmenes de rociado, ajuste proporcionalmente. Agregue 2 cucharaditas de herbicida y aceite concentrado por cada 0.75 fl oz por 1000 sq ft de concentración de la etiqueta.

Agregue los componentes en la secuencia siguiente, mezclando suavemente entre cada agregado:

1. **Basagran T&O**
2. Producto de mezcla en tanque, si se utiliza
3. Concentrado de aceite

Tape el frasco, inviértalo 10 veces y deje reposar durante 15 minutos.

Evalúe. Una combinación ideal de mezcla en tanque será uniforme. La idoneidad del concentrado de aceite es cuestionable si se observa alguno de los siguientes aspectos:

- **Aceite libre en la superficie:** Película o glóbulos
- **Floculación:** Partículas finas que pueden estar suspendidas en el líquido o encontrarse como una capa precipitada en el fondo del frasco
- **Cuajamiento:** Textura espesa (coagulada) parecida al yogur o cuajada como la del requesón

Dosis de concentrado de aceite

Aplique el concentrado de aceite a razón de 0.75 fl oz por 1000 sq ft (equivalente a 2 pintas/acre).

La adición de concentrado de aceite a **Basagran T&O** puede causar una ligera quemadura en las hojas de plantas deseadas (césped, plantas ornamentales, etc.) cuando la humedad relativa y la temperatura son altas. Consulte a su proveedor de **Basagran T&O** para obtener información sobre experiencias locales satisfactorias antes de comprar concentrado de aceite.

NO aplique **Basagran T&O** más concentrado de aceite con pesticidas cuyas etiquetas adviertan contra su uso con coadyuvantes a base de aceite.

Restricciones de uso

- **NO** aplique durante condiciones de viento, ya que la deriva del producto puede causar daños a plantas ornamentales adyacentes.
- **NO** aplique el herbicida **Basagran® T&O** en aguas abiertas.
- **NO** aplique este producto mediante ningún tipo de sistema de riego.

Malezas controladas

Aplique el herbicida **Basagran® T&O** en posemergencia temprana a malezas en crecimiento activo antes de que alcancen el tamaño máximo indicado en la **Tabla 2**. La aplicación temprana a malezas recién emergidas o pequeñas proporcionará el control más eficaz. Retrasar la aplicación permitirá que las malezas continúen creciendo más allá del tamaño máximo indicado y dará como resultado un control inadecuado. **EXCEPCIONES:** Juncia avellanada o chufa y cardo cundidor. Consulte las **Instrucciones especiales para malezas problemáticas** después de la **Tabla 2**.

Tabla 2. Malezas controladas

Nombre común	Nombre científico	Concentración de aplicación de Basagran T&O			
		0.55 fl oz/1000 sq ft (24 fl oz/acre)		0.75 fl oz/1000 sq ft (32 fl oz/acre)	
		Etapa de crecimiento de la maleza			
		Etapa foliar	Altura máxima (pulgadas)	Etapa foliar	Altura máxima (pulgadas)
Malva cimarrona, violeta de monte	<i>Anoda cristata</i>	Hasta 6	3	6 a 8	4
Tomatillo, bolsa de coyote	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	2 a 4	2	4 a 6	3
Polígono trepador o enredadera	<i>Polygonum convolvulus</i>	Hasta 4	3	4 a 6	5
Cafecillo	<i>Cassia occidentalis</i>	NR	—	Hasta 1 pinado*	2
Canutillo	<i>Commelina</i> spp.	Hasta 6	4	6 a 10	8
Garra del diablo	<i>Proboscidea louisiana</i>	NR	—	Hasta 6*	3
Estrellita, andán chico	<i>Galinsoga</i> spp.	NR	—	Cotiledón a 6*	2
Flor amarilla, hierba cana	<i>Senecio vulgaris</i>	NR	—	2 a 10	6
Persicaria	<i>Polygonum persicaria</i>	Hasta 6	6	6 a 10	10
Quínoa ¹ común	<i>Chenopodium album</i>	NR	—	4 a 8*	2
Mostaza de campo	<i>Sinapis arvensis</i>	Hasta 6	4	6 a 10	8
Juncia avellanada, chufa	<i>Cyperus esculentus</i>	Consultar las Instrucciones especiales para malezas problemáticas			
Nochebuena silvestre	<i>Euphorbia heterophylla</i>	2 a 4	4	4 a 8*	6
Escoba dura	<i>Sida spinosa</i>	Hasta 6	3	6 a 8	4
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	Hasta 4	1	4 a 6	2
Ambrosía común (artemisa)	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NR	—	4 a 6*	3
Ambrosía gigante ²	<i>Ambrosia trifida</i>	NR	—	Hasta 4	6
Malva	<i>Melochia corchorifolia</i>	4 a 6	6	6 a 10	8
Juncia anual	<i>Cyperus compressus</i>	NR	6 a 8	NR	6 a 8
Sesbania	<i>Sesbania exaltata</i>	NR	—	3 a 5*	3
Bolsa de pastor ³	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hasta 6	4	6 a 10	8
Poligonato de Pensilvania	<i>Polygonum pensylvanicum</i>	Hasta 6	6	6 a 10	10
Rosetilla/Pinchudo	<i>Soliva pterosperma</i>	NR	—	2 a 6	3
Girasol silvestre	<i>Helianthus annuus</i>	Hasta 4	5	4 a 6	8
Cardo cundidor	<i>Cirsium arvense</i>	Consultar las Instrucciones especiales para malezas problemáticas			
Cardo almizclero	<i>Carduus nutans</i>				

¹ El control puede ser parcial o irregular.

² Si aparece un segundo brote de malezas después de la primera aplicación, vuelva a tratar según esta tabla de concentraciones.

³ **NO** trate la roseta antes de que aparezca el tallo de la semilla.

* Requiere agregar concentrado de aceite a razón de 0.75 fl oz/1000 sq ft (2 pintas/acre).

NR = No se recomienda para el uso

Instrucciones especiales para malezas problemáticas

Cardo cundidor

Aplique 0.75 fl oz de herbicida **Basagran® T&O** por 1000 sq ft (32 fl oz/acre) cuando el cardo cundidor tenga de 8 pulgadas (20 cm) de altura hasta la fase de capullo. Si no se obtiene el control deseado con la primera aplicación, realice una segunda aplicación con la misma concentración 7 a 10 días después o cuando aparezca nuevo crecimiento.

Cardo almizclero

Aplique 0.75 fl oz de **Basagran T&O** por 1000 sq ft (32 fl oz/acre) cuando el cardo almizclero se encuentre en etapa de roseta y no tenga más de 10 pulgadas (25 cm) de diámetro. Si no se obtiene el control deseado con la primera aplicación, realice una segunda aplicación con la misma concentración 7 a 10 días después o cuando aparezca nuevo crecimiento.

Juncia avellanada, chufa

Realice dos aplicaciones de **Basagran T&O** para un mejor control de juncia avellanada o chufa. Aplique de 0.55 a 0.75 fl oz de **Basagran T&O** por 1000 sq ft (24 a 32 fl oz/acre) cuando la juncia avellanada o chufa tenga de 6 a 8 pulgadas (15 a 20 cm) de altura. Realice una segunda aplicación con la misma concentración 7 a 10 días después o cuando aparezca nuevo crecimiento más adelante en la temporada. Es esencial lograr una cobertura completa de rociado sobre la juncia avellanada o chufa para un control máximo.

La juncia avellanada o chufa emerge de mayo a julio en el norte de los Estados Unidos, pero emerge durante todo el año en el sur de los Estados Unidos. Planifique las aplicaciones iniciales cuando la juncia avellanada o chufa haya emergido, ya que **Basagran T&O** solo controlará las plantas de juncia que hayan emergido.

Información específica para el sitio de uso

Césped establecido

Basagran T&O puede aplicarse en césped establecido que crece en áreas tales como campos deportivos, zonas comerciales o residenciales, campos de golf, áreas recreativas, granjas productoras de césped o cualquier otra zona con césped establecido bajo mantenimiento.

Basagran T&O puede utilizarse en las siguientes especies de césped establecido:

Pasto bahía, hopillo rastrero, grama común (zacate Bermuda), zacate azul, hierba búfalo, pasto alfombra, grama ciempiés, festuca, raigrás, hierba de San Agustín o gramón, grama de agua o césped del mar y zoysia.

Restricciones para césped

- **NO** aplique **Basagran T&O** a césped que se encuentre sometido a condiciones de estrés, tales como sequía, bajas temperaturas o daño causado por otros herbicidas o pesticidas.
- **NO** aplique **Basagran T&O** a césped recién sembrado o recién establecido por estolones hasta que las plántulas o los estolones estén bien establecidos, ya que pueden producirse daños.
- **NO** aplique más de 32 fl oz de **Basagran T&O** por acre (1.0 lb de bentazón/acre) en una sola aplicación.

- **NO** aplique más de 0.75 fl oz de **Basagran T&O** por 1000 sq ft (1.0 lb de bentazón/acre) en una sola aplicación.
- **NO** aplique más de un total de 64 fl oz de **Basagran T&O** por acre (2.0 lb de bentazón/acre) por año.
- Cantidad máxima de aplicaciones por año: 2.
- **NO** realice más de una aplicación dentro de un período de 7 días.
- **NO** utilice el producto en greens ni en collares de campos de golf.
- Para un mejor control de malezas de hoja ancha, **NO** corte el césped dentro de los 3 días anteriores o posteriores a la aplicación.
- Para un mejor control de juncias, **NO** corte el césped dentro de los 5 días posteriores a la aplicación.
- **Raigrás perenne.** No aplique más de 0.75 fl oz de **Basagran T&O** por 1000 sq ft (32 fl oz/acre, 1.0 lb de bentazón/acre) en una sola aplicación y realice las aplicaciones subsiguientes con un intervalo mínimo de 21 días.

Precauciones para el césped

- **Césped establecido sin cortar.** Realice la primera aplicación de **Basagran T&O** después del brote, pero antes de que la juncia anual, el cardo cundidor y la juncia avellanada o chufa alcancen 8 pulgadas (20 cm) de altura. Las malezas anuales de hoja ancha no deben tener más de 4 pulgadas (10 cm) de altura.
- Al tratar césped con **Basagran T&O**, evite rociar por encima de árboles, arbustos y flores ornamentales adyacentes, salvo que se especifique lo contrario en esta etiqueta. La aplicación cerca de la base de árboles, arbustos y flores ornamentales establecidos no debiera causar daños, **excepto en plátano occidental y rododendro.**

Mezclas en tanque para céspedes establecidos

Para el control posemergente de otras malezas de hoja ancha o juncias que no figuran en esta etiqueta, mezcle en tanque **Basagran T&O** con otros productos registrados para uso en césped, tales como el herbicida **Turflon®**, 2,4-D, atrazine, MSMA y mezclas de 2,4-D, MCPP (mecoprop) o 2,4-DP (dichlorprop). Algunos de estos productos no pueden utilizarse en todos los sitios o especies de césped. Consulte las etiquetas respectivas de cada producto para conocer las restricciones por sitio y especie. Puede utilizarse una mezcla en tanque con el herbicida **Segment® II** en grama ciempiés y especies de festuca fina.

Determine la compatibilidad del posible producto para mezcla en tanque antes de mezclarlo con **Basagran T&O** en el tanque de rociado. Si es necesario, puede utilizarse un agente antiespumante. **NO** utilice un surfactante ni aditivo a base de aceite con 2,4-D, MCPP o 2,4-DP.

Lea la etiqueta de cada producto para mezcla en tanque para conocer las **Instrucciones de uso**, las **Declaraciones de precaución** y las **Restricciones de uso**. El usuario del producto es responsable de verificar que todos los productos en las mezclas de la lista estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y las declaraciones de precaución más restrictivas de cada producto en la mezcla en tanque.

Consulte a las autoridades profesionales locales cuando utilice combinaciones de mezcla en tanque distintas a las especificadas por BASF. De lo contrario, pruebe una pequeña área del sitio con la combinación deseada de mezcla en tanque y espere de 7 a 10 días para evaluar el potencial de daño antes de su uso a gran escala.

Plantas ornamentales, viveros, sitios no agrícolas, bordes de carretera y derechos de vía

El herbicida **Basagran® T&O** puede aplicarse por encima de ciertas especies ornamentales indicadas en la **Tabla 3. NO** aplique el concentrado de aceite en una mezcla en tanque con **Basagran T&O** sobre la parte superior de plantas ornamentales. Debido a la variabilidad dentro de las especies, así como a las diferencias en las técnicas de aplicación y métodos de uso, no se ha determinado completamente si **Basagran T&O** puede utilizarse de manera segura en todas las plantas ornamentales o de vivero bajo todas las condiciones de crecimiento. Por lo tanto, se debe aplicar el producto solamente en algunas plantas para determinar si **Basagran T&O** puede utilizarse de manera segura antes de realizar una aplicación a gran escala.

Para todos los demás árboles, arbustos, flores y plantas de vivero de paisajismo y ornamentales que no figuren en la **Tabla 3**, aplique **Basagran T&O** como aspersión dirigida, evitando el follaje de las plantas deseadas. **NO** aplique **Basagran T&O** como aspersión dirigida bajo la línea de goteo del árbol ni sobre las raíces de **plátano occidental y rododendro**, ya que pueden producirse daños. **NO** aplique el producto si el riesgo de daño al **plátano occidental y rododendro** no es aceptable.

Basagran T&O puede utilizarse en sitios donde debe mantenerse el césped.

Tabla 3. Especies ornamentales para aplicación sobre el follaje

Nombre común	Nombre científico
Coralito, heuchera	<i>Heuchera</i> spp.
Manzano (sin frutos)	<i>Malus</i> spp.
Tuya del Canadá*	<i>Thuja occidentalis</i>
Agracejo rojo	<i>Berberis thunbergii</i>
Búgula o lechuguilla	<i>Ajuga</i> spp.
Tepozán	<i>Buddleia davidii</i>
Col de jardín	<i>Brassica</i> spp.
Jazmín del Cabo	<i>Gardenia</i> spp.
Aronia	<i>Photinia</i> spp.
Campanilla de coral	<i>Heuchera</i> spp.
Griñolera	<i>Cotoneaster</i> spp.
Manzano silvestre (sin frutos)	<i>Malus</i> spp.
Árbol de Júpiter	<i>Lagerstroemia indica</i>
Ciprés calvo	<i>Taxodium distichum</i>
Lirio de la mañana	<i>Hemerocallis</i> spp.

(continúa)

Tabla 3. Especies ornamentales para aplicación sobre el follaje (continúa)

Nombre común	Nombre científico
Aciano	<i>Centaurea cineraria</i>
Evónimo rastrero	<i>Euonymus</i> spp.
Gardenia común	<i>Gardenia</i> spp.
Jabonero de la China	<i>Koelreuteria bipinnata</i>
Espino indio	<i>Rhaphiolepis indica</i>
Acebo	<i>Ilex</i> spp.
Acebo chino	<i>Ilex cornuta</i>
Acebo chino enano	<i>Ilex cornuta</i>
Acebo japonés	<i>Ilex crenata</i>
Jazmín	<i>Jasminum</i> spp.
Hosta, hermosa	<i>Hosta fortunei</i>
Liriope, serpentina	<i>Liriope</i> spp.
Lirio azul grande	<i>Liriope muscari</i>
Espigosa, lirio césped	<i>Liriope spicata</i>
Cempoa	<i>Tagetes</i> spp.
Árbol de la cera	<i>Myrica cerifera</i>
Roble rojo americano*	<i>Quercus rubra</i>
Diamante	<i>Pachysandra terminalis</i>
Petunia	<i>Petunia hybrida</i>
Fotinia	<i>Photinia</i> spp.
Pino de montaña	<i>Pinus mugo</i>
Pino blanco	<i>Pinus strobus</i>
Pitóspero japonés	<i>Pittosporum tobira</i>
Boca de dragón, conejitos	<i>Antirrhinum majus</i>

* No realice más de una aplicación por cultivo por temporada de crecimiento. Algunas especies dentro de un mismo género pueden variar en cuanto a su grado de tolerancia. Antes de aplicar en una gran cantidad de plantas dentro de la misma especie, pruebe **Basagran T&O** en una pequeña cantidad de plantas de esa especie y observe durante 2 semanas. **NO aplique aceite agrícola** junto con la aplicación de **Basagran T&O** por encima de plantas ornamentales, ya que pueden producirse daños.

Restricciones para plantas ornamentales y de vivero

- **NO** aplique **Basagran T&O** a plantas ornamentales o de vivero que hayan estado sujetas a condiciones de estrés tales como daños por granizo, inundación, sequía, calor extremo o fluctuaciones amplias de temperatura, ya que pueden producirse daños en el cultivo.
- **NO** aplique **Basagran T&O** si las plantas ornamentales o de vivero presentan daños (fitotoxicidad foliar o retraso en el crecimiento) producidos por una aplicación previa de herbicida, ya que tales daños pueden intensificarse o prolongarse.
- **NO** aplique más de 32 fl oz de **Basagran T&O** por acre (1.0 lb de bentazón/acre) en una sola aplicación.
- **NO** aplique más de 0.75 fl oz de **Basagran T&O** por 1000 sq ft (1.0 lb de bentazón/acre) en una sola aplicación.

- **NO** aplique más de un total de 64 fl oz de herbicida **Basagran® T&O** por acre (2.0 lb de bentazón/acre) por año.
- Cantidad máxima de aplicaciones por año: 2.
- **NO** realice más de una aplicación dentro de un período de 7 días.

Mezclas en tanque para plantas ornamentales y viveros

Mezclas en tanque de Basagran T&O con herbicida Tower®.

Aplique una mezcla en tanque de **Basagran T&O** y **Tower** como aspersión dirigida en posemergencia para controlar la juncia avellanada o chufa y ciertas malezas de hoja ancha emergidas que figuran en la etiqueta de **Basagran T&O**. Esta mezcla en tanque también controlará ciertas malezas de hoja ancha y gramíneas indicadas en la etiqueta de **Tower** que no hayan emergido. Aplique esta mezcla en tanque como aspersión dirigida, evitando el follaje de las plantas ornamentales. Si el follaje de alguna planta deseada recibe aplicación directa o indirecta, lave la solución del follaje inmediatamente.

Mezcla en tanque de Basagran T&O y herbicida Segment® II.

Se puede aplicar una mezcla en tanque de **Basagran T&O** y **Segment II** para controlar la juncia avellanada o chufa, ciertas malezas de hoja ancha y malezas gramíneas anuales y perennes. Esta mezcla en tanque no controlará malezas ni gramíneas que no hayan emergido. Aplique la mezcla como aspersión dirigida, evitando el follaje de las plantas ornamentales. Si el follaje de alguna planta deseada recibe aplicación directa o indirecta, lave la solución del follaje inmediatamente.

Otras mezclas en tanque. **Basagran T&O** puede mezclarse en tanque con otros productos compatibles, registrados para usarse en plantas ornamentales. Aplique las mezclas en tanque de **Basagran T&O** y otros productos, como aspersión dirigida, evitando el follaje de las plantas ornamentales. Si el follaje de alguna planta deseada recibe aplicación directa o indirecta, lave la solución del follaje inmediatamente.

Cuando aplique mezclas en tanque no especificadas en esta etiqueta, pruebe la aplicación en un área pequeña para determinar la seguridad de la mezcla prevista. Antes de realizar una aplicación a gran escala de esta mezcla en tanque, evalúe el potencial de daño de 5 a 7 días después.

Lea la etiqueta de cada producto para mezcla en tanque para conocer las **Instrucciones de uso**, las **Declaraciones de precaución** y las **Restricciones de uso**. El usuario del producto es responsable de verificar que todos los productos en las mezclas de la lista estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y las declaraciones de precaución más restrictivas de cada producto en la mezcla en tanque.

Condiciones de venta y garantía

Las **Instrucciones de uso** de este producto reflejan la opinión de expertos con base en el uso y las pruebas de campo. Las instrucciones se consideran confiables si se siguen cuidadosamente. No obstante, es imposible eliminar todos los riesgos inherentes al uso de este producto. Podrían suceder daños, ineficacia u otras consecuencias inesperadas en las plantas debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o el uso del producto de manera contraria a lo indicado en la etiqueta, todo lo cual está fuera del control de BASF Agricultural Solutions US LLC ("BASF") o el Vendedor. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el Comprador asumirá todos esos riesgos.

BASF garantiza que este producto cumple con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente apto para los propósitos mencionados en la sección **Instrucciones de uso**, sujeto a los riesgos inherentes antedichos.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE, BASF NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE APTITUD NI COMERCIABILIDAD, NI OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE, EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE BASF, YA SEA POR VÍA CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O CUALQUIER OTRA, SE LIMITARÁ AL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE, BASF Y EL VENDEDOR RENUNCIAN A TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES, EJEMPLARES, ESPECIALES O INDIRECTOS RESULTANTES DEL USO O EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO.

BASF y el Vendedor ofrecen este producto, y el Comprador y el Usuario lo aceptan, sujeto a las **Condiciones de venta y garantía** antes indicadas, las cuales pueden modificarse solamente mediante un acuerdo por escrito, firmado por un representante debidamente autorizado de BASF.

1108P

***Basagran**, **Segment** y **Tower** son marcas registradas de BASF.*

***Turflon** es una marca registrada de Dow AgroSciences LLC.*

© 2025 BASF Agricultural Solutions US LLC
Todos los derechos reservados.

007969-00326.20250212.**NVA 2024-04-0375-0287**

Con base en: NVA 2018-04-375-0001
Reemplaza a: NVA 2024-04-0375-0276

BASF Agricultural Solutions US LLC
2 TW Alexander Drive
Research Triangle Park, NC 27713


We create chemistry