

TRITICONAZOL	GRUPO	3	FUNGICIDA
PIRACLOSTROBINA	GRUPO	11	FUNGICIDA

Pillar[®] SC

Intrinsic[®] Brand Fungicide

Para el control de enfermedades y la salud vegetal en céspedes y plantas ornamentales

Ingredientes activos*:

triticonazol: (1RS)-(E)-5-[(4-clorofenil)metileno]-2, 2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol. 17.95%

piraclostrobina: (ácido carbámico [2-[[[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxil]metil]fenil]metoxi-, éster metilo) 15.80%

Otros ingredientes: 66.25%

Total: 100.00%

* El fungicida marca **Pillar[®] SC Intrinsic[®]** contiene 1.67 lb de triticonazol y 1.47 lb de piraclostrobina por galón (200 g/litro y 176 g/litro respectivamente), formulado como un concentrado en suspensión (SC).

N.º de reg. de EPA 7969-480

N.º de est. de EPA

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

WARNING/AVISO

Si no entiende la etiqueta, pida a alguien que se la explique detalladamente.

Lea toda la etiqueta para ver la información completa sobre **primeros auxilios, declaraciones de precaución, instrucciones de uso, condiciones de venta y garantía**, y las restricciones específicas del estado en cuanto a cultivo o sitio de uso.

En caso de una emergencia que ponga en peligro la vida o los bienes y que involucre a este producto, llame en cualquier momento del día o la noche al 1-800-832-4357 (HELP).

Contenido neto:

PRIMEROS AUXILIOS

Si se ingiere	• Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento. • Si la persona puede tragar, haga que tome pequeños sorbos de agua. • NO induzca el vómito, a menos que así lo indique el centro de control de envenenamientos o el médico. • NO administre nada por vía oral a una persona inconsciente.
Si es inhalado	• Traslade a la persona a un lugar con aire fresco. • Si la persona no está respirando, llame al 911, a su número local de emergencias o a una ambulancia. Luego proceda a dar respiración artificial, preferiblemente de boca a boca, si es posible. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.
Si cae en la piel o la ropa	• Quítese la ropa contaminada. • Enjuáguese inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.
Si entra en contacto con los ojos	• Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y cuidadosamente con agua durante 15 a 20 minutos. • Si usa lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos; luego continúe enjuagándose los ojos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.

NÚMERO TELEFÓNICO DIRECTO

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede ponerse en contacto con BASF Agricultural Solutions US LLC (de aquí en adelante, referida como "BASF") para pedir información sobre el tratamiento médico de emergencia: 1-800-832-4357 (HELP).

Declaraciones de precaución

Riesgos para los seres humanos y animales domésticos

AVISO. Puede ser letal si se ingiere. Dañino si se inhala. Evite el contacto con la piel o la ropa. Lávese con abundante agua y jabón luego de manipular los pesticidas y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o ir al baño. Evite respirar polvo, vapor o la niebla del rociado de este producto. Quítese y lave la ropa contaminada antes de reutilizarla. **El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.**

Equipo de protección personal

Los aplicadores y todas las personas que manipulen el producto deben utilizar:

- Camisa de manga larga y pantalones largos
- Guantes impermeables o resistentes a productos químicos (hechos de laminados impermeables, goma de butilo, goma de nitrilo, goma de neopreno, cloruro de polivinilo (PVC) o Viton® de ≥ 14 milipulgadas [0.36 mm] de espesor en todos los casos)
- Zapatos y calcetines

Requerimientos de seguridad para el usuario

Deseche la ropa y otros materiales absorbentes que hayan sido empapados o muy contaminados con el concentrado de este producto. **NO** vuelva a utilizarlos. Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y el mantenimiento del equipo de protección personal. En caso de no existir dichas instrucciones de lavado, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el equipo de protección personal separadamente de otra ropa para lavar.

Controles de ingeniería

Cuando las personas que manipulan el producto utilicen sistemas cerrados, cabinas confinadas o aeronaves de una manera que cumpla con los requisitos establecidos en el Estándar para la Protección del Trabajador (WPS, por sus

siglas en inglés) para pesticidas agrícolas [40 CFR 170.240(d) (4-6) de EE. UU.], los requisitos en cuanto al equipo de protección personal de estas personas se pueden reducir o modificar según se especifica en el WPS.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

Los usuarios deben:

- Quitarse inmediatamente la ropa o el equipo de protección personal si el pesticida penetra o ingresa a los mismos. Luego, lavarse muy bien y ponerse ropa limpia.
- Quitarse el equipo de protección personal inmediatamente después de manipular este producto. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lavarse muy bien y ponerse ropa limpia lo antes posible.

Riesgos para el medio ambiente

Este pesticida es tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. La deriva y las escorrentías pueden ser peligrosas para los organismos acuáticos en aguas adyacentes a las áreas tratadas.

NO lo aplique directamente a cuerpos de agua, en áreas donde haya aguas superficiales o en áreas intermareales que se encuentren bajo el nivel de altura máxima promedio del agua. **NO** contamine cuerpos de agua cuando elimine las aguas de lavado de equipo o aguas de enjuague.

Este producto puede impactar la calidad de cuerpos de agua superficiales debido a escorrentías de aguas pluviales. Esto es especialmente notable en suelos con poco drenaje y suelos con una tabla de agua que está cercana a la superficie.

Notificación sobre el agua subterránea

Se sabe que la piraclostrobina puede filtrarse a aguas subterráneas bajo ciertas condiciones como resultado del uso según la etiqueta. El triticonazol y la piraclostrobina pueden filtrarse a aguas subterráneas si se utilizan en áreas donde el suelo es permeable, especialmente en donde la tabla de agua está cercana a la superficie.

Notificación sobre aguas superficiales

Este producto puede impactar la calidad de cuerpos de agua superficiales debido a escorrentías de aguas pluviales. Esto es especialmente notable en suelos con poco drenaje y suelos con una tabla de agua que está cercana a la superficie. Este producto se clasifica con alto potencial de llegar al agua superficial mediante la escorrentía por varios meses o más después de su aplicación. Una franja vegetal de protección o zona de amortiguamiento, nivelada y bien mantenida, entre las áreas donde este producto es utilizado y cuerpos de agua superficiales, incluidos lagos (lagunas), ríos y manantiales, reducirá el posible movimiento de residuos de triticonazol, piraclostrobina y sus productos degradados provenientes de aguas de escorrentía y sedimentos. Se pueden reducir considerablemente las escorrentías de este producto evitando su aplicación cuando esté pronosticada lluvia o irrigación dentro de 48 horas.

Las prácticas eficaces de control de la erosión reducirán la contribución de este producto a la contaminación de las aguas superficiales.

Instrucciones de uso

Es una violación de la ley federal (EE. UU.) utilizar este producto de manera inconsistente con lo indicado en su etiqueta. El usuario debe tener esta etiqueta consigo durante la aplicación.

Lea toda la etiqueta. Utilice el producto cumpliendo estrictamente las declaraciones de precaución e instrucciones, y los reglamentos estatales y federales correspondientes.

NO aplique este producto de manera que pueda entrar en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea de forma directa o mediante la deriva. Solo se permite la presencia en el área del personal a cargo de la manipulación del producto durante su aplicación, con la protección adecuada. Para obtener información acerca de los requisitos específicos de su estado o localidad, consulte a la agencia responsable de la regulación de pesticidas.

REQUISITOS DE USO AGRÍCOLA

Use este producto solamente según lo indicado en la etiqueta y en cumplimiento con el Estándar para la Protección del Trabajador (40 CFR parte 170 de EE. UU.). Dicho estándar contiene los requisitos de protección para trabajadores agrícolas en granjas, bosques, invernaderos y viveros, y para los manipuladores de pesticidas agrícolas. Contiene los requisitos de capacitación, descontaminación, notificación y asistencia ante emergencias. Además, contiene instrucciones específicas y excepciones relativas a las declaraciones de esta etiqueta sobre el uso de equipo de protección personal, notificación a los trabajadores y el intervalo de acceso restringido. Los requisitos indicados en este recuadro se aplican solamente a los usos de este producto que están cubiertos por el Estándar para la Protección del Trabajador (EE. UU.).

NO entre a las áreas tratadas ni permita el ingreso de trabajadores a ellas durante el intervalo de acceso restringido de **12 horas**.

El Estándar para la Protección del Trabajador (EE. UU.) permite usar el equipo de protección personal exigido para el acceso anticipado a las áreas tratadas cuando ello implica el contacto con cualquier cosa que se haya tratado, como plantas, suelo o agua. Dicho equipo consiste en:

- Overol

REQUISITOS DE USO AGRÍCOLA

- Guantes resistentes a productos químicos (materiales laminados impermeables, goma de butilo, goma de nitrilo, goma de neopreno, cloruro de polivinilo (PVC) o Viton® de ≥ 14 milipulgadas [0.36 mm] de espesor en todos los casos)
- Zapatos y calcetines

REQUISITOS DE USO NO AGRÍCOLA

Los requisitos en este recuadro corresponden a los usos de este producto que NO están cubiertos por el Estándar para la Protección del Trabajador para pesticidas agrícolas (40 CFR parte 170 de EE. UU.). Dicho estándar se aplica cuando este producto se utiliza para cultivar plantas agrícolas en granjas, viveros o invernaderos.

NO ingrese ni permita el acceso de otras personas al área tratada hasta que se haya secado el rociado.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

NO contamine agua, comida ni forrajes mediante el almacenamiento o desecho.

Almacenamiento de pesticidas

Almacene este producto solamente en su recipiente original. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. **NO** lo guarde cerca de comestibles ni alimentos para animales.

Desecho de pesticidas

Los residuos resultantes del uso de este producto pueden desecharse en el sitio en cuestión o en un centro aprobado para la eliminación de desechos.

Manipulación de recipientes

Recipiente no rellenable. NO reutilice ni rellene este recipiente. Enjuague tres veces o enjuague a presión el recipiente (o equivalente) inmediatamente después de vaciarlo; luego ofrezca para el reciclaje si está disponible o el reacondicionado, si es adecuado, o perfore y deseche en un área adecuada para desechos sanitarios, o por incineración, o por otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales.

Enjuague tres veces los recipientes que sean suficientemente pequeños como para agitarlos (con capacidad de ≤ 5 galones [≤ 19 L]) de esta manera:

Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o un tanque de mezclar, y drene por 10 segundos después de que el flujo empiece a gotear. Llene el recipiente una cuarta parte con agua y vuélvalo a tapar. Agítelo durante 10 segundos. Vierta el enjuague en el equipo de aplicación o tanque de mezclar, o almacene el enjuague para su uso o desecho posterior. Drene durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Repita este procedimiento dos veces más.

Enjuague tres veces los recipientes que sean demasiado grandes como para agitarlos (capacidad de >5 galones [>19 L]) de esta manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o un tanque de mezclar. Llene el recipiente 1/4 con agua. Tape de nuevo y asegure los cierres. Vuelque el recipiente al lado y hágalo rodar por 30 segundos, asegurando por lo menos una revolución completa. Ponga el recipiente vertical e inclínelo hacia adelante y hacia atrás varias veces. Dé vuelta al recipiente hacia el lado opuesto e inclínelo hacia adelante y hacia atrás varias veces. Vierta el enjuague en el equipo de aplicación o tanque de mezclar, o almacene el enjuague para su uso o eliminación posterior. Repita este procedimiento dos veces más.

(continúa)

ALMACENAMIENTO Y DESECHO (continúa)

Manipulación de recipientes (continúa)

Enjuague a presión siguiendo estas indicaciones:

Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o un tanque de mezclar y drene por 10 segundos después de que el flujo empiece a gotear. Mantenga el recipiente boca abajo sobre el equipo de aplicación o un tanque de mezclar, o recolecte el enjuague para su uso o eliminación posterior. Inserte la boquilla de enjuague a presión en el lado del recipiente y enjuague aproximadamente a 40 psi por lo menos durante 30 segundos. Drene durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear.

Recipiente rellenable. Rellene este recipiente únicamente con pesticida. **NO** vuelva a utilizar este recipiente para ningún otro propósito. Enjuagar a presión el recipiente antes de su eliminación final es la responsabilidad de la persona que se deshace del recipiente. La limpieza antes de rellenar es la responsabilidad de la persona que lo va a rellenar.

Enjuague tres veces siguiendo estas indicaciones:

Para limpiar el recipiente antes de la eliminación final, vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o tanque de mezclar. Llene el recipiente aproximadamente un 10% con agua. Agítelo vigorosamente o haga recircular el agua con la bomba durante 2 minutos. Vierta o bombee el enjuague en el equipo de aplicación o sistema de recolección de enjuague. Repita este procedimiento de enjuague dos veces más.

Cuando se haya vaciado el recipiente, vuelva a ponerle la tapa y selle todas las aberturas efectuadas durante el uso; devuelva el recipiente al punto de compra o al lugar designado para ello. Este recipiente puede llenarse únicamente con un producto pesticida. Antes de rellenar el recipiente, inspecciónelo atentamente para detectar daños como grietas, punciones, abrasiones y desgastes de roscas o dispositivos de cierre. Antes de rellenar y de transportar el recipiente, verifique si hay fugas. **NO** transporte este recipiente si está dañado o tiene fugas. Si el recipiente está dañado, tiene fugas o es obsoleto, y no se devuelve al punto de compra o al lugar designado para ello, enjuague tres veces el recipiente vacío y ofrézcalo para su reciclaje, si está disponible, o deséchelo en cumplimiento de las normas estatales y locales.

En caso de emergencia

En caso de un derrame a gran escala de este producto, llame a:

- CHEMTREC 1-800-424-9300
- BASF 1-800-832-4357 (HELP)

En caso de emergencia médica con respecto a este producto, llame a:

- Su médico local para obtener tratamiento de inmediato
- Su centro de control de envenenamientos (hospital) local
- BASF 1-800-832-4357 (HELP)

Pasos a dar si se produce un derrame o escape de este material:

- En caso de derrame en el suelo o sobre superficies pavimentadas, límpielo y llévelo a un área de almacenamiento de residuos de productos químicos hasta que se pueda desechar de forma adecuada si no puede usarse de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

- Rodee y contenga el derrame con material inerte (arena, tierra, etc.) y transfiera el material de contención líquido y sólido a contenedores separados para su desecho.
- Quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón las áreas afectadas de la piel.
- Lave la ropa antes de volver a utilizarla.
- Mantenga el derrame alejado de sistemas de alcantarillado y de los cuerpos de agua abiertos.

Información del producto

El fungicida marca **Pillar® SC Intrinsic®** es un fungicida concentrado en suspensión de amplio espectro que contiene los ingredientes activos triticonazol y piraclostrobina para usarlo en césped y plantas ornamentales.

Con el fin de maximizar el control de las enfermedades, aplique **Pillar SC Intrinsic** mediante un plan de rociado de protección a intervalos regulares, y utilice un plan de rotación con otros fungicidas **no pertenecientes al Grupo 3 ni al Grupo 11**.

Las aplicaciones preventivas de **Pillar SC Intrinsic** optimizan el control de las enfermedades, lo cual redundará en una mejor salud de las plantas.

Modos de acción

Cada uno de los componentes en **Pillar SC Intrinsic** suministra un modo de acción diferente contra los hongos patógenos de las plantas.

El triticonazol inhibe el paso de desmetilación de la biosíntesis de esteroides (DMI), que rompe la síntesis de la membrana celular y está clasificado por el Comité de Acción de Resistencia de Fungicidas (FRAC) como un fungicida del **Grupo 3**.

La piraclostrobina pertenece al grupo de inhibidores de respiración clasificados por la EPA de EE. UU. y la PMRA de Canadá como inhibidores externos de la quinona (QoI) y clasificados por FRAC como fungicidas del **Grupo 11**.

Manejo de la resistencia

Para el manejo de la resistencia, tenga en cuenta que **Pillar SC Intrinsic** contiene tanto un fungicida del **Grupo 3** (triticonazol) como del **Grupo 11** (piraclostrobina). Todas las poblaciones de hongos pueden contener individuos naturalmente resistentes a **Pillar SC Intrinsic** y otros fungicidas del **Grupo 3** o del **Grupo 11**. Si estos fungicidas se usan repetidamente en los mismos campos, puede ocurrir una pérdida gradual o total del control de plagas con el tiempo. Se deben seguir estrategias adecuadas de manejo de la resistencia.

Para retardar la resistencia al fungicida, tome una o más de las medidas siguientes:

- Rote el uso del **Pillar SC Intrinsic** u otros fungicidas del **Grupo 3** o **Grupo 11** con grupos diferentes que controlen los mismos patógenos.
- Utilice mezclas de tanque con fungicidas de un grupo diferente que sean igualmente eficaces en la plaga objetivo cuando se permita ese uso. Utilice al menos la concentración mínima de aplicación que figure en la etiqueta del fabricante.
- Adopte un programa integrado de manejo de enfermedades para el uso de fungicidas que incluya exploración, utilice datos históricos relativos al uso de pesticidas y que considere la resistencia de la planta huésped, el impacto de las condiciones ambientales en el desarrollo de la

enfermedad, los umbrales de la enfermedad, así como las prácticas de control de cultivo, biológicas y otras prácticas de control químico.

- Siempre que sea posible, utilice modelos de predicción de enfermedades para programar eficazmente las aplicaciones de fungicida.
- Vigile si hay falta de eficacia en el área de tratamiento que podría indicar un posible desarrollo de resistencia.
- Para obtener recomendaciones adicionales sobre el manejo de la resistencia a los pesticidas o sobre el **manejo integrado de plagas (IPM)** para cultivos y patógenos específicos, comuníquese con su especialista de extensión agrícola local o su asesor certificado en cultivos.
- Si desea más información o para reportar una presunta resistencia, consulte a su representante local de BASF, especialista de extensión agrícola o asesor certificado en cultivos.

Sitios de uso

Césped y plantas ornamentales

- Aeropuertos
- Cementerios
- Césped institucional, comercial y residencial
- Parques
- Áreas recreativas, incluyendo campos deportivos
- Derechos de vía
- Granjas productoras de césped
- Viveros o plantaciones de árboles forestales y coníferas, granjas y viveros de árboles de Navidad
- Invernaderos, cobertizos de listones y umbráculos
- Jardines interiores
- Otras áreas ajenas al césped (por ej., lechos de paisajismo, extensiones de árboles) rodeadas por áreas con césped, incluidos campos de golf
- Viveros al aire libre (incluso plantas ornamentales cultivadas en macetas, bancos, lechos, cuadros de jardín y campo)
- Jardines residenciales y comerciales
- Viveros minoristas

Instrucciones de aplicación

- Aplique el fungicida marca **Pillar® SC Intrinsic®** tal como se indica en las secciones **Instrucciones de uso en céspedes** o **Instrucciones de uso en plantas ornamentales**.
- Comience con las aplicaciones de **Pillar SC Intrinsic** de manera preventiva (antes de que comience la enfermedad o en sus primeras etapas) y continúe a lo largo de la temporada siguiendo intervalos y lineamientos de control de resistencia específicos.
- Use un intervalo especificado más breve o una proporción especificada más alta cuando las condiciones favorezcan la enfermedad.
- Se requiere una cobertura completa y uniforme para lograr un control óptimo de la enfermedad.
- El equipo de aplicación debe limpiarse a fondo antes y después de aplicar este producto, especialmente si se utilizó un producto con potencial de daños antes de aplicar **Pillar SC Intrinsic**.
- Antes de usarlo a gran escala, aplique la proporción especificada de **Pillar SC Intrinsic** en un área de prueba pequeña o en una pequeña cantidad de plantas bajo las condiciones de crecimiento esperadas. Vigile que no haya daños durante 14 días después de la aplicación.

Restricciones y limitaciones

- **NO** lo aplique en cultivos destinados a alimentación o forraje.
- Para la concentración de uso máxima por temporada e intervalos de aplicación secuenciales, consulte la tabla **Concentraciones e intervalos de aplicación en césped** y la tabla **Concentraciones e intervalos de aplicación en plantas ornamentales**.

Aplicación terrestre

- Puede aplicar **Pillar SC Intrinsic** con aspersores terrestres, incluso de barra terrestre con tractor, de mochila o barra manual, vara de mano, etc.
- Utilice las concentraciones de aplicación especificadas para cada enfermedad tal como se indica en la tabla **Concentraciones e intervalos de aplicación en césped** y en la tabla **Concentraciones e intervalos de aplicación en plantas ornamentales**.

Manejo de la deriva del rociado

QUIEN LO APLICA ES RESPONSABLE DE EVITAR LA DERIVA DEL ROCIADO FUERA DEL SITIO. TENGA EN CUENTA LOS SITIOS CERCANOS NO OBJETIVO Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

NO lo aplique cuando las condiciones favorezcan la deriva fuera del área de aplicación (objetivo) prevista. Las consideraciones y medidas para reducir la deriva incluyen:

1. **Tamaño de las microgotas.** Aplique las microgotas más grandes que proporcionen el control de la plaga objetivo. El tamaño de las microgotas se puede controlar con:
Volumen: Aumentar el volumen de rociado reducirá la deriva al producir gotas más grandes. Utilice el mayor volumen de rociado que resulte práctico para la aplicación.
Presión: Utilice la presión de rociado más baja especificada para la boquilla con el fin de producir el volumen de aplicación y el tamaño de microgota deseados.
Boquilla de aspersión: Utilice una boquilla de aspersión diseñada para la aplicación prevista. Considere utilizar boquillas diseñadas para reducir la deriva.
2. **Altura de la barra o altura de la boquilla.** Para equipos terrestres, la barra aspersora debe permanecer nivelada con el cultivo y tener un rebote mínimo. En aplicaciones terrestres sin barra aspersora, fijar las boquillas a la mínima altura eficaz ayudará a reducir el potencial de deriva del producto.
3. **Aspersores con pantalla.** Considere usar barras aspersoras con pantalla protectora o boquillas individuales para reducir la deriva. Verifique que las pantallas no interfieran en la dispersión uniforme del rociado sobre el área de aplicación.
4. **Temperatura y humedad.** Tenga cuidado al hacer aplicaciones en condiciones calurosas y secas, pues favorecen la deriva. Use microgotas más grandes para reducir los efectos de la evaporación.

5. **Inversiones térmicas. NO aplique el producto durante inversiones térmicas. Antes de la aplicación, consulte los servicios del clima local para ver si hay condiciones favorables para una inversión.** El potencial de deriva es alto durante inversiones térmicas. Las inversiones térmicas se caracterizan por el aumento de la temperatura con la altura y son comunes en las noches con nubosidad limitada y poco o nada de viento. La presencia de una inversión puede identificarse por la niebla sobre el suelo o por el movimiento de humo de una fuente terrestre o un generador de humo de aeronave. El humo que se acumula y se desplaza lateralmente en una nube concentrada (bajo condiciones de poco viento) indica una inversión, mientras que el humo que sube y se disipa rápidamente indica una buena mezcla de aire vertical.
6. **Viento. NO lo aplique si las velocidades del viento superan las 15 millas por hora (24 km/h). NO lo aplique si hay vientos en ráfagas.** Aplíquelo solamente cuando el potencial de deriva hacia áreas sensibles adyacentes (por ejemplo, cuerpos de agua o cultivos que no son parte del objetivo) es mínimo y cuando el viento sopla lejos de las áreas sensibles. Los aplicadores deben familiarizarse con los patrones de viento locales y el terreno que podrían afectar la deriva del rociado.

Mezcla en tanque con otros productos y aditivos

El usuario del producto tiene la responsabilidad de verificar que todos los productos estén registrados para el uso previsto. Lea y siga las restricciones y limitaciones pertinentes, así como las instrucciones de uso en todas las etiquetas de los productos involucrados en el mezclado en tanque. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y las declaraciones de precaución más restrictivas de cada producto en la mezcla en tanque.

El fungicida marca **Pillar® SC Intrinsic®** se puede mezclar en tanque con la mayoría de los fungicidas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes líquidos, productos de control biológico, adyuvantes y aditivos. Siga siempre las instrucciones de uso más estrictas de la etiqueta.

Precauciones del mezclado en el tanque

Si mezcla **Pillar SC Intrinsic** con otros productos, podría haber incompatibilidad física, disminuir el control de la enfermedad o producirse daños en el cultivo.

Los coadyuvantes en el mezclado (productos que incluyen adhesivos, diluyentes, agentes humectantes, adyuvantes de aspersión) por lo general no son necesarios para usar con **Pillar SC Intrinsic**; cuando se usen esos productos, asegúrese de que la etiqueta indique que son aptos para el uso previsto. Si desea más información sobre el uso de aditivos o adyuvantes con este producto, consulte a un representante de BASF o a una autoridad local.

Se ha demostrado que el uso de productos formulados con silicio orgánico al 100% es perjudicial; sin embargo, las mezclas comerciales pueden ser seguras bajo condiciones de cultivo. Pruebe la combinación del producto en una muestra del cultivo a tratar para asegurarse de que no se produzca una reacción fitotóxica antes de la aplicación a gran escala.

Prueba de compatibilidad de los componentes de mezclado en tanque

Antes de mezclar los componentes, siempre haga una prueba de compatibilidad en frasco.

1. Agregue los componentes en el orden que aparece en las instrucciones de la sección **Orden de mezclado**.
 - **Para un volumen de rociado de 100 galones:** Comience con 16 tazas (1 galón) de agua de la fuente prevista a la temperatura de la fuente.
 - **Para otros volúmenes de rociado:** Ajuste las concentraciones según corresponda.
 - **Producto seco:** Agregue 2 cucharaditas por libra de producto por acre.
 - **Producto líquido:** Agregue 1 cucharadita por pinta de producto por acre.
2. Siempre tape el frasco y dele vuelta 10 veces, después de adicionar los componentes.
3. Cuando todos los componentes estén en el frasco, deje que la solución se asiente durante 15 minutos.
4. **Evalúe** la solución para determinar su homogeneidad y estabilidad. La solución de rociado no debe tener aceite libre en la superficie, partículas finas precipitadas en el fondo ni textura densa (cuajada). **NO** use ninguna solución de rociado que pueda obstruir las boquillas aspersoras.

Orden de mezclado

Asegúrese de que cada componente se mezcle y suspenda completamente antes de agregar coadyuvantes al mezclado en tanque. Excepto cuando mezcle productos en bolsas de PVA, mantenga constantemente la agitación durante el mezclado y la aplicación.

1. **Agua:** Llene un tanque de rociado totalmente limpio con 3/4 partes de agua limpia y comience a agitar.
2. **Inductor:** Si utiliza un inductor, enjuáguelo totalmente después de agregar cada componente.
3. **Productos en bolsas de PVA:** Ponga los productos en bolsas de PVA solubles en agua en el tanque de mezclar. Espere hasta que todas las bolsas se hayan disuelto completamente y el producto se haya mezclado de forma homogénea en el tanque antes de continuar.
4. **Productos dispersables en agua** (tales como productos secos autosuspensibles, polvos humedecibles, concentrados de suspensión, incluido **Pillar SC Intrinsic** o suspoemulsiones)
 - **Recipientes de 5 galones o menos:** Agite bien antes de agregar al tanque.
5. **Productos solubles en agua**
6. **Concentrados emulsificables** (tales como concentrados de aceite cuando corresponda)
7. **Aditivos solubles en agua** (tales como sulfato de amonio [AMS] o nitrato de amonio de urea [UAN] cuando corresponda)
8. **Cantidad de agua remanente**

Tabla de diluciones para césped. Utilice una concentración de 1 fl oz de fungicida marca **Pillar® SC Intrinsic®**/1000 sq ft (43.6 fl oz de **Pillar SC Intrinsic**/acre)*

Volumen de aplicación (galones de rociado final por 1000 sq ft)	Onzas líquidas de Pillar SC Intrinsic diluido en estos volúmenes de rociado final			
	1 galón	4 galones	50 galones	100 galones
2	0.5	2	25	50
4	0.25	1	12.5	25
5	0.2	0.8	10	20
10	0.1	0.4	5	10

* 0.50 lb de piraclostrobina/acre, 0.57 lb de triticonazol/acre

- Para convertir onzas líquidas a mililitros, multiplique por 29.57
- 1 onza líquida = 29.57 ml

Instrucciones de uso en céspedes

El fungicida **Pillar SC Intrinsic** controla un amplio espectro de enfermedades y promueve la salud del césped. Aplique **Pillar SC Intrinsic** solo como aspersión foliar o en mezclas en tanque con otros fungicidas registrados para el césped. Siga las restricciones de las secciones **Manejo de la resistencia** y **Restricciones y limitaciones para céspedes**. Realice todas las aplicaciones según las indicaciones de esta etiqueta. Si no se siguen las instrucciones y precauciones en esta etiqueta se pueden producir daños en el césped o un control inferior de la enfermedad.

Instrucciones de aplicación en césped

- Realice las aplicaciones de **Pillar SC Intrinsic** bajo condiciones favorables de crecimiento del césped.
- Utilice intervalos más cortos cuando las condiciones favorezcan la enfermedad.
- Antes de usarlo a gran escala, aplique la proporción específica de **Pillar SC Intrinsic** en una zona de prueba pequeña bajo las condiciones de crecimiento previstas. Vigile que no se dañe el césped durante 14 días después de la aplicación.
- Para obtener mejores resultados, aplique **Pillar SC Intrinsic** en 1 a 4 galones de agua por 1000 sq ft, a menos que se especifiquen volúmenes de rociado mayores para la enfermedad. Para un mejor control de enfermedades transmitidas por el suelo/raíz/corona, aplique 0.25 pulgadas de riego después de la aplicación (por ejemplo, anillo de hada, mancha de verano, pudrición total de la raíz, mancha total).
- Consulte la **Tabla de diluciones para césped** para las diluciones de rociado equivalentes (fl oz/100 galones de solución de rociado) a fin de obtener las concentraciones especificadas en la tabla **Concentraciones e intervalos de aplicación en césped**.

Especies de césped tolerantes

Las especies césped tolerantes son las siguientes:

- Hierba fina, colonial
- Hierba fina, rastrera
- Pasto bermuda o grama común
- Pasto bermuda híbrido
- Zacate azul, pasto de invierno (*Poa annua*)
- Espiguilla
- Gamilla, cervuno (*Poa trivialis*)
- Grama de olor
- Grama ciempiés
- Dicondra
- Festuca fina
- Festuca alta
- Kikuyo o pasto africano
- Grama de agua, césped del mar
- Raigrás, anual
- Raigrás, perenne
- Pasto de San Agustín o gramón
- Zoysia

Restricciones y limitaciones

- **NO** lo aplique mediante ningún tipo de sistema de riego.
- **NO** aplique el producto a céspedes por vía aérea, excepto en granjas productoras de césped.

Para la concentración de uso máxima por temporada e intervalos de aplicación secuenciales, consulte la tabla **Concentraciones e intervalos de aplicación en césped**.

Concentraciones e intervalos de aplicación

Enfermedad controlada <i>Patógeno</i>		Concentración de dilución fl oz/1000 sq ft (fl oz/acre)	Intervalo de aplicación (días)
Aplicado de manera preventiva cuando las condiciones favorezcan la enfermedad	Antracnosis <i>Colletotrichum graminicola</i>		
	Mancha necrótica de la hierba fina <i>Ophiosphaerella agrostis</i>		
	Mancha café <i>Rhizoctonia solani</i>		
	Mancha dólar <i>Clarireedia</i> spp.		
	Anillo de hada Diversos hongos <i>Basidiomycete</i>		
	Mancha gris de la hoja <i>Pyricularia grisea</i>		
	Moho nivoso gris/tizón de tifus <i>Typhula</i> spp.		
	Mancha grande/mancha de zoysia <i>Rhizoctonia solani</i>		
	Mancha de las hojas <i>Bipolaris</i> spp. <i>Drechslera</i> spp. <i>Exserohilum</i> spp.	1.0 (43.6)	14 a 28
	Mancha borrosa <i>Drechslera poae</i>		
	Mancha por microdochium/Mancha por fusarium <i>Microdochium nivale</i>		
	Anillo necrótico <i>Ophiosphaerella korrae</i>		
	Mancha rosa <i>Limonomyces roseipellis</i>		
	Moho rosa de la nieve <i>Microdochium nivale</i>		
	Moho polvoroso <i>Blumeria graminis</i>		
	Plaga de pythium <i>Pythium aphanidermatum</i> <i>Pythium</i> spp.	1.0 (43.6)	14
	Disfunción de la raíz de pythium <i>Pythium volutum</i> <i>Pythium</i> spp.		

(continúa)

Concentraciones e intervalos de aplicación

Enfermedad controlada		Concentración de dilución fl oz/1000 sq ft (fl oz/acre)	Intervalo de aplicación (días)
Aplicarlo de manera preventiva cuando las condiciones favorezcan la enfermedad (continúa)	Tizón rápido <i>Labyrinthula terrestris</i>	1.0 (43.6)	14 a 28
	Hilo rojo <i>Laetisaria fuciformis</i>		
	Mancha de la hoja y de la vaina por rhizoctonia/anillito/ mancha anular café <i>Waitea circinata</i> <i>Waitea zea</i>		
	Roya (hoja, tallo, franjas) <i>Puccinia</i> spp.		
	Mancha de verano <i>Magnaporthiopsis poae</i>		
	Mancha total <i>Gaeumannomyces graminis</i> var. <i>avenae</i>		
	Pudrición total de la raíz <i>Gaeumannomyces graminis</i> var. <i>graminis</i>		
	Panoja local (moho vellosa) <i>Sclerophthora macrospora</i>		

Restricciones para el usuario

Para obtener mejores resultados, aplique una irrigación de 0.25 pulgadas después de la aplicación cuando el objetivo sean enfermedades transmitidas por el suelo (por ej., anillos de hada, mancha grande, disfunción de la raíz por *Pythium*, mancha de verano, pudrición total de la raíz y mancha total).

- **NO** aplique más de 43.6 fl oz (0.57 lb de triticonazol, 0.50 lb de piraclostrobina) por aplicación por acre (1.0 fl oz por 1000 sq ft).
- **NO** haga más de dos aplicaciones secuenciales del fungicida marca **Pillar® SC Intrinsic®** antes de alternar con un fungicida **no perteneciente al Grupo 3** ni al **Grupo 11**, a menos que se especifique otra cosa.
- El intervalo mínimo para un nuevo tratamiento es de 14 días.
- **NO** haga más de 5 aplicaciones por acre al año.
- **NO** aplique más de 218 fl oz (2.843 lb de triticonazol, 2.502 lb de piraclostrobina) por acre por año (5 fl oz por 1000 sq ft).

Instrucciones de uso en plantas ornamentales

El fungicida marca **Pillar® SC Intrinsic®** controla un amplio espectro de enfermedades en plantas ornamentales de producción y de paisaje. Siga las restricciones de las secciones **Manejo de la resistencia** y **Restricciones para plantas ornamentales**.

Instrucciones de aplicación en plantas ornamentales

Comience con las aplicaciones de **Pillar SC Intrinsic** de manera preventiva (antes de que comience la enfermedad o en sus primeras etapas) y continúe a lo largo de la temporada siguiendo intervalos y lineamientos de control de resistencia específicos.

Una cobertura completa y uniforme de las plantas es esencial para el control óptimo de la enfermedad. Para obtener instrucciones de uso para el control de enfermedades objetivo, consulte la tabla de concentraciones.

Utilice el intervalo especificado más corto o la concentración especificada más alta cuando las condiciones favorezcan el desarrollo de la enfermedad o cuando haya una presión intensa de la enfermedad.

Instrucciones de aplicación por empapado

Para enfermedades de raíz y copa es necesario cubrir y humedecer la zona de la raíz, la copa y la base de la planta, así como los medios de cultivo que la rodean.

Volumen de solución de empapado de **Pillar SC Intrinsic** según el diámetro del envase

Tamaño del envase (diámetro en pulgadas)	Solución de empapado por envase (fl oz)
4	3
6	8
8	10
10	20
12	40

Tolerancia de las plantas

Pillar SC Intrinsic se ha evaluado en una amplia variedad de plantas ornamentales de acuerdo con las instrucciones de uso de esta etiqueta sin observarse fitotoxicidad. No todas las especies de plantas y sus variedades y cultivares se han sometido a prueba para determinar su tolerancia a aplicaciones de **Pillar SC Intrinsic**, las posibles combinaciones de mezclas en tanque con **Pillar SC Intrinsic**, los tratamientos con

pesticidas que preceden o siguen a los de **Pillar SC Intrinsic** ni las combinaciones de **Pillar SC Intrinsic** con adyuvantes o surfactantes. Las condiciones locales también pueden influir en la tolerancia de los cultivos y posiblemente estas no coincidan con las condiciones bajo las cuales BASF realizó las pruebas. Muchos cultivares varían en tolerancia a las aplicaciones químicas; por lo tanto, los productores deben reconocer esas diferencias y probar el producto según corresponda. El productor asume la responsabilidad de probar la idoneidad de las especies a **Pillar SC Intrinsic** bajo las condiciones locales de cultivo. Como mínimo, pruebe siempre un pequeño grupo de plantas representativas para determinar su tolerancia a **Pillar SC Intrinsic** según la concentración especificada, antes de su utilización a gran escala. En la medida en que sea compatible con la legislación local, al aplicar **Pillar SC Intrinsic**, el usuario asume la responsabilidad por daños a los cultivos u otra responsabilidad relacionada con factores que están fuera del control del fabricante, como las condiciones meteorológicas, la presencia de otros materiales y la forma o el uso de la aplicación.

Se han observado respuestas indeseables, como atrofia de las hojas o decoloración en las flores, en ciertas plantas ornamentales, incluso ciclamen, alegría, belenes de Nueva Guinea, pensamiento, nochebuena, primula y algunos cultivares de follaje tropical, como aglaonema y dieffenbachia.

Especies de plantas sensibles a **Pillar SC Intrinsic**

NO exponga estas especies o variedades al rociado o a la deriva porque no son tolerantes.	Vid	<i>Vitis</i> sp., Concord, Fredonia, Niagara, Noiret (NY73.0136.17), Rougeon, Steuben y Worden
	Fisocarpio	<i>Physocarpus opulifolius</i>
	Huso de la fortuna	<i>Euonymus vegetus</i>

Restricciones para plantas ornamentales

- Para la concentración de uso máxima por temporada e intervalos de aplicación secuenciales, consulte la tabla **Concentraciones e intervalos de aplicación en plantas ornamentales**.
- **NO** lo utilice en hortalizas cultivadas en invernaderos para la producción de cultivos ni en la producción de trasplantes de hortalizas para uso en exteriores.

Plantas ornamentales

Concentraciones e intervalos de aplicación

Enfermedad controlada		Concentración de dilución** (fl oz de producto/ 100 galones)	Intervalo de aplicación (días)
Aplicarlo de manera preventiva cuando las condiciones favorezcan la enfermedad	Antracnosis <i>Colletotrichum</i> spp. <i>Gloeosporium</i> spp.	8 a 12	14 a 28
	Mancha negra en rosales <i>Diplocarpon rosae</i>		
	Tizones de flores y pétalos <i>Monilinia</i> spp.		
	Moho gris <i>Peronospora</i> spp.		
	Mancha de las hojas <i>Alternaria</i> spp. <i>Cercospora</i> spp. <i>Didymellina</i> spp. <i>Diplocarpon</i> spp. <i>Entomosporium</i> spp. <i>Mycosphaerella</i> spp. <i>Myrothecium</i> spp. <i>Phyllosticta</i> spp. <i>Ramularia</i> spp. <i>Septoria</i> spp.		
	Tizón aéreo por phytophthora <i>Phytophthora</i> spp.		
	Moho polvoroso <i>Golovinomyces</i> spp. <i>(Erysiphe spp.)</i> <i>Microsphaera</i> spp. <i>Oidium</i> spp. <i>Phyllactinia</i> spp. <i>Podosphaera</i> spp. <i>Sphaerotheca</i> spp. <i>Uncinula</i> spp.		
	Enfermedades de la raíz y la copa*** <i>Berkeleyomyces</i> spp. (<i>Thielaviopsis</i> spp.) <i>Cylindrocladium</i> spp. <i>Fusarium</i> spp. <i>Phytophthora</i> spp. <i>Pythium</i> spp. <i>Rhizoctonia solani</i>		

(continúa)

Concentraciones e intervalos de aplicación

Enfermedad controlada		Concentración de dilución** (fl oz de producto/ 100 galones)	Intervalo de aplicación (días)
Aplicarlo de manera preventiva cuando las condiciones favorezcan la enfermedad (continúa)	Tizón del tallo / muerte regresiva <i>Fusarium</i> spp. <i>Phoma</i> spp. <i>Phomopsis</i> spp. <i>Rhizoctonia</i> spp. <i>Sclerotinia</i> spp. <i>Sclerotium rolfsii</i>	8 a 12	14 a 28
	Antracnosis (costra/mancha) <i>Cladosporium</i> spp. <i>Elsinoe</i> spp. <i>Venturia</i> spp.	8 a 12	14 a 28
Aplicarlo al primer indicio de enfermedad	Roya <i>Gymnosporangium</i> spp. <i>Melampsora</i> spp. <i>Puccinia</i> spp.	8 a 12	

Restricciones para el usuario

** Utilice concentraciones más altas o intervalos más cortos en caso de una alta presión de la enfermedad. El intervalo puede ampliarse hasta en 28 días si hay condiciones desfavorables para la infección o si la enfermedad no se ha intensificado.

*** Hay que cubrir totalmente la copa y base de la planta y el suelo o medio de cultivo alrededor de la copa.

- **NO** aplique más de 36 fl oz (0.47 lb de triticonazol, 0.41 lb de piraclostrobina) por aplicación por acre.
- **NO** haga más de dos aplicaciones secuenciales del fungicida marca **Pillar® SC Intrinsic®** antes de alternar con un fungicida **no perteneciente al Grupo 3** ni al **Grupo 11**.
- El intervalo mínimo para un nuevo tratamiento es de 14 días.
- **NO** haga más de 9 aplicaciones por año.
- **NO** aplique más de 218 fl oz (2.843 lb de triticonazol, 2.502 lb de piraclostrobina) por acre por año.

Condiciones de venta y garantía

Las **Instrucciones de uso** de este producto reflejan la opinión de expertos con base en el uso y las pruebas de campo. Las instrucciones se consideran confiables si se siguen cuidadosamente. No obstante, es imposible eliminar todos los riesgos inherentes al uso de este producto. Podrían suceder daños, ineficacia u otras consecuencias inesperadas en los cultivos debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales o el uso del producto de manera contraria a lo indicado en la etiqueta, todo lo cual está fuera del control de BASF Agricultural Solutions US LLC ("BASF") o el Vendedor. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el Comprador asumirá todos esos riesgos.

BASF garantiza que este producto cumple con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente apto para los propósitos mencionados en la sección **Instrucciones de uso**, sujeto a los riesgos inherentes antedichos.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE, BASF NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE APTITUD NI COMERCIABILIDAD, NI OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE, EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE BASF, YA SEA POR VÍA CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O CUALQUIER OTRA, SE LIMITARÁ AL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE, BASF Y EL VENDEDOR RENUNCIAN A TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES, EJEMPLARES, ESPECIALES O INDIRECTOS RESULTANTES DEL USO O EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO.

BASF y el Vendedor ofrecen este producto, y el Comprador y el Usuario lo aceptan, sujeto a las **Condiciones de venta y garantía** antes indicadas, las cuales pueden modificarse solamente mediante un acuerdo por escrito, firmado por un representante debidamente autorizado de BASF.

1108

Insignia, Intrinsic y Pillar son marcas comerciales registradas de BASF.

© 2025 BASF Agricultural Solutions US LLC
Todos los derechos reservados.

007969-00480.20250922.**NVA 2025-04-0646-0233**
Con base en: NVA 2023-04-0646-0123
Reemplaza a: NVA 2024-04-0646-0442

BASF Agricultural Solutions US LLC
2 TW Alexander Drive
Research Triangle Park, NC 27713


We create chemistry