



Contiene halosulfuron, el ingrediente activo utilizado en Permit®.

Promote es un herbicida para el control selectivo preemergente y posemergente de las malezas listadas, incluidas tanto malezas de hoja ancha como juncias presentes en cultivos y otros sitios no destinados al cultivo especificados en la etiqueta.

INGREDIENTE ACTIVO:	% POR PESO
Halosulfuron-metil	75%
OTROS INGREDIENTES:	25%
TOTAL:	100%

N.º de reg. de EPA: 91234-31

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN

Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a usted en detalle.

Consulte las declaraciones de precaución adicionales más adelante.

PRIMEROS AUXILIOS	
SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:	▪ Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y cuidadosamente con agua durante 15 a 20 minutos. ▪ Si utiliza lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. ▪ Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento.
SI SE INGIERE:	▪ Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para consejo de tratamiento. ▪ Retire las partículas visibles de la boca. ▪ La persona afectada debe enjuagarse la boca con abundante agua y luego escupirla. ▪ Si la persona puede tragar, haga que tome pequeños sorbos de agua. ▪ No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. ▪ No administre nada por vía oral a una persona inconsciente.
NÚMERO TELEFÓNICO DIRECTO	
Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. Para obtener asistencia en emergencias médicas, llame a SafetyCall: 1-844-685-9173.	

En caso de emergencia química: En caso de derrame, fuga, incendio, exposición o accidente, llame a CHEMTREC, de día o de noche, dentro de los EE. UU. y Canadá: 1-800-424-9300 o +1-703-527-3887 (se aceptan llamadas por cobrar)

Promote™ no es fabricado ni distribuido por Gowan Company, LLC, vendedor de Permit®.

**DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN
PELIGRO PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
PRECAUCIÓN**

Causa irritación moderada en los ojos. Daño si se ingiere. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese con abundante agua y jabón luego de manipular el producto.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los aplicadores y otros manipuladores de pesticidas deben usar:

- Camisa de manga larga, pantalones largos y
- Zapatos y calcetines

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza/mantenimiento del equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés). En caso de no existir dichas instrucciones de lavado, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el PPE separadamente de otra ropa para lavar.

DECLARACIONES SOBRE CONTROLES DE INGENIERÍA:

Cuando los manipuladores del producto utilicen sistemas cerrados, cabinas confinadas o aeronaves de una manera que se cumpla con los requisitos establecidos en el Estándar para la Protección del Trabajador (WPS, por sus siglas en inglés) para pesticidas agrícolas [40 CFR 170.240 (d) (4-6)], los requisitos en cuanto al PPE de estas personas pueden reducirse o modificarse según lo especificado en el WPS.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO:

Los usuarios deben:

- Quitarse inmediatamente el PPE después de manipular este producto.
- Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos.
- Tan pronto sea posible, lavarse muy bien y ponerse ropa limpia.
- Lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o ir al baño.
- Quitarse inmediatamente la ropa/equipo de protección personal (PPE) si el pesticida penetra o ingresa a los mismos. Luego, lavarse muy bien y ponerse ropa limpia.

RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Este producto es tóxico para las plantas vasculares no objetivo. No lo aplique directamente a cuerpos de agua, en áreas donde haya aguas superficiales o en áreas intermareales que se encuentren bajo el nivel de altura máxima promedio del agua. No contamine cuerpos de agua cuando limpie el equipo o disponga de las aguas de lavado de equipo o aguas de enjuague.

Este químico tiene propiedades y características asociadas con químicos detectados en aguas subterráneas. El uso de este producto químico en áreas donde el suelo es permeable, especialmente en donde la tabla de agua está cercana a la superficie, puede causar la contaminación de las aguas subterráneas.

Se sabe que el halosulfuron-metil puede filtrarse a través del suelo a aguas subterráneas bajo ciertas condiciones como resultado del uso según la etiqueta. Este producto químico se puede filtrar a aguas subterráneas si es utilizado en áreas donde el suelo es permeable, especialmente en donde la tabla de agua está cercana a la superficie.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS

No lo mezcle ni permita que entre en contacto con agentes oxidantes, ya que puede ocurrir una reacción química peligrosa.

INSTRUCCIONES DE USO

Es una violación de la ley federal (EE. UU.) utilizar este producto de cualquier manera inconsistente con lo indicado en su etiqueta. Este producto sólo puede utilizarse según las instrucciones de uso de esta etiqueta o de etiquetas complementarias publicadas por separado por Atticus, LLC.

No aplique este producto de manera que pueda entrar en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea de forma directa o mediante la deriva. Sólo se permite la presencia de los manipuladores del producto con protección adecuada en el área durante su aplicación. Si desea obtener información acerca de los requisitos específicos para su estado o tribu, consulte a la agencia responsable de la regulación de pesticidas.

Lea toda la etiqueta antes de usar este producto. Úselo solamente según las instrucciones de la etiqueta.

REQUISITOS DE USO AGRÍCOLA

Utilice este producto sólo de acuerdo con su etiqueta y el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola (WPS, por sus siglas en inglés), 40 CFR Parte 170. Dicho estándar contiene los requisitos para la protección de los trabajadores agrícolas en granjas, bosques, viveros e invernaderos, y para las personas que manipulan pesticidas agrícolas. Contiene los requisitos de capacitación, descontaminación, notificación y asistencia en emergencias. También contiene instrucciones específicas y excepciones relativas a las declaraciones de esta etiqueta sobre el uso de equipo de protección personal y el intervalo de acceso restringido. Los requisitos en esta sección de la etiqueta (requisitos para uso agrícola) aplican únicamente a los usos de este producto que están cubiertos por el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola (WPS).

No ingrese ni permita la entrada de trabajadores a las áreas tratadas durante este intervalo de acceso restringido (REI, por sus siglas en inglés) de 12 horas.

El equipo de protección personal requerido para el acceso anticipado a áreas tratadas de acuerdo con el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola, y que involucra el contacto con elemento tratado, como plantas, tierra o agua, es:

- Overol (mameluco)
- Zapatos y calcetines
- Guantes resistentes a productos químicos hechos con materiales como goma de nitrilo, goma de neopreno o polietileno.

REQUISITOS DE USO NO AGRÍCOLA

Los requisitos en esta sección de la etiqueta aplican a los usos de este producto que NO están cubiertos por el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola (40 CFR Parte 170 de EE. UU.). Dicho estándar se aplica cuando este producto se utiliza para producción de plantas agrícolas en granjas, bosques, viveros o invernaderos.

Mantenga a las personas y a las mascotas alejadas de las zonas tratadas hasta que se haya secado la solución de rociado.

Información del producto

Promote es un herbicida de sulfonilurea que actúa inhibiendo la acetolactato sintasa (ALS). Diversos factores como la concentración de aplicación, las especies de malezas, el estrés y las condiciones de las malezas (incluyendo el tamaño y factores climáticos) afectan el nivel de control. Las aplicaciones efectuadas a malezas activamente en crecimiento en las etapas iniciales de desarrollo (según se describe a continuación) optimizarán el desempeño. En las aplicaciones posemergentes en malezas, el tratamiento anticipado es la mejor manera de controlar las malezas que compiten con el cultivo. Para el control residual en tratamientos posemergentes tempranos (en maíz), podría ser necesario hacer una segunda aplicación para controlar los brotes de malezas posteriores.

Promote actúa rápidamente en las malezas objetivo retardando su crecimiento, lo cual permite favorecer el desarrollo del cultivo sobre las malezas objetivo. Una vez que se atrofia el desarrollo de las malezas objetivo, las hojas y el punto de crecimiento comienzan a descolorarse hasta perecer. El control total suele ocurrir en 7 a 14 días, dependiendo del tamaño de las malezas, el tipo de especie y las condiciones de crecimiento. Dependiendo de la etapa y desarrollo de las malezas objetivo, generalmente el control se logra en 7 a 14 días.

Pautas para el manejo de la resistencia

Promote es un herbicida del Grupo 2. Cualquier población de malezas puede contener o desarrollar individuos naturalmente resistentes a **Promote** y a otros herbicidas del Grupo 2. Las especies de malezas con resistencia adquirida al Grupo 2, con el tiempo pueden dominar la población de malezas si se utilizan herbicidas del Grupo 2 repetidamente en el mismo campo o en años sucesivos como método principal de control de las especies objetivo. Esto podría causar pérdida parcial o total del control de esas especies con **Promote** u otros herbicidas del Grupo 2.

Para retardar la resistencia, considere lo siguiente:

- Evite el uso consecutivo de **Promote** u otros herbicidas del Grupo 2 que tengan un sitio de acción objetivo similar en la misma especie de malezas.
- Utilice mezclas en tanque o premezclas con herbicidas de diferentes Grupos de sitios de acción objetivo, siempre y cuando todos los productos en cuestión estén registrados para el mismo uso, tengan diferentes sitios de acción y sean eficaces tanto en la concentración de mezcla en tanque como en la de preenvasado sobre las malezas de interés.
- Base la utilización del herbicida en un programa amplio de manejo integrado de plagas.
- Monitoree las poblaciones de malezas tratadas para detectar si hay pérdida de eficacia en el campo.
- Comuníquese con su especialista de extensión agrícola local, asesor certificado en cultivos, fabricante del producto o especialista en manejo integrado de malezas para consultar los biotipos resistentes de malezas y cultivos específicos.

Instrucciones de mezclado

Promote está formulado como gránulos dispersables en agua que pueden diluirse con agua a las concentraciones indicadas en las instrucciones de uso del cultivo específico. Llene el tanque de rociado utilizando aproximadamente ½ del volumen de agua o portador necesarios. Con el sistema de agitación en marcha, agregue la cantidad especificada de formulación indicada en las instrucciones de uso del cultivo objetivo. Termine el proceso de llenado manteniendo la agitación. Retire la manguera del tanque de mezclado inmediatamente después de llenarlo para evitar el sifonado de retorno hacia la fuente portadora. Agregue un surfactante no iónico y otros aditivos de rociado como últimos ingredientes en el tanque. Deje transcurrir el tiempo necesario para que la mezcla se disperse completamente.

Puesto que este producto crea una suspensión en el agua, es importante mantener una buena agitación durante el mezclado y la aplicación. Si deja que la suspensión de rociado se asiente por un breve lapso, cerciórese de agitarla durante 10 minutos como mínimo. Aplique la solución de rociado dentro de las 24 horas posteriores al mezclado.

Aditivos de rociado

Se pueden usar aditivos de rociado tales como surfactantes no iónicos (NIS), o concentrados de aceite de cultivo (COC) y fertilizantes de nitrógeno líquido (p. ej., 28-0-0) con **Promote** para mejorar el rendimiento. Un surfactante no iónico común contiene al menos 80% de material activo y está aprobado por la EPA para usarlo en cultivos alimentarios. La concentración de uso es 0.25 a 0.5% de concentrado de surfactante no iónico (1 a 2 cuartos de galón por 100 galones de mezcla de aplicación). Una alternativa para el surfactante no iónico es un concentrado de aceite de cultivo. El concentrado de aceite de cultivo típico es un producto a base de aceite (petróleo) no tóxico para la vegetación o de origen de cultivo (vegetal) que contiene un mínimo de 14% de surfactante para permitir que sea mezclable con agua. La concentración de uso para el concentrado de aceite de cultivo es 1% vol/vol (1 galón por 100 galones de mezcla de aplicación). Los surfactantes no iónicos (NIS) o los concentrados de aceite de cultivo (COC) son los únicos aditivos de rociado requeridos para mejorar la eficacia. No use al mismo tiempo un surfactante no iónico (NIS) y un concentrado de aceite de cultivo (COC) en la mezcla de aplicación. Use nitrógeno líquido para aquellos adyuvantes de mezcla en tanque que requieran un aditivo de nitrógeno líquido para mejorar el rendimiento. Consulte las etiquetas de los adyuvantes de mezcla en tanque para ver los requisitos específicos de aditivos y sus interacciones. En lugar del fertilizante de nitrógeno líquido, se utiliza un sulfato de amonio de alta calidad, apto para rociado (p. ej., 21-0-0), con una concentración de uso de 2 a 4 libras por acre. Use ya sea un surfactante no iónico (NIS) o un concentrado de aceite de cultivo (COC) en la mezcla de aplicación.

Para detalles específicos, consulte las instrucciones de uso en la sección de cultivos de la etiqueta.

Equivalencia de concentración de uso

Dado que **Promote** contiene 75% de ingrediente activo por libra de producto, la siguiente tabla expresa la equivalencia en onzas de la concentración de uso de este producto en términos de libras de ingrediente activo por acre.

Oz de producto por acre	Lb de ingrediente activo por acre
½	0.0235
⅔	0.031
1	0.047
1 ⅓	0.062
2	0.094
2 ⅔	0.125
5 ⅓	0.250

Métodos de aplicación

Aplique este producto con equipo terrestre o aéreo para producir una cobertura uniforme en el suelo o las malezas en crecimiento y lograr un control homogéneo de las malezas.

Se necesita una cobertura de rociado completa y uniforme para obtener un control óptimo. Calibre el equipo de aplicación conforme a las especificaciones del fabricante. Utilice configuraciones de boquillas que proporcionen una distribución óptima y una máxima cobertura de rociado mientras se evita el contacto con el follaje sensible del cultivo.

Limpie inmediatamente el equipo de aplicación por completo después de usarlo y antes de rociar un cultivo que no sea maíz ni sorgo granifero. Encontrará mayores detalles en la sección "Limpieza del equipo de rociado" de esta etiqueta.

Aplicaciones terrestres

Cuando **Promote** se aplique con equipo terrestre, utilice como mínimo 10 galones de agua por acre en aplicaciones al voleo. En poblaciones de malezas densas y con amplia cobertura de follaje,

se deben aplicar mayores volúmenes de rociado, p. ej., 15 a 20 galones de agua por acre. Utilice la boquilla y el volumen de rociado adecuados para garantizar una cobertura completa y uniforme de las malezas objetivo. Utilice aplicaciones dirigidas para evitar el contacto con el follaje sensible del cultivo. Seleccione boquillas que proporcionen un volumen, distribución y cobertura del rociado óptimos a una presión (psi) que reduzca al mínimo la deriva del rociado. Inspeccione la distribución de la boquilla durante la aplicación para evitar manchas y traslapes.

Aplicaciones aéreas

Cuando **Promote** se aplique con equipo aéreo, utilice un mínimo de 3 a 15 galones (11 a 57 L) de agua por acre. Calibre adecuadamente el equipo de rociado. Siga las pautas de "Manejo de la deriva del rociado" presentadas a continuación. Inspeccione la distribución de la boquilla durante la aplicación para evitar manchas, traslapes y deriva de rociado.

Manejo de la deriva del rociado

No permita que este producto se desplace hacia los cultivos adyacentes, a las áreas no destinadas al cultivo ni que se utilice de una manera o en una época que no sea la indicada en las instrucciones de la etiqueta, pues podrían producirse daños a animales, plantas o cultivos, generarse residuos ilegales u otros resultados no deseados.

LA PERSONA QUE EFECTÚE LA APLICACIÓN ES RESPONSABLE DE EVITAR LA DERIVA DEL ROCIADO EN EL LUGAR DE APLICACIÓN. La interacción de muchos factores relacionados con el equipo y el clima determina el potencial de deriva del rociado. El aplicador y el agricultor son responsables de considerar todos esos factores al tomar decisiones. Algunos estados tienen reglamentos más estrictos que deben cumplirse.

Se deben acatar los siguientes requisitos de manejo de la deriva para evitar su movimiento fuera de la zona objetivo desde aplicaciones aéreas a cultivos agrícolas. Estos requisitos no rigen para las aplicaciones forestales, los usos de salud pública ni las aplicaciones que utilizan formulaciones secas.

1. La distancia de las boquillas más externas de la barra rociadora no debe superar las ¾ partes de la longitud de la envergadura del ala ni del diámetro del rotor.
2. Las boquillas siempre deben apuntar hacia atrás en paralelo con la corriente de aire y nunca apuntar hacia abajo más de 45 grados. Algunos estados tienen reglamentos más estrictos que deben cumplirse.

Importancia del tamaño de la microgota de rociado:

La manera más eficaz de reducir el potencial de deriva es aplicar microgotas grandes. La mejor estrategia para controlar la deriva consiste en aplicar microgotas más grandes que proporcionen suficiente cobertura y control. La aplicación de microgotas más grandes reduce la posibilidad de deriva, pero puede que no la prevenga si la aplicación se hace de manera incorrecta o bajo condiciones ambientales desfavorables (consulte las secciones tituladas "Viento", "Temperatura y humedad" e "Inversiones térmicas" de estas advertencias).

Cómo controlar el tamaño inicial de la microgota:

- Volumen: Utilice boquillas de alto caudal para aplicar el mayor volumen práctico de rociado. Las boquillas de mayor caudal volumétrico producen microgotas más grandes.
- Presión: Utilice las presiones de aplicación más bajas indicadas para la boquilla. La presión más alta reduce el tamaño de la microgota y no mejora la penetración en la cubierta vegetal (dosel). Cuando necesite caudales volumétricos más altos, utilice boquillas con caudales volumétricos más altos en lugar de aumentar la presión.
- Cantidad de boquillas: Utilice la cantidad mínima de boquillas que proporcione una cobertura uniforme.
- Orientación de la boquilla: Al orientar las boquillas de modo que el rociado se libere hacia atrás en paralelo a la corriente de aire, se producirán microgotas más grandes que con otras orientaciones. Una considerable desviación de la horizontal reducirá el tamaño de las microgotas y aumentará el potencial de deriva.
- Tipo de boquilla: Utilice un tipo de boquilla diseñado para la aplicación prevista. En la mayoría de los tipos de boquilla, los ángulos de rociado más estrechos producen microgotas más grandes. Considere utilizar boquillas que produzcan baja deriva. Las boquillas de chorro sólido orientadas hacia atrás producen microgotas más grandes que otros tipos de boquillas.

Cómo controlar la colocación de las microgotas de rociado:

- Longitud de la barra rociadora: Para algunos patrones de uso, a fin de reducir aún más la deriva sin acortar el ancho de la pasada, reduzca la longitud efectiva de la barra rociadora a menos de ¾ de la envergadura o longitud del rotor.
- Altura de aplicación: No aplique a una altura mayor de 10 pies (3 m) por encima del follaje de las plantas más altas, a menos que se necesite una altura mayor por la seguridad de la aeronave. Las alturas de aplicación mayores resultan en una mayor reducción del tamaño de las microgotas a través de la evaporación y mayor movimiento en las corrientes de aire. Hacer las aplicaciones a la altura más baja que sea segura reduce la exposición de las microgotas a la evaporación y al viento.
- Velocidad de aplicación: Las velocidades de aeronave más lentas dentro de un rango seguro producirán menos turbulencia de aire y menos microgotas pequeñas.

Ajuste de la pasada: Cuando las aplicaciones se realizan con viento cruzado, la pasada se desplazará a favor del viento. Por lo tanto, en los bordes en contra y a favor del viento del campo, los aplicadores deben compensar dicho desplazamiento con el ajuste de la pasada de la aeronave en contra del viento. Las distancias de ajuste de la pasada deben aumentar con el mayor potencial de deriva (velocidad del viento, tamaño de las microgotas, etc.).

Factores ambientales clave:

- **Viento:** El potencial de deriva es el mínimo a velocidades de viento de 2 a 10 millas por hora (3 a 16 km/h). No obstante, muchos factores como el tamaño de la microgota y el tipo de equipo determinan el potencial de deriva en cualquier punto específico. Hay que evitar la aplicación cuando la velocidad de viento sea inferior a 2 millas por hora (3 km/h) debido a la dirección variable del viento y el alto potencial de inversión. **NOTA:** El terreno local puede influir en los patrones del viento. Los aplicadores deben estar familiarizados con los patrones de viento local y deben conocer cómo estos patrones inciden en la deriva.
- **Temperatura y humedad:** Al hacer aplicaciones en condiciones de baja humedad relativa, configure el equipo para producir microgotas más grandes con el fin de compensar la evaporación. La evaporación de las microgotas es más intensa cuando las condiciones son calientes y secas.
- **Inversiones térmicas:** No aplique durante una inversión térmica, puesto que el potencial de deriva es elevado. Las inversiones térmicas restringen la mezcla vertical en el aire, lo cual hace que las microgotas pequeñas suspendidas permanezcan en una nube concentrada. Esa nube puede desplazarse en direcciones impredecibles a causa de corrientes de aire ligeras variables que son comunes durante las inversiones. Las inversiones térmicas se caracterizan por el aumento de la temperatura con la altitud y son comunes en las noches con nubosidad limitada y poco o nada de viento. Comienzan a formarse desde la puesta del sol y generalmente continúan hasta la mañana siguiente. Su presencia puede manifestarse en forma de niebla sobre el suelo; sin embargo, si no hay niebla, las inversiones también pueden identificarse por el movimiento de humo proveniente de una fuente terrestre o un detector de humo de aeronave. El humo que se acumula y se desplaza lateralmente en una nube concentrada (bajo condiciones de poco viento) indica una inversión, mientras que el humo que sube y se disipa rápidamente indica una buena mezcla de aire vertical.

Áreas sensibles:

Utilice productos pesticidas adyacentes a áreas sensibles solamente cuando exista un potencial mínimo de deriva o movimiento fuera del objetivo, p. ej., que el viento sople en sentido contrario de los cultivos no objetivo, zonas residenciales, hábitats conocidos de especies amenazadas o en peligro de extinción, etc.

En California (solamente), los cultivos particularmente sensibles se identifican como algodón y ciruelas para deshidratar. En aplicaciones cercanas a estos cultivos sensibles, utilice las siguientes zonas de amortiguamiento:

- No realice aplicaciones aéreas dentro de 4 millas (6.5 km) de cultivos sensibles.
- No realice aplicaciones terrestres dentro de 1 milla (1.6 km) de cultivos sensibles, excepto cuando la dirección del viento durante la aplicación sea en dirección contraria a los cultivos sensibles. En ese caso, las aplicaciones terrestres no deben efectuarse a una distancia menor de 0.5 millas (800 m) de los cultivos sensibles.
- No realice aplicaciones secas directas en arroz por vía aérea dentro de 360 pies (110 m) de cultivos sensibles.

Limpieza del equipo de rociado

La limpieza del tanque de mezclar y el equipo de rociado es una práctica importante para evitar daños en los cultivos deseables. Es fundamental limpiar todos los equipos de mezclado y rociado inmediatamente después de usarlos y antes de aplicar productos pesticidas, incluido **Promote**. Esto es especialmente importante antes de aplicar el producto en cualquier cultivo (que no sea sorgo granífero ni maíz).

Para limpiar el equipo de rociado, siga los procedimientos descritos a continuación:

- Drene en su totalidad el tanque de mezclado y/o el rociador y luego lave a fondo el tanque, rociador, barra rociadora y boquillas con agua limpia. Vuelva a drenar el sistema.
- Llene hasta la mitad el tanque de mezclado o de rociado con agua limpia y agregue amoníaco de uso doméstico, normalmente una solución al 3%, con una proporción de dilución del 1% vol/vol de amoníaco o 1 galón por 100 galones de agua de enjuague.
- Llene completamente los tanques con agua limpia adicional. Agite, haga recircular y enjuague la barra rociadora y las mangueras. Deje el sistema funcionando durante 10 a 15 minutos. Drene el sistema completamente.
- Retire las boquillas y mallas (filtros), y extraiga todo el material sólido visible. Luego remoje los componentes en un 1% vol/vol de solución de amoníaco. Inspeccione las boquillas y mallas (filtros), y retire todos los residuos visibles.
- Repita por segunda vez los procedimientos anteriores.
- Enjuague con agua limpia el tanque de mezclado o rociador, la barra rociadora y las mangueras. Vuelva a drenar el sistema y revise si tiene residuos visibles. Si los hay, vuelva a repetir el ciclo de limpieza.
- Si los residuos del enjuague no pueden eliminarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, comuníquese con su agencia estatal de pesticidas o de control ambiental, o con el representante de residuos peligrosos en la oficina regional más cercana de la EPA (EE. UU.) para obtener indicaciones del proceso a seguir para su eliminación.

Mezclas en tanque

Para mejorar la eficacia de este producto, aplíquelo en combinación con otros productos pesticidas registrados para usarlos con el mismo cultivo y técnicas de aplicación.

Encontrará una lista de posibles adyuvantes de mezcla en tanque en la sección de instrucciones de uso para cada cultivo. Esta lista es un ejemplo de productos utilizados, pero no incluye absolutamente todos. Para obtener información actualizada sobre el adyuvante de mezcla en tanque en su área, consulte a su distribuidor local o representante del servicio de extensión agrícola estatal.

Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos en la lista de mezclas estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque.

Si **Promote** va a mezclarse en tanque con otros herbicidas, haga una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo. Utilice un recipiente pequeño y mezcle todos los componentes en una cantidad reducida, generalmente 0.5 a 1 cuarto de galón de rociado. Combine todos los productos en la misma proporción y orden de adición que con la mezcla de aplicación prevista. Observe la mezcla en busca de indicios de incompatibilidad, lo cual comúnmente ocurre de 10 a 30 minutos después del mezclado. Si observa incompatibilidad, intente cambiar el orden de adición de los componentes. La pauta para adyuvantes de mezcla en tanque depende del tipo de formulación. Comience con los polvos humedecibles, incluyendo bolsas solubles en agua, gránulos dispersables en agua, concentrados en suspensión o autosuspensibles, todos con muy buena agitación. Siga con los concentrados mezclables en agua y concentrados emulsionables (EC) antes de agregar aditivos para el control de la deriva, surfactantes no iónicos (NIS) o concentrados de aceite de cultivo (COC). Después de agitar vigorosamente, se debe obtener una suspensión homogénea. Deje reposar la mezcla en tanque final y observe si los componentes se asientan rápidamente o comienzan a flotar. Si hay indicios de incompatibilidad física, no utilice la mezcla para rociar.

Restricciones de aplicación

- No utilice rociadores asistidos por aire (barrido seco) para aplicar este producto.
- No aplique este producto mediante ningún tipo de sistema de riego.
- No lo aplique cuando la velocidad del viento supere las 15 millas por hora (24 km/h).
- No aplique más de 2 onzas de este producto por acre por un periodo de 12 meses (incluye aplicaciones a cultivos y los intermedios de hileras/surcos) en cultivos, excepto en tierra en barbecho, maíz de campo y caña de azúcar.
- No aplique más de 2 ⅔ oz de este producto (0.125 lb de ingrediente activo) por acre por temporada de uso en tierra en barbecho, maíz de campo y caña de azúcar.
- No permita que este producto se desplace fuera del área objetivo.
- No aplique mezclas en tanque si el cultivo está sometido a condiciones severas de estrés debido a sequía, suelos saturados con agua, baja fertilidad (especialmente niveles bajos de nitrógeno), granizo, heladas, insectos o cuando la temperatura máxima durante el día sea superior a 92 °F (33 °C).
- No utilice este producto si las malezas o el cultivo objetivo están sometidos a estrés debido a sequía, suelos saturados con agua, baja fertilidad (especialmente niveles bajos de nitrógeno) u otras condiciones desfavorables para el crecimiento.

Precauciones de aplicación

- Evite rociar cuando las condiciones favorezcan las precipitaciones o si se usan sistemas de riego con aspersores elevados durante las 4 horas siguientes a esta aplicación.
- Puede ocurrir daño significativo al cultivo cuando el residuo de rociado de la aplicación al voleo de este producto sobre mantillo plástico se concentra en el hoyo de la planta por riego o lluvia. Para minimizar este daño potencial, asegúrese de que los lechos de siembra estén coronados adecuadamente.
- Bajo condiciones de crecimiento frías y húmedas que retarden el brote, la vitalidad o el desarrollo temprano de las plántulas, este producto podría provocar daños o pérdidas en el cultivo. Es más probable que estas condiciones ocurran durante la primera siembra de la temporada.
- Se puede causar pérdida de eficacia o daños en el cultivo si las malezas están sometidas a sequía, estrés, enfermedades o daños por insectos.
- La madurez del cultivo tratado podría retardarse al usar este producto.
- Los insecticidas organofosforados aplicados al suelo o al follaje en cultivos tratados con este producto pueden aumentar el potencial de daños al cultivo y/o la severidad de dichos daños.
- Se puede causar un aumento en los daños del cultivo si la profundidad de siembra es muy escasa y hay cantidades excesivas de agua (más de 1 pulgada [25 mm]) debido a precipitaciones o sistemas de riego por aspersión.
- Utilice boquillas y presiones que minimicen la producción de partículas finas que se desplacen fuera del área objetivo.
- Aplique este producto a cultivos que figuren en la etiqueta (incluyendo cultivares y/o híbridos de estos). Sin embargo, no todos los híbridos/variedades han sido evaluados para determinar su sensibilidad a este producto. Para variedades no probadas, trate una pequeña cantidad del campo y determine la sensibilidad potencial para su uso. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el usuario asume la responsabilidad por dicho uso y cualquier daño a la planta que pueda ocurrir.
- Las aplicaciones de este producto podrían provocar amarilleo temporal o atrofia en el crecimiento del cultivo.

- Acate las pautas de manejo de la resistencia, especialmente en malezas tolerantes.
- En California y Arizona, debido a las condiciones ambientales que retardan la degradación de este producto, se deben ampliar los intervalos de rotación del cultivo cuando se usa irrigación por goteo.
- Cuando este producto se aplique por encima del cultivo floreciente, se puede producir una pérdida de brotes bajo ciertas condiciones ambientales.
- Si se producen precipitaciones o se riega durante las 4 horas después de la aplicación, podría reducirse la eficacia del producto.
- Evite alterar (p. ej., labrar) las áreas tratadas por lo menos 7 días después de la aplicación.

Para obtener un mejor desempeño

Diversos factores como la concentración de aplicación, las especies de malezas, el estrés y las condiciones de las malezas (incluyendo el tamaño y los factores climáticos) afectan el nivel de control. Las aplicaciones efectuadas a malezas activamente en crecimiento en las etapas iniciales de desarrollo (según se describe a continuación) optimizarán el desempeño. En las aplicaciones posemergentes en malezas, el tratamiento anticipado es la mejor manera de controlar las malezas que compiten con el cultivo. Para el control residual en tratamientos posemergentes tempranos (en maíz), podría ser necesario hacer una segunda aplicación para controlar los brotes de malezas posteriores.

Promote actúa rápidamente en las malezas objetivo retardando su crecimiento, lo cual permite favorecer el desarrollo del cultivo sobre las malezas objetivo. Una vez que se atrofia el desarrollo de las malezas objetivo, las hojas y el punto de crecimiento comienzan a descolorarse hasta perecer.

El control total suele ocurrir en 7 a 14 días, dependiendo del tamaño de las malezas, el tipo de especie y las condiciones de crecimiento. Dependiendo de la etapa y desarrollo de las malezas objetivo, generalmente el control se logra en 7 a 14 días.

Al utilizar aditivos de rociado, siga detalladamente las instrucciones de uso indicadas.

- En aplicaciones preemergentes:
 - Si las malezas objetivo están presentes antes de que emerja el cultivo, use un surfactante no iónico identificado en la sección "Aditivos de rociado" de la etiqueta.
 - Para un control de malezas preemergente óptimo, active la humedad del suelo.
 - El control de malezas preemergente se mejora incorporando este producto con riegos (¼ a ½ pulgada [6 a 12 mm] como máximo).
- En aplicaciones posemergentes:
 - Se obtiene un mejor control cuando se aplica de manera temprana a malezas pequeñas de hoja ancha de crecimiento activo (1 a 3 pulg. [2.5 a 7.6 cm] de altura). Es posible que no se puedan controlar adecuadamente las malezas grandes de hoja ancha.
 - Las plantas de juncia se pueden controlar mejor en la etapa de crecimiento activo de 3 a 5 hojas.
 - Después de una aplicación posemergente, postergue el riego con aspersores elevados por 2 a 3 días.
 - No utilice este producto si las malezas están sometidas a sequía, estrés, enfermedades o daños por insectos.
- Si hay una gran infestación de malezas, utilice el producto en las primeras etapas, antes de que las malezas compitan demasiado con el cultivo.
- Para controlar malezas suprimidas, malezas grandes que exceden las limitaciones de tamaño, malezas que emergen después de una aplicación o especies de malezas que no figuran en la lista, cultive el suelo tratado 7 a 10 días después de una aplicación posemergente, a menos que se especifique lo contrario.
- Evite alterar (p. ej., labrar) las áreas tratadas por lo menos 7 días después de la aplicación.
- Las malezas anuales pueden tener múltiples florecimientos de plántulas o las plantas perennes tratadas podrían volver a crecer desde las raíces o tallos subterráneos, dependiendo de las precipitaciones y otras condiciones ambientales. Para maximizar el control de esas malezas, haga una aplicación secuencial de este producto.

Tabla de actividad de malezas preemergentes - Promote - por especies de malezas

Nombre común	Nombre científico	Control	Supresión	Instrucciones
Amaranto espinoso	<i>Amaranth spinosus</i>	SÍ		Ciertos biotipos de esta maleza son conocidos por ser resistentes a herbicidas ALS. ¹
Bardana común	<i>Xanthium strumarium</i>	SÍ		
Esparrilla	<i>Spergula arvensis</i>	SÍ		
Flor de Santa Lucía	<i>Commelina erecta</i>	SÍ		
Botoncillo	<i>Eclipta prostrata</i>	SÍ		
Juncia de arrozal	<i>Cyperus iria</i>		SÍ	
Estrellita	<i>Galinsoga</i>	SÍ		
Pie de ganso		SÍ		
Hierba cana	<i>Senecio vulgaris</i>	SÍ		
Crisantemo /pegajosa	<i>Erigeron canadensis</i>	SÍ		
Estramonio	<i>Datura stramonium</i>	SÍ		
Coquia	<i>Kochia scoparia</i>	SÍ		Ciertos biotipos de esta maleza son conocidos por ser resistentes a herbicidas ALS. ¹
Persicaria	<i>Polygonum persicaria</i>	SÍ		
Quinoa	<i>Chenopodium album</i>	SÍ		
Mostaza de campo	<i>Sinapis arvensis</i>	SÍ		
Juncia avellanada, amarilla	<i>Cyperus esculentus</i>		SÍ	Utilice concentraciones más altas especificadas para supresión
Juncia real	<i>Cyperus rotundus</i>		SÍ	Utilice concentraciones más altas especificadas para supresión
Quelite, bledo rojo	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SÍ		Ciertos biotipos de esta maleza son conocidos por ser resistentes a herbicidas ALS. ¹
Quintonil blanco	<i>Amaranthus hybridus</i>	SÍ		Ciertos biotipos de esta maleza son conocidos por ser resistentes a herbicidas ALS. ¹
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>		SÍ	
Rabanillo silvestre	<i>Raphanus raphanistrum</i>	SÍ		
Ambrosia común	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SÍ		Ciertos biotipos de esta maleza son conocidos por ser resistentes a herbicidas ALS. ¹
Bolsa de pastor	<i>Capsella bursapastoris</i> (L.) medicus	SÍ		
Poligonato de Pensilvania	<i>Polygonum pensylvanicum</i>	SÍ		
Girasol	<i>Helianthus annuus</i>	SÍ		
Yute chino (hoja terciopelo)	<i>Abutilon theophrasti</i>	SÍ		

¹ Si hay malezas resistentes a ALS presentes, use otro herbicida con un modo de acción registrado en el cultivo contra las malezas objetivo al usarse solo o como un adyuvante de mezcla en tanque.

Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos en la lista de mezclas estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque.

Tabla de actividad de malezas posemergentes - Promote - por especies de malezas

Nombre común	Nombre científico	Control	Supresión	Instrucciones
Amaranto espinoso	<i>Amaranth spinosus</i>	SÍ		Ciertos biotipos de esta maleza son conocidos por ser resistentes a herbicidas ALS. ¹
Pasto dentado	<i>Echinochloa crusgalli</i>	SÍ		
Correhuela	<i>Calystegia sepium</i>	SÍ		
Pepino espinoso o pepinillo cornichón	<i>Sicyos angulatus</i>	SÍ	SÍ	
Sagitaria de California	<i>Sagittaria montevidensis</i>	SÍ		Se requiere una concentración de 1 - 1 ½ onzas.
Bardana común	<i>Xanthium strumarium</i>	SÍ		
Esparcilla	<i>Spergula arvensis</i>	SÍ		
Hierba caribe	<i>Eriochloa villosa</i>	SÍ		
Flor de Santa Lucía	<i>Commelina erecta</i>		SÍ	
Cáñamo Canadá	<i>Apocynum cannabinum</i>		SÍ	
Botoncillo	<i>Eclipta prostrata</i>		SÍ	
Juncia de arrozal	<i>Cyperus iria</i>	SÍ		
Margarita Philadelphia	<i>Erigeron philadelphicus</i>	SÍ		
Mijo (cola de zorro): gigante, amarillo, verde erizado		SÍ		
Estrellita	<i>Galinsoga</i>	SÍ		
Girasolcito, girasolillo	<i>Verbesina encelioides</i>	SÍ		
Pie de ganso		SÍ		
Ortiga de Bull	<i>Solanum carolinense</i>	SÍ		
Cola de caballo	<i>Equisetum</i>		SÍ	
Caminadora	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>	SÍ		
Dormidera	<i>Aeschynomene</i>	SÍ		
Rizomas de sorgo de Alepo, plántula	<i>Sorghum halepense</i>	SÍ		
Coquia	<i>Kochia scoparia</i>		SÍ	Ciertos biotipos de esta maleza son conocidos por ser resistentes a herbicidas ALS. ¹
Persicaria	<i>Polygonum persicaria</i>	SÍ		
Aurora	<i>Hibiscus trionum</i>	SÍ		
Algodoncillo común	<i>Asclepias syriaca</i>		SÍ	
Vid azul	<i>Ampelamus albidus</i>		SÍ	
Mijo común (silvestre)	<i>Panicum miliaceum</i>	SÍ		
Campanilla, hoja de hiedra (trompillo)	<i>Ipomoea hederacea</i>		SÍ	Utilice concentraciones más altas para supresión.
Campanilla morada	<i>Ipomoea purpurea</i>		SÍ	Utilice concentraciones más altas para supresión.
Mostaza de campo	<i>Sinapis arvensis</i>	SÍ		
Hierba mora negra	<i>Solanum americanum</i>	SÍ		
Juncia avellanada, amarilla	<i>Cyperus esculentus</i>	SÍ		Las infestaciones intensas requieren aplicaciones secuenciales.
Juncia real	<i>Cyperus rotundus</i>	SÍ		Las infestaciones intensas requieren aplicaciones secuenciales.
Avena		SÍ		
Falso mijo	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	SÍ		
Panizo texano (mijo de Texas)	<i>Panicum texanum</i>	SÍ		
Pasionaria, pasiflora	<i>Passiflora incarnata</i>	SÍ		
Quelite, bledo rojo	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SÍ		Ciertos biotipos de esta maleza son conocidos por ser resistentes a herbicidas ALS. ¹
Quintonil blanco	<i>Amaranthus hybridus</i>	SÍ		Ciertos biotipos de esta maleza son conocidos por ser resistentes a herbicidas ALS. ¹
Hierba carmín	<i>Phytolacca</i>	SÍ		

(continúa)

Nombre común	Nombre científico	Control	Supresión	Instrucciones
Gramma (ballico)	<i>Elytrigia repens</i>	SÍ		
Rabanillo silvestre	<i>Raphanus raphanistrum</i>	SÍ		
Ambrosia común	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SÍ		Ciertos biotipos de esta maleza son conocidos por ser resistentes a herbicidas ALS. ¹
Ambrosia gigante	<i>Ambrosia trifida</i>	SÍ		Ciertos biotipos de esta maleza son conocidos por ser resistentes a herbicidas ALS. ¹
Aguja de pastor (tallo rojizo)	<i>Ammannia auriculata</i>	SÍ		Se requiere una concentración de 1 - 1 ½ onzas.
Junco de los arrozales	<i>Scirpus mucronatus</i>	SÍ		Ciertos biotipos de esta maleza son conocidos por ser resistentes a herbicidas ALS. ¹
Zacate italiano, raigrás italiano	<i>Lolium multiflorum</i>	SÍ		
Cardillo		SÍ		
Sesbania	<i>Sesbania exaltata</i>	SÍ		
Sorgo común	<i>Sorghum bicolor</i>	SÍ		
Pasto bandera, hoja ancha		SÍ		
Bolsa de pastor	<i>Capsella bursapastoris</i> (L.) <i>medicus</i>		SÍ	
Escoba dura		SÍ		
Flor pequeña	<i>Umbrellaplant</i>	SÍ		Se requiere una concentración de 1 - 1 ½ onzas.
Poligonato de Pensilvania	<i>Polygonum pensylvanicum</i>	SÍ		
Sorghum Almum		SÍ		
Cardo cundidor	<i>Cirsium arvense</i>	SÍ		
Girasol	<i>Helianthus annuus</i>	SÍ		
Yute chino (hoja terciopelo)	<i>Abutilon theophrasti</i>	SÍ		

¹ Si hay malezas resistentes a ALS presentes, use otro herbicida con un modo de acción registrado en el cultivo contra las malezas objetivo al usarse solo o como un adyuvante de mezcla en tanque. Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos en la lista de mezclas estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque.

Índice de cultivo/sitio de uso de Promote

Página

Maíz:	
Maíz de campo, maíz de campo cultivado para semilla	9-12
Maíz dulce y maíz palomero.....	19-20
Algodón	8
Tierra en barbecho.....	8
Sorgo granífero (milo)	12-13
Mijo común (silvestre)	13
Pastizales, praderas y gramíneas/heno para Programas de reserva de conservación (CRP)	14
Arroz	15-16
Soya, semilla	16-17
Caña de azúcar	18-19
Frijoles secos	8

La concentración de uso para **Promote** se expresa en términos de onzas de este producto por peso por acre como concentración oz/acre.

El intervalo de precosecha (PHI) son los días requeridos entre la última aplicación de **Promote** y la cosecha del cultivo.

Para los intervalos mínimos aceptables entre la última aplicación de **Promote** y la siembra de un cultivo rotacional, consulte la sección "Pautas de rotación de cultivos" de esta etiqueta.

Si **Promote** se utiliza con adyuvantes de mezcla en tanque, consulte las etiquetas específicas de los adyuvantes y acate todas las declaraciones de precaución e instrucciones de uso, incluidos los intervalos de precosecha, las restricciones de rotación de cultivos, y las instrucciones de mezcla y aplicación. Acate las limitaciones, precauciones e instrucciones más restrictivas de la etiqueta de todos los productos usados en las mezclas.

Cultivo	Concentración (oz/acre)	Intervalo de precosecha (PHI)	RESTRICCIONES
ALGODÓN (excepto en California)	$\frac{2}{3}$ - 1 $\frac{1}{3}$	28	No aplique más de 1 $\frac{1}{3}$ oz de este producto por acre por ciclo de cultivo, sin exceder 1 $\frac{1}{3}$ oz (0.062 lb de ingrediente activo) por acre por periodo de 12 meses.
Para un control posemergente de malezas en algodón emergido, aplique este producto como un rociado dirigido en equipo con capucha protectora. Realice la aplicación en cualquier momento después de que emerja el algodón hasta que el cierre de surco prohíba el uso de equipo de rociado con capucha protectora. Use este producto en cualquier momento después de que emerja el algodón hasta que el cierre de surco inhiba el uso de equipo de rociado con capucha protectora. El aplicador es responsable de mantener una velocidad de rociado y posición del equipo adecuadas para que la niebla del rociado no entre en contacto con las plantas de algodón.			

Cultivo	Concentración (oz/acre)	Intervalo de precosecha (PHI)	RESTRICCIONES
FRIJOLE SECOS	$\frac{1}{2}$ - 1		No aplique más de 1 oz de este producto (0.047 lb de halosulfuron-metil) por aplicación. No aplique más de 1 oz de este producto por acre por ciclo de cultivo, sin exceder 2 oz (0.094 lb de ingrediente activo) por acre por periodo de 12 meses (incluidas aplicaciones al cultivo y a intermedios de hileras/surcos). Para aplicaciones preemergentes y posemergentes de siembra directa, no aplique más de $\frac{2}{3}$ oz de este producto (0.031 lb de halosulfuron-metil) por aplicación. No aplique más de 2 oz (0.094 lb de halosulfuron-metil) por acre por periodo de 12 meses (incluido aplicaciones al cultivo y a los intermedios de hileras/surcos). Para aplicaciones en intermedios de hileras/surcos, no aplique más de 1 oz de este producto (0.047 lb halosulfuron-metil) por aplicación. No aplique este producto con aplicador de mecha ni con enjugadores.
Para aplicaciones por rociado, coloque suficiente agua en el área de tratamiento para obtener una cobertura y distribución uniformes de la mezcla de aplicación en las malezas o el suelo. En el caso de equipo terrestre, use como mínimo 15 galones (57 L) de agua por acre. Aplicaciones preemergentes de siembra directa: Concentración de uso: $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ oz Use este producto después de plantar, pero antes del agrietamiento. Para suelos de textura más ligera con un bajo nivel de materia orgánica, use la concentración más baja. Aplicaciones posemergentes de siembra directa: Concentración de uso: $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ oz Use este producto cuando las plantas tengan 1 a 3 hojas trifoliadas, pero antes de la floración. Para obtener mejores resultados, aplique a malezas que tengan menos de 6 pulgadas (15 cm) de altura. Use un surfactante no iónico (NIS). No todos los híbridos/variedades han sido evaluados para determinar su sensibilidad a este producto. Para variedades que no se hayan sometido a pruebas, se debe rociar una pequeña cantidad del campo para determinar la sensibilidad potencial para su uso. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el usuario asume la responsabilidad por dicho uso y cualquier daño a la planta que pueda ocurrir. Aplicaciones en intermedios de hileras/surcos: Concentración de uso: $\frac{1}{2}$ - 1 oz Aplique este producto entre surcos del cultivo para el control de la juncia y malezas de hoja ancha incluidas en la etiqueta. Evite el contacto de este producto con el cultivo sembrado. Si se usa plástico en el surco sembrado, ajuste el equipo para mantener la aplicación fuera del plástico. Ajuste la concentración y el volumen de rociado proporcionalmente al área tratada real. Adyuvante de mezcla en tanque Una mezcla en tanque de Promote con Eptam® 7-E proveerá un espectro más amplio de control de malezas que cualquiera de los productos usados por separado. Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos en la lista de mezclas estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque. Use Promote a razón de $\frac{1}{2}$ a $\frac{2}{3}$ oz con la concentración indicada en la etiqueta de Eptam® 7-E e incorpore en el suelo a una profundidad de aproximadamente 2 pulgadas (5 cm) antes de la siembra. Si aparece alguna costra en el suelo, rómpala mediante labranza rotativa ligera con un azadón durante o poco después de que emerjan los frijoles. Para suelos de textura más ligera con un bajo nivel de materia orgánica, use la concentración más baja.			

Cultivo	Concentración (oz/acre)	Intervalo de precosecha (PHI)	RESTRICCIONES
TIERRA EN BARBECHO	$\frac{2}{3}$ - 1 $\frac{1}{3}$		No haga más de 2 aplicaciones por temporada de uso. No aplique más de 2 $\frac{2}{3}$ oz de este producto (0.125 lb de ingrediente activo) por acre por temporada de uso.
Aplique este producto como un rociado al voleo en tierra en barbecho. Para aplicaciones por rociado, coloque suficiente agua en el área de tratamiento para obtener una cobertura y distribución uniformes de la mezcla de aplicación en las malezas o el suelo.			

Cultivo	Concentración (oz/acre)	Intervalo de precosecha (PHI)	RESTRICCIONES
MAÍZ DE CAMPO Y MAÍZ DE CAMPO CULTIVADO PARA SEMILLA	$\frac{2}{3}$ - 1 $\frac{1}{3}$	30	No realice más de 2 aplicaciones por temporada de uso de cultivo. No aplique más de 2 $\frac{2}{3}$ oz de este producto (0.125 lb de ingrediente activo) por acre por temporada de uso. Después de la aplicación al follaje, deje pasar 30 días antes de pastorear ganado doméstico, cosechar forraje o cosechar ensilaje. No aplique este producto con aplicador de mecha ni con enjugadores.

Si se usa solo, aplique un rociado al voleo por encima o con boquillas de goteo desde la etapa de espiga hasta la etapa de la última labor de cultivo ("layby") del maíz de campo. Utilice boquillas de goteo para maíz grande o un dosel denso competitivo.

Evite rociar una cantidad excesiva directamente sobre los surcos y dentro del verticilo del tallo de maíz.

Tabla de actividad por altura de la maleza en maíz

Actividad de maleza	Control		Supresión	
	$\frac{2}{3}$ oz	1 - 1 $\frac{1}{3}$ oz	$\frac{2}{3}$ oz	1 - 1 $\frac{1}{3}$ oz
Altura de maleza	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas
Pepino espinoso o pepinillo cornichón			1 - 3	4 - 12
Bardana común	1 - 9	9 - 14		
Margarita Philadelphia	1 - 3			
Coqui ¹	1 - 3			3 - 6
Quinoa			1 - 2	
Aurora	1 - 3	4 - 12		
Algodoncillo común			3 - 5	6 - 12
Vid azul		1 - 6	1 - 3	
Campanilla				1 - 3
Mostaza de campo		4 - 6		
Juncia: avellanada ² real	3 - 6 3 - 6	3 - 12 3 - 12		
Pasionaria, pasiflora	1 - 3			
Quelite, bledo rojo ^{1,3}	1 - 3	4 - 6		
Hierba carmín	1 - 6			
Rabanillo silvestre		4 - 6		
Ambrosia: común ¹ gigante ¹	1 - 9 1 - 3	9 - 12 4 - 6		
Poligonato de Pensilvania	1 - 2			
Girasol común	1 - 12	12 - 15		
Yute chino (hoja terciopelo) ³	1 - 9	9 - 12		

¹ Consulte las tablas de actividad de malezas preemergentes y poseemergentes.

² Las infestaciones intensas de juncia requieren aplicaciones secuenciales. Para prevenir que la juncia compita con el cultivo se requiere una aplicación más temprana.

³ Para el control de yute chino (hoja terciopelo) y amaranto (acederón/bledo) grandes se sugiere aplicar el producto con fertilizante de nitrógeno líquido (2 a 4 cuartos de galón por acre) más concentrado de aceite de cultivo o surfactante no iónico.

Adyuvantes de mezcla en tanque

Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos en la lista de mezclas estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque.

2,4-D	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS). Aplique rociado al voleo en maíz de hasta 8 pulgadas (20 cm) de altura. Si el maíz excede 8 pulgadas (20 cm), use rociado dirigido con boquillas de goteo. Malezas de hoja ancha. Evite rociados sobre hojas de maíz justo después de desplegarse, ya que pueden ocurrir daños. Aplique durante el período desde que emerja el maíz hasta la etapa de 5 hojas o de 8 pulgadas (20 cm) de alto, lo que ocurra primero.
-------	---

(continúa)

Herbicida Accent®	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Concentrado de aceite de cultivo (COC) o surfactante no iónico (NIS) o fertilizante amoniacal nitrogenado (p. ej., 28%). Aplique rociado al voleo o con boquillas de goteo en maíz emergido de hasta 24 pulgadas (61 cm) de altura (sin soporte en posición vertical). Para maíz de 24 a 36 pulgadas (61 a 91 cm) de altura, use rociado dirigido con boquillas de goteo. Malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Evite rociar directamente dentro de los verticilos de tallos de maíz grandes. Consulte la etiqueta de Accent® para ver las restricciones de uso en las variedades de maíz.
Herbicida Accent Gold®	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Concentrado de aceite de cultivo (COC) o fertilizante amoniacal nitrogenado (p. ej., 28%). Aplique rociado al voleo en maíz de hasta 12 pulgadas (30 cm) de altura. Malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. No lo aplique a maíz para semilla.
Herbicida Atrazine 4L	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Concentrado de aceite de cultivo (COC). Aplique rociado al voleo en maíz de hasta 12 pulgadas (30 cm) de altura. Aplique cuando las malezas de hoja ancha sean pequeñas (3 pulgadas [8 cm] o menos). Control posemergente de malezas de hoja ancha incluidas en la etiqueta. Ayuda a quemar (eliminar) y controlar muchas malezas gramíneas (1.5 pulgadas [4 cm] o menos) que han escapado a tratamientos herbicidas preemergentes. Las mezclas de Atrazine pueden reducir el control (antagonismo) de malezas de hoja ancha más grandes. Las malezas más pequeñas son más fáciles de controlar.
Herbicida Atrazine 90DF	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Concentrado de aceite de cultivo (COC). Aplique rociado al voleo en maíz de hasta 12 pulgadas (30 cm) de altura. Aplique cuando las malezas de hoja ancha sean pequeñas (3 pulgadas [8 cm] o menos). Control posemergente de malezas de hoja ancha incluidas en la etiqueta. Ayuda a quemar (eliminar) y controlar muchas malezas gramíneas (1.5 pulgadas [4 cm] o menos) que han escapado a tratamientos herbicidas preemergentes. Las mezclas de Atrazine pueden reducir el control (antagonismo) de malezas de hoja ancha más grandes. Las malezas más pequeñas son más fáciles de controlar.
Los herbicidas Banvel® o Clarity® (dicamba)	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS). Aplique rociado al voleo en maíz desde que emerja hasta 36 pulgadas (91 cm) de altura. Use concentraciones de Banvel más bajas o rociados dirigidos en maíz con una altura superior a 8 pulgadas (20 cm). Malezas de hoja ancha. Evite rociados directos dentro de los verticilos de tallos de maíz grandes. No realice aplicaciones después de que el maíz exceda 36 pulgadas (91 cm) o 15 días antes de que emerja la panoja, lo que ocurra primero. Los concentrados de aceite de cultivo (COC) pueden causar daño al cultivo, especialmente con concentraciones más altas de Banvel® o Clarity®.
Herbicida Basis® Gold	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Concentrado de aceite de cultivo (COC) o surfactante no iónico (NIS) o fertilizante amoniacal nitrogenado (p. ej., 28%). Aplique rociado al voleo en maíz de hasta 12 pulgadas (30 cm) de altura. Espectro más amplio. No lo aplique a maíz para semilla.
Herbicida Beacon®	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Concentrado de aceite de cultivo (COC) o surfactante no iónico (NIS) o fertilizante amoniacal nitrogenado (p. ej., 28%). Aplique rociado al voleo o con boquillas de goteo en maíz de 4 a 20 pulgadas (10 a 51 cm) de altura. Para maíz de 20 a 36 pulgadas (51 a 91 cm) de altura hasta prepanoja, use boquillas de goteo. Espectro más amplio. Evite rociar directamente dentro de los verticilos de maíz más grande. Consulte a su distribuidor o al representante de proveedor de semillas para obtener una lista de híbridos susceptibles.
Herbicida Buctril®	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS). Aplique rociado al voleo en maíz hasta que emerja la panoja. Para el control posemergente de malezas anuales de hoja ancha. Pueden producirse quemaduras en las hojas. El uso de concentrado de aceite de cultivo (COC) o fertilizante amoniacal nitrogenado (p. ej., 28%) puede causar quemaduras adicionales en las hojas.
Herbicida Buctril® más Atrazine	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS). Aplique rociado al voleo en maíz de hasta 12 pulgadas (30 cm) de altura. Para el control posemergente de malezas anuales de hoja ancha. Pueden producirse quemaduras en las hojas. El uso de concentrado de aceite de cultivo (COC) o fertilizante amoniacal nitrogenado (p. ej., 28%) puede causar quemaduras adicionales en las hojas.
Herbicida Callisto® 4L	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Concentrado de aceite de cultivo (COC) o fertilizante amoniacal nitrogenado (p. ej., 28%). Aplique rociado al voleo o con boquillas de goteo en maíz de semilla o de campo de hasta 30 pulgadas (76 cm) de altura o con 8 collares foliares, lo que sea más restrictivo. Espectro más amplio.
Herbicida Distinct®	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS). Aplique rociado al voleo o con boquillas de goteo en maíz de 4 a 36 pulgadas (10 a 91 cm) de altura, p. ej., etapa V2 a V10 o 15 días antes de que emerja la panoja, lo que ocurra primero. Para maíz con una altura superior a 20 pulgadas (51 cm), use boquillas de goteo. Espectro más amplio. Evite rociar directamente dentro de los verticilos de tallos de maíz grandes. No use concentrado de aceite de cultivo (COC).

(continúa)

Glifosato (diversas formulaciones)	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS) o sulfato de amonio apto para rociado a 17 lb/100 galones. Aplique rociado al voleo o con boquillas de goteo en maíz de campo tolerante al glifosato (GT) de hasta 30 pulgadas (76 cm) de altura o con 8 collares foliares, lo que sea más restrictivo. Para maíz de campo GT entre 24 y 36 pulgadas (61 a 91 cm), use boquillas de goteo. Para maíz con una altura superior a 20 pulgadas (51 cm), use boquillas de goteo. Para la quema (eliminación) de hierbas anuales emergidas, malezas de hoja ancha y juncia. Verifique la etiqueta de formulación del producto para ver las restricciones específicas. Para uso SOLAMENTE en híbridos de maíz tolerantes al herbicida glifosato.
Glifosato (diversas formulaciones)	Use Promote a razón de ⅔ oz. Para glifosato, consulte la etiqueta de formulación del producto. Surfactante no iónico (NIS). Aplique rociado al voleo. Para la quema (eliminación) antes de la siembra de pastos anuales emergidos, malezas de hoja ancha y juncia. Para mejorar el control de quema (eliminación) de malezas de hoja ancha use dicamba o 2,4-D. Use solamente en híbridos de maíz Pioneer IR.
Herbicida Impact® 2.8L	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS) (preferido) o concentrado de aceite de cultivo (COC) o fertilizante amoniacal nitrogenado (p. ej., 28%). Aplique rociado al voleo o con boquillas de goteo en maíz de semilla o de campo de hasta 36 pulgadas (91 cm) de altura. Para un dosel denso, se prefieren las boquillas de goteo. Espectro más amplio.
Herbicida Liberty® 1.67L	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Sulfato de amonio apto para rociado (17 lb/100 galones de mezcla de rociado). Aplique rociado al voleo o con boquillas de goteo en maíz de campo de hasta 24 pulgadas (61 cm) de altura o con 7 collares foliares, lo que sea más restrictivo. Para maíz de campo con una altura superior a 24 pulgadas (61 cm) y de hasta 36 pulgadas (91 cm) de altura, use boquillas de goteo. Malezas de hoja ancha y hierbas anuales. No agregue surfactante no iónico (NIS) o concentrado de aceite de cultivo (COC). Para uso SOLAMENTE en híbridos de maíz tolerantes al herbicida Liberty®.
Herbicida Marksman®	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS). Aplique rociado al voleo en maíz de hasta 8 pulgadas (20 cm) de altura. Espectro más amplio. El concentrado de aceite de cultivo (COC) puede causar daños al cultivo.
Herbicida para maíz Option® 35WDG	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Concentrado de aceite de cultivo (COC) o fertilizante amoniacal nitrogenado (p. ej., 28%) o sulfato de amonio apto para rociado (17 lb/100 galones). Aplique rociado al voleo o con boquillas de goteo en maíz de campo de 4 a 16 pulgadas (10 a 41 cm) de altura p. ej., V2 a V6. Para maíz de campo con más de 16 hasta 36 pulgadas (41 hasta 91 cm) de altura, p. ej., V6 a V10, use boquillas de goteo. Espectro más amplio. No aplique Option® a maíz de semilla. Evite rociar directamente dentro de los verticilos de tallos de maíz grandes.
Herbicida Status®	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS). Aplique rociado al voleo o con boquillas de goteo en maíz de hasta 20 pulgadas (51 cm) de altura. Para maíz con una altura superior a 20 pulgadas (51 cm), use boquillas de goteo. Espectro más amplio. No use concentrado de aceite de cultivo (COC).
Herbicida Steadfast® 75DF	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Concentrado de aceite de cultivo (COC) o surfactante no iónico (NIS) o fertilizante amoniacal nitrogenado (p. ej., 28%) o sulfato de amonio apto para rociado (17 lb / 100 galones). Aplique rociado al voleo o con boquillas de goteo en maíz de campo de hasta 20 pulgadas (51 cm) de altura o con 6 collares foliares, lo que sea más restrictivo. Espectro más amplio. Evite rociar directamente dentro de los verticilos de tallos de maíz grandes. No lo aplique a maíz para semilla.
Adyuvantes de mezcla en tanque residuales del suelo	Use Promote a razón de ⅔ oz. Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Micro-Tech® o Bullet® o Harness® Xtra o Harness® Xtra 5.6L o Degree® o Degree Xtra®. Surfactante no iónico (NIS) (1 qt/100 galones de rociado) y fertilizante de nitrógeno al 28% (4 gal/100 galones de rociado). Aplique como rociado al voleo en 15 a 30 galones de rociado/acre a hierbas emergidas en la etapa de 2 hojas (o menos) y en maíz de menos de 11 pulgadas (28 cm) de altura (5 pulgadas [13 cm] de altura para Micro-Tech® y Bullet®). Para el control temprano posemergente de maleza pequeña de hoja ancha, juncia y hierbas emergidas adicionales, y el control preemergente o reducción de la competencia de malezas de hoja ancha y hierbas anuales según se indica en la etiqueta del producto adyuvante. Para controlar quinoa emergida de menos de 4 pulgadas (10 cm) de altura, use Banvel® o Clarity® (dicamba). Use Promote a razón de ⅔ oz y Accent®. Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Micro-Tech® o Bullet® o Harness® Xtra o Harness® Xtra 5.6L o Degree® o Degree Xtra®. Surfactante no iónico (NIS) (1 qt/100 galones de rociado) y fertilizante de nitrógeno al 28% (4 gal/100 galones de rociado). Aplique como rociado al voleo en 15 a 30 galones de rociado/acre a hierbas emergidas en la etapa de 2 hojas (o menos), cola de zorro de menos de 2 pulgadas (5 cm) de altura y en maíz de menos de 11 pulgadas (28 cm) de altura (5 pulgadas [13 cm] de altura para Micro-Tech® y Bullet®). Para el control temprano posemergente de maleza pequeña de hoja ancha y hierbas emergidas adicionales, incluida cola de zorro, y el control preemergente o reducción de la competencia de malezas de hoja ancha y hierbas anuales según se indica en la etiqueta del producto adyuvante. Para controlar quinoa emergida de menos de 4 pulgadas (10 cm) de altura, use Banvel® o Clarity® (dicamba).

(continúa)

Adyuvantes de mezcla en tanque residuales del suelo (continúa)	Use Promote más Accent[®], Beacon[®], Option[®] o Steadfast[®]. Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Alacloro, acetocloro, metolacoloro y dimetenamida. Surfactante no iónico (NIS) (1 qt/100 galones de rociado) y fertilizante de nitrógeno al 28% (4 gal/100 galones de rociado). Aplice como rociado al voleo en 15 a 30 galones (57 a 114 L) de rociado/acre a colas de zorro emergidas y otras hierbas. Para el control temprano posemergente y residual de colas de zorro emergentes y otras malezas gramíneas en maíz de semilla y de campo. Proporciona control residual o reducción de la competencia de malezas anuales y ciertas malezas de hoja ancha según se indica en la etiqueta del herbicida correspondiente. Siga todas las instrucciones y restricciones en cuanto a la altura máxima del maíz para aplicaciones posteriores en esta etiqueta y en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Utilice las pautas más restrictivas.
Híbridos de maíz de campo Pioneer IR	Use Promote a razón de 1½ a 2 oz. Aplique rociado al voleo al suelo. Para el control residual de yute chino (hoja terciopelo), bardana común, quínoa, ambrosía, amaranto (acederón/bledo), poligonato, girasol y otras malezas difíciles de controlar. Use solamente en híbridos de maíz Pioneer IR.
Presiembra, preemergente	Use Promote más Accent[®], Beacon[®], Option[®] o Steadfast[®]. Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Como Harness[®], Harness[®] Xtra, Harness[®] Xtra 5.6L, Degree[®], Degree Xtra[®], Micro-Tech[®], Bullet[®], Lasso[®], alacloro, acetocloro, metolacoloro y dimetenamida. Surfactante no iónico (NIS) (1 qt/100 galones de rociado) y fertilizante de nitrógeno al 28% (4 gal/100 galones de rociado). Aplique como rociado al voleo en 15 a 30 galones (57 a 114 L) de rociado/acre. Aplice como un tratamiento de presiembra temprano aplicado a la superficie, tratamiento de presiembra incorporado o tratamiento preemergente. Para un control eficaz de hoja ancha en combinaciones de adyuvantes de mezcla en tanque con herbicidas para hierbas preemergentes en todos los sistemas de labranza. Siga todas las instrucciones y restricciones en esta etiqueta y en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Utilice las pautas más restrictivas.

Cultivo	Concentración (oz/acre)	Intervalo de pre cosecha (PHI)	RESTRICCIONES
Sorgo granífero (milo)	⅔ - 1	30	No haga más de 1 aplicación por temporada de uso. No aplique más de 1 oz de este producto (0.047 lb de ingrediente activo) por acre por temporada de uso. Después de la aplicación al follaje, deje pasar 30 días antes de pastorear ganado doméstico, cosechar forraje o cosechar ensilaje. No aplique este producto con aplicador de mecha ni con enjugadores.

Si se usa solo, aplique desde la etapa de 2 hojas hasta la etapa de la última labor de cultivo ("layby") del sorgo granífero (antes de que emerja la cabeza del grano). Si el sorgo granífero está sometido a estrés, se producirá una reducción temporal de la estatura del cultivo después de aplicar este producto. Después de la aplicación, este efecto será evidente en 7 a 10 días, pero bajo condiciones de crecimiento normales se recuperará rápidamente.

Tabla de actividad por altura de la maleza en sorgo

Actividad de maleza	Control		Supresión
	⅔ oz	1 oz	⅔ oz
Concentración de producto	⅔ oz	1 oz	⅔ oz
Altura de maleza	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas
Pepino espinoso o pepinillo cornichón			1 - 3
Bardana común	1 - 9		
Margarita Philadelphia	1 - 3		
Coqui ¹	1 - 3		
Quínoa			1 - 2
Aurora	1 - 3		
Algodoncillo común			3 - 5
Vid azul			1 - 3
Juncia: avellanada ² real	3 - 6 3 - 6	3 - 12 3 - 12	
Pasionaria, pasiflora	1 - 3		
Quelite, bledo rojo	1 - 3		
Hierba carmín	1 - 6		
Ambrosia: común Gigante	1 - 9 1 - 3		
Poligonato de Pensilvania	1 - 2		
Girasol común	1 - 12		
Yute chino (hoja terciopelo)	1 - 9		

¹ Consulte las tablas de actividad de malezas preemergentes y posemergentes.

² Las infestaciones intensas de juncia requieren aplicaciones secuenciales. Para prevenir que la juncia compita con el cultivo se requiere una aplicación más temprana.

Adyuvantes de mezcla en tanque

Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos en la lista de mezclas estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque.

2,4-D	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS). Aplique rociado al voleo en sorgo de 6 a 15 pulgadas (15 a 38 cm) de altura. Si el sorgo excede las 8 pulgadas (20 cm), use rociado dirigido con boquillas de goteo y evite aplicarlo sobre el follaje. Malezas de hoja ancha. No trate durante la etapa de embuche, floración o pastosa. No realice aplicaciones cuando el sorgo exceda las 15 pulgadas (38 cm).
Herbicida Atrazine 4L	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Concentrado de aceite de cultivo (COC). Aplique rociado al voleo en sorgo de hasta 12 pulgadas (30 cm) de altura. Aplique cuando las malezas de hoja ancha sean pequeñas (3 pulgadas [8 cm] o menos). Control posemergente de malezas de hoja ancha incluidas en la etiqueta. Ayuda a quemar (eliminar) y controlar muchas malezas gramíneas (1.5 pulgadas [4 cm] o menos) que han escapado a tratamientos herbicidas preemergentes. Las mezclas de Atrazine pueden reducir el control (antagonismo) de malezas de hoja ancha más grandes. Las malezas más pequeñas son más fáciles de controlar.
Herbicida Buctril®	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS). Aplique rociado al voleo en sorgo. Para el control posemergente de malezas anuales de hoja ancha.
Herbicida Buctril® más Atrazine	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS). Aplique rociado al voleo en sorgo. Para el control posemergente de malezas anuales de hoja ancha.

Cultivo	Concentración (oz/acre)	Intervalo de precosecha (PHI)	RESTRICCIONES
MIJO COMÚN (SILVESTRE)	1/2 - 2/3	0 Forraje de mijo 50 Grano y paja de mijo 37 Heno de mijo	No haga más de 1 aplicación por periodo de 12 meses. No aplique más de 3/4 oz de este producto (0.031 lb de halosulfuron-metil) por acre por periodo de 12 meses. No aplique este producto con aplicador de mecha ni con enjugadores. No lo aplique menos de 0 días antes de la cosecha para forraje de mijo. No lo aplique durante los 50 días previos a la cosecha de grano y paja de mijo. No lo aplique durante los 37 días previos a la cosecha de heno de mijo.

Etapas de crecimiento del mijo: **Promote**, utilizado solo, puede aplicarse desde la etapa de 2 hojas hasta la etapa de la última labor de cultivo (antes de que emerja la cabeza del grano). Puede ocurrir una reducción temporal de la estatura del cultivo después de la aplicación de **Promote** si el mijo común silvestre está sometido a estrés. Este efecto será más evidente de 7 a 10 días después de la aplicación. El cultivo se recuperará rápidamente bajo condiciones normales de crecimiento. Las aplicaciones deben realizarse después de que emerja la maleza y cuando esté creciendo activamente. Si agrega una mezcla en tanque, consulte la sección de mezcla en tanque de esta etiqueta.

Mezclas en tanque para mijos:

Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos en la lista de mezclas estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de los productos en la mezcla en tanque.

Se pueden agregar mezclas en tanque para un control adicional de malezas de hoja ancha, incluyendo (entre otras) 2,4-D y dicamba.

Los productos insecticidas y fungicidas pueden mezclarse en tanque con **Promote**.

Intervalos de días indicados después de una aplicación de **Promote**.

Cultivo	Todos los animales (lactantes y no lactantes)		
	Intervalo de prepastoreo (PGI)	Intervalo de precosecha (PHI)	Intervalo de prematanza (PSI)
Forraje de mijo	0	0	0
Grano de mijo	NC	50	0
Paja de mijo	NC	50	0
Heno de mijo	NC	37	0

Cultivo	Concentración (oz/acre)	Intervalo de pre cosecha (PHI)	RESTRICCIONES
PASTIZALES, PRADERAS Y GRAMÍNEAS/HENO PARA FORRAJE Y PROGRAMAS DE RESERVA DE CONSERVACIÓN (CRP) Grupo agrícola 17	$\frac{2}{3}$ - 1 $\frac{1}{3}$	37	No realice más de 2 aplicaciones por periodo de 12 meses. No aplique más de 1 $\frac{1}{3}$ oz de este producto (0.062 lb de halosulfuron-metil) por acre por periodo de 12 meses. No aplique este producto con aplicador de mecha ni con enjugadores.

Para aplicaciones por rociado al voleo, coloque suficiente agua en el área de tratamiento para una cobertura y distribución uniformes de la mezcla de aplicación en las malezas o el suelo. En el caso de equipo terrestre, use como mínimo 10 galones (38 L) de agua por acre.

Aplicaciones de rociado al voleo posemergentes en campos establecidos

Concentración de uso: $\frac{2}{3}$ - 1 $\frac{1}{3}$ oz

Realice la aplicación tan pronto como sea posible después de retirar el heno o antes de que las malezas excedan la restricción de altura de la etiqueta. Retrase el riego por al menos 48 horas después de la aplicación.

Tratamiento posemergente en puntos localizados en campos establecidos

Concentración de uso: $\frac{2}{3}$ - $\frac{3}{4}$ oz

Use a concentraciones equivalentes a las concentraciones de campo al voleo y sin exceder una concentración de aplicación máxima de $\frac{3}{4}$ oz/acre. Use con suficiente agua para proporcionar una cobertura y distribución uniformes de la mezcla de aplicación en las malezas o el suelo.

Rociado al voleo posemergente seguido por tratamiento localizado posemergente

Concentración de uso: $\frac{2}{3}$ - $\frac{3}{4}$ oz

Para maximizar el control de la juncia, puede que se deba usar una segunda aplicación localizada posemergente en aquellas áreas donde la juncia ha emergido o rebrotado. En este caso, use un método de tratamiento en puntos localizados tratando solamente aquellas áreas de juncia emergida. Use a concentraciones equivalentes a las concentraciones de campo al voleo y sin exceder una concentración de aplicación máxima de $\frac{3}{4}$ oz/acre. Aplique con suficiente agua para proporcionar una cobertura y distribución uniformes de la mezcla de aplicación a las malezas.

Adyuvantes de mezcla en tanque

Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos en la lista de mezclas estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de los productos en la mezcla en tanque. Lea y cumpla las restricciones y limitaciones correspondientes, así como las instrucciones de uso en todas las etiquetas de los productos incluidos en la mezcla en tanque.

Para un control de malezas de hoja ancha de espectro más amplio, use adyuvantes, incluyendo (entre otros) 2,4-D, dicamba y Grazon® P+D, N.º de registro de EPA 62719-182 (picloram, sal de potasio).

Los insecticidas adyuvantes, incluido Confirm® 2F, N.º de registro de EPA 8033-111 (tebufenozida) y los productos fungicidas especificados para usos en la sección "Pastizales, praderas y gramíneas/heno para forraje y Programas de reserva de conservación (CRP)" pueden utilizarse con este producto.

Intervalos de días indicados después de una aplicación de **Promote**.

Cultivo	Animales lactantes y no lactantes		
	Intervalo de prepastoreo (PGI)	Intervalo de pre cosecha (PHI)	Intervalo de premananza (PSI)
Pastizales, praderas y gramíneas/heno para forraje y Programas de reserva de conservación (CRP)	0	37	0

Cultivo	Concentración (oz/acre)	Intervalo de precosecha (PHI)	RESTRICCIONES
ARROZ	$\frac{2}{3}$ - 1 $\frac{1}{3}$	48*	No realice más de 3 aplicaciones (incluyendo tratamientos de presembrado y al momento de la siembra) por año. No aplique más de 1 $\frac{1}{3}$ oz de este producto (0.062 lb de ingrediente activo) por acre por año de uso. Después de la aplicación al follaje, deje pasar 30 días antes de pastorear ganado doméstico, cosechar forraje o cosechar ensilaje. *No lo aplique durante los 69 días previos a la cosecha en California. Para aplicaciones secas directas por aire: No lo aplique en campos de arroz secos. Realice aplicaciones aéreas a un máximo no superior a $\frac{1}{2}$ de la envergadura del ala. No use un ancho de pasada superior a 120 pies (36 m). No mezcle este producto con ningún otro aditivo excepto según lo indicado por esta etiqueta. No lo aplique dentro de 360 pies (110 m) de cultivos sensibles. No lo aplique cuando la velocidad del viento sea menor a 3 mph (5 km/h) o mayor a 15 mph (24 km/h).

Tabla de actividad según altura de la maleza en arroz

Actividad de maleza	Control		Supresión	
	$\frac{2}{3}$ oz	1 - 1 $\frac{1}{3}$ oz	$\frac{2}{3}$ oz	1 - 1 $\frac{1}{3}$ oz
Concentración de producto	$\frac{2}{3}$ oz	1 - 1 $\frac{1}{3}$ oz	$\frac{2}{3}$ oz	1 - 1 $\frac{1}{3}$ oz
Altura de maleza	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas
Pepino espinoso o pepinillo cornichón			1 - 3	4 - 12
Sagitaria de California		Sí		
Bardana común	1 - 9	9 - 14		
Flor de Santa Lucía	1 - 2	3 - 4		
Botoncillo	1 - 4	4 - 8		
Juncia de arrozal	1 - 9	9 - 12		
Margarita Philadelphia	1 - 3			
Dormidera	1 - 2	3 - 4		
Coquia ¹	1 - 3			3 - 6
Quinoa			1 - 2	
Aurora	1 - 3	4 - 12		
Algodoncillo común			3 - 5	6 - 12
Vid azul		1 - 6	1 - 3	
Campanilla				1 - 3
Mostaza de campo		4 - 6		
Juncia: avellanada ²	1 - 6	6 - 12		
real	1 - 6	6 - 12		
Pasionaria, pasiflora	1 - 3			
Quelite, bledo rojo	1 - 3	4 - 6		
Hierba carmín	1 - 6			
Rabanillo silvestre		4 - 6		
Ambrosia: común	1 - 9	9 - 12		
Gigante	1 - 3	4 - 6		
Aguja de pastor (tallo rojizo)	1 - 3	Sí		
Junco de los arrozales		Sí		
Sesbania	1 - 3	3 - 6		
Escoba dura	1 - 2	3 - 4		
Paragüita de flor pequeña		Sí		
Poligonato de Pensilvania	1 - 2			
Girasol común	1 - 12	12 - 15		
Yute chino (hoja terciopelo) ³	1 - 9	9 - 12		

¹ Consulte las tablas de actividad de malezas posemergentes.

² Las infestaciones intensas de juncia requieren aplicaciones secuenciales. Para prevenir que la juncia compita con el cultivo se requiere una aplicación más temprana.

³ Para el control de yute chino (hoja terciopelo) y amaranto (acederón/bledo) grandes, aplique con fertilizante de nitrógeno líquido (2 - 4 qt/acre).

(continúa)

Aplicaciones de presiembra, al momento de la siembra, posemergentes y antes de que emerja el arroz hasta la inundación permanente:

Use $\frac{2}{3}$ a 1 $\frac{1}{2}$ oz de este producto por acre por temporada de uso.

Realice aplicaciones foliares de este producto en la etapa de 3 a 5 hojas del arroz cuando las malezas tengan 2 a 4 hojas. Para aplicaciones foliares, use surfactante no iónico a razón de 0.25 a 0.5% en la mezcla de aplicación.

Para las aplicaciones foliares aéreas, use un mínimo de 3 a 15 galones (11 a 57 L) de agua por acre. Para aplicaciones foliares terrestres, use un mínimo de 10 galones (38 L) de agua por acre.

Después de mezclar, aplique las suspensiones de rociado el mismo día para mejores resultados.

Precauciones:

El mejor control de malezas emergidas con aplicaciones foliares ocurre cuando el 70% a 80% del follaje de la maleza está expuesto. Para el mejor control de malezas sumergidas, aplique cuando las malezas tengan 2 hojas o menos.

Consulte la sección "Manejo de la deriva del rociado" de esta etiqueta.

Después de las aplicaciones foliares de este producto, no reintroduzca agua en los campos de arroz o cuadros (tablares) por al menos 24 horas. Para mejorar el espectro de control de malezas, mezcle este producto en tanque con Shark®.

Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos en la lista de mezclas estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque.

Aplicaciones secuenciales:

Para mejorar el espectro de control de malezas, aplique este producto secuencialmente con Bolero®, Clincher®, Regiment® o Shark®.

Aplicación seca directa:

Aplique este producto posinundación como una aplicación seca al voleo a razón de 1 a 1 $\frac{1}{2}$ oz por acre por temporada de uso. Cuando las malezas tengan 2 hojas o menos, aplique el tratamiento seco al voleo de este producto en la etapa de 1 a 2 hojas del arroz.

Los niveles de agua en campos de arroz y cuadros (tablares) deben permanecer estáticos (3 a 6 pulgadas [8 a 15 cm] de profundidad) después de aplicaciones secas al voleo de este producto. No reintroduzca agua en los campos de arroz o cuadros por al menos 5 días después de tratamientos secos al voleo.

Los campos de arroz y cuadros pueden ser regados para mantener el nivel de agua, pero esto puede reducir el control de malezas. Se permite la coaplicación con Shark.

Adyuvantes de mezcla en tanque

Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos en la lista de mezclas estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque.

Glifosato (diversas formulaciones)	Use Promote a razón de $\frac{2}{3}$ oz. Consulte la etiqueta de Glifosato para ver sus concentraciones. Surfactante no iónico (NIS). Rociado al voleo. Para la quema (eliminación) de presiembra o al momento de la siembra de hierbas anuales emergidas, malezas de hoja ancha y juncia. Si se aplica como tratamiento de quema (eliminación) de presiembra; consulte las "Pautas de rotación de cultivos" de este producto y la etiqueta de Glifosato.
Stam® M4 y Propanil 4E (propanil)	Use Promote a razón de $\frac{2}{3}$ – 1 $\frac{1}{2}$ oz. Consulte las etiquetas de propanil para ver sus concentraciones. Control de malezas de espectro más amplio. Si se aplica como tratamiento de quema (eliminación) de presiembra, consulte las "Pautas de rotación de cultivos".

Cultivo	Concentración (oz/acre)	Intervalo de precosecha (PHI)	RESTRICCIONES
SOYA, Semilla de soya (excepto CA)	$\frac{2}{3}$ – 1 $\frac{1}{2}$	88	No haga más de 1 aplicación por año. No aplique más de 1 $\frac{1}{2}$ oz de este producto (0.062 lb de ingrediente activo) por acre por año. NO lo aplique en suelo congelado. Después de la aplicación al follaje, deje pasar 30 días antes de pastorear ganado doméstico o cosechar forraje, ensilaje y heno. No aplique este producto si los planes incluyen sembrar frijoles Adzuki, ya que puede ocurrir daño inaceptable al cultivo. No use aplicaciones posemergentes de este producto en variedades de soya Roundup Ready puras o convencionales, ya que ocurrirá daño severo al cultivo. No use más de $\frac{2}{3}$ oz de este producto en aplicaciones posemergentes en soya tolerante a sulfonilurea.

Quema (eliminación) de presiembra – Aplicación de otoño:

Concentración de uso: $\frac{2}{3}$ – 1 $\frac{1}{2}$ oz.

Para el control o supresión de malezas anuales de invierno de hoja ancha que figuran en la lista antes de plantar soya en la siguiente primavera, aplique este producto como un herbicida de quema (eliminación) de otoño y/o aplicación preventiva.

Si las malezas de hoja ancha que figuran en la lista son visibles, use concentrados de aceite de cultivo de alta calidad (1 a 2% vol/vol) y AMS granular (2 a 4 lb/acre) o UAN (1 a 2% vol/vol) en la suspensión de rociado para mejorar el rendimiento.

Aplique este producto en cualquier momento desde después de la cosecha hasta que el suelo se congele. Aplique este producto por vía terrestre o aérea.

En ensayos de investigación, no han ocurrido instancias de daños al cultivo por aplicaciones de otoño, pero no todas las variedades de soya han sido probadas en cuanto a su tolerancia a halosulfuron-metil.

Para obtener la información más reciente sobre tolerancia a halosulfuron-metil, consulte a los agrónomos de semillas locales y al proveedor de semillas.

Para actividad de malezas anuales de invierno de hoja ancha, este producto debe entrar en contacto con las malezas emergidas y llegar a la superficie del suelo.

En sistemas de labranza reducida, con el fin de mantener el ingrediente activo en la capa superior del suelo donde germinan las semillas de las malezas, aplique este producto después de efectuar las labores otoñales con arado cincel, rastra de discos, etc.

Adyuvantes de mezcla en tanque

Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos en la lista de mezclas estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque.

2,4-D amina o LV éster (diversas formulaciones)	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Para un control de espectro más amplio en la quema (eliminación) de presiembr de malezas de hoja ancha anuales emergidas o bajo una fuerte infestación de malezas.
Glifosato (diversas formulaciones)	Consulte las concentraciones del producto en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Para un control de quema de presiembr de malezas gramíneas emergentes.

Aplicación preemergente o de presiembr en primavera a variedades de soya tolerantes a herbicidas de sulfonilurea (STS) solamente:

Concentración de uso: $\frac{2}{3}$ oz

Para un control o supresión por contacto y residual de malezas anuales de hoja ancha de invierno y de germinación temprana en verano que figuran en la lista, aplique este producto desde 21 días antes de la siembra hasta antes de que emerjan (p. ej., agrietamiento).

Para un mejor rendimiento, aplique este producto a malezas en crecimiento activo libres de estrés ambiental.

Si las malezas de hoja ancha que figuran en la lista son visibles, use concentrados de aceite de cultivo de alta calidad (1% vol/vol) y AMS granular (2 a 4 lb/acre) o UAN (1 a 2% vol/vol) a la suspensión de rociado para mejorar el rendimiento.

Para uso en cualquier variedad de soya tolerante a herbicidas de sulfonilurea (STS), a menos que el proveedor de la semilla lo prohíba.

En ensayos de investigación, no han ocurrido instancias de daño al cultivo por aplicaciones preemergentes y de presiembr en primavera, pero no todas las variedades de soya tolerantes a sulfonilurea (STS) han sido probadas en cuanto a su tolerancia al halosulfuron-metil. Para obtener la información más reciente sobre tolerancia a halosulfuron-metil, consulte a los agrónomos de semillas locales y al proveedor de semillas.

En sistemas de labranza reducida, con el fin de mantener el ingrediente activo en la capa superior del suelo donde germinan las semillas de malezas, aplique este producto después de todas las labores de labranza.

Adyuvantes de mezcla en tanque

Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos en la lista de mezclas estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque.

2,4-D LV éster (diversas formulaciones)	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Para el control de malezas de verano de germinación temprana.
Glifosato (diversas formulaciones)	Consulte las concentraciones del producto en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Para un control de espectro más amplio en la quema (eliminación) de presiembr de hierbas o malezas de hoja ancha anuales emergidas.

Aplicación posemergente a variedades de soya tolerantes a herbicidas de sulfonilurea (STS) solamente:

Concentración de uso: $\frac{2}{3}$ oz

Para un control por contacto y residual de malezas de hoja ancha y juncia que figuran en la lista, aplique este producto posemergente desde las etapas V1 hasta R2 de variedades de soya tolerantes a sulfonilurea (STS) solamente.

Si la variedad de soya tolerante también se combina con el rasgo de tolerancia al glifosato o al glufosinato, entonces se puede utilizar glifosato o glufosinato, respectivamente, como adyuvante de mezcla en tanque.

Para un mejor rendimiento, aplique este producto a malezas en crecimiento activo libres de estrés ambiental.

Para uso en cualquier variedad de soya tolerante a herbicidas de sulfonilurea (STS), a menos que el proveedor de la semilla lo prohíba.

Siempre agregue un surfactante no iónico (NIS) (1 a 2 qt/100 galones de rociado) o concentrados de aceite de cultivo de alta calidad (1% vol/vol) y sulfato amónico granular (2 a 4 lb/acre) o nitrato de amonio úrico (1 a 2% vol/vol) a la suspensión de rociado para mejorar el rendimiento.

Las aplicaciones posemergentes pueden producir cierta fitotoxicidad en variedades de soya tolerantes a sulfonilurea (STS) susceptibles. Estos síntomas pueden incluir retardo del crecimiento (visto como una reducción en el tamaño de la hoja o longitud internodal), amarillamiento de las hojas y/o venas rojas y necrosis de las hojas y peciolo. Las variedades de soya tolerantes a sulfonilurea (STS) que han presentado estos síntomas tienden a recuperarse después de que el producto es metabolizado por la planta. El daño a la soya es más evidente cuando las plantas están sometidas a condiciones de estrés ambiental tales como condiciones cálidas y húmedas, o amplias fluctuaciones en condiciones climáticas, sequía, etc.

Para obtener la información más reciente sobre tolerancia a halosulfuron-metil, consulte a los agrónomos de semillas locales y al proveedor de semillas.

Adyuvantes de mezcla en tanque

Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos en la lista de mezclas estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque.

Glifosato (diversas formulaciones)	Consulte las concentraciones del producto en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Para un control de espectro más amplio de malezas de hoja ancha anuales y malezas gramíneas emergidas o si hay una fuerte infestación de malezas.
---------------------------------------	--

Cultivo	Concentración (oz/acre)	Intervalo de precosecha (PHI)	RESTRICCIONES
CAÑA DE AZÚCAR	$\frac{2}{3}$ - 1 $\frac{1}{3}$	30	No haga más de 3 aplicaciones (incluidas aplicaciones de presembrado) por año. No aplique más de 2 $\frac{2}{3}$ oz de este producto (0.125 lb de ingrediente activo) por acre por año. Después de la aplicación al follaje, deje pasar 30 días antes de pastorear ganado doméstico, cosechar forraje o cosechar ensilaje. No aplique este producto con aplicador de mecha ni con enjugadores.

Si se usa solo, aplique este producto antes de sembrar, antes de que emerja o después de que emerja la caña de azúcar y hasta el cierre de surco. Use cultivo mecánico para controlar especies de malezas que no figuren en esta etiqueta. Si se usa cultivo mecánico, aplique un tratamiento secuencial para controlar las malezas en zonas de suelos alterados (removidos).

Tabla de actividad según altura de la maleza en caña de azúcar

Actividad de maleza	Control		Supresión	
	Concentración de producto			
	$\frac{2}{3}$ oz	1 - 1 $\frac{1}{3}$ oz	$\frac{2}{3}$ oz	1 - 1 $\frac{1}{3}$ oz
	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas
Pepino espinoso o pepinillo cornichón			1 - 3	4 - 12
Bardana común	1 - 9	9 - 14		
Margarita Philadelphia	1 - 3			
Coquía ¹	1 - 3			3 - 6
Quínoa			1 - 2	
Aurora	1 - 3	4 - 12		
Algodoncillo común			3 - 5	6 - 12
Vid azul		1 - 6	1 - 3	
Campanilla				1 - 3
Mostaza de campo		4 - 6		
Juncia: avellanada ² real	3 - 6 3 - 6	3 - 12 3 - 12		
Pasionaria, pasiflora	1 - 3			
Quelite, bledo rojo ³	1 - 3	4 - 6		
Hierba carmín	1 - 6			
Rabanillo silvestre		4 - 6		
Ambrosía: común Gigante	1 - 9 1 - 3	9 - 12 4 - 6		
Poligonato de Pensilvania	1 - 2			
Girasol común	1 - 12	12 - 15		
Yute chino (hoja terciopelo) ³	1 - 9	9 - 12		

¹ Consulte las tablas de actividad de malezas preemergentes y poseemergentes.

² Las infestaciones intensas de juncia requieren aplicaciones secuenciales. Para prevenir que la juncia compita con el cultivo se requiere una aplicación más temprana.

³ Para el control de yute chino (hoja terciopelo) y amaranto (acederón/bledo) grandes, aplique con fertilizante de nitrógeno líquido (2 a 4 qt/ acre) más surfactante no iónico (NIS) o concentrado de aceite de cultivo (COC).

Adyuvantes de mezcla en tanque Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos en la lista de mezclas estén registrados para el uso previsto. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y declaraciones de precaución más estrictas de cada producto en la mezcla en tanque.	
2,4-D amina	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS). Aplique a la caña de azúcar antes o después de que emerja el cultivo hasta 6 semanas antes de la cosecha. Malezas de hoja ancha. No haga más de 3 aplicaciones por año.
Herbicida Asulam	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS) o concentrado de aceite de cultivo (COC). Aplique a la caña de azúcar antes o después de que emerja el cultivo hasta 90 días antes de la cosecha. Espectro más amplio. No haga más de dos aplicaciones por año.
Herbicida Atrazine 4L	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS) o concentrado de aceite de cultivo (COC). Aplique rociado al voleo en caña de azúcar. Aplique cuando las malezas de hoja ancha sean pequeñas (1.5 pulgadas [4 cm] o menos). Control posemergente de malezas de hoja ancha incluidas en la etiqueta. Ayuda a quemar (eliminar) y controlar muchas malezas gramíneas que han escapado a tratamientos herbicidas preemergentes. Las mezclas de Atrazine pueden reducir el control (antagonismo) de malezas de hoja ancha más grandes. Las malezas más pequeñas son más fáciles de controlar.
Herbicida Ametryn	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS). Aplique rociado al voleo en la caña de azúcar antes o después de que emerja el cultivo hasta el cierre de surco. Malezas de hoja ancha y hierbas. Se reduce la eficacia si las temperaturas exceden 85 °F (29 °C) durante la aplicación.
Glifosato (diversas formulaciones)	Consulte las concentraciones en la etiqueta del adyuvante de mezcla en tanque. Surfactante no iónico (NIS). Aplicarlo como rociado al voleo. Para la quema (eliminación) antes de la siembra de pastos anuales emergidos, malezas de hoja ancha y juncia.

Cultivo	Concentración (oz/acre)	Intervalo de precosecha (PHI)	RESTRICCIONES
Maíz dulce y maíz palomero	$\frac{2}{3}$	30	La concentración máxima de aplicación es de $\frac{2}{3}$ oz de este producto. Se permiten dos aplicaciones de este producto por año. No exceda una aplicación total de $1\frac{1}{3}$ oz del producto (0.062 lb de ingrediente activo) por acre por temporada de uso. Después de la aplicación al follaje, deje pasar 30 días antes de pastorear ganado doméstico, cosechar forraje o cosechar ensilaje. No lo utilice en maíz dulce "Jubilee". No aplique este producto en maíz dulce o maíz palomero previamente tratado con insecticidas organofosforados aplicados al suelo. No aplique un insecticida organofosforado dentro de 7 días antes o 3 días después de cualquier aplicación de este producto. No aplique este producto al maíz dulce ni al maíz palomero, a menos que la empresa productora de semillas, el procesador o el servicio de extensión agrícola estatal hayan probado este producto en el híbrido o la variedad en cuestión y aprueben y respalden específicamente su uso. No aplique este producto si el maíz dulce o maíz palomero están sometidos a estrés debido a sequía, suelos saturados con agua, baja fertilidad (especialmente niveles bajos de nitrógeno) u otras condiciones desfavorables para el crecimiento.

Aplicaciones por rociado

Si se usa solo, aplique un rociado al voleo por encima o con boquillas de goteo desde la etapa de espiga hasta la etapa de la última labor de cultivo ("layby") del maíz. Use cultivo mecánico para controlar especies de malezas que no figuren en esta etiqueta.

Aplique un tratamiento secuencial, si es necesario, sólo con boquillas de goteo semidirigidas o dirigidas para evitar la aplicación dentro del verticilo de la planta de maíz.

Precauciones:

No todos los híbridos o variedades de maíz dulce o maíz palomero han sido evaluados para determinar su sensibilidad a este producto. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el usuario asume toda responsabilidad por dicho uso.

Después de la aplicación, evite el cultivo por al menos 7 días.

(continúa)

Tabla de actividad por altura del maíz dulce y maíz palomero

Actividad de maleza	Control	Supresión
Concentración de producto	2/3 oz	2/3 oz
Altura de maleza	Pulgadas	Pulgadas
Pepino espinoso o pepinillo cornichón		1 - 3
Bardana común	1 - 9	
Margarita Philadelphia	1 - 3	
Coquia ¹	1 - 3	
Quinoa		1 - 2
Aurora	1 - 3	
Algodoncillo común		3 - 5
Vid azul		1 - 3
Juncia: avellanada ² real	3 - 6 3 - 6	
Pasionaria, pasiflora	1 - 3	
Quelite, bledo rojo	1 - 3	
Hierba carmín	1 - 6	
Ambrosía: común Gigante	1 - 9 1 - 3	
Poligonato de Pensilvania	1 - 2	
Girasol común	1 - 12	
Yute chino (hoja terciopelo)	1 - 9	

¹ Consulte las tablas de actividad de malezas preemergentes y poseemergentes.

² Las infestaciones intensas de juncia requieren aplicaciones secuenciales. Para prevenir que la juncia compita con el cultivo se requiere una aplicación más temprana.

PAUTAS DE ROTACIÓN DE CULTIVOS

Después de las aplicaciones de este producto, los intervalos de rotación de cultivos que se indican a continuación proporcionan seguridad adecuada a los cultivos recién sembrados. Si el cultivo se siembra en un intervalo más corto, podrían producirse daños en los cultivos. Si la degradación de halosulfuron-metil se ralentiza por condiciones tales como sequía, condiciones frescas o riego por goteo en Arizona y California, los plazos deben extenderse. Dado que no se han probado todos los posibles escenarios ambientales y de aplicación, Atticus, LLC sugiere que el usuario final pruebe este producto para determinar su idoneidad para el uso previsto. En las zonas en las que la experiencia local haya demostrado la seguridad de los cultivos, utilice los intervalos más cortos. En caso de pérdida de la cosecha, los cultivos especificados pueden volver a sembrarse en la zona tratada bajo la responsabilidad del usuario, debido a posible fitotoxicidad para la cosecha posterior.

INTERVALO (MESES) ANTES DE SEMBRAR DESPUÉS USAR PROMOTE

CULTIVO	MESES	EXCEPCIONES
CULTIVO NO INCLUIDO ESPECÍFICAMENTE EN LA LISTA	36	
Alfalfa	9	
Manzana*	9	
Cebada (invierno)	2	
Frijoles secos	9	En el noreste, sureste, Texas y Colorado: 2 meses.
Ejote, frijol verde	9	En el noreste y sureste: 2 meses; en Texas: 3 meses.
Brócoli	18	En zonas de Florida con suelos que contienen turba: 3 meses.
Arándano azul*	9	
Repollo	15	En zonas de Florida con suelos que contienen turba: 3 meses.
Zarzas*	9	
Canola (colza)	15	
Zanahoria	15	
Coliflor	18	En zonas de Florida con suelos que contienen turba: 3 meses.
Cultivos de cereales, primavera	2	
Tréboles	9	
Berza	18	
Maíz de campo IR/IMR	0	
Maíz de campo IT	1	
Maíz de campo normal	1	
Maíz semillero	2	
Maíz dulce y maíz palomero	3	Para el maíz dulce y maíz palomero, las concentraciones de aplicación de este producto son específicas para esos cultivos. Para volver a sembrar cultivos de maíz dulce y palomero en las áreas tratadas que se hayan perdido, destruido o cosechado, se debe respetar el intervalo de rotación de cultivos.
Algodón	4	
Pepinos	9	En el noreste y sureste: 2 meses; en Texas: 3 meses.
Berenjena	12	Para trasplantes en Florida: 4 meses.
Hierbas forrajeras	2	
Uvas*	9	
Cultivos de lechuga	18	En zonas de Florida con suelos que contienen turba: 3 meses.
Melones	9	En el sureste y Texas: 2 meses.
Menta	15	
Avena	2	
Cebollas y puerros	18	
Cacahuates	6	

(continúa)

CULTIVO	MESES	EXCEPCIONES
Perales*	9	
Guisantes	9	
Guisantes de campo	9	
Pimientos	10	Para trasplantes en Florida: 4 meses y para trasplantes en Texas: 3 meses.
Papas	9	
Calabazas	9	En el sureste: 2 meses.
Mijo proso	2	
Rábano	12	En zonas de Florida con suelos que contienen turba: 3 meses.
Remolacha roja	24	Si se requiere riego o la lluvia es escasa, el intervalo de tiempo es de 36 meses.
Arroz	2	
Centeno (invierno)	2	
Sorgos	2	
Frijoles de soya	9	
Espinaca	24	En zonas de Florida con suelos que contienen turba: 3 meses.
Calabacín	9	En el sureste: 2 meses.
Fresas	36	Para trasplantes anuales en Florida: 6 meses.
Remolacha de azúcar	24	Si se requiere riego o la lluvia es escasa, el intervalo de tiempo es de 36 meses; en Michigan: 21 meses; En Minnesota, Dakota del Norte, Valle del Río Rojo: 36 meses.
Caña de azúcar	0	
Girasoles	18	
Tomate (trasplantado)	8	En el noreste y sureste: 2 meses; en Texas: 3 meses.
Frutos secos*	9	
Trigo (invierno)	2	

*Después de la aplicación de este producto, el suelo debe ser arado y rastreado en cruz antes de la rotación de cultivo.

Cuando se use con adyuvantes de mezcla en tanque, consulte las etiquetas de los productos adyuvantes para determinar las restricciones de rotación de cultivos. Siga la etiqueta más restrictiva al planificar y aplicar las combinaciones de mezcla en tanque.

Sureste: Alabama, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Carolina del Norte, Puerto Rico, Carolina del Sur, Tennessee.

Noreste: Connecticut, Delaware, Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Misuri, Dakota del Norte, Nebraska, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Dakota del Sur, Virginia, Vermont, Wisconsin, Virginia Occidental.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

No contamine agua, comida ni forrajes mediante el almacenamiento o desecho.

ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: Almacénelo en un lugar seco y seguro.

DESECHO DE PESTICIDAS: Los residuos de pesticidas son muy peligrosos. La eliminación inadecuada de pesticida sobrante, mezclas de aplicación o aguas de enjuague o lavado de envases constituye una violación de la Ley Federal (EE. UU.). Si estos residuos no pueden ser eliminados de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, contacte a la agencia para el manejo de pesticidas o control ambiental de su estado, o al representante para el Manejo de Residuos Peligrosos de la Oficina Regional de la EPA más cercana para obtener indicaciones del proceso a seguir para su eliminación.

BOTELLAS DE PLÁSTICO

MANIPULACIÓN DE RECIPIENTES: Recipiente no rellenable. No reutilice ni rellene este recipiente. Enjuague tres veces o enjuague a presión el recipiente (o equivalente) inmediatamente después de vaciarlo. **Enjuague tres veces siguiendo estas indicaciones:** Vacíe los contenidos restantes en el equipo de aplicación o un tanque de mezclar. Llene el recipiente $\frac{1}{4}$ con agua y tape de nuevo. Agite por 10 segundos. Vierta el enjuague en el equipo de aplicación o tanque de mezclar. Drene por 10 segundos después de que el flujo empiece a gotear. Repita este procedimiento dos veces más. **Enjuague a presión siguiendo estas indicaciones:** Vacíe los contenidos restantes en el equipo de aplicación o un tanque de mezclar. Mantenga el recipiente boca abajo sobre el equipo de aplicación o un tanque de mezclar, o recolecte el enjuague para su uso o eliminación posterior. Inserte la boquilla de enjuague a presión en el lado del recipiente y enjuague a aproximadamente 40 PSI por al menos 30 segundos. Drene por 10 segundos después de que el flujo empiece a gotear.

Después del triple enjuague, reciclelo si es factible. Algunos envases de pesticidas agrícolas pueden llevarse a un sitio de recolección de recipientes u ofrecerlos para su reciclaje. Para encontrar el sitio más cercano, comuníquese con su fabricante o distribuidor de productos químicos. Si el reciclaje no está disponible, deseche el envase en un área adecuada para desechos sanitarios o por incineración si lo permiten los reglamentos estatales y locales.

Condiciones de venta y limitación de garantía y responsabilidad

Se deben seguir atentamente las instrucciones de uso de este producto. Es imposible eliminar todos los riesgos asociados intrínsecamente con el uso de este producto. Podrían ocurrir daños, ineficacia u otras consecuencias inesperadas para los cultivos debido a factores como las condiciones climáticas, la presencia de otros materiales, cepas resistentes u otros factores que influyen en el uso de este producto y están fuera del control de Atticus, LLC o del vendedor. El comprador y el usuario asumen todos esos riesgos y, además, se comprometen a eximir a Atticus, LLC y al vendedor de toda reclamación relacionada con esos factores.

En la medida que lo permitan las leyes pertinentes, Atticus, LLC garantiza que este producto cumple con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente apto para los propósitos mencionados en la sección titulada "Instrucciones de uso", sujeto a los riesgos intrínsecos antes mencionados, cuando se utiliza de acuerdo con las indicaciones bajo condiciones normales de uso. Esta garantía no se amplía al uso de este producto de manera contraria a las instrucciones de la etiqueta ni bajo condiciones anormales o no previsibles para el vendedor o Atticus, LLC, y el comprador y el usuario asumen el riesgo de todo uso de ese tipo. EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE, ATTICUS, LLC NO OFRECE GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN NI DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, NI OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SALVO LAS INDICADAS ANTES.

En la medida permitida por las leyes pertinentes, ni Atticus, LLC ni el Vendedor serán responsables de daños incidentales, resultantes o especiales derivados del uso o el manejo de este producto. EN LA MEDIDA QUE LO PERMITAN LAS LEYES PERTINENTES, EL RECURSO EXCLUSIVO DEL USUARIO O EL COMPRADOR, Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE ATTICUS, LLC Y EL VENDEDOR POR TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES, PÉRDIDAS, LESIONES O DAÑOS (INCLUIDAS LAS RECLAMACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O DE OTRO TIPO) QUE RESULTEN DEL USO O EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO, SERÁ EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O, A ELECCIÓN DE ATTICUS, LLC O EL VENDEDOR, LA SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO.

Atticus, LLC y el vendedor ofrecen este producto, y el comprador y usuario lo aceptan, sujeto a las condiciones de venta y limitaciones de garantía y responsabilidad antes indicadas, las cuales pueden modificarse solamente mediante un acuerdo por escrito firmado por un representante debidamente autorizado de Atticus, LLC.

Promote™ es una marca comercial de Atticus, LLC.

Permit® es una marca registrada de Gowan Company, LLC.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

20240516ap1