

GROUP	3	FUNGICIDE
GROUPE	3	FONGICIDE



Phobos™ FC³⁶⁰

Suspension

For Control or Suppression of Listed Diseases in Barley, Borage, *Brassica carinata*, Bushberries, Canola, Chickpeas, Crambe, Low Growing Berries - except strawberries, Corn, Cucurbits, Flax (Linseed), Lentils, Oats, Oriental Mustard, Peanut, Rapeseed, Safflower, Soybean, Sugar Beet, Sunflower, Wheat and Certain Other Small Grains.

COMMERCIAL - AGRICULTURAL

REGISTRATION NUMBER: 35881 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

ACTIVE INGREDIENT: PROTHIOCONAZOLE 360 g/L

Contains 1,2-benzisothiazolin-3-one at 0.04053% as a preservative.
Warning, contains the allergen soy.

READ THE LABEL AND ATTACHED BOOKLET BEFORE USING KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

For medical or treatment information from exposure to this product, call 1-800-255-3924 (7 days/week, 24-hr).

For 24-hour chemical spill, leak, fire, exposure, or accident response information, call CHEMTEL INC. toll free at 1-800-255-3924.

NET CONTENTS: 9.46 LITRES



Vive Crop Protection Inc.
6275 Northam Dr., Suite 1
Mississauga, Ontario
1-888-760-0187

Suspension

Pour la suppression ou la répression des maladies indiquées dans l'orge, la bourrache officinale, *Brassica carinata*, les petits fruits, le canola, les pois chiches, le crambe, les petits fruits de plantes naines, sauf les fraises, le maïs, les cucurbitacées, le lin, les lentilles, l'avoine, la moutarde orientale, les arachides, le colza, le carthame, le soja, la betterave à sucre, le tournesol, le blé et certaines autres petites céréales.

COMMERCIAL - AGRICOLE

Nº D'HOMOLOGATION : 35881 LOI SUR LES PRODUITS
ANTIPARASITAIRES

PRINCIPE ACTIF : PROTHIOCONAZOLE 360 g/L

Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,04053 % à titre d'agent de conservation.

Avertissement, contient l'allergène soja.

**LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE CI-JOINTE AVANT
L'EMPLOI**

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Pour des informations médicales ou de traitement suite à une exposition à ce produit, appelez le 1-800-255-3924 (7 jours/semaine, 24 heures).

Pour obtenir des informations sur les déversements chimiques, les fuites, les incendies, les expositions ou les interventions en cas d'accident 24 heures sur 24, appelez CHEMTEL INC. sans frais au 1-800-255-3924.

CONTENU NET: 9,46 LITRES

GENERAL INFORMATION

SECTION 1: THE PRODUCT

PHOBOS FC 360 is a broad-spectrum systemic fungicide for the control or suppression of listed *Ascomycetes*, *Basidiomycetes* and *Deuteromycetes* diseases on barley, bushberries, *Brassica carinata*, borage, canola, chickpeas, crambe, low growing berries - except strawberries, corn, cucurbits, flax (linseed), lentils, oats, Oriental mustard, peanut, rapeseed, safflower, soybean, sugar beet, sunflower, wheat and certain other small grains.

SECTION 2: SAFETY AND HANDLING - PRECAUTIONS, PROTECTIVE CLOTHING & EQUIPMENT, AND RESTRICTED-ENTRY INTERVALS.

PRECAUTIONS:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Avoid contact with skin, eyes, and clothing. Avoid breathing vapor or spray mist.

DO NOT eat, drink or smoke/vape while using this product. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum/tobacco, smoking/vaping, or using the toilet. Aircraft cockpit and vehicle cabs must be decontaminated regularly.

Apply only when the potential for drift beyond the area to be treated is minimal. Take into consideration wind speed, wind direction, temperature inversions, application equipment, and sprayer settings.

DO NOT enter or allow worker entry into treated areas during the intervals specified in the following table:

Crop	Post application Activity	REI and/or PHI
Low-growing berries (except strawberries), safflowers, sunflowers	Harvesting	45 days
	All other activities	24 hours
Canola, rapeseed, oriental mustard, <i>Brassica carinata</i> , flax (linseed), crambe, borage	Harvesting	36 days
	All other activities	24 hours
Wheat (spring, durum and winter), barley, oats, pearl millet, proso millet, rye, triticale, teosinte, buckwheat	Harvesting	30 days
	All other activities	24 hours
Sweet corn	Hand harvesting	20 days
	Mechanical harvesting	14 days
	All other activities	24 hours
Seed corn	Hand detasseling	20 days
	Harvesting	14 days
	All other activities	24 hours

Crop	Post application Activity	REI and/or PHI
Field corn, peanuts	Harvesting	14 days
	All other activities	24 hours
Soybeans	Harvesting	20 days
	All other activities	24 hours
Chickpeas, lentils, sugar beets	Harvesting	7 days
	All other activities	24 hours
Bushberries, cucurbits	Harvesting	7 days
	Hand-line irrigation	3 days
	All other activities	24 hours

PROTECTIVE CLOTHING AND EQUIPMENT:

Wear a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and shoes during mixing, loading, application, clean-up and repair. In addition, workers must wear protective eyewear (goggles or a face shield) during mixing, loading, clean-up and repair. Gloves are not required within a closed cab and/or cockpit.

If the product comes in contact with clothing/PPE, remove all contaminated clothing/PPE, wash with soap and water and dress in clean clothing. Wash the outside of gloves with soap and water before removing. Launder contaminated clothing/PPE regularly and separately from other laundry.

SECTION 3: FIRST AID AND TOXICOLOGICAL INFORMATION

FIRST AID:

IF SWALLOWED: Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.

Take container, label, or product name and Pest Control Product Registration number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION:

Treat symptomatically.

SECTION 4: ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS

Toxic to aquatic organisms and non-target terrestrial plants. Observe spray buffer zones specified under DIRECTIONS FOR USE.

To reduce runoff from treated areas into aquatic habitats, avoid application to areas with a moderate to steep slope, compacted soil, or clay. Avoid application when heavy rain is forecast.

Contamination of aquatic areas as a result of runoff may be reduced by including a vegetative filter strip between the treated area and the edge of the water body. Additional guidance can be found on the Runoff Mitigation portion of the Canada.ca website.

SECTION 5: STORAGE

- Store this product away from food and feed.
- Keep away from fire or open flame or other sources of heat.
- Do not store at temperatures below freezing.
- If stored for 1 year or longer, shake well before using.
- Store the tightly closed container away from feeds, seeds, fertilizer, plants and foodstuffs.
- Do not use or store in or around the home.
- Keep in original container during storage.

SECTION 6: DISPOSAL

Recyclable Containers:

DO NOT reuse this container for any purpose. This is a recyclable container, and is to be disposed of at a container collection site. Contact your local distributor/dealer or municipality for the location of the nearest collection site. Before taking the container to the collection site:

1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the spray mixture in the tank.
2. Make the empty, rinsed container unsuitable for further use.

If there is no container collection site in your area, dispose of the container in accordance with provincial or territorial requirements.

Returnable Containers:

DO NOT reuse this container for any purpose. For disposal, this empty container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer).

Disposal of Unused, Unwanted Product:

For information on disposal of unused, unwanted product, contact the registrant or the provincial or territorial regulatory agency. Contact the registrant and the provincial or territorial regulatory agency in case of a spill, and for cleanup of spills.

Disposal of Unused Spray Solution:

If any spray solution remains in the tank after spraying is finished, it should be sprayed on the perimeter of the area just sprayed, NOT ON THE CROP, away from water supplies, ditches, and irrigation canals. Spray buffer zones indicated in the DIRECTIONS FOR USE must also be respected.

DIRECTIONS FOR USE

SECTION 7: CROP, DISEASE, RATE, TIMING

CEREALS (Barley, Wheat and Oats)			
CROP	DISEASE	RATE	TIMING
Barley	For suppression of Fusarium head blight or scab (<i>Fusarium</i> spp.)	Apply PHOBOS FC 360 once, at 417 to 555 mL/ha (150-200 g a.i./ha) Adjuvant: Apply with a non-ionic surfactant, e.g., AgSurf or Agral 90 at 0.125% v/v	Fusarium head blight outbreaks in barley occur when the weather is warm and wet at ear emergence. The application of PHOBOS FC 360 for protection against fusarium head blight (scab) should be considered when these environmental conditions are forecasted for this stage of barley development. Timing of application is critical: For optimum suppression of fusarium head blight, apply PHOBOS FC 360 as a preventative spray within the time period when 70 to 100% of the barley main stem heads are fully emerged, to 3 days after full head emergence. Application of the 555 mL/ha rate is suggested in situations where disease pressure is expected to be high. Such situations may occur when prolonged periods of warm wet weather are forecast during barley ear emergence, when barley is grown in a crop rotation that has contained corn or when susceptible cultivars are grown. Use of the 555 mL/ha rate will typically provide highest levels of mycotoxin reduction. Spray Coverage is essential for optimum efficacy: Spray equipment must be set up to provide good coverage to barley heads. To achieve thorough barley head coverage using ground application equipment, it is recommended to use forward and backward mounted nozzles or nozzles that have a two-directional spray. Nozzles should be operated within the spray pressure recommendations suggested by the manufacturer.

CROP	DISEASE	RATE	TIMING
Barley	For control of: Net blotch (<i>Pyrenophora teres</i>); Scald (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Spot blotch (<i>Cochliobolus sativus</i>)	Apply PHOBOS FC 360 once, at 278 to 417 mL/ha (100-150 g a.i./ha) Adjuvant: Apply with a non-ionic surfactant, e.g., AgSurf or Agral 90 at 0.125% v/v	Apply PHOBOS FC 360 as a preventive foliar spray when the earliest disease symptoms appear on the leaves and stems. Barley fields should be observed closely for early disease symptoms, particularly when susceptible varieties are planted and/or under prolonged conditions favorable for disease development.

Note: A maximum of 2 applications (1110 mL/ha) of PHOBOS FC 360, with a minimum 7-day application interval, may be applied per barley crop, per year. Do not apply within 30 days of harvest. Applications may be made by ground or aerial spray equipment.

CROP	DISEASE	RATE	TIMING
Wheat (spring, durum and winter)	For suppression of Fusarium head blight or scab (<i>Fusarium</i> spp.) For control of Glume blotch (<i>Stagonospora nodorum</i>)	Apply PHOBOS FC 360 once, at 417 to 555 mL/ha (150-200 g a.i./ha) Adjuvant: Apply with a non-ionic surfactant, e.g., AgSurf or Agral 90 at 0.125% v/v	Fusarium head blight outbreaks in wheat occur when the weather is warm and wet at head emergence and flowering. The application of PHOBOS FC 360 for protection against fusarium head blight (scab) should be considered when these environmental conditions are forecasted for this stage of wheat development. Timing of application is critical: For optimum suppression of fusarium head blight or control of glume blotch, apply PHOBOS FC 360 within the time period from when at least 75% of the wheat heads on the main stem are fully emerged to when 50% of the heads on the main stem are in flower. Application of the 555 mL/ha rate is suggested in situations where disease pressure is expected to be high. Such situations may occur when prolonged periods of warm, wet weather are forecast during anthesis, when wheat is grown in a crop rotation that has contained corn or when more susceptible cultivars or wheat types (i.e. durum) are grown.

CROP	DISEASE	RATE	TIMING
Wheat (spring, durum and winter)	For suppression of Fusarium head blight or scab (<i>Fusarium</i> spp.) For control of Glume blotch (<i>Stagonospora nodorum</i>)	Apply PHOBOS FC 360 once, at 417 to 555 mL/ha (150-200 g a.i./ha) Adjuvant: Apply with a non-ionic surfactant, e.g., AgSurf or Agral 90 at 0.125% v/v	Use of the 555 mL/ha rate will typically provide highest levels of mycotoxin reduction. Spray Coverage is essential for optimum efficacy: Spray equipment must be set up to provide good coverage to wheat heads. To achieve thorough wheat head coverage using ground application equipment, it is recommended to use forward and backward mounted nozzles or nozzles that have a two-directional spray. Nozzles should be operated within the spray pressure recommendations suggested by the manufacturer.
	For control of : Speckled leaf blotch (<i>Septoria tritici</i>) ; Tan spot (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>) ; Leaf rust (<i>Puccinia recondita</i>)	Apply PHOBOS FC 360 at 417 mL/ha (150 g a.i./ha) Adjuvant: Apply with a non-ionic surfactant, e.g., AgSurf or Agral 90 at 0.125% v/v	Apply PHOBOS FC 360 as a preventive foliar spray when the earliest disease symptoms appear on the leaves and stems. Wheat fields should be observed closely for early disease symptoms, particularly when susceptible varieties are planted and/or under prolonged conditions favorable for disease development.
Note: A maximum of 2 applications (1110 mL/ha) of PHOBOS FC 360, with a minimum 7-day application interval, may be applied per wheat crop per year. Do not apply within 30 days of harvest. Applications may be made by ground or aerial spray equipment.			

CROP	DISEASE	RATE	TIMING
Oats	For control of Crown rust (<i>Puccinia coronata</i>)	Apply PHOBOS FC 360 at 417 mL/ha (150 g a.i./ha) Adjuvant: Apply with a non-ionic surfactant, e.g., AgSurf or Agral 90 at 0.125% v/v	Apply PHOBOS FC 360 as a preventive foliar spray when the earliest disease symptoms appear on the leaves and stems. Fields should be observed closely for early disease symptoms, particularly when susceptible varieties are planted and/or under prolonged conditions favorable for disease development.
Note: A maximum of 2 applications (834 mL/ha) of PHOBOS FC 360, with a minimum 7-day application interval, may be applied per oat crop per year. Do not apply within 30 days of harvest. Applications may be made by ground or aerial spray equipment.			

CROP	DISEASE	RATE	TIMING
Pearl millet, Proso millet, Rye, Triticale, Teosinte, Buckwheat	For suppression of: Fusarium head blight or scab (<i>Fusarium</i> spp.), except buckwheat For control of Rust (<i>Puccinia</i> spp.)	Apply PHOBOS FC 360 at 417 to 555 mL/ha (150-200 g a.i./ha) Adjuvant: Apply with a non-ionic surfactant, e.g., AgSurf or Agral 90 at 0.125% v/v	Apply PHOBOS FC 360 as a preventive foliar spray when the earliest disease symptoms appear on the leaves and stems. Fields should be observed closely for early disease symptoms, particularly when susceptible varieties are planted and/or under prolonged conditions favorable for disease development
Note: A maximum of 2 applications (1110 mL/ha) of PHOBOS FC 360, with a minimum 7-day application interval, may be applied per year. Do not apply within 30 days of harvest. Applications may be made by ground equipment only.			

OILSEED CROPS (Canola, Rapeseed, Oriental Mustard, <i>Brassica carinata</i>)			
CROP	DISEASE	RATE	TIMING
Canola, Rapeseed, Oriental mustard, <i>Brassica carinata</i>	For control of Sclerotinia stem rot (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Apply PHOBOS FC 360 at 417 to 486 mL/ha (150-175 g a.i./ha)	Apply PHOBOS FC 360 when the crop is in the 20 - 50% bloom stage. Best protection will be achieved when the fungicide is applied prior to petals beginning to fall, and will allow for the maximum number of petals to be protected. The 417 mL/ha rate is the recommended rate for most oilseed crops, however, the higher rate is recommended for fields with a history of heavy disease pressure or for dense crop stands. Good spray coverage of the plants is essential. A second application at a rate of 417 mL/ha may be applied 7-10 days later, up to full bloom, if disease persists or weather conditions are favourable for disease development. When conditions favouring disease are severe, use the shorter interval.
Note: PHOBOS FC 360 may be applied with a non-ionic surfactant, e.g., AgSurf or Agral 90, at 0.125% v/v . The application may be made by ground or aerial spray equipment. A maximum of two applications (903 mL/ha of PHOBOS FC 360) may be applied per year. Do not apply within 36 days of harvest.			

PULSE CROPS (Chickpeas, Lentils)			
CROPS	DISEASE	RATE	TIMING
Chickpeas	For control of Ascochyta blight (<i>Ascochyta rabiei</i>)	Apply PHOBOS FC 360 at 417 to 555 mL/ha (150-200 g a.i./ha)	Apply PHOBOS FC 360 at the first sign of disease. After the initial application, repeat applications may be made on 10- to 14-day intervals. Apply the higher rate when conditions favour disease development, or when growing less disease resistant varieties. A maximum of 1,665 mL/ha of PHOBOS FC 360 may be applied per crop year for chickpeas. Maximum of three applications per year.
Lentils	For control of Ascochyta blight (<i>Ascochyta</i> spp.)	Apply PHOBOS FC 360 at 417 to 555 mL/ha (150-200 g a.i./ha)	Apply PHOBOS FC 360 at the beginning of flowering or at first sign of disease. After the initial application, one additional application may be made 10-14 days afterwards if conditions remain favourable for continued or increased disease development. Apply the higher rate when conditions favour disease development, or when growing less disease resistant varieties. A maximum of 1,110 mL/ha of PHOBOS FC 360 may be applied per crop year for lentils. Maximum of two applications per year.
Note: PHOBOS FC 360 may be applied with a non-ionic surfactant, e.g., AgSurf or Agral 90, at 0.125% v/v. Applications may be made by ground or aerial spray equipment. Do not apply within 7 days of cutting or swathing of the crop.			

Soybean			
CROP	DISEASE	RATE	TIMING
Soybean	For control of: Asian soybean rust (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>) Frogeye leaf spot (<i>Cercospora sojina</i>)	Apply PHOBOS FC 360 at 278 mL/ha (100 g a.i./ha)	Apply PHOBOS FC 360 when first symptoms of disease can be found or that the risk of infection is imminent. Do not apply more than one application per year.
Note: PHOBOS FC 360 may be applied with a non-ionic surfactant, e.g., AgSurf or Agral 90, at 0.125% v/v. The application may be made by ground or aerial spray equipment. Do not apply within 20 days of harvest.			

Corn (field, sweet and popcorn)			
CROP	DISEASE	RATE	TIMING
Corn (field, sweet and popcorn, including seed production)	For the control of Rusts (<i>Puccinia sorghi</i> , <i>Puccinia polysora</i>), Eyespot (<i>Kabatiella zeae</i> or <i>Aureobasidium zeae</i>), and Northern blight (<i>Setosphaeria turcica</i>)	Apply PHOBOS FC 360 at 417 mL/ha (150 g a.i./ha)	Apply PHOBOS FC 360 as a preventive foliar spray when the earliest disease symptoms appear on the leaves and stems. Fields should be observed closely for early disease symptoms, particularly under prolonged conditions favorable for disease development. Under high disease pressure, it is recommended to use a non-ionic surfactant with PHOBOS FC 360 (do not apply a non- ionic surfactant prior to tassel emergence as crop injury may occur). Refer to the section "Note" of this table for directions.

Corn (field, sweet and popcorn)			
CROP	DISEASE	RATE	TIMING
Corn (field, sweet and popcorn, including seed production)	Provides control of all diseases listed above, plus the following: For the control of Grey leaf spot (<i>Cercospora zeae-maydis</i>) For the suppression of Fusarium and Gibberella ear rots (<i>Fusarium</i> spp. and <i>Gibberella</i> spp.) For suppression of the stalk rot <i>Fusarium</i> spp., <i>Gibberella</i> spp. and <i>Colletotrichum</i> spp. which may cause stalk lodging.	Apply PHOBOS FC 360 at 555 mL/ha (200 g a.i./ha)	Fusarium ear rot outbreaks in corn occur when the weather is warm and wet during silking. It is also driven by hybrid selection and field history of severe fusarium outbreaks. The application of PHOBOS FC 360 for protection against fusarium ear rot should be considered when these conditions are forecasted for a specific corn field. Applications of PHOBOS FC 360 timed for suppression of fusarium ear rot may also reduce lodging caused by stalk rot pathogens. Timing of application is critical: For optimum suppression of Fusarium Ear Rot apply PHOBOS FC 360 from the development stage of corn between the tip of stigmata visible (silking, BBCH 63) to the stigmata drying (silk browning, BBCH 67). PHOBOS FC 360 will reduce both disease symptoms and levels of mycotoxin in the grain. Spray Coverage is essential for optimum efficacy: Spray equipment must be set up to provide good coverage to the cobs. To achieve thorough cob coverage using ground application equipment, it is recommended to use drop- nozzles. Nozzles should be operated within the spray pressure recommendations suggested by the manufacturer.
Note: PHOBOS FC 360 may be applied with a non-ionic surfactant, e.g., AgSurf or Agral 90, at 0.125% v/v. Do not apply a non-ionic surfactant prior to tassel emergence. The application may be made by ground or aerial spray equipment. Do not apply within 14 days of harvest. Do not apply more than one application per year.			

Peanut		
DISEASE	RATE	TIMING
<u>Soil-Borne:</u> Suppression of Rhizoctonia pod rot (<i>Rhizoctonia solani</i>)	555 mL per hectare (200 g a.i./ha)	For Soil-Borne Diseases Applications of fungicides with a different mode of action should be made prior to and following applications of PHOBOS FC 360 to discourage development of resistant strains of fungi. In fields with a history of pod rot or in situations where conditions favour disease development apply PHOBOS FC 360 at about mid-season and continue PHOBOS FC 360 applications at 14-day intervals. PHOBOS FC 360 must be carried by rainfall or irrigation into the root and pod zone for control of pod rot caused by <i>Rhizoctonia solani</i> . Drought conditions will decrease the effectiveness of PHOBOS FC 360 against pod rot.
<u>Foliar:</u> Early leaf spot (<i>Cercospora arachidicola</i>) Suppression of Leaf Rust (<i>Puccinia arachidis</i>)	486 to 555 mL per hectare (175-200 g a.i./ha)	Foliar Disease Spray Program Apply the specified rate in a preventive spray schedule. Apply up to 4 sprays using a 14-day interval Use the higher use rate when conditions are favourable for severe disease pressure and/or when growing less disease resistant varieties.
Note: Apply up to four (4) applications of PHOBOS FC 360 per year. When planting varieties with good to excellent levels of resistance to foliar diseases, the application interval may be extended up to 21 days in the absence of soil borne diseases. A maximum of 2.22 L per hectare of PHOBOS FC 360 may be applied per year. PHOBOS FC 360 may be applied up to 14 days before harvest. Do not feed hay or threshings or allow livestock to graze in treated areas. Applications may be made by ground spray equipment only.		

Cucurbit Vegetables			
CROP	DISEASE	RATE	TIMING
Cucurbit vegetables: Chinese waxgourd (Chinese preserving melon); citron melon; cucumber; gherkin; gourd, edible (includes hyotan, cucuzza, hechima, Chinese okra); <i>Momordica</i> spp (includes balsam apple, balsam pear, bittermelon, Chinese cucumber); muskmelon (includes cantaloupe); pumpkin; squash, summer; squash, winter (includes butternut squash, calabaza, hubbard squash, acorn squash, spaghetti squash); watermelon	Fusarium wilt Fusarium blight (<i>Fusarium</i> spp.) Gummy stem blight (<i>Didymella</i> spp.)	Apply PHOBOS FC 360 at 555 mL/ha (0.2 kg a.i./ha) (soil) PHOBOS FC 360 at 555 mL/ha (0.2 kg a.i./ha) (foliar)	Apply PHOBOS FC 360 at planting via drip / drench equipment. Follow with foliar treatments during the season.
	Powdery mildew (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	Apply PHOBOS FC 360 at 278 to 555 mL/ha (0.1-0.2 kg a.i./ha)	For Powdery Mildew Control apply PHOBOS FC 360 as a preventive foliar spray when the earliest sign of disease is first noticed., repeat at 5 – 10 day intervals with PHOBOS FC 360 or another approved fungicide from a different chemical group
General Comments: Apply up to one (1) soil application and two (2) foliar applications of PHOBOS FC 360 at the high rate, or one soil application and four (4) foliar applications per year at the low rate. Repeat foliar applications using a 5- to 10-day spray interval if conditions remain favorable for continued or increasing disease development. Foliar applications may be applied by ground application equipment only. Apply with a non-ionic surfactant, AgSurf or Agral 90 at 0.125% v/v. A maximum of 1.665 L/ha of PHOBOS FC 360 may be applied per crop year. Do not apply within 7 days of harvest.			

Bushberry			
CROP	DISEASE	RATE	TIMING
Bushberry subgroup: Aronia berry; blueberry, highbush; blueberry, lowbush; buffalo currant; cranberry, highbush; currant, black; currant, red; elderberry; European barberry; gooseberry; honeysuckle, edible; huckleberry; jostaberry; juneberry (Saskatoon berry); lingonberry; salal; sea buckthorn; cultivars, varieties, and/or hybrids of these.	Suppression of Septoria leaf spot (<i>Septoria</i> spp.)	Apply PHOBOS FC 360 at 417 mL/ha (150 g a.i./ha).	Apply PHOBOS FC 360 at the first sign of disease. After the initial application, one additional application may be made 10-14 days afterwards if conditions remain favourable for continued or increased disease development.
	Suppression of Leaf rust (<i>Thekopsora minima</i>) and Valdensinia leaf spot (<i>Valdensinia heterodoxa</i>) - blueberry only	Apply PHOBOS FC 360 at 528 mL/ha (190 g a.i./ha)	
	Monilinia blight (<i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i>) – blueberry only	Apply PHOBOS FC 360 at 417 to 555 mL/ha (0.15 – 0.2 kg a.i./ha)	Begin applications at early bloom for fruit rot. Make a second application of PHOBOS FC 360 or another approved fungicide 5-10 days later.
General Comments: Apply up to two (2) applications of PHOBOS FC 360 per year. Applications may be made by ground application equipment only. Apply with a non-ionic surfactant, e.g., AgSurf or Agral 90 at 0.125% v/v. A maximum of 1,110 mL/ha of PHOBOS FC 360 may be applied per crop year. Do not apply within 7 days of harvest.			

Low-Growing Berry, except strawberry			
CROP	DISEASE	RATE	TIMING
Low growing berry subgroup, except strawberry: Bearberry; bilberry; cloudberry; cranberry; partridgeberry; cultivars, varieties, and/or hybrids of these	Fruit rot: (<i>Coleophoma empetri</i> , <i>Glomerella cingulata</i> , <i>Phyllosticta vaccinii</i> , <i>Phybaslopora vaccinii</i> <i>Allantophomopsis lycopodina</i> , <i>Allantophomopsis cytispora</i> , <i>Fusicoccum putrefaciens</i> , <i>Penicillium</i> spp., <i>Phomopsis vaccinii</i> , <i>Colletotrichum acutatum</i> , <i>Colletotrichum coccodes</i>) Suppression of Septoria leaf spot (<i>Septoria</i> spp.)	Apply PHOBOS FC 360 at 486 mL/ha (0.175 kg a.i./ha) Adjuvant: Apply with a non-ionic surfactant, e.g., AgSurf or Agral 90 at 0.125% v/v	Begin applications at early bloom for fruit rot. Make a second application of PHOBOS FC 360 or another approved fungicide 5-10 days later.
General Comments: Apply up to two (2) applications of PHOBOS FC 360 per year. Repeat applications as needed using a 5- to 10-day spray interval if conditions remain favorable for continued or increasing disease development. Applications may be made by ground spray equipment only. A maximum of 972 mL/ha of PHOBOS FC 360 may be applied per year. Do not apply within 45 days of harvest.			

The DIRECTIONS FOR USE for the uses described in this section of the label were developed by persons other than Vive Crop Protection Inc. under the User Requested Minor Use Label Expansion program. For these uses, Vive Crop Protection Inc. has not fully assessed performance (efficacy) and/or crop tolerance (phytotoxicity) under all environmental conditions or for all crop varieties when used in accordance with the label. The user should test the product on a small area first, under local conditions and using standard practices, to confirm the product is suitable for widespread application.

CROP	DISEASE	RATE	TIMING
Sunflower, Safflower	For suppression of Sclerotinia head rot (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Apply PHOBOS FC 360 at 555 mL/ha (200 g a.i./ha)	Apply PHOBOS FC 360 when the crop is in the 10 - 50% disk flower bloom stage.

Note: PHOBOS FC 360 may be applied with a non-ionic surfactant, e.g., AgSurf or Agral 90, at 0.125%. The application may be made by ground or aerial spray equipment. A maximum of one application (555 mL/ha of PHOBOS FC 360) may be applied to sunflower or safflower per year. Do not *apply* within 45 days of harvest. If applying PHOBOS FC 360 to greater than 310 ha per day of sunflower and/or safflower using open cab ground boom equipment, applicators must also wear a NIOSH/MSHA-approved respirator.

CROP	DISEASE	RATE	TIMING
Flax (linseed), Crambe, Borage	For control of Sclerotinia stem rot (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Apply PHOBOS FC 360 at 417 to 486 mL/ha (150-175 g a.i./ha)	Apply PHOBOS FC 360 when the crop is in the 20 - 50% bloom stage. Best protection will be achieved when the fungicide is applied prior to petals beginning to fall, and will allow for the maximum number of petals to be protected. The higher rate is recommended for fields with a history of heavy disease pressure or for dense crop stands. Good spray coverage of the plants is essential.

Note: PHOBOS FC 360 may be applied with a non-ionic surfactant, e.g., AgSurf or Agral 90, at 0.125% v/v. The application may be made by ground or aerial spray equipment. A maximum of one application (486 mL/ha of PHOBOS FC 360) may be applied per year. Do not apply within 36 days of harvest.

CROP	DISEASE	RATE	TIMING
Sugar beets	For control of foliar diseases: Cercospora Leaf Spot (<i>Cercospora beticola</i>)	Apply PHOBOS FC 360 at 417 to 555 mL/ha (150 –200 g a.i./ha) – 200 g a.i./ha)	Apply PHOBOS FC 360 at the first sign of disease. Use the higher rate and shorter intervals when conditions are favourable for severe disease pressure and/or when growing less disease-resistant varieties. Apply the specified rate of PHOBOS FC 360 in 100 – 200 L of water per hectare when using ground application equipment. Repeat applications using a 14 to 21-day spray interval depending on disease pressure. Use a 14-day spray interval under normal to heavy disease pressure and a 21-day spray interval under light disease pressure.
	For control of soil-borne diseases: Rhizoctonia Crown Rot (<i>Rhizoctonia solani</i>)	Apply PHOBOS FC 360 at 555mL/ha (200 g a.i./ha)	Apply PHOBOS FC 360 at the 4-leaf to row closure growth stage. Apply the specified rate of PHOBOS FC 360 in 50 – 100 L of water per hectare. Repeat applications using a 21-day spray interval.
Note: A maximum of 3 applications (1,665 mL/ha of PHOBOS FC 360) may be applied per crop year. Do not apply within 7 days of harvest. PHOBOS FC 360 may be applied with a non-ionic surfactant, e.g., AgSurf or Agral 90, at 0.125% v/v. The application may be made by ground or aerial application equipment. PHOBOS FC 360 is a Group 3 fungicide. To limit the potential for development of disease resistance, alternate every application of PHOBOS FC 360 with a non-Group 3 fungicide.			

As this product is not registered for the control of pests in aquatic systems, **DO NOT** use to control aquatic pests. **DO NOT** contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes.

Field sprayer application: **DO NOT** apply when wind speed is less than 1 km/h. Avoid application of this product when winds are gusty. **DO NOT** apply with sprays finer than the American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) S572 (572.1 to 572.3) medium classification. Boom height must be 60 cm or less above the crop or ground.

Airblast application: **DO NOT** apply when wind speed is less than 1 km/h. Avoid application of this product when winds are gusty. **DO NOT** direct spray above plants to be treated. Turn off outward pointing nozzles at row ends and outer rows. **DO NOT** apply when wind speed is greater than 16 km/h at the application site as measured outside of the treatment area on the upwind side.

Conventionally piloted aircraft application: **DO NOT** apply when wind speed is less than 1 km/h. Avoid application of this product when winds are gusty. **DO NOT** apply when wind speed is greater than 16 km/h at flying height at the site of application. **DO NOT** apply with sprays finer than the American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) S572 (572.1 to 572.3) medium classification. Reduce drift caused by turbulent wingtip vortices. Nozzle distribution along the spray boom length **MUST NOT** exceed 65% of the wing- or rotorspan.

Tank Mixes

This product may be tank mixed with registered pest control products, whose labels also allow tank mixing, provided the entirety of both labels, including Directions For Use, Precautions, Restrictions, Environmental Precautions, and Spray Buffer Zones are followed for each product. In cases where these requirements differ between the tank mix partner labels, the most restrictive label must be followed. Do not tank mix products containing the same active ingredient unless specifically listed on this label.

In some cases, tank mixing pest control products can result in reduced pesticide efficacy or increased host crop injury. The user should contact Vive Crop Protection Inc. at 1-888-760-0187 for information before applying any tank mix that is not specifically recommended on this label.

Spray Buffer Zones:

A spray buffer zone is NOT required for:

- uses with hand-held application equipment permitted on this label,
- low-clearance hooded or shielded sprayers that prevent spray contact with crop, fruit or foliage,
- soil drench.

The spray buffer zones specified in the table below are required between the point of direct application and the closest downwind edge of sensitive terrestrial habitats (such as grasslands, forested areas, shelter belts, woodlots, hedgerows, riparian areas and shrublands), sensitive freshwater habitats (such as lakes, rivers, sloughs, ponds, prairie potholes, creeks, marshes, streams, reservoirs and wetlands) and estuarine/marine habitats.

Method of Application	Crop	Spray Buffer Zones (metres) Required for the Protection of:				
		Aquatic Habitat of Depths:				Terrestrial Habitat
		Less than 1 m	1-3 m	Greater than 3 m		
Field sprayer	All listed crops		2	1	0	0
Airblast	Bushberries	Early growth stage	25	15	4	1
		Late growth stage	15	5	2	1

Method of Application	Crop	Spray Buffer Zones (metres) Required for the Protection of:			
		Aquatic Habitat of Depths:			Terrestrial Habitat
		Less than 1 m	1-3 m	Greater than 3 m	
Aerial (fixed and rotary wing)	Flax (linseed), crambe, borage, soybeans	15	5	2	1
	Corn, safflower, sunflower	15	5	0	0
	Oats	20	10	0	0
	Canola, Oriental mustard, rapeseed, <i>Brassica carinata</i>	20	10	1	10
	Wheat, barley	25	10	0	10
	Lentils	30	10	0	15
	Sugarbeets	45	15	4	15
	Chickpeas	50	15	5	15

When tank mixes are permitted, consult the labels of the tank mix partners and observe the largest (most restrictive) spray buffer zone of the products involved in the tank mixture and apply using the coarsest spray (ASABE) category indicated on the labels for those tank mix partners.

The spray buffer zones for this product for conventional application equipment can be modified based on weather conditions and spray equipment configuration by accessing the Spray Buffer Zone Calculator on the Drift Mitigation portion of the Canada.ca website.

Rotation restrictions:

Treated areas may be replanted with any crop specified on this label as soon as practical after the last application. For crops not listed on this label, do not plant back within 30 days of last application.

Section 8: Resistance Management

Resistance Management Recommendations:

For resistance management, PHOBOS FC 360 contains a Group 3 fungicide. Any fungal population may contain individuals naturally resistant to PHOBOS FC 360 and other Group 3 fungicides. A gradual or total loss of pest control may occur over time if these fungicides are used repeatedly in the same fields. Other resistance mechanisms that are not linked to site of action, but specific for individual chemicals, such as enhanced metabolism, may also exist.

Appropriate resistance-management strategies should be followed.

To delay fungicide resistance:

- Alternate with fungicides having a different mode of action other than Group 3 every 7 to 10 days after each application of PHOBOS FC 360.
- Do not apply more than the indicated maximum number of applications per year specified for each crop in the DIRECTIONS FOR USE, Section 7 table.

- Use tank mixtures with fungicides from a different group that is effective on the target pathogen when such use is permitted.
- Fungicide use should be based on an integrated disease management program that includes scouting, historical information related to pesticide use and crop rotation and considers host plant resistance, impact of environmental conditions on disease development, disease thresholds, as well as cultural, biological and other chemical control practices.
- Where possible, make use of predictive disease models to effectively time fungicide applications.
- Monitor treated fungal populations for resistance development. Notify Vive Crop Protection Inc. if reduced sensitivity of the pathogen to PHOBOS FC 360 is suspected.
- If disease continues to progress after treatment with this product, do not increase the use rate. Discontinue use of this product, and switch to another fungicide with a different site of action, if available.
- Contact your local extension specialist or certified crop advisors for any additional pesticide resistance-management and/or IPM recommendations for specific crops and pathogens.
- For further information and to report suspected resistance, contact Vive Crop Protection Inc. at 1-888-760-0187.

Section 9: Application Precautions

GROUND APPLICATION:

1. Use well-maintained and calibrated conventional spray equipment, which provides adequate and uniform coverage.
2. Apply PHOBOS FC 360 in a minimum of 100 L water/ha, unless otherwise specified in DIRECTIONS FOR USE, Section 7.
3. Spray screens should be no finer than 50 mesh.
4. Ensure that the by-pass line discharges at the bottom of the tank to minimize foaming.
5. Maintain pressure at no less than 275 kPa to ensure good foliage penetration and coverage.
6. Provincial spray buffer zones that are greater than the spray buffer zones indicated in the DIRECTIONS FOR USE, Section 7, should be respected.
7. If spray mixture remains in the tank overnight, or for long periods during the day, agitate thoroughly prior to application.

AERIAL APPLICATION-GENERAL INFORMATION:

1. Apply only by fixed-wing or rotary aircraft equipment which has been functionally and operationally calibrated for the atmospheric conditions of the area and the application rates and conditions of this label.
2. Label rates, conditions and precautions are product specific. Read and understand the entire label before opening this product. Apply only at the rate specified for aerial application on this label. Where no rate for aerial application appears for the specific use, this product cannot be applied by any type of aerial equipment. If you have questions, call 1-888-760-0187 or obtain technical advice from the distributor or your provincial or territorial agricultural representative.
3. Ensure uniform application. To avoid streaked, uneven or overlapped application, use appropriate marking devices.
4. Apply PHOBOS FC 360 in a minimum of 50 L of water/ha.
5. To ensure proper coverage and distribution and to minimize drift, check to see that swath width and droplet size are adequate, and that wind velocities are low.
6. Use mechanical flaggers only.

AERIAL APPLICATION-USE PRECAUTIONS:

1. Apply only when meteorological conditions at the treatment site allow for complete and even crop coverage.
2. Apply only under conditions of good practice specific to aerial application as outlined in the National Aerial Pesticide Application Manual, developed by the Federal/Provincial/Territorial Committee on Pest Management and Pesticides.

AERIAL APPLICATION- OPERATOR PRECAUTIONS:

1. **DO NOT** allow the pilot to mix chemicals to be loaded onto the aircraft. Loading of premixed chemicals with a closed system is permitted.
2. It is desirable that the pilot has communication capabilities at each treatment site at the time of application.
3. The field crew and the mixer/loaders must wear chemical resistant gloves, coveralls and goggles or face shield during mixing/loading, cleanup and repair. Follow the more stringent label precautions in cases where the operator precautions exceed the generic label recommendations on the existing ground boom label.
4. All personnel on the job site must wash hands and face thoroughly before eating and drinking.
5. Protective clothing, aircraft cockpit and vehicle cabs must be decontaminated regularly.
6. Read and understand the entire label before opening this product. If you have questions, call the registrant at 1-888-760-0187 or obtain technical advice from the distributor or your provincial or territorial agricultural representative.

Section 10: Mixing Instructions

Mixing Instructions:

PHOBOS FC 360 must be applied with properly calibrated, clean equipment. Prior to adding PHOBOS FC 360 to the spray tank, ensure that the spray tank is thoroughly clean.

- Add one-half of the required amount of water to the spray or mixing tank and start agitation.
- Add the required quantity of PHOBOS FC 360 to the water and complete filling with water to the required total volume.
- Add the required quantity of PHOBOS FC 360 and any permitted tank mix partners to the water following the VALES mixing order. Complete filling the tank with water to the required total volume.
- Maintain agitation throughout mixing and spraying.
- PHOBOS FC 360 should be thoroughly dispersed prior to the addition of a nonionic surfactant. PHOBOS FC 360 is recommended to be used with a registered non-ionic surfactant, such as Agral 90 or AgSurf, at 0.125% vol/vol (1.25 L/1000 L water).

Section 11: Pre-harvest Intervals

Crop	PHI (days)
Wheat (spring, durum and winter), Barley, Oats, Pearl Millet, Proso Millet, Rye, Triticale, Teosinte, Buckwheat	30
Canola, Rapeseed, Oriental Mustard, <i>Brassica carinata</i> , Flax (Linseed), Crambe, borage	36
Corn (field, sweet, popcorn)	14
Chickpea, Lentils	7
Soybean	20
Sugar Beet	7
Bushberry	7
Peanut	14
Cucurbits	7
Low-Growing Berries (except strawberries), Safflower, Sunflower	45

Section 12: Notices

NOTICE TO USER:

This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.

For more information contact:

Vive Crop Protection Inc.
6275 Northam Dr., Suite 1
Mississauga, ON
L4V 1Y8

Phobos is a registered trademark of Vive Crop Protection Inc.

All other products mentioned are trademarks of their respective companies.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

SECTION 1 : LE PRODUIT

PHOBOS FC 360 est un fongicide systémique à large spectre utilisé pour supprimer ou réprimer les maladies *Ascomycètes*, *Basidiomycètes* et *Deutéromycètes* indiquées sur l'étiquette dans l'orge, les petits fruits, *Brassica carinata*, la bourrache officinale, le canola, les pois chiches, le crambe, les petits fruits de plantes naines, sauf les fraises, le maïs, les cucurbitacées, le lin, les lentilles, l'avoine, la moutarde orientale, les arachides, le colza, le carthame, le soja, la betterave à sucre, le tournesol, le blé et certaines autres petites céréales.

SECTION 2 : SECTION 2 : SÉCURITÉ ET MANIPULATION – MISES EN GARDE, VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENT PROTECTEURS, ET DÉLAIS DE SÉCURITÉ.

MISES EN GARDE :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.

NE PAS manger, boire, ou fumer/vapoter pendant l'utilisation de ce produit. Bien se laver avec de l'eau et du savon après la manipulation et avant de manger, boire, mâcher de la gomme/du tabac, de fumer/vapoter ou d'aller aux toilettes. Le cockpit de l'avion et les cabines des véhicules doivent être décontaminés régulièrement. Appliquer seulement lorsque le potentiel de dérive au-delà de la zone à traiter est minime. Prendre en considération la vitesse et la direction du vent, les inversions de température, la calibration de l'équipement d'application et du pulvérisateur.

NE PAS pénétrer ni permettre à des travailleurs de pénétrer dans les zones traitées pendant les intervalles spécifiés dans le tableau suivant:

Culture	Activité après l'application	DS et/ou DAAR
Le petits fruits de plantes naines (sauf les fraises), carthame, tournesol	Récolte	45 jours
	Toutes les autres activités	24 heures
Canola, colza, moutarde orientale, <i>Brassica carinata</i> , lin, crambe, bourrache officinale	Récolte	36 jours
	Toutes les autres activités	24 heures
Blé (de printemps, dur et l'hiver), l'orge, avoine, millet perlé, millet rond, seigle, triticale, téosinte, sarrasin	Récolte	30 jours
	Toutes les autres activités	24 heures
Maïs sucré	Récolte à la main	20 jours
	Récolte mécanique	14 jours
	Toutes les autres activités	24 heures
Maïs de semence	L'écimage à la main	20 jours
	Récolte	14 jours
	Toutes les autres activités	24 heures

Culture	Activité après l'application	DS et/ou DAAR
Mais de grande culture, arachides	Récolte	14 jours
	Toutes les autres activités	24 heures
Soja	Récolte	20 jours
	Toutes les autres activités	24 heures
Pois chiches, lentilles, betteraves sucrières	Récolte	7 jours
	Toutes les autres activités	24 heures
Petits fruits, cucurbitacées	Récolte	7 jours
	Irrigation manuelle	3 jours
	Toutes les autres activités	24 heures

VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENT PROTECTEURS:

Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage et les réparations. De plus, les travailleurs doivent porter des lunettes de protection (lunettes de protection ou écran facial) pendant le mélange, le chargement, le nettoyage et les réparations. Les gants ne sont pas requis à l'intérieur de la cabine fermée et/ou du cockpit fermé.

Si le produit entre en contact avec les vêtements/l'ÉPI, enlever tous les vêtements/l'ÉPI contaminés, se laver avec de l'eau et du savon et enfiler des vêtements propres. Laver l'extérieur des gants avec du savon et de l'eau avant de les retirer. Laver les vêtements/l'ÉPI contaminés régulièrement et séparément des autres vêtements.

SECTION 3 : PREMIERS SOINS ET RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Traiter selon les symptômes.

SECTION 4 : MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES

Toxique pour les organismes aquatiques et les plantes terrestres non ciblées. Observer les zones tampons de pulvérisation spécifiées à la section MODE D'EMPLOI.

Afin de réduire le ruissellement à partir des sites traités vers les habitats aquatiques, éviter d'appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compacté ou sur de l'argile. Éviter d'appliquer ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues.

La contamination des habitats aquatiques par ruissellement peut être réduite par l'aménagement d'une bande de végétation filtrante entre le site traité et le bord du plan d'eau. On peut consulter d'autres renseignements dans la section sur l'Atténuation du ruissellement du site Web Canada.ca.

SECTION 5 : ENTREPOSAGE

- Entreposer ce produit à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
- Garder ce produit éloigné du feu, d'une flamme nue ou de toutes autres sources de chaleur.
- Ne pas entreposer à des températures inférieures au point de congélation.
- Si le produit est entreposé depuis au moins 1 an, bien secouer avant d'utiliser.
- Entreposer le contenant bien fermé à l'écart de la nourriture de consommation animale, des semences, des engrais, des plantes et des denrées alimentaires.
- Ne pas utiliser ni entreposer dans la maison ni à proximité.
- Entreposer dans le contenant d'origine.

SECTION 6 : ÉLIMINATION

Contenants recyclables:

NE PAS utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus proche. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant vide trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant vide rincé inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale ou territoriale.

Contenants récupérables:

NE PAS utiliser ce contenant à d'autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (distributeur ou détaillant).

Élimination de produit non utilisé et dont on veut se départir :

Pour tout renseignement concernant l'élimination de produit non utilisé et dont on veut se départir, s'adresser au titulaire ou à l'organisme de réglementation provincial ou territorial. S'adresser au titulaire et à l'organisme de réglementation provincial ou territorial en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

Élimination de la solution de pulvérisation inutilisée :

S'il reste de la solution de pulvérisation dans le réservoir après le traitement, elle doit être pulvérisée sur le périmètre du champ qui vient d'être traité, NON PAS SUR LA CULTURE, à l'écart des sources d'approvisionnement en eau, fossés et canaux d'irrigation. Il faut également respecter les zones tampons de pulvérisation indiquées dans le MODE D'EMPLOI.

MODE D'EMPLOI

SECTION 7 : CULTURE, MALADIE, TAUX, PÉRIODES D'APPLICATION

CÉRÉALES (orge, blé et avoine)			
CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Orge	Pour la répression de la fusariose ou de la tavelure (<i>Fusarium spp.</i>)	Faire une application de PHOBOS FC 360, à raison de 417 à 555 ml/ha (150-200 g m.a./ha) Adjuvant : Appliquer avec un agent tensioactif non ionique, par exemple AgSurf ou Agral 90 à 0,125 % v/v	La fusariose se manifeste dans l'orge lorsque le temps est chaud et humide à l'épiaison. L'application du PHOBOS FC 360 pour protéger la culture de la fusariose (tavelure) doit être envisagée lorsque ces conditions environnementales sont prévues à ce stade de croissance de l'orge. La période d'application est importante : Pour obtenir une répression optimale de la fusariose, appliquer PHOBOS FC 360 comme traitement préventif au cours de la période pendant laquelle de 70 à 100 % des tiges florales de l'orge sont entièrement émergées, jusqu'à 3 jours après l'épiaison complète. L'application du taux de 555 ml/ha est suggérée lorsque l'on prévoit que le degré d'infestation de la maladie sera élevé. Ces situations peuvent se produire lorsque de longues périodes de temps chaud et humide sont prévues au moment de l'épiaison, lorsque l'orge est cultivée dans le cadre d'un programme de rotation avec le maïs ou lorsque des cultivars sensibles sont utilisés. L'utilisation du taux de 555 ml/ha offre typiquement les degrés les plus élevés de réduction de la mycotoxine. Une couverture uniforme est essentielle pour obtenir une efficacité optimale : l'équipement de pulvérisation doit être réglé de façon à permettre une bonne couverture des épis. Pour obtenir une excellente couverture des épis à l'aide de pulvérisateurs terrestres, il est recommandé d'utiliser des buses montées vers l'arrière et vers l'avant ou qui ont des jets bidirectionnels. Les buses doivent être utilisées selon les recommandations de pression de pulvérisation du fabricant.

CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Orge	Pour la suppression de : Rayure réticulée (<i>Pyrenophora teres</i>); Rynchosporiose (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Tache helminthosporienne (<i>Cochliobolus sativus</i>)	Faire une application de PHOBOS FC 360 à raison de 278 à 417 ml/ha (100 -150 g m.a./ha) Adjuvant : Appliquer avec un agent tensioactif non ionique, par exemple AgSurf ou Agral 90 à 0,125 % v/v	Appliquer PHOBOS FC 360 comme traitement préventif lorsque les tout premiers symptômes de la maladie se manifestent sur les feuilles et les tiges. Les champs d'orge doivent être inspectés minutieusement pour déceler les premiers symptômes de la maladie, en particulier lorsque des variétés sensibles sont plantées et/ou lorsque prévalent des conditions prolongées propices au développement de la maladie.
Note : Deux applications au maximum (1110 ml/ha) de PHOBOS FC 360, moyennant un intervalle d'application minimum de 7 jours, peuvent être effectuées annuellement pour chaque culture d'orge. Ne pas appliquer dans les 30 jours précédant la récolte. Les épandages doivent être faits à l'aide d'équipement de pulvérisation terrestre ou aérien.			

CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Blé (de printemps, dur et d'hiver)	Pour la répression de la fusariose ou de la tavelure (<i>Fusarium</i> spp.) Pour la suppression de la tache des glumes (<i>Stagonospora nodorum</i>)	Faire une application de PHOBOS FC 360 à raison de 417 à 555 ml/ha (150-200 g m.a./ha) Adjuvant : Appliquer avec un agent tensioactif non ionique, par exemple AgSulf ou Agral 90 à 0,125 % v/v	La fusariose se manifeste dans le blé lorsque le temps est chaud et humide à l'épiaison et à la floraison. L'application du PHOBOS FC 360 pour protéger la culture de la fusariose (tavelure) doit être envisagée lorsque ces conditions environnementales sont prévues à ce stade de croissance du blé. <u>La période d'application est importante :</u> Pour obtenir une répression optimale de la fusariose ou la suppression de la tache des glumes, appliquer PHOBOS FC 360 au cours de la période pendant laquelle 75 % des épis de blé sur la tige principale sont entièrement émergés jusqu'au moment où 50 % des épis sur la tige principale sont en fleurs. L'application du taux de 555 ml/ha est suggérée lorsque l'on prévoit que le degré d'infestation de la maladie sera élevé. Ces situations peuvent se produire lorsque de longues périodes de temps chaud et humide sont prévues durant la floraison, lorsque le blé est cultivé dans le cadre d'un programme de rotation avec le maïs ou lorsque des cultivars ou des types de blés plus sensibles (blé dur) sont utilisés. L'utilisation du taux de 555 ml/ha offre typiquement les degrés les plus élevés de réduction de la mycotoxine. Une couverture uniforme est essentielle pour obtenir une efficacité optimale : l'équipement de pulvérisation doit être réglé de façon à permettre une bonne couverture des épis. Pour obtenir une excellente couverture des épis à l'aide de pulvérisateurs terrestres, il est recommandé d'utiliser des buses montées vers l'arrière et vers l'avant ou qui ont des jets bidirectionnels. Les buses doivent être utilisées selon les recommandations de pression de pulvérisation du fabricant.

CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Blé (de printemps, dur et d'hiver)	Pour la suppression de : Tache septorienne (<i>Septoria tritici</i>); Tache auréolée (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>); Rouille des feuilles (<i>Puccinia recondata</i>)	Appliquer le PHOBOS FC 360 à raison de 417 ml/ha (150 g m.a./ha) Adjuvant : Appliquer avec un agent tensioactif non ionique, par exemple AgSurf ou Agral 90 à 0,125 % v/v	Appliquer PHOBOS FC 360 comme traitement préventif lorsque les tout premiers symptômes de la maladie se manifestent sur les feuilles et les tiges. Les champs de blé doivent être inspectés minutieusement pour déceler les premiers symptômes de la maladie, en particulier lorsque des variétés sensibles sont plantées et/ou lorsque prévalent des conditions prolongées propices au développement de la maladie.

Note : Deux applications au maximum (1110 ml/ha) de PHOBOS FC 360, moyennant un intervalle d'application minimum de 7 jours, peuvent être effectuées annuellement pour chaque culture de blé. Ne pas appliquer dans les 30 jours précédant la récolte. Les épandages doivent être faits à l'aide d'équipement de pulvérisation terrestre ou aérien.

CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Avoine	Pour la suppression de la rouille couronnée (<i>Puccinia coronata</i>)	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 417 ml/ha (150 g m.a./ha) Adjuvant : Appliquer avec un agent tensioactif non ionique, par exemple AgSurf ou Agral 90 à 0,125 % v/v	Appliquer PHOBOS FC 360 comme traitement foliaire préventif lorsque les tout premiers symptômes de la maladie se manifestent sur les feuilles et les tiges. Les champs doivent être inspectés minutieusement pour déceler les premiers symptômes de la maladie, en particulier lorsque des variétés sensibles sont plantées et/ou lorsque prévalent des conditions prolongées propices au développement de la maladie.

Note : Deux applications au maximum (834 ml/ha) de PHOBOS FC 360, moyennant un intervalle d'application minimum de 7 jours, peuvent être effectuées annuellement pour chaque culture d'avoine. Ne pas appliquer dans les 30 jours précédant la récolte. Les épandages doivent être faits à l'aide d'équipement de pulvérisation terrestre ou aérien.

CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Millet perlé, millet rond, seigle, tritcale, téosinte, sarrasin	Pour la répression de la fusariose ou de la tavelure (<i>Fusarium spp.</i>), sauf le sarrasin Pour la suppression de la rouille (<i>Puccinia spp.</i>)	Faire une application de PHOBOS FC 360 à raison de 417 à 555 ml/ha (150 - 200 g m.a./ha) Adjuvant : Appliquer avec un agent tensioactif non ionique, par exemple AgSurf ou Agral 90 à 0,125 % v/v	Appliquer PHOBOS FC 360 comme traitement foliaire préventif lorsque les tout premiers symptômes de la maladie se manifestent sur les feuilles et les tiges. Les champs doivent être inspectés minutieusement pour déceler les premiers symptômes de la maladie, en particulier lorsque des variétés sensibles sont plantées et/ou lorsque prévalent des conditions prolongées propices au développement de la maladie.

Note : Deux applications au maximum (1110 ml/ha) de PHOBOS FC 360, moyennant un intervalle d'application minimum de 7 jours, peuvent être effectuées annuellement. Ne pas appliquer dans les 30 jours précédant la récolte. Les épandages doivent être faits à l'aide d'équipement de pulvérisation terrestre seulement.

OLÉAGINEUX (Canola, Colza, Moutarde orientale, *Brassica carinata*)

CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Canola, colza, moutarde orientale, <i>Brassica carinata</i>	Pour la suppression de la pourriture sclérotique (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 417 à 486 ml/ha (150-175 g m.a./ha)	Appliquer PHOBOS FC 360 lorsque la culture est au stade de 20 à 50 % de floraison. On obtiendra une meilleure protection lorsque le fongicide est appliqué avant le début de la chute des pétales, ce qui permettra de protéger un nombre maximum de pétales. Le taux de 417 ml/ha est recommandé pour la plupart des cultures oléagineuses; toutefois, le taux le plus élevé est recommandé pour les champs qui ont un historique de degré d'infestation élevé ou de forte densité des cultures. Une couverture uniforme des plantes est essentielle. Une deuxième application à raison de 417 ml/ha peut être faite 7 à 10 jours plus tard, jusqu'à la pleine floraison, si la maladie persiste ou que les conditions météorologiques favorisent le développement de la maladie. Lorsque les conditions propices à la maladie sont optimales, utiliser l'intervalle plus court.

Note : PHOBOS FC 360 peut être appliqué avec un agent tensioactif non ionique, par exemple AgSurf ou Agral 90, à 0,125 % v/v. L'épandage peut être fait à l'aide d'équipement de pulvérisation terrestre ou aérien. Un maximum de deux applications (903 ml/ha de PHOBOS FC 360) peut être effectué par année. Ne pas appliquer dans les 36 jours précédant la récolte.

CULTURES DE LÉGUMINEUSES (pois chiches, lentilles)

CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Pois chiches	Pour la suppression de l'ascochytose (<i>Ascochyta rabiei</i>)	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 417 à 555 ml/ha (150-200 g m.a./ha)	Appliquer PHOBOS FC 360 aux premiers signes de la maladie. Après la première application, d'autres applications peuvent être faites à intervalles de 10 à 14 jours. Utiliser le taux le plus élevé lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie, ou lorsque des variétés moins résistantes à la maladie sont cultivées. Un maximum de 1 665 ml/ha de PHOBOS FC 360 peut être appliqué par culture, par année. Maximum de deux applications par année.

CULTURES DE LÉGUMINEUSES (pois chiches, lentilles)

CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Lentilles	Pour la suppression de l'ascochytose (<i>Ascochyta spp.</i>)	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 417 à 555 ml/ha (150-200 g m.a./ha)	Appliquer PHOBOS FC 360 au début de la floraison ou dès les premiers signes de la maladie. Après la première application, une autre application peut être faite 10 à 14 jours plus tard, si les conditions favorisent un degré d'infestation continu ou plus élevé. Utiliser le taux le plus élevé lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie, ou lorsque des variétés moins résistantes à la maladie sont cultivées. Un maximum de 1 110 ml/ha de PHOBOS FC 360 peut être appliqué par année par culture, par année. Maximum de deux applications par année.
Note : PHOBOS FC 360 peut être appliqué avec un agent tensioactif non ionique, par exemple AgSurf ou Agral 90 à 0,125 % v/v. Les épandages doivent être faits à l'aide d'équipement de pulvérisation terrestre ou aérien. Ne pas appliquer dans les 7 jours précédant la coupe ou l'andainage de la récolte.			

Soja			
CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Soja	Pour la suppression de : Rouille asiatique du soja (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>) Cercosporiose (<i>Cercospora soja</i>)	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 278 ml/ha (100 g m.a./ha)	Appliquer PHOBOS FC 360 dès les premiers symptômes de la maladie ou lorsque le risque d'infection est imminent. Ne pas faire plus d'une application par année.
Note : PHOBOS FC 360 peut être appliqué avec un agent tensioactif non ionique, par exemple AgSurf ou Agral 90 à 0,125 % v/v. L'épandage doit être fait à l'aide d'équipement de pulvérisation terrestre ou aérien. Ne pas appliquer dans les 20 jours précédant la récolte.			

Maïs (de plein champ, doux et à éclater)			
CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Maïs (de plein champ, sucré et à éclater, y compris la production de semence)	Pour la suppression des rouilles (<i>Puccinia sorghi</i> , <i>Puccinia polysora</i>), de la kabatielliose du maïs (<i>Kabatiella zeae</i> ou <i>Aureobasidium zeae</i>), et du dessèchement (<i>Setosphaeria turcica</i>)	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 417 ml/ha (150 g m.a./ha)	Appliquer PHOBOS FC 360 comme traitement foliaire préventif lorsque les tout premiers symptômes de la maladie se manifestent sur les feuilles et les tiges. Les champs doivent être inspectés minutieusement pour déceler les premiers symptômes de la maladie, en particulier lorsque prévalent des conditions prolongées propices au développement de la maladie. Lorsque la pression de la maladie est élevée, il est recommandé d'utiliser un agent surfactant non ionique avec PHOBOS FC 360 (ne pas appliquer un agent tensioactif non ionique avant l'apparition de la panicule car la culture pourrait être endommagée). Consulter la section intitulée « Note » de ce tableau pour obtenir plus de détails concernant le mode d'emploi.
	Pour la suppression des maladies indiquées ci-dessus, plus les suivantes : Pour la suppression de la tache grise (<i>Cercospora zeae-maydis</i>) Pour la répression de la fusariose de l'épi (<i>Fusarium spp.</i> et <i>Gibberella spp.</i>)	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 555 ml/ha (200 g m.a./ha)	L'éclosion de la fusariose de l'épi se produit dans le maïs par temps chaud et humide, durant l'apparition des soies. Elle résulte également de la sélection des hybrides ainsi que de l'historique de graves épidémies de <i>Fusarium</i> dans le champ. L'application du PHOBOS FC 360 comme protection contre la fusariose de l'épi doit être envisagée lorsque ces conditions sont prévues dans un champ de maïs particulier. Les applications du PHOBOS FC 360 planifiées pour la répression de la fusariose de l'épi peuvent également réduire la verse causée par les agents pathogènes de la pourriture de la tige. La période d'application est importante : Pour obtenir une répression optimale de la fusariose de l'épi, appliquer PHOBOS FC 360 à partir du stade de développement du maïs qui s'écoule entre la pointe du stigmate visible (formation des soies, BBCH 63) au dessèchement du stigmate (brunissement des soies, BBCH 67). PHOBOS FC 360 atténuera les symptômes des maladies et les niveaux de mycotoxine dans le grain.

Maïs (de plein champ, doux et à éclater)			
CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Maïs (de plein champ, sucré et à éclater, y compris la production de semence)	Pour la répression des agents pathogènes de la pourriture de la tige (<i>Fusarium</i> spp., <i>Gibberella</i> spp. et <i>Colletotrichum</i> spp.), qui peuvent causer la verse.	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 555 ml/ha (200 g m.a./ha)	Une couverture complète est essentielle pour obtenir une efficacité optimale : l'équipement de pulvérisation doit être réglé de façon à permettre une bonne couverture des épis. Pour obtenir une excellente couverture des épis à l'aide de pulvérisateurs terrestres, il est recommandé d'utiliser des buses à jets dirigés. Les buses doivent être utilisées selon les recommandations de pression de pulvérisation du fabricant.
Note : PHOBOS FC 360 peut être appliqué avec un agent tensioactif non ionique, par exemple AgSurf ou Agral 90, à 0,125 % v/v. Ne pas appliquer un agent tensioactif non ionique avant l'apparition de la panicule. L'épandage doit être fait à l'aide d'équipement de pulvérisation terrestre ou aérien. Ne pas appliquer dans les 14 jours précédant la récolte. Ne pas faire plus d'une application par année.			

Arachides		
MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
<u>Transmis par le sol :</u> Répression de la pourriture des gousses (<i>Rhizoctonia solani</i>)	555 ml par hectare (200 g m.a./ha)	Maladies transmises par le sol Les applications de fongicides affichant un mode d'action différent doivent être faites avant et après les applications de PHOBOS FC 360, afin de décourager le développement de souches de champignons résistantes. Dans les champs ayant un historique de pourriture des gousses, ou lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie, appliquer PHOBOS FC 360 vers la mi-saison et poursuivre les applications de PHOBOS FC 360 à intervalles de 14 jours. PHOBOS FC 360 doit s'infiltrer avec la pluie ou l'eau d'irrigation jusqu'à la zone des racines ou des gousses afin de supprimer la pourriture des gousses causée par <i>Rhizoctonia solani</i> . La sécheresse réduira l'efficacité de PHOBOS FC 360 à supprimer la pourriture des gousses.

Arachides		
MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
<u>Foliaire :</u> Cercosporiose de l'arachide, sous forme précoce (<i>Cercospora arachidicola</i>) Répression de la rouille des feuilles (<i>Puccinia arachidis</i>)	486 à 555 ml par hectare (175-200 g m.a./ha)	Programme d'épandages contre les maladies foliaires Appliquer au taux prescrit dans le cadre de traitements préventifs. Faire jusqu'à 4 épandages à intervalles de 14 jours. Utiliser le taux le plus élevé lorsque les conditions favorisent une pression sévère exercée par la maladie et/ou lorsque des variétés moins résistantes à la maladie sont cultivées.
Note : Faire jusqu'à quatre (4) applications de PHOBOS FC 360 par année. Lorsqu'on plante des variétés affichant des degrés de résistance bons à excellents aux maladies foliaires, l'intervalle d'application peut être allongé jusqu'à 21 jours en l'absence de maladies transmises par le sol. Un maximum de 2,22 L par hectare de PHOBOS FC 360 peut être appliqué chaque année. Ne pas appliquer PHOBOS FC 360 dans les 14 jours précédant la récolte. Ne pas nourrir le bétail avec le foin ou les battages des cultures traitées ni permettre au bétail de paître dans les zones traitées. Les épandages doivent être faits à l'aide d'équipement de pulvérisation terrestre seulement.		

Cucurbitacées			
CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Cucurbitacées : Courge creuse, pastèque à confire, concombre, concombre des Antilles, gourde comestible (y compris la gourde hyotan, la courge- bouteille, la gourde hechima et l'okra chinois), momordique (y compris la pomme de merveille, la margose amère et la margose à piquants), melon véritable (y compris le cantaloup), citrouille, courge d'été, courge d'hiver (y compris la courge musquée, la courge hubbard, la courge poivrée et la courge spaghetti), pastèque	Moississure rose des neiges <i>Fusariose (Fusarium spp.)</i> Pourriture noire <i>(Didymella spp.)</i>	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 555 ml/ha (0,2 kg m.a./ha) (sol) Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 555 ml/ha (0,2 kg m.a./ha) (foliaire)	Appliquer PHOBOS FC 360 à la plantation avec de l'équipement d'irrigation au goutte-à-goutte / d'aspersion. Poursuivre avec des traitements foliaires durant la saison.
	Blanc (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 278 à 555 ml/ha (0,1 - 0,2 kg m.a./ha)	Pour la suppression du blanc, appliquer PHOBOS FC 360 comme traitement foliaire préventif dès que les tout premiers signes de la maladie se manifestent. Répéter les traitements à intervalles de 5 à 10 jours avec PHOBOS FC 360 ou un autre fongicide approuvé d'un groupe chimique différent.
Commentaires généraux : Faire jusqu'à une (1) application au sol et deux (2) applications foliaires de PHOBOS FC 360 au taux élevé, ou une application au sol et quatre (4) applications foliaires par année au taux faible. Répéter les applications foliaires à un intervalle de pulvérisation de 5 à 10 jours, si les conditions restent favorables au développement continu ou accru de la maladie. Les applications foliaires doivent être faites avec de l'équipement de pulvérisation terrestre seulement. Appliquer avec un agent tensioactif non ionique, AgSurf ou Agral 90 à 0,125 % v/v. Un maximum de 1,665 L/ha de PHOBOS FC 360 peut être appliqué par culture, par année. Ne pas appliquer dans les 7 jours précédant la récolte.			

Petits fruits			
CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Sous-groupe de petits fruits : aronie, bleuet en corymbe, bleuet nain, gabelle odorante, pimblina, cassis noir, gabelle rouge, baie de sureau, raisin d'ours, groseille à maquereau, camerise, baie de gaylussaquier, casseille, amélanche, airelle rouge, baie de salal, argouse, cultivars, variétés et/ou hybrides de ces cultures.	Répression de la tache septorienne (<i>Septoria</i> spp.)	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 417 ml/ha (150 g m.a./ha).	Appliquer PHOBOS FC 360 dès les premiers signes de la maladie. Une application supplémentaire peut être faite 10 à 14 jours plus tard si les conditions restent favorables au développement continu ou accru de la maladie.
	Répression de la rouille des feuilles (<i>Thekopsora minima</i>) et tache valdensinienne (<i>Valdensinia heterodoxa</i>) - bleuet seulement	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 528 ml/ha (190 g m.a./ha)	
	Pourriture sclérotique (<i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i>) - bleuet seulement	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 417 à 555 ml/ha (0,15 - 0,2 kg m.a./ha)	Débuter les applications au début de la floraison pour lutter contre la pourriture des fruits. Faire une deuxième application de PHOBOS FC 360 ou d'un autre fongicide approuvé 5 à 10 jours plus tard.
Commentaires généraux : Faire jusqu'à deux (2) applications de PHOBOS FC 360 par année . Les applications foliaires doivent être faites avec de l'équipement de pulvérisation terrestre seulement. Appliquer avec un agent tensioactif non ionique, par exemple AgSurf ou Agral 90 à 0,125 % v/v. Un maximum de 1 110 ml/ha de PHOBOS FC 360 peut être appliqué par culture, par année. Ne pas appliquer dans les 7 jours précédant la récolte.			

Petits fruits de plantes naines, à l'exception de la fraise

CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Sous-groupe des petits fruits de plantes naines, à l'exception de la fraise : raisin d'ours, myrtille, chicouté, canneberge, pain de perdrix, cultivars, variétés et/ou hybrides de ces cultures	Pourriture des fruits : (<i>Coleophoma empetri</i> , <i>Glomerella cingulata</i> , <i>Phyllosticta vaccinii</i> , <i>Phylospora vaccinii</i> <i>Allantophomopsis lycopodina</i> , <i>Allantophomopsis cytispora</i> , <i>Fusicoccum putrefaciens</i> , <i>Penicillium spp.</i> , <i>Phomopsis vaccinii</i> , <i>Colletotrichum acutatum</i> , <i>Colletotrichum coccodes</i>) Répression de la tache septorienne (<i>Septoria spp.</i>)(<i>Septoria spp.</i>)	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 486 ml/ha (0,175 kg m.a./ha) Adjuvant : Appliquer avec un agent tensioactif non ionique, par exemple AgSulf ou Agral 90 à 0,125 % v/v	Commencer les applications au début de la floraison pour lutter contre la pourriture des fruits. Faire une deuxième application du PHOBOS FC 360 ou d'un autre fongicide approuvé 5 à 10 jours plus tard.

Commentaires généraux : Faire jusqu'à deux (2) applications de PHOBOS FC 360 par année. Répéter les applications foliaires à un intervalle de pulvérisation de 5 à 10 jours, si les conditions restent favorables au développement continu ou accru de la maladie. Les applications foliaires doivent être faites avec de l'équipement de pulvérisation terrestre seulement. Un maximum de 972 ml/ha de PHOBOS FC 360 peut être appliqué par culture, par année. Ne pas appliquer dans les 45 jours précédant la récolte.

Le MODE D'EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne les utilisations décrites dans cette partie de l'étiquette, a été élaboré par des personnes autres que Vive Crop Protection Inc. dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Dans le cas de ces utilisations, Vive Crop Protection Inc. n'a pas complètement évalué la performance (efficacité) et/ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) du produit lorsqu'il est utilisé de la façon indiquée sur l'étiquette pour l'ensemble des conditions environnementales ou des variétés végétales. Avant d'appliquer le produit à grande échelle, l'utilisateur devrait faire un essai sur une surface réduite, dans les conditions du milieu et en suivant les pratiques courantes pour confirmer que le produit se prête à une application généralisée.

CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Tournesol, carthame	Pour la répression du flétrissement sclérotique (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 555 ml/ha (200 g m.a./ha)	Appliquer PHOBOS FC 360 lorsque la culture est au stade de 10 à 50 % du disque floral.
Note : PHOBOS FC 360 peut être appliqué avec un agent tensioactif non ionique, par exemple AgSurf ou Agral 90, à 0,125 % v/v. L'épandage peut être fait à l'aide d'équipement de pulvérisation terrestre ou aérien. Un maximum d'une application (555 ml/ha de PHOBOS FC 360) peut être fait sur le tournesol ou le carthame par année. Ne pas <i>appliquer</i> dans les 45 jours précédant la récolte. Si le PHOBOS FC 360 est appliqué sur une surface supérieure à 310 ha par jour, dans le tournesol et/ou le carthame, à l'aide d'un équipement muni d'une rampe d'aspersion en cabine ouverte, les préposés à l'application doivent également porter un respirateur approuvé par NIOSH/MSHA.			
CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Lin (graines de lin), crambe, bourrache	Pour la suppression de la pourriture sclérotique (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 417 à 486 ml/ha (150-175 g m.a./ha)	Appliquer PHOBOS FC 360 lorsque la culture est au stade de 20 à 50 % de floraison. On obtiendra une meilleure protection lorsque le fongicide est appliqué avant le début de la chute des pétales, ce qui permettra de protéger un nombre maximum de pétales. Le taux le plus élevé est recommandé pour les champs qui ont un historique de degré d'infestation élevé ou de forte densité des cultures. Une couverture uniforme des plantes est essentielle.
Note : PHOBOS FC 360 peut être appliqué avec un agent tensioactif non ionique, par exemple AgSurf ou Agral 90 à 0,125 % v/v. L'épandage peut être fait à l'aide d'équipement de pulvérisation terrestre ou aérien. Un maximum d'une application (486 ml/ha de PHOBOS FC 360) peut être fait par année. Ne pas appliquer dans les 36 jours précédant la récolte.			

CULTURE	MALADIE	TAUX	PÉRIODE D'APPLICATION
Betteraves à sucre	Pour la suppression des maladies foliaires : Cercosporiose (<i>Cercospora beticola</i>)	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 417 à 555 ml/ha (150 - 200 g m.a./ha)	Appliquer PHOBOS FC 360 dès les premiers signes de la maladie. Utiliser le taux le plus élevé et les intervalles plus courts lorsque les conditions favorisent un degré d'infestation élevé, ou lorsque des variétés moins résistantes à la maladie sont cultivées. Appliquer le taux prescrit de PHOBOS FC 360 dans 100 à 200 L d'eau par hectare lorsqu'on utilise un équipement d'application au sol. Répéter les applications à intervalles de 14 à 21 jours, selon le degré d'infestation. Utiliser l'intervalle d'épandage de 14 jours lorsque le degré d'infestation est normal à élevé et de 21 jours lorsque le degré d'infestation est faible.
	Pour la suppression des maladies transmises par le sol : Rhizoctone commun (<i>Rhizoctonia solani</i>)	Appliquer PHOBOS FC 360 à raison de 555 ml/ha (200 g m.a./ha)	Appliquer PHOBOS FC 360 entre le stade 4 feuilles et la fermeture des rangs. Appliquer le taux prescrit de PHOBOS FC 360 dans 50 à 100 L d'eau par hectare. Répéter les applications à intervalles de 21 jours.
Note : Trois applications au maximum (1 665 ml/ha de PHOBOS FC 360) peuvent être faites par année. Ne pas appliquer dans les 7 jours précédant la récolte. PHOBOS FC 360 peut être appliqué avec un agent tensioactif non ionique, par exemple AgSurf ou Agral 90, à 0,125 % v/v. Les épandages doivent être faits à l'aide d'équipement de pulvérisation terrestre ou aérien. PHOBOS FC 360 est un fongicide du groupe 3. Pour limiter le risque que se développe une résistance à la maladie, appliquer PHOBOS FC 360 en alternance avec un fongicide qui ne fait pas partie du groupe 3.			

Puisque ce produit n'est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les systèmes aquatiques, **NE PAS** l'utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatique. **NE PAS** contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets.

Application par pulvérisateur agricole: **NE PAS** appliquer lorsque la vitesse du vent est inférieure à 1 km/heure. Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales. **NE PAS** appliquer avec des pulvérisations plus fines que le calibre moyen de la classification de l'American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) S572 (572.1 à 572.3). La hauteur de la rampe doit être de 60 cm ou moins au-dessus de la culture ou du sol.

Application à l'aide d'une pulvérisation pneumatique: **NE PAS** appliquer lorsque la vitesse du vent est inférieure à 1 km/heure. Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales. **NE PAS** diriger le jet de pulvérisation au-dessus des plantes ciblées. Arrêter la pulvérisation par les buses extérieures au bout des rangs et aux rangs externes.

NE PAS appliquer lorsque la vitesse du vent dépasse 16 km/heure au site de traitement, tel que mesuré à l'extérieur du site, du côté face au vent.

Application par aéronef à pilotage conventionnel: **NE PAS** appliquer lorsque la vitesse du vent est inférieure à 1 km/heure. Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales. **NE PAS** appliquer lorsque la vitesse du vent dépasse 16 km/heure à hauteur de vol, au-dessus du site d'application. **NE PAS** appliquer avec des pulvérisations plus fines que le calibre moyen de la classification de l'American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) S572 (572.1 à 572.3). Réduire la dérive causée par les turbulences créées en bout d'aile de l'aéronef. L'espacement des buses le long de la rampe d'aspersion NE DOIT PAS dépasser 65 % de l'envergure des ailes ou du rotor.

Mélanges en cuve

Ce produit peut être mélangé avec des produits antiparasitaires homologués, dont les étiquettes permettent aussi les mélanges en cuve, à la condition que la totalité de chaque étiquette, y compris le mode d'emploi, les mises en garde, les restrictions, les précautions relatives à l'environnement et les zones tampons de pulvérisation, soit suivie pour chaque produit. Lorsque les renseignements inscrits sur les étiquettes des produits d'association divergent, il faut suivre le mode d'emploi le plus restrictif. Ne pas effectuer de mélanges en cuve avec des produits contenant le même principe actif, à moins que ces produits soient recommandés spécifiquement sur cette étiquette.

Dans certains cas, le mélange de produits antiparasitaires en cuve peut entraîner une diminution de l'efficacité antiparasitaire ou une augmentation des dommages à la culture hôte. L'utilisateur devrait communiquer avec Vive Crop Protection Inc. au 1-888-760-0187 pour demander des renseignements avant d'appliquer tout mélange en cuve qui n'est pas recommandé spécifiquement sur cette étiquette.

Zones Tampons de Pulvérisation :

Une zone tampon de pulvérisation N'EST PAS requise pour :

- les utilisations faisant appel à un équipement d'application portatif permises sur la présente étiquette,
- l'utilisation d'un pulvérisateur à écran de protection à profil bas, qui fait en sorte que la dérive de pulvérisation n'entre pas en contact avec les cultures, les fruits ou le feuillage,
- le trempage du sol.

Les zones tampons de pulvérisation spécifiées dans le tableau ci-dessous sont requises entre le point d'application directe et la bordure sous le vent la plus rapprochée des habitats terrestres sensibles (tels que les prairies, les zones forestières, les plantations brise-vent, les boisés, les haies, les zones riveraines et les arbustes), des habitats d'eau douce sensibles (comme les lacs, les rivières, les marécages, les étangs, les fondrières des prairies, les criques, les marais, les ruisseaux, les réservoirs et les terres humides) et les habitats estuariens/marins.

Méthode d'épandage	Culture	Zones tampons de pulvérisation requises (en mètres) pour la protection d'un :				
		Habitat aquatiques d'une profondeur de :				Habitat terrestre
		Moins de 1 m	1 à 3 m	Plus de 3 m		
Pulvérisateur agricole	Toutes les cultures indiquées	2	1	0		0
Pulvérisateur pneumatique	Petits fruits	Début de la croissance	25	15	4	1
		Fin de la croissance	15	5	2	1
Aérienne (voilure fixe et tournante)	Lin, crambe, bourrache officinale, soja	10	0	0		0
	Mais, carthame, tournesol	15	5	0		0
	Avoine	20	10	0		0
	Canola, moutarde orientale, colza, <i>Brassica carinata</i>	20	10	1		10
	Blé, orge	25	10	0		10
	Lentilles	30	10	0		15
	Betteraves à sucre	45	15	4		15
	Pois chiches	50	15	5		15

Lorsque les mélanges en cuve sont permis, consulter l'étiquette des produits d'association et respecter la zone tampon de pulvérisation la plus grande (la plus restrictive) indiquée pour chacun des produits utilisés dans le mélange en cuve, puis appliquer en utilisant le calibre de gouttelettes le plus gros (selon la classification de l'ASABE) parmi ceux indiqués sur l'étiquette des produits d'association.

Il est possible de modifier les zones tampons de pulvérisation associées à ce produit pour les technologies d'application conventionnelles selon les conditions météorologiques et la configuration du matériel de pulvérisation en utilisant le calculateur de zone tampon de pulvérisation dans la section Atténuation de la dérive du site Web Canada.ca.

Restrictions en matière de rotation :

Toute autre culture indiquée sur cette étiquette peut être semée dans les zones traitées dès qu'il est possible de le faire, d'un point de vue pratique, après la dernière application. En ce qui concerne les cultures non indiquées sur cette étiquette, ne pas ressemer dans les 30 jours suivant la dernière application.

Section 8 : Gestion de la résistance

Recommandations sur la gestion de la résistance :

Aux fins de la gestion de la résistance, PHOBOS FC 360 contient un fongicide au groupe 3. Toute population de champignons peut renfermer des individus naturellement résistants à PHOBOS FC 360 et à d'autres fongicides du

groupe 3. Il peut se produire une perte progressive ou complète d'efficacité lorsque ces fongicides sont appliqués à répétition sur les mêmes champs. Il peut également exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition d'une résistance aux fongicides :

- Utiliser en alternance avec des fongicides affichant un mode d'action différent de celui des fongicides du groupe 3, tous les 7 à 10 jours, après chaque épandage de PHOBOS FC 360.
- Ne pas faire plus que le nombre maximum d'épandages annuels indiqués pour chaque culture dans le MODE D'EMPLOI, dans le tableau de la section 7.
- Utiliser, si cet emploi est permis, des mélanges en cuve contenant des fongicides qui appartiennent à un groupe différent et qui sont efficaces contre les pathogènes ciblés.
- Utiliser les fongicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée contre les maladies qui privilégie les inspections sur le terrain, la consultation de données antérieures sur l'utilisation des pesticides et la rotation des cultures, et qui prévoit l'acquisition d'une résistance chez les plantes hôtes, les répercussions des conditions environnementales sur l'apparition des maladies, les seuils déclencheurs de maladie de même que l'intégration de pratiques culturales ou biologiques ou d'autres formes de lutte chimique.
- Le cas échéant, utiliser des modèles de prévision des maladies afin d'appliquer les fongicides au moment propice.
- Surveiller les populations fongiques traitées pour y déceler les signes éventuels de l'acquisition d'une résistance. Informer Vive Crop Protection Inc. en présence d'une baisse possible de sensibilité à PHOBOS FC 360 chez l'agent pathogène.
- Lorsque la maladie continue de progresser après le traitement avec ce produit, ne pas augmenter la dose d'application. Cesser d'employer le produit et opter, si possible, pour un autre fongicide ayant un site d'action différent.
- Communiquer avec les spécialistes ou les conseillers agricoles certifiés de la région pour obtenir des recommandations supplémentaires sur une culture ou un agent pathogène précis pour ce qui est de la gestion de la résistance aux pesticides et de la lutte intégrée.
- Pour obtenir davantage d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, communiquer avec Vive Crop Protection Inc. au 1-888-760-0187.

Section 9 : Mises en garde à l'application

APPLICATION TERRESTRE :

1. Utiliser de l'équipement de pulvérisation classique bien entretenu et calibré, qui offre une couverture appropriée et uniforme.
2. Appliquer PHOBOS FC 360 dans au moins 100 L d'eau/ha, à moins d'autres instructions dans le MODE D'EMPLOI (section 7).
3. Les tamis du pulvérisateur doivent comporter un maximum de 50 mailles.
4. S'assurer que la conduite de dérivation se décharge au fonds du réservoir pour réduire la formation de mousse.
5. Maintenir la pression à au moins 275 kPa pour assurer une bonne couverture et une bonne pénétration foliaire.
6. Les zones tampons de pulvérisation provinciales qui sont supérieures aux zones tampons de pulvérisation indiquées

dans le MODE D'EMPLOI (section 7) doivent être respectées.

7. Si la solution de pulvérisation demeure dans le réservoir jusqu'au lendemain ou pendant de longues périodes de temps au cours de la journée, bien agiter avant d'appliquer.

APPLICATION PAR VOIE AÉRIENNE - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

1. Épandre seulement avec un avion ou un hélicoptère réglé et étalonné pour être utilisé dans les conditions atmosphériques de la région et selon les taux et directives figurant sur cette étiquette.
2. Les précautions à prendre ainsi que les directives et taux d'épandage à respecter sont propres au produit. Lire attentivement l'étiquette et s'assurer de bien la comprendre avant d'ouvrir le contenant. Utiliser seulement les quantités spécifiées pour l'épandage aérien qui sont indiquées sur l'étiquette. Si, pour l'utilisation prévue du produit, aucun taux d'épandage aérien ne figure sur l'étiquette, on ne peut utiliser ce produit, et ce, quel que soit le type d'appareil aérien disponible. Pour toute question, appeler le titulaire en composant le 1-888-760-0187. Pour obtenir des conseils techniques, contacter le distributeur ou un conseiller agricole provincial ou territorial.
3. S'assurer que l'épandage est uniforme. Afin d'éviter que le produit ne soit épandu de façon non uniforme (épandage en bandes, irrégulier ou double), utiliser des marqueurs appropriés.
4. Appliquer PHOBOS FC 360 dans au moins de 50 L d'eau/ha.
5. Pour que la couverture et la distribution soient appropriées et pour réduire la dérive de pulvérisation, s'assurer que la largeur d'épandage et la grosseur des gouttelettes conviennent et que la vitesse du vent est faible.
6. Utiliser des marqueurs mécaniques seulement.

APPLICATION PAR VOIE AÉRIENNE - MISES EN GARDE CONCERNANT L'UTILISATION :

1. Épandre seulement quand les conditions météorologiques à l'endroit traité permettent une couverture complète et uniforme de la culture visée.
2. Les conditions favorables spécifiques à l'épandage aérien décrites dans le Guide national d'apprentissage – Application de pesticides par aéronef, développé par le Comité fédéral, provincial et territorial sur la lutte antiparasitaire et les pesticides doivent être présentes.

APPLICATION PAR VOIE AÉRIENNE - MISES EN GARDE CONCERNANT L'OPÉRATEUR ANTIPARASITAIRE :

1. **NE PAS** permettre au pilote de mélanger les produits chimiques qui seront embarqués à bord de l'appareil. Il peut toutefois charger des produits chimiques prémélangés contenus dans un système fermé.
2. Il serait préférable que le pilote puisse établir une communication à chaque emplacement traité au moment de l'épandage.
3. Le personnel au sol de même que les préposés au mélange et au chargement doivent porter des gants résistant aux produits chimiques, des combinaisons et des lunettes ou un écran facial les protégeant contre les produits chimiques durant le mélange des produits, le chargement, le nettoyage et les réparations. Lorsque les précautions qu'on recommande à l'opérateur de prendre sont plus strictes que les recommandations générales qui figurent sur les étiquettes pour épandage avec pulvérisateur terrestre, suivre les précautions les plus rigoureuses.
4. Tout le personnel sur le lieu de travail doit se laver les mains et le visage à grande eau avant de manger et de boire.
5. Les vêtements protecteurs, le cockpit de l'avion et les cabines des véhicules doivent être décontaminés régulièrement.
6. Lire attentivement l'étiquette au complet et bien la comprendre avant d'ouvrir le contenant. Pour toute question, appeler le titulaire en composant le 1-888-760-0187. Pour obtenir des conseils techniques, contacter le distributeur ou un conseiller agricole provincial ou territorial.

Section 10 : Instructions de mélange

Instructions de mélange :

PHOBOS FC 360 doit être appliqué avec de l'équipement propre et bien calibré. Avant d'ajouter PHOBOS FC 360 dans le réservoir du pulvérisateur, s'assurer que ce dernier est bien propre.

- Verser la moitié du volume d'eau nécessaire dans le réservoir de pulvérisation ou de mélange et commencer l'agitation.
- Ajouter la quantité requise de PHOBOS FC 360 dans le réservoir, y compris tous les partenaires de mélange en cuve autorisés, en suivant l'ordre de mélange WALES. Finir de remplir d'eau jusqu'à l'obtention du volume total nécessaire.
- Maintenir l'agitation durant le mélange et la pulvérisation.
- PHOBOS FC 360 doit être bien dispersé avant l'ajout de l'agent tensioactif non ionique. On recommande d'utiliser PHOBOS FC 360 avec un agent tensioactif non ionique, comme Agral 90 ou AgSurf, à 0,125 % vol/vol (1,25 L/1000 L d'eau).

Section 11 : Délais d'attente avant la récolte

Culture	DS (jours)
Blé (de printemps, dur et d'hiver), orge, avoine, millet perlé, millet rond, seigle, triticale, téosinte, sarrasin	30
Canola, colza, moutarde orientale, <i>Brassica carinata</i> , lin, crambe, bourrache officinale	36
Maïs (de plein champ, sucré, à éclater)	14
Pois chiches, lentilles	7
Soja	20
Betterave à sucre	7
Petits fruits	7
Arachides	14
Cucurbitacées	7
Petits fruits de plantes naines (sauf les fraises), carthame, tournesol	45

Section 12 : Avis

AVIS À L'UTILISATEUR :

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Vive Crop Protection Inc.
6275 Northam Dr., Suite 1
Mississauga, ON
L4V 1Y8

Phobos est une marque déposée de Vive Crop Protection Inc.

Tous les autres produits mentionnés sont des marques de commerce de leurs entreprises respectives.

