

PESTICIDA DE USO RESTRINGIDO

DEBIDO A LA TOXICIDAD EN INVERTEBRADOS, MAMÍFEROS Y ORGANISMOS ACUÁTICOS NO OBJETIVO PARA LA VENTA AL POR MENOR Y USO SOLO POR APLICADORES CERTIFICADOS O PERSONAS QUE ESTÉN BAJO SU DIRECTA SUPERVISIÓN Y ÚNICAMENTE PARA LOS USOS DETALLADOS EN LA CERTIFICACIÓN DEL APLICADOR CERTIFICADO.

ABAMECTINA	GRUPO	6	INSECTICIDA
------------	-------	---	-------------



Ingrediente activo: **Por peso**

Abamectina (Núm. CAS 71751-41-2) 8.0 %

Otros ingredientes: 92.0 %

TOTAL 100.0 %

Este producto contiene 0.7 libras de ingrediente activo por galón

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
WARNING / AVISO

Si usted no entiende la etiqueta, consiga que alguien se la explique en detalle.
(If you do not understand the label, find someone to explain it to you in detail.)

El usuario debe tener esta etiqueta en el momento de la aplicación.
Consulte el folleto en el interior para ver instrucciones de uso e información preventiva adicional.

Núm. de registro de la EPA 89118-10

Contenido neto: 2.5 galones



Vive Crop Protection Inc.
500 Westover Dr. #10198
Sanford, NC 27330
1-888-760-0187

PRIMEROS AUXILIOS	
Si se ingiere:	• Llame de inmediato a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener instrucciones para el tratamiento. • Si la persona puede tragar, haga que beba un vaso de agua lentamente. • No induzca el vómito, a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. • No administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.
Si se inhala	• Traslade a la persona a un lugar con aire fresco. • Si la persona no está respirando, llame al 911 o a una ambulancia, y luego administre respiración artificial, preferiblemente de boca a boca, si es posible. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener instrucciones para el tratamiento.
Si cae en la piel o en la ropa	• Retire la ropa contaminada. • Enjuague la piel inmediatamente con agua abundante durante 15 a 20 minutos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener instrucciones para el tratamiento.
Si entra en contacto con los ojos	• Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y cuidadosamente con agua, durante 15 a 20 minutos. • Si utiliza lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener instrucciones para el tratamiento.
Nota para el médico: Los signos iniciales de intoxicación incluyen dilatación de las pupilas, pérdida de coordinación muscular y temblores musculares. La toxicidad posterior a la ingestión accidental de este producto puede minimizarse con la administración rápida de adsorbentes químicos (por ejemplo, carbón activado). Si la toxicidad debida a la exposición ha progresado hasta provocar vómitos intensos, debe medirse el grado del desequilibrio de líquidos y electrolitos resultante. Debe aplicarse terapia apropiada para reemplazo parenteral de líquidos, además de otras medidas auxiliares (como mantener los niveles de presión arterial y el funcionamiento respiratorio adecuado) conforme a lo indicado por los signos clínicos, los síntomas y las mediciones. En casos graves, las observaciones deben continuarse por lo menos durante varios días, hasta que el estado clínico sea estable y normal. Dado que se cree que la abamectina aumenta la actividad del GABA en animales, probablemente es prudente evitar los medicamentos que aumentan la actividad del GABA (barbitúricos, benzodiazepinas, ácido valproico) en pacientes con exposición potencialmente tóxica a la abamectina.	
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA Cuando llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. En caso de una emergencia médica o química, comuníquese con Chemtel Inc. en Norteamérica al 1-800-255-3924 o a nivel internacional al +1-813-248-0585.	

DECLARACIONES PREVENTIVAS

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

Aviso. Puede ser letal si se ingiere. Puede ser letal si se inhala. No inhale la niebla pulverizada. Nocivo si se absorbe por la piel. No permita que caiga en los ojos, la piel o la ropa.

Equipo de protección personal (PPE)

Los aplicadores y otros manipuladores de pesticidas (plaguicidas) deberán utilizar:

- Camisas de manga larga y pantalones largos;
- Zapatos con medias;
- Guantes resistentes a productos químicos hechos de laminados impermeables, goma de butilo ≥ 14 mil, goma de nitrilo ≥ 14 mil, goma de neopreno ≥ 14 mil, caucho natural ≥ 14 mil, polietileno, cloruro de polivinilo (PVC) ≥ 14 mil o Viton ≥ 14 mil.
- Utilice como mínimo, un respirador con mascarilla de filtrado para partículas aprobado por NIOSH con cualquier filtro R o P, O un respirador de filtro mecánico para polvos y partículas de material elastomérico aprobado por NIOSH con cualquier filtro R o P, O un respirador purificador con de aire motorizado aprobado por NIOSH con filtros HE.

Deseche la ropa y otros materiales absorbentes que se hayan mojado o contaminado demasiado con el concentrado de este producto. No vuelva a utilizarlos. Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza/mantenimiento del equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés). En caso de no existir dichas instrucciones de lavado, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el PPE separadamente de otra ropa para lavar.

Declaraciones de controles de ingeniería

Cuando los aplicadores y otros manipuladores usan sistemas cerrados o aplicadores con cabina cerrada de una forma que cumpla los requisitos detallados en el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola (WPS, por sus siglas en inglés) para pesticidas agrícolas [40 CFR 170.240(d)(4-6)], los requisitos de PPE para los aplicadores y otros manipuladores pueden reducirse o modificarse, tal como se especifica en el WPS.

IMPORTANTE: Cuando se usa equipo de protección personal (PPE) reducido porque se utiliza un sistema cerrado, los manipuladores deben recibir todo el PPE especificado anteriormente para “aplicadores y otros manipuladores” y tener este PPE disponible para su uso inmediato en caso de emergencia, tal como un derrame o ruptura del equipo.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

Los usuarios deben hacer lo siguiente:

- Lavarse las manos después de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle o tabaco, o usar el sanitario.
- Quitarse la ropa de inmediato si entra pesticida. Luego deben lavarse muy bien y ponerse ropa limpia.
- Quitarse el PPE de inmediato después de la manipulación de este producto. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Tan pronto sea posible, lávese muy bien y póngase ropa limpia.

PELIGROS AMBIENTALES

Este pesticida es tóxico para los peces y la vida silvestre.

No lo aplique directamente en el agua, en áreas donde haya aguas superficiales o áreas intermareales por debajo del límite medio de la marea alta. No lo aplique cuando las condiciones meteorológicas favorezcan su deriva desde las áreas objetivo. No contamine cuerpos de agua cuando deseche las aguas de lavado del equipo o aguas de enjuague.

Este producto es altamente tóxico para las abejas que estén expuestas al tratamiento directo en cultivos en floración o malezas. No aplique este producto ni permita su deriva hacia cultivos en floración o malezas si hay abejas visitando el área de tratamiento.

El uso de este producto puede representar un riesgo para especies amenazadas y en peligro de extinción de anfibios, crustáceos (incluidos camarones de agua dulce) e insectos. Todos los usos de este producto en California deben cumplir con las recomendaciones del Proyecto de Especies en Peligro de Extinción de California. Antes de usar este producto en California, consulte al comisionado de agricultura de su condado para determinar las limitaciones de uso aplicables en su región.

RECOMENDACIONES PARA CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES

Este producto puede afectar la calidad de cuerpos de agua superficiales debido a escorrentías de aguas pluviales. Esto es especialmente notable en suelos con poco drenaje y suelos con un nivel freático poco profundo. Este producto está clasificado con un potencial medio para llegar tanto a cuerpos de agua superficiales como a sedimento acuáticos por escorrentía, durante varias semanas después de su aplicación. Una franja de vegetación nivelada y bien mantenida entre las áreas donde se utiliza este producto y cuerpos de agua superficiales tales como estanques, ríos y manantiales reducirá el posible movimiento de la abamectina hacia aguas de escorrentía y sedimentos. Las escorrentías de este producto pueden reducirse al evitar aplicaciones cuando se pronostiquen lluvias en un plazo de 48 horas.

PREVENCIÓN DE ESCORRENTÍA

Para proteger el ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra hacia desagües pluviales, zanjas de drenaje, cunetas o cuerpos de agua superficiales. Aplicar este producto cuando el tiempo esté tranquilo y no se pronostique lluvia para las próximas 24 horas ayudará a asegurarse de que el pesticida no se arrastrará fuera del área tratada debido al viento o la lluvia. Lavar el equipo de aplicación dentro del área tratada ayudará a evitar escorrentías a cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

PELIGROS FÍSICOS O QUÍMICOS

No lo mezcle con agentes oxidantes, ni permita que entre en contacto con ellos. Puede ocurrir una reacción química peligrosa.

INSTRUCCIONES DE USO

PESTICIDA DE USO RESTRINGIDO

El uso de este producto de forma contraria a lo indicado en su etiqueta constituye una infracción de la ley federal.

REQUISITOS PARA USO AGRÍCOLA

No aplique este producto de una forma que entre en contacto con los trabajadores u otras personas, ya sea de forma directa o por deriva. Solo los aplicadores y otros manipuladores protegidos pueden estar en el área durante la aplicación. Para conocer los requisitos específicos para su estado o tribu, consulte la agencia responsable de la regulación de pesticidas.

Utilice este producto solo de acuerdo con su etiqueta y el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola (WPS), 40 CFR Parte 170. Esta ley contiene los requisitos para la protección de los trabajadores agrícolas en granjas, bosques, viveros e invernaderos, y para las personas que manipulan pesticidas agrícolas. Contiene requisitos para la capacitación, descontaminación, notificación y asistencia de emergencia. También contiene instrucciones específicas y excepciones relacionadas con las indicaciones en esta etiqueta acerca del equipo de protección personal, los intervalos de ingreso restringido y las notificaciones para los trabajadores. Los requisitos en este cuadro se aplican únicamente a los usos de este producto que están cubiertos por el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola (WPS, por sus siglas en inglés).

No ingrese ni permita el ingreso de trabajadores a las áreas tratadas durante el intervalo de acceso restringido (REI, por sus siglas en inglés) de 12 horas

Excepciones:

- Si el producto se inyecta o se incorpora en el suelo, el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola permite, bajo ciertas circunstancias, que los trabajadores entren al área tratada en caso de no haber contacto alguno con todo lo que se trató.
- No debe ingresar ni permitir que los trabajadores ingresen al área tratada para descortezar vides, mover pitones y atar vides durante el intervalo de acceso restringido (REI) de 4 días.

Para el acceso anticipado a áreas tratadas de acuerdo con el Estándar para la Protección del Trabajador Agrícola que, además, involucre el contacto con material tratado, como plantas, tierra o agua, use lo siguiente:

- Overol.
- Zapatos con medias.
- Guantes resistentes a productos químicos hechos de laminados impermeables, goma de butilo ≥ 14 mil, goma de nitrilo ≥ 14 mil, goma de neopreno ≥ 14 mil, caucho natural ≥ 14 mil, polietileno, cloruro de polivinilo (PVC) ≥ 14 mil o Viton ≥ 14 mil.

Si no se siguen las indicaciones y precauciones de esta etiqueta pueden producirse daños en el cultivo, un control deficiente de plagas o residuos ilegales.

RESTRICCIONES DEL PRODUCTO

Restricciones de uso

- No usar para tratar plantas cultivadas para su trasplante. Este producto no debe ser usado por productores de plantas para trasplante comercial en viveros, instalaciones de propagación vegetativa o invernaderos con plantas cultivadas para trasplante.
- No usar para tratar cultivos producidos en invernaderos para cosecha, excepto cuando se especifique en la sección de esta etiqueta correspondiente a usos en cultivos específicos.
- No usar en jardines residenciales ni en zonas residenciales.
- No está permitida su aplicación aérea en el estado de Nueva York.
- Para evitar residuos ilegales al aplicar mediante rociado aéreo, Averland FC SIEMPRE DEBE aplicarse con un rociado adyuvante humectante, propagador o penetrante que no sea fitotóxico ni activador iónico, o con un aceite hortícola (no un aceite para dormancia). Consulte la sección “Instrucciones de aplicación y mezclado” para ver más detalles.

Restricciones en cultivos rotativos

Este producto no tiene restricciones para su uso en cultivos rotativos. Las áreas tratadas con Averland FC pueden usarse para plantar cualquier cultivo en cuanto sea práctico, después de la última aplicación.

INSTRUCCIONES GENERALES

Averland FC contiene el ingrediente activo abamectina en una formulación concentrada con suspensión optimizada que es compatible con los fertilizantes líquidos. Averland FC provee actividad contra muchos importantes nematodos parásitos de los cultivos, así como contra los insectos y ácaros indicados. Averland FC se mezcla bien con fertilizantes líquidos, agua dura, micronutrientes y otros productos protectores de cultivos. Averland FC puede aplicarse mediante quimigación con aspersores para suprimir trips. Averland FC como tratamiento en el surco provee supresión de los nematodos.

Control de resistencia

Averland FC contiene el ingrediente activo abamectina, que es un INSECTICIDA/ACARICIDA/NEMATICIDA DEL GRUPO 6 y es eficaz contra una gama de nematodos, ácaros e insectos.

Se sabe que algunas especies de insectos, ácaros o nematodos pueden desarrollar resistencia a productos que se usen repetidamente para control. Como el desarrollo de resistencia no se puede predecir, el uso de este producto debería ajustarse a las estrategias de control de resistencia definidas para el área de uso. Consulte con las universidades o autoridades agrícolas estatales o locales para obtener más detalles.

Para controlar la resistencia, Averland FC contiene un insecticida/acaricida/nematicida del Grupo 6. Todas las poblaciones de insectos, ácaros o nematodos pueden contener especímenes que sean inherentemente resistentes a Averland FC y a otros insecticidas/acaricidas/nematicidas del Grupo 6. Los especímenes resistentes eventualmente pueden prevalecer en la población de insectos, ácaros o nematodos si este Grupo de insecticidas/acaricidas/nematicidas se usa de forma repetida en los mismos campos. Se deben seguir estrategias de control de resistencia adecuadas.

Si se desarrolla resistencia a este producto en su área, este producto u otros productos con medios de acción similares pueden no brindar un control adecuado. Si el desempeño deficiente no puede atribuirse a una aplicación incorrecta o a condiciones meteorológicas extremas, podría existir una variedad resistente de insecto o ácaro. Si tiene dificultades con el control y la resistencia es una causa razonable, consulte de inmediato al representante de la compañía en su localidad o a su asesor agrícola para encontrar el mejor método alternativo de control para su área.

Para retrasar la resistencia al insecticida/acaricida/nematicida, tome las siguientes medidas:

- Alterne el uso de Averland FC u otros insecticidas/acaricidas/nematicidas del Grupo 6 dentro de una estación de crecimiento, o entre diferentes estaciones de crecimiento, con diferentes grupos que controlen las mismas plagas.
- Use mezclas en tanque con insecticidas/acaricidas/nematicidas de grupos diferentes que sean igualmente eficaces para las plagas objetivo, cuando se permita ese tipo de uso. No utilice la misma mezcla repetidamente para la misma población de plagas. Tenga en cuenta cualquier problema conocido de resistencia cruzada (para las plagas objetivo) entre los componentes individuales de una mezcla. Además, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones proporcionadas por el Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticidas (IRAC, por sus siglas en inglés):
- Los insecticidas individuales que se elijan para usar en las mezclas deben ser altamente eficaces y se deben aplicar según las dosis que cada uno tenga registrada para su uso contra las especies objetivo.
- Las mezclas con componentes que tengan la misma clasificación de modo de acción de IRAC no se recomiendan para el control de resistencia de los insectos.
- Al usar mezclas, tenga en cuenta los problemas conocidos de resistencia cruzada para las plagas objetivo entre los componentes individuales.
- Las mezclas serán menos eficaces si ya se está desarrollando resistencia a uno o ambos ingredientes activos, pero aún ofrecerán beneficios para el control de las plagas.
- Los beneficios de control de resistencia de insectos de una mezcla de insecticidas son mayores si los dos componentes tienen períodos similares de actividad insecticida residual. Las mezclas de insecticidas con diferentes períodos de actividad insecticida residual pueden ofrecer un beneficio de control de resistencia de insectos solo por el período en el que ambos insecticidas estén activos.
- Adopte un programa de control de plagas integrado para el uso de insecticidas/acaricidas/nematicidas que incluya exploración, que use información histórica relacionada con el uso de pesticidas, rotación de cultivos, mantenimiento de registros y que considere aspectos culturales, biológicos y otras prácticas de control de productos químicos.
- Después de la aplicación, monitoree la supervivencia inesperada de la plaga objetivo. Si el nivel de supervivencia indica la presencia de resistencia, consulte con los especialistas de la universidad local o con un asesor de control de plagas certificado.
- Comuníquese con su especialista de extensión local o con asesores de cultivos certificados para obtener recomendaciones adicionales sobre el control de resistencia de pesticidas o el manejo integral de plagas (IPM, por sus siglas en inglés) para los problemas específicos del sitio y de las plagas en su área.
- Para obtener más información o para informar una sospecha de resistencia, comuníquese con Vive Crop Protection llamando al 1-888-760-0187. También puede comunicarse con el distribuidor del pesticida o con el especialista de extensión universitaria para reportar la resistencia.

Mantener la susceptibilidad a estas clases de productos químicos

- Evite usar exclusivamente insecticidas/acaricidas/nematicidas del Grupo 6 para controlar durante toda la temporada a las especies de insectos o ácaros con más de una generación por temporada de cultivo.
- En el caso de especies de insectos, ácaros o nematodos con generaciones sucesivas o superpuestas, aplique Averland FC u otros insecticidas/acaricidas/nematicidas del Grupo 6 con una estrategia de “períodos de tratamiento”. Un período de tratamiento es un período de tiempo que se define por el estado de desarrollo del cultivo o la biología de las plagas en cuestión. Dentro del período de tratamiento, y dependiendo de la duración de la actividad residual, pueden hacerse aplicaciones únicas o consecutivas (tratamiento de semillas, tierra, hojas, a menos que se especifique lo contrario) del insecticida/acaricida/nematicida del Grupo 6. No exceda la cantidad máxima de Averland FC permitida por año.
- Después de un período de tratamiento con insecticidas/acaricidas/nematicidas del Grupo 6, alterne a un período de tratamiento con productos eficaces que tengan un medio de acción diferente antes de hacer aplicaciones adicionales de insecticidas/acaricidas/nematicidas del Grupo 6.
- La rotación de períodos de tratamiento, junto con otras prácticas de IPM para el cultivo y el área de uso, se considera una estrategia eficaz para prevenir o retrasar la capacidad de una plaga para desarrollar resistencia a estos tipos de sustancias químicas.
- Si se sospecha que existe resistencia, no vuelva a aplicar Averland FC ni otros insecticidas/acaricidas/nematicidas del Grupo 6.

Otras prácticas de control de la resistencia de los insectos (IRM)

- Incorporar técnicas de IPM en su programa de control de insectos, ácaros o nematodos.
- Monitorear las poblaciones tratadas de insectos o ácaros para determinar la pérdida de eficacia en el campo.
- Usar mezclas en tanque o mezclas previas con insecticidas/acaricidas/nematicidas de un grupo de acción con objetivo diferente, mientras todos los productos en cuestión estén registrados para el mismo cultivo y se apliquen en cantidades eficaces.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y MEZCLADO

Averland FC es una formulación en suspensión concentrada. Agítelo bien antes de medirlo o verterlo. Como la mayoría de las formulaciones en suspensión concentrada, Averland FC se espesará después de permanecer en la misma posición por largos períodos de tiempo. Averland FC volverá a convertirse en un líquido de flujo fácil después de agitarlo brevemente.

Averland FC se disuelve uniformemente en fertilizantes líquidos y productos micronutrientes sin dilución previa con agua. Sin embargo, debido a la amplia variabilidad en la composición y la consistencia, se recomienda realizar una prueba de jarras.

El insecticida Averland FC está diseñado para aplicaciones en planta y foliares, y se debe diluir fertilizante líquido o agua antes de la aplicación. Consulte las Instrucciones de Uso Específicas para Cultivos para ver las instrucciones para el control o la eliminación de plagas.

No use filtros de boquillas con una designación de malla superior a 50.

Asegúrese de que el equipo esté completamente limpio y calibrado adecuadamente antes de la aplicación, y completamente limpio después de la aplicación.

Averland FC puede mezclarse directamente con agua o fertilizante inicial líquido o popup. Llene el tanque hasta la mitad con agua o fertilizante líquido y empiece a agitar. Añada Averland FC conforme a la dosis de uso para el cultivo y llene el tanque hasta el volumen previsto. Al verterlo, evite que Averland FC entre en contacto directo con la pared del contenedor, para lograr una mejor distribución. Mézclelo bien para dispersar y suspender el Averland FC. Siga agitando durante la aplicación y en los tanques intermedios o de almacenamiento.

No prepare más mezcla de la que sea necesaria para el tratamiento. Para obtener resultados óptimos, úselo de inmediato después de mezclar. Si la mezcla se asienta, agítela y obsérvela para asegurarse de que esté bien mezclada nuevamente antes de la aplicación.

Debe elegir una dosis de aplicación dentro de los rangos de la etiqueta para el cultivo que se tratará, en función de la presión prevista de plagas. Esto se puede determinar por datos históricos y exploración del campo, y si se espera que las condiciones meteorológicas sean favorables. Use las dosis más bajas cuando se espera que la presión prevista de plagas sea baja y use dosis mayores cuando se espera que sea alta. Las dosis de aplicación generalmente son más altas en los climas áridos.

A menos que se indique lo contrario en etiquetas complementarias registradas, siga las instrucciones de uso en cada sección de grupo de cultivos.

Tabla de resumen de dosis de aplicación			
onzas fluidas de producto/acre	lb de abamectina/acre	Acres tratados por galón de producto	Acres tratados por recipiente de 2.5 galones de producto
1.00	0.005	128	320
1.25	0.007	102	256
1.75	0.010	73	183
2.25	0.012	57	142
2.5	0.014	51	128
3.5	0.019	37	91
4.0	0.022	32	80
4.25	0.023	30	75
5.5	0.030	23	58
6.0	0.033	21	53
10.0	0.055	13	32
15.0	0.082	9	21

Requisitos de adyuvantes

Para evitar residuos ilegales al aplicar mediante rociado aéreo, Averland FC **SIEMPRE DEBE** aplicarse con un rociado adyuvante humectante, propagador o penetrante que no sea fitotóxico ni activador iónico, o con un aceite hortícola (no un aceite para dormancia) cuando se especifique en las instrucciones para el cultivo específico. Los adyuvantes humectantes, propagadores o penetrantes que no son activadores iónicos incluyen:

- surfactantes no iónicos (NIS) que tengan al menos 75% de agente superficial activo,
- concentrados de aceite para cultivos (COC),
- concentrados de aceites vegetales (VOC),
- aceites de semilla metilados (MSO),
- organosilicios (OS) que tengan al menos 15% de emulsionantes/surfactantes,
- mezclas de estos adyuvantes rociados de tipo activador no iónicos.

Los adyuvantes rociados deben ser compatibles con Averland FC y deben usarse en las concentraciones especificadas en las instrucciones de uso en la etiqueta del producto adyuvante para el cultivo objetivo, a menos que se incluyan instrucciones más específicas en la sección de instrucciones de uso para un cultivo individual en esta etiqueta. **No**

use adyuvantes de tipo aglutinante o adherente, ya que esos tipos de adyuvantes pueden reducir el movimiento translaminar del ingrediente activo hacia el interior de la planta.

Aplicación de mezclas en tanque

Es responsabilidad del usuario del pesticida asegurarse de que todos los productos estén registrados para el uso previsto. Lea y siga las instrucciones, limitaciones y restricciones vigentes para usar en todas las etiquetas de productos que formen parte de la mezcla del tanque. Los usuarios deben seguir las instrucciones de uso y las declaraciones preventivas más restrictivas de cada producto en la mezcla del tanque.

Averland FC puede aplicarse en mezclas en tanque con adyuvantes, micronutrientes y otros productos aprobados para su uso en cultivos registrados. Antes del uso, se deben realizar pruebas de jarras (u otros métodos similares) para garantizar la compatibilidad entre los productos.

Cuando se use un adyuvante, se recomienda usar uno que cumpla con los estándares de certificación de adyuvantes del Consejo de Productores y Distribuidores de Agrotecnología (CPDA, por sus siglas en inglés).

Recomendación del orden de adición para mezclado en tanque

Esta es la recomendación general para el orden de adición. Siempre siga las instrucciones sobre el orden específico de adición en todas las etiquetas de mezclado en tanque del otro producto. Antes del uso, se deben realizar pruebas de jarras (u otros métodos similares) para garantizar la compatibilidad en el orden de adición entre los productos.

1. Llene el tanque hasta una tercera parte o la mitad de su capacidad con el diluyente de la mezcla (agua, fertilizante líquido, etc.).
2. Comience a agitar el tanque antes de agregar cualquier producto adicional a la mezcla del tanque.
3. Agregue agentes de compatibilidad, antiespumantes o acondicionadores de agua.
4. Agregue productos en paquetes solubles en agua y permita que se disuelvan por completo.
5. Agregue polvos humectables/autosuspensibles (DC, DS, GR, SG, SP).
6. Agregue suspensiones en microcápsulas (ME).
7. Agregue líquidos y productos solubles (SC, SU), incluido Averland FC.
8. Agregue concentrados emulsionables (EC).
9. Agregue los adyuvantes.

Procedimiento de prueba de jarras

Pruebe los diferentes productos de mezcla, lo que incluye adyuvantes, para detectar la compatibilidad de mezclado mediante el uso de una prueba de jarras estándar u otros métodos similares, y para comprobar la seguridad de los cultivos antes del uso.

Se recomienda el siguiente procedimiento de prueba de jarras para evaluar la compatibilidad. Siguiendo las instrucciones específicas del producto en cuanto al orden de adición, vierta las proporciones recomendadas de productos en un contenedor adecuado, mezcle por completo y permita que se estabilice por al menos veinte (20) minutos. Si la combinación permanece mezclada, o se puede volver a mezclar fácilmente, la mezcla se considera físicamente compatible. Si la combinación no permanece mezclada y no se puede volver a mezclar fácilmente, los productos no son físicamente compatibles y no deben mezclarse juntos en el tanque.

No prepare más mezcla de la que sea necesaria para el tratamiento. Para obtener resultados óptimos, úselo de inmediato después de mezclar. Si la mezcla se asienta, agítela y obsérvela para asegurarse de que esté bien mezclada nuevamente antes de la aplicación.

INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN EN LAS PLANTAS

Averland FC puede mezclarse con fertilizante inicial o popup líquido para usarse en la planta, como rocío o goteo en el surco. Consulte las instrucciones específicas de uso de esta etiqueta para determinar si la aplicación en la planta se indica para un determinado cultivo y plaga. Siga las recomendaciones de la etiqueta respecto a la dosis del fertilizante líquido y la seguridad de las semillas.

Como con cualquier otro insecticida, se debe tener cuidado de minimizar la exposición de las abejas y otros polinizadores al Averland FC.

Dosis de aplicación en el surco durante la siembra (onzas fluidas por 1000 pies de surco)										
Onzas fluidas de producto por acre	Espaciado promedio entre hileras (pulgadas)									
	15 pulg.	20 pulg.	22 pulg.	24 pulg.	30 pulg.	32 pulg.	34 pulg.	36 pulg.	38 pulg.	40 pulg.
3.5	0.10	0.13	0.15	0.16	0.20	0.21	0.23	0.24	0.25	0.27
4.0	0.11	0.15	0.17	0.18	0.23	0.24	0.26	0.28	0.29	0.31
4.5	0.13	0.17	0.19	0.21	0.26	0.28	0.29	0.31	0.33	0.34
5.0	0.14	0.19	0.21	0.23	0.29	0.31	0.33	0.34	0.36	0.38
5.5	0.16	0.21	0.23	0.25	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40	0.42
6.0	0.17	0.23	0.25	0.28	0.34	0.37	0.39	0.41	0.44	0.46
10.0	0.29	0.38	0.42	0.46	0.57	0.61	0.65	0.69	0.73	0.77
15.0	0.43	0.57	0.53	0.69	0.86	0.92	0.98	1.03	1.09	1.15
IMPORTANTE: La dosis de aplicación lineal afecta la duración y el grado de control en gran medida. Las dosis de aplicación lineal en las partes sombreadas de la tabla anterior podrían no ofrecer protección temprana a la semilla y la plántula. Siga todas las instrucciones de uso específicas del cultivo respecto de las dosis máximas de uso.										
~ Cálculo de pies lineales de hilera: $522,720 \div \text{espaciado entre hileras (en pulgadas)} = \text{pies lineales de hilera por acre}$										

INSTRUCCIONES PARA APLICACIONES POR DIFUSIÓN

Averland FC puede aplicarse por rociado al follaje, pero debe aplicarse con un adyuvante (ver la sección **Instrucciones de mezclado**). Consulte las instrucciones específicas de los cultivos para determinar si esas aplicaciones figuran en la etiqueta para un determinado cultivo y, de ser así, para qué plagas de insectos.

No lo aplique cuando las condiciones puedan generar deriva del área prevista para el tratamiento, siga las instrucciones en la sección de **Control de deriva de rociado.**

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN CON QUIMIGACIÓN

- Para su aplicación mediante riego por aspersión (quimigación) en cebollas de bulbo, cebollas verdes y tubérculos y cormos, solamente para la supresión de trips.
- Solamente debe aplicarse con riego por aspersores.
- Solamente aplique Averland FC para quimigación conforme a las instrucciones específicas para el cultivo específico.
- Aplique Averland FC solo a través de sistemas de riego por aspersión, como los de pivote central, desplazamiento lateral, arrastre final, rodillo lateral (ruedas), de avance, cañón de largo alcance, aspersores fijos, o movimiento manual. No aplique Averland FC mediante otro tipo de sistema de riego.

- Se pueden generar daños a los cultivos, falta de efectividad o residuos de pesticidas ilegales en los cultivos debido a la distribución no uniforme del agua o fertilizante líquido tratado.
- Si tiene preguntas sobre la calibración, comuníquese con especialistas del servicio de extensión del estado, fabricantes de equipos u otros expertos.
- No conecte un sistema de riego (incluidos sistemas de invernadero) que se usen para la aplicación de pesticidas a un sistema público de agua a menos que se hayan colocado los dispositivos de seguridad para los sistemas de agua pública que se definen en la etiqueta del pesticida.
- Una persona con conocimiento del sistema de quimigación y que sea responsable de su funcionamiento o esté bajo la supervisión de la persona responsable debe cerrar el sistema y hacer los ajustes necesarios, si surgiera la necesidad.
- Siga las dosis y los tiempos de aplicación proporcionados en las instrucciones específicas del cultivo. Consulte al servicio de extensión estatal o a otros expertos locales para recibir recomendaciones sobre el uso de adyuvantes, diluentes, dosis e instrucciones de mezclado. Debe probarse la eficacia de Averland FC (u otros productos con abamectina) en la aplicación mediante riego por aspersión, por medio de pruebas de campo de universidades o grupos de extensión.
- El tanque de suministro del producto químico y el sistema de inyectores deben limpiarse por completo y enjuagarse con agua limpia.
- No debe aplicarse cuando la velocidad del viento favorezca la deriva fuera del área prevista de tratamiento o la distribución no uniforme de la solución de tratamiento.

Instrucciones para quimigación

- El sistema debe tener una válvula antirretorno funcional, una válvula de alivio de vacío, un drenaje de baja presión ubicados adecuadamente en la tubería de riego para evitar contaminar la fuente de agua ante un flujo de retorno.
- La tubería de inyección de pesticida debe contener una válvula antirretorno funcional, automática y de cerrado rápido para evitar el retorno de flujo hacia la bomba de inyección.
- La tubería de inyección de pesticida también debe contar con una válvula solenoide funcional, normalmente cerrada, ubicada en el lado de entrada de la bomba de inyección y conectada al sistema de bloqueo para evitar que el fluido se retire del tanque de suministro cuando el sistema de riego se apague, ya sea de forma automática o manual.
- El sistema debe tener controles de bloqueo funcionales para apagar automáticamente la bomba de inyección de pesticida cuando el motor de la bomba de agua se detenga.
- La tubería de riego o la bomba de agua deben incluir un interruptor de presión funcional que detenga el motor de la bomba de agua cuando la presión de agua disminuya al punto en que la distribución de pesticidas pueda verse afectada de manera adversa.
- Los sistemas deben usar una bomba dosificadora como una bomba de inyección de desplazamiento positivo (p. ej., bomba de diafragma) efectivamente diseñada y construida con materiales que sean compatibles con pesticidas y que tengan la posibilidad de instalarse con bloqueos del sistema.
- Cualquier alternativa a los dispositivos de seguridad antes mencionados debe cumplir con lo indicado en la lista de dispositivos alternativos aprobados por la EPA.
- No debe aplicarse cuando la velocidad del viento favorezca la deriva fuera del área prevista de tratamiento o la distribución no uniforme de la solución de tratamiento.

Instrucciones para sistemas públicos de agua

- Un sistema público de agua significa un sistema destinado a proporcionar agua potable para el consumo humano a la población a través de tuberías si ese sistema tiene, al menos, 15 conexiones de servicio o brinda servicio regulado a un promedio de al menos 25 personas a diario, al menos 60 días al año.
- Los sistemas de quimigación conectados a los sistemas de agua públicos deben contar con un dispositivo de prevención de contraflujo con zona de presión reducida, o un dispositivo equivalente, funcional en la línea de suministro de agua, antes del punto de introducción del pesticida. Como una alternativa a la zona de presión reducida (RPZ, por sus siglas en inglés), el agua del sistema de agua público debe descargarse en un depósito de reserva antes de la introducción del pesticida. Debe haber una interrupción física completa (espacio de aire)

entre el extremo de salida de la tubería de llenado y la parte superior o el borde de desbordamiento del depósito de reserva de al menos el doble del diámetro interno de la tubería de llenado.

- La tubería de inyección de pesticida debe contener una válvula antirretorno funcional, automática y de cerrado rápido para evitar el retorno de flujo hacia la bomba de inyección.
- La tubería de inyección de pesticida debe contar con una válvula solenoide funcional, normalmente cerrada, ubicada en el lado de entrada de la bomba de inyección y conectada al sistema de bloqueo para evitar que el fluido se retire del tanque de suministro cuando el sistema de riego se apague, ya sea de forma automática o manual.
- El sistema debe tener controles de bloqueo funcionales para apagar automáticamente la bomba de inyección de pesticida cuando el motor de la bomba de agua se detenga.
- La tubería de riego o la bomba de agua deben incluir un interruptor de presión funcional que detenga el motor de la bomba de agua cuando la presión de agua disminuya al punto en que la distribución de pesticidas pueda verse afectada de manera adversa.
- Los sistemas deben usar una bomba dosificadora como una bomba de inyección de desplazamiento positivo (p. ej., bomba de diafragma) efectivamente diseñada y construida con materiales que sean compatibles con pesticidas y que tengan la posibilidad de instalarse con bloqueos del sistema.
- Cualquier alternativa a los dispositivos de seguridad antes mencionados debe cumplir con lo indicado en la lista de dispositivos alternativos aprobados por la EPA.
- No debe aplicarse cuando la velocidad del viento favorezca la deriva fuera del área prevista de tratamiento o la distribución no uniforme de la solución de tratamiento.

Instrucciones para sistemas de riego

- La aplicación mediante riego por aspersión (quimigación) solamente puede usarse en cebollas de bulbo, cebollas verdes y tubérculos y cormos, solamente para la supresión de trips.
- Siga las dosis y los tiempos de aplicación proporcionados en las instrucciones específicas del cultivo. Consulte al servicio de extensión estatal o a otros expertos locales para recibir recomendaciones sobre el uso de adyuvantes, diluentes, dosis e instrucciones de mezclado. Debe probarse la eficacia de Averland FC (u otros productos con abamectina) en la aplicación mediante riego por aspersión, por medio de pruebas de campo de universidades o grupos de extensión.
- Revise el sistema de riego para asegurarse de que la aplicación final del rocío sea uniforme en todas las áreas. Es necesario lograr una cobertura completa del follaje para tener un buen control. Debe mantenerse una buena agitación en el tanque de suministro del pesticida antes del período de aplicación y durante él.
- Para aplicarlo, inyecte la dosis recomendada de Averland FC al sistema de riego, usando un dispositivo de medición que introduzca un flujo constante y distribuyendo el producto al área objetivo en 0.1 acres-pulgadas de agua. En general, use la menor cantidad de agua posible para la distribución y cobertura apropiada. Es recomendable que el producto se inyecte en la tubería de riego principal después de un ángulo recto para garantizar la dispersión o mezcla apropiada en el agua de riego. Después de terminar la aplicación, enjuague todo el sistema de riego e inyección con agua limpia antes de detener el sistema.
- Además de las recomendaciones anteriores, si la aplicación se hace durante un período de riego normal de un aspersor estacionario, la dosis recomendada de Averland FC para el área cubierta debe inyectarse en el sistema solamente durante el final del período de riego, durante suficiente tiempo para proveer una cobertura y distribución adecuada del producto.

DERIVA DEL ROCÍO

Aplicaciones de pulverización terrestre con barra:

- El usuario solo debe aplicarlo con la altura de liberación recomendada por el fabricante, pero a no más de 4 pies por encima del suelo o del follaje del cultivo.
- Se requiere que los aplicadores usen un tamaño de gota intermedia o gruesa (ASABE S572.1).
- No lo aplique cuando la velocidad del viento exceda las 15 millas por hora en el sitio de aplicación.
- No lo aplique durante inversiones térmicas.

Aplicaciones de pulverización terrestre sin barra:

- Se requiere que los aplicadores usen un tamaño de gota intermedia o gruesa (ASABE S572.1) para todas las aplicaciones.
- No lo aplique cuando la velocidad del viento exceda las 15 millas por hora en el sitio de aplicación.
- No lo aplique durante inversiones térmicas.

Aplicaciones aéreas:

- No rocíe a una altura superior a 10 pies por encima del suelo o del follaje de la vegetación, a menos que se necesite una altura de aplicación mayor para la seguridad del piloto.
- Se requiere que los aplicadores usen un tamaño de gota intermedia o gruesa (ASABE S572.1).
- No lo aplique cuando la velocidad del viento exceda las 15 mph (millas por hora) en el sitio de aplicación. Si la velocidad del viento es superior a 10 mph, el largo de la barra no debe superar el 65% de la envergadura del avión o el 75% del diámetro del rotor del helicóptero. Por lo demás, la longitud de la barra no debe superar el 75% de la envergadura del avión o el 90% del diámetro del rotor del helicóptero.
- Los aplicadores deben usar un desplazamiento de ½ franja hacia el lado contraviento en el lado a favor del viento del campo.
- No lo rocíe durante inversiones térmicas.

Aplicaciones de pulverización hidroneumática:

- Los pulverizadores deben estar dirigidos al follaje.
- No lo aplique cuando la velocidad del viento exceda las 15 millas por hora en el sitio de aplicación.
- El usuario debe apagar las boquillas que apunten hacia afuera en el final de la hilera y cuando se rocíe la hilera externa.
- No lo rocíe durante inversiones térmicas.

ADVERTENCIAS SOBRE LA DERIVA DE ROCIADO**EL APLICADOR ES RESPONSABLE DE EVITAR LA DERIVA DE ROCIADO FUERA DEL SITIO. TENGA EN CUENTA LOS SITIOS CERCANOS NO OBJETIVO Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES.**

No permita que este producto derive a áreas no objetivo. La deriva puede producir residuos ilegales o daños a especies no objetivo. El riesgo de exposición en áreas sensibles puede reducirse al aplicar este producto cuando el viento sople en contra del área sensible.

Requisitos de zonas de protección y franjas de vegetación

- No debe aplicarse por medio de equipo terrestre a menos de 25 pies de lagos, reservorios, ríos, cursos de agua permanentes, marismas, estanques, lagunas naturales, estuarios y estanques para piscicultura comercial.
- No cultive a menos de 25 pies de las áreas acuáticas para permitir el crecimiento de una franja filtrante de vegetación.

Temperatura y humedad

- Al hacer aplicaciones cuando esté seco y caluroso, use gotas más grandes para reducir los efectos de la evaporación.
- Evite su aplicación cuando la temperatura sea elevada o la humedad sea baja. Esas condiciones podrían aumentar la evaporación de gotas del rociado y la probabilidad de deriva a áreas acuáticas.

Inversiones térmicas

- Durante una inversión térmica hay altas posibilidades de deriva. Las inversiones térmicas se caracterizan por el aumento de temperatura con la altitud y son comunes en las noches despejadas sin viento o con viento leve. La presencia de inversión se puede identificar por la niebla a nivel del suelo o por el movimiento de humo proveniente de una fuente terrestre o de un generador de humo en una aeronave. El humo que se forma en capas y se mueve lateralmente en una nube concentrada (en condiciones de poco viento) indica una inversión, mientras que el humo que se mueve hacia arriba y se disipa rápidamente indica una buena mezcla vertical de aire. Evite aplicaciones durante inversiones térmicas.

Viento

- La posibilidad de deriva generalmente aumenta con la velocidad del viento. EVITE APLICACIONES CUANDO HAYA RACHAS DE VIENTO
- Los aplicadores deben estar familiarizados con los patrones de viento y la topografía locales que podrían ocasionar deriva de rociado.
- No lo aplique cuando las condiciones meteorológicas puedan causar deriva.

Importancia del tamaño de la gota

Una manera eficaz de reducir la deriva de rociado es aplicar gotas grandes. Use el tamaño de gota más grande que permita cumplir con el objetivo de control de las plagas. Si bien al aplicar gotas más grandes se reduce la deriva de rociado, el potencial de deriva será mayor si las aplicaciones se hacen de forma inadecuada o bajo condiciones ambientales desfavorables.

Control del tamaño de la gota: pulverización terrestre con barra

- Volumen: aumentar el volumen de rociado para producir gotas más grandes ayudará a reducir la deriva de rociado. Use el volumen más alto posible que resulte práctico para la aplicación. Si se necesita un mayor volumen de rociado, considere usar una boquilla de mayor caudal.
- Presión: use la presión de rociado más baja recomendada para la boquilla a fin de producir el volumen de rociado y el tamaño de gota esperados.
- Boquilla de rociado: use una boquilla de rociado que esté diseñada para la aplicación prevista. Considere usar boquillas que estén diseñadas para reducir la deriva de rociado.

Control del tamaño de la gota: aeronaves

- Ajuste las boquillas: siga las recomendaciones del fabricante de las boquillas para ajustarlas. En general, para reducir las gotas finas, las boquillas deben orientarse de forma paralela al flujo de aire durante el vuelo.

Información sobre la deriva del rocío durante la aplicación aérea

Deben cumplirse los siguientes requisitos de control de la deriva para evitar el movimiento de las aplicaciones aéreas a cultivos agrícolas fuera del objetivo.

- Dirección de las boquillas: las boquillas siempre deben apuntarse hacia atrás y paralelas al flujo de aire, y nunca deben apuntarse más de 45 grados hacia abajo.
- Orientación de las boquillas: orientar las boquillas de manera que el rocío se libere paralelo al flujo de aire produce gotas más grandes que las otras orientaciones, y es la práctica recomendada.
- Número de boquillas: use la cantidad mínima de boquillas que produzca una cobertura uniforme.
- Tipo de boquillas: use un tipo de boquilla que esté diseñada para la aplicación prevista. En la mayoría de los tipos de boquillas, los ángulos de rociado más estrechos producen gotas más grandes. Considere la opción de usar boquillas de baja deriva. Las boquillas de flujo continuo orientadas directamente hacia atrás producen las gotas más grandes y la menor deriva.
- Longitud de la barra: para algunos patrones, reducir la longitud efectiva de la barra a menos del 75% de la envergadura o de la longitud de los rotores puede reducir más la deriva, sin disminuir la anchura de la franja.
- Ajuste de la franja: cuando se hacen aplicaciones con vientos cruzados, la franja se desplazará en la dirección del viento. Por lo tanto, en los bordes del campo que estén a favor y en contra del viento, el aplicador debe compensar el desplazamiento con ajustes en la ruta de la aeronave en contra de la dirección del viento.

- Altura de liberación: hacer aplicaciones a la menor altitud segura reduce la exposición de las gotas a la evaporación y el viento. Una mayor altura de liberación aumenta la posibilidad de deriva de rociado.

Información sobre la deriva de rocío en aplicaciones terrestres

Tenga en cuenta estas precauciones cuando utilice métodos de aplicación terrestre para rociar cultivos de árboles o lúpulo en las cercanías de áreas acuáticas, como lagos, reservorios, cursos de agua permanentes, marismas, estanques, lagunas naturales, estuarios o estanques para piscicultura comercial.

- No lo aplique cuando las condiciones meteorológicas favorezcan su deriva a áreas acuáticas.
- No lo aplique a menos de 110 pies a contraviento de áreas acuáticas, ni cuando la velocidad del viento sea mayor a 8 millas por hora.
- Rocíe las últimas 3 hileras en la dirección del viento hacia áreas acuáticas usando solamente boquillas de un lado, con el rocío dirigido a la dirección opuesta de las áreas acuáticas.
- Para evitar que el rocío pase sobre las copas de los árboles, ajuste o cierre las boquillas superiores. Cierre las boquillas del lado contrario al huerto cuando rocíe la hilera externa. Cierre las boquillas al girar en los extremos de las hileras y al pasar por los espacios de separación de los árboles en las hileras.

Altura de la barra: pulverización terrestre con barra

- Para el equipo de pulverización terrestre, la barra debe permanecer nivelada con el cultivo y tener un rebote mínimo.

Pulverizadores con protección antideriva

- Agregar protección a la barra o a las boquillas individuales puede reducir la deriva de rociado. Considere usar pulverizadores con protección antideriva. Verifique que las protecciones no interfieran con el vertido uniforme del rociado en el área objetivo.

Aplicaciones de pulverización terrestre sin barra:

- Ajustar las boquillas a la menor altura posible sin que afecte la eficacia ayudará a reducir la posibilidad de deriva de rociado.

INSTRUCCIONES DE USO ESPECÍFICAS PARA CULTIVOS

ARÚGULA

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Araña roja Mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i> Araña de dos puntos	1.75 - 3.5 (0.010 - 0.019)
Tiempo de aplicación • Aplicar cuando se observen por primera vez las arañas rojas o moscas minadoras de hojas adultas y repetir la aplicación si es necesario para mantener el control. Instrucciones de uso • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 20 galones/acre de manera terrestre, o 5 galones/acre de manera aérea. • Con la aplicación aérea, el nivel y la duración del control resultante podría ser menor que con la aplicación terrestre. • En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso:	

• Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre). • Intervalo mínimo de aplicación: 7 días. • Dosis máxima anual: 10.25 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.056 libras de ingrediente activo/acre/año calendario de productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones secuenciales de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 7 días.
--

AGUACATE

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Trips del aguacate (<i>Scirtothrips perseae</i>) ¹ Araña cristalina (<i>Oligonychus perseae</i>)	2.25 - 4.25 (0.012 - 0.023)
Tiempo de aplicación • Aplique cuando se observen trips inmaduros por primera vez, pero antes de que las cifras excedan de 5 trips inmaduros por hoja/fruta. • Haga una segunda aplicación si es necesario para mantener el control, por lo menos 30 días después de la primera aplicación. Instrucciones de uso • No use una dosis menor a 2.25 onzas fluidas/acre. • Ajuste los galones de rociado por acre tomando en cuenta el tamaño y la cantidad de árboles por acre y la densidad del follaje. En cualquier caso, resulta esencial hacer una cobertura minuciosa para lograr un buen control de ácaros e insectos. • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 100 galones/acre de manera terrestre, o 50 galones/acre de manera aérea. • Con la aplicación aérea, el nivel y la duración del control de trips resultante podría ser menor que con la aplicación terrestre. • Para aplicación terrestre: Si el volumen de rociado es mayor a 400 galones/acre, aplique Averland FC a una dosis de 0.5 onzas fluidas por cada 100 galones. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Instrucciones para plagas específicas: • ¹Trips: Número de trips inmaduros por hoja/fruta: 1-2 = nivel de infestación bajo, 3-4 = nivel de infestación moderado, 5 o más = nivel de infestación grave.	
Precauciones: • Cuando utilice un aceite de rociado hortícola o cualquier adyuvante mezclado en tanque, siga todas las precauciones y restricciones en la etiqueta del adyuvante. Antes de usar un aceite de rociado hortícola a más del 20%, trate una pequeña área de prueba antes de hacer una aplicación a gran escala.	
Restricciones de uso específicas: • Dosis máxima de aplicación única: 4.25 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.023 lb de ingrediente activo/acre). • Intervalo mínimo de aplicación: 30 días. • Dosis máxima anual: 8.5 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.046 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina por año.	

- **NO** permita que el ganado paste en huertos tratados.
- **Intervalo previo a la cosecha (PHI):** 14 días.

FRIJOLES, SECOS y FRESCOS

Frijol (*Lupinus*, varias especies) (incluye lupino de grano, lupino dulce, lupino blanco y lupino blanco dulce); frijol (*Phaseolus*, varias especies) (incluye frijol de campo, habichuela, frijol pallar, frijol blanco, frijol pinto, ayocote, judías verdes, frijol tépari, frijol de cera); frijol (*Vigna*, varias especies.) (incluye frijol adzuki, frijol espárrago, alubia ojo negro, carilla, judía de metro, caupí (solo semilla seca), alubia ojo de liebre, frijol polilla, frijol mungo, frijol arroz, frijol sureño, frijol negro, judía de vaca); haba (vicia fava); garbanzo

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i> Ácaros tetraníquidos	1.75 - 3.5 (0.010 - 0.019)
Tiempo de aplicación • Moscas minadoras de hojas y ácaros tetraníquidos: Aplique cuando se observen por primera vez moscas minadoras de hojas adultas o ácaros tetraníquidos adultos, cuando sea necesario, para mantener el control dentro de los límites de un programa sólido de manejo de resistencia. Instrucciones de uso • Puede aplicarse de manera terrestre o desde una aeronave. • Para lograr un mejor control, aplique Averland FC con equipo de aplicación terrestre. Con la aplicación aérea, el control resultante de moscas minadoras de hojas y ácaros tetraníquidos podría ser menor que con la aplicación terrestre. • Use de 1.75 a 2.5 onzas fluidas por acre para infestaciones bajas o moderadas y 3.5 onzas fluidas por acre para infestaciones altas. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre). • Intervalo mínimo de aplicación: 6 días. • Dosis anual máxima 10.25 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.056 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones foliares secuenciales de productos que contengan abamectina por año. • NO permita que el ganado paste en áreas con caupí tratado, ni alimente al ganado con forraje y heno de caupí tratado. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 7 días.	

BAYAS DE TALLO, SUBGRUPO DE CULTIVOS 13-07A

Mora; loganberry; frambuesa, negra y roja; frambuesa silvestre; sus variedades o híbridos.

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Ácaros tetraníquidos	1.75 - 3.5 (0.010 - 0.019)
Araña blanca	3.5 (0.019)

Tiempo de aplicación • Aplicar cuando se observen por primera vez los ácaros tetránquidos adultos y repetir la aplicación si es necesario para mantener el control. Instrucciones de uso • Resulta esencial hacer una cobertura completa del follaje del cultivo para lograr resultados óptimos. La cobertura inadecuada puede provocar un control reducido. • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 10 galones/acre de manera terrestre, o 5 galones/acre de manera aérea. • En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre). • Intervalo mínimo de aplicación: 7 días. • Dosis máxima anual: 10.25 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.056 libras de ingrediente activo/acre/año calendario de productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones secuenciales de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina. • NO lo aplique desde el inicio de la floración hasta que termine la caída de los pétalos. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 7 días.

APIO NABO (RAÍZ DE APIO)

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Araña de dos puntos	3.5 (0.019)
Tiempo de aplicación • Aplique cuando los ácaros aparezcan por primera vez y repita si es necesario para mantener el control. Instrucciones de uso • Resulta esencial hacer una cobertura completa del follaje del cultivo para lograr resultados óptimos. La cobertura inadecuada del cultivo puede provocar un control reducido. • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 20 galones/acre. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre). • Intervalo mínimo de aplicación: 7 días. • Dosis máxima anual (después de trasplantar el apio nabo): 10.25 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.056 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones secuenciales de Averland FC o de cualquier otro producto de aplicación foliar que contenga abamectina.	

- **NO** lo aplique de forma aérea.
- **Intervalo previo a la cosecha (PHI):** 7 días.

LECHUGA CHINA

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Araña roja Mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i> Araña de dos puntos	1.75 - 3.5 (0.010 - 0.019)
Tiempo de aplicación • Aplicar cuando se observen por primera vez las arañas rojas o moscas minadoras de hojas adultas y repetir la aplicación si es necesario para mantener el control. Instrucciones de uso • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 20 galones/acre de manera terrestre, o 5 galones/acre de manera aérea. • Con la aplicación aérea, el nivel y la duración del control resultante podría ser menor que con la aplicación terrestre. • En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre). • Intervalo mínimo de aplicación: 7 días. • Dosis máxima anual: 10.25 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.056 libras de ingrediente activo/acre/año calendario de productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones secuenciales de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 7 días.	

CULTIVOS FRUTALES CÍTRICOS GRUPO 10-10

Lima del desierto; caviar cítrico; lima redonda australiana; microcitrus australásica; calamondina; cidro; híbridos de cítricos; toronja; amanatsu; kumquat; limón; lima; mandarina mediterránea; lima de Mount White; lima silvestre de Nueva Guinea; naranja agria; naranja dulce; pummelo; citrus inodora; mandarina satsuma; limetta dulce; naranja tachibana; limón persa; tangelo; mandarina; tangor; naranjo trifoliado; ugli; incluidas todas las variedades de especies cultivadas o híbridos de estos productos

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Minador de los cítricos Ácaro de la negrilla	1.0 - 4.25 (0.005 - 0.023)
Psílido asiático de los cítricos Araña blanca Ácaro del brote de los cítricos Trips de los cítricos Araña de dos puntos	2.25 - 4.25 (0.012 - 0.023)

Tiempo de aplicación

- Para el control del **psílido asiático de los cítricos**, aplique para proteger el follaje nuevo en expansión durante la primavera, el verano o el otoño.
- Para el control de la **araña blanca**, aplique cuando las arañas aparezcan por primera vez durante la primavera, el verano o el otoño.
- Para el control del **ácaro del brote de los cítricos**, haga el rociado durante el crecimiento de los brotes para lograr mejores resultados.
- Para el control del **minador de los cítricos**, aplique para proteger el crecimiento nuevo durante la primavera, el verano o el otoño.
- Para el control de los **trips de los cítricos**, la aplicación solamente controlará a la generación actual y debe hacerse en el momento apropiado. Aplique cuando se hayan alcanzado los umbrales económicos (después de que inicie la eclosión de los huevos, de preferencia a principios o mediados de la eclosión).

Instrucciones de uso

- Solamente se permite la aplicación aérea para el control del **minador de los cítricos** y del **psílido asiático de los cítricos**. Para todas las demás plagas, haga solamente aplicaciones terrestres.
- Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 25 galones/acre de manera terrestre, o 10 galones/acre de manera aérea.
- Con la aplicación aérea, el nivel y la duración del control resultante del psílido asiático de los cítricos y del minador de los cítricos podría reducirse, en comparación con la aplicación terrestre. Al aplicar de manera aérea, use el extremo superior del intervalo de dosis (3.75 - 4.25 onzas fluidas/acre)
- En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada.
- Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección **Instrucciones de aplicación y mezclado** para ver más información.

Restricciones de uso:

- **Dosis máxima de aplicación única:** 4.25 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.023 lb de ingrediente activo/acre).
- **Intervalo mínimo de aplicación:** 30 días.
- **Dosis máxima anual:** 8.5 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario.
 - **NO** exceda 0.046 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje).
- **NO** haga más de 3 aplicaciones de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina por año.
- La aplicación de este producto está prohibida desde el inicio de la floración hasta el final del período de floración. Observe los períodos definidos de floración establecidos por las oficinas locales de extensión universitaria, los comisionados de agricultura de los condados u otras agencias estatales o tribales. En las zonas en las que esas autoridades no proporcionen una declaración o definición del inicio y el final de la floración, las aplicaciones están prohibidas desde que inicie hasta que termine la floración.
- **NO** aplique por aire, excepto para controlar el minador de los cítricos y el psílido asiático de los cítricos.
- **NO** permita que el ganado pade en huertos de cítricos tratados.
- **Intervalo previo a la cosecha (PHI):** 7 días.

MAÍZ*

Maíz de campo; maíz palomero; maíz dulce; maíz cultivado para semilla

PLAGAS DE TIERRA	DOSIS DE USO	
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)	onzas fluidas de producto/1000 pies lineales de hilera (onzas de ingrediente activo por 1000 pies lineales de hilera) con hileras de 30 pulg.
Eliminación: Nematodos	4.0 – 6.0 (0.022 - 0.033)	0.23 - 0.34 (0.020 - 0.030)
Tiempo de aplicación - Para la supresión de nematodos al principio de la temporada, aplique durante la plantación. Instrucciones de uso - Aplique en el surco, por lo menos 5 galones por acre de volumen final, en forma de rociado o por goteo dirigido a la semilla durante la plantación. - La dosis de aplicación lineal se basa en hileras de 30 pulg. Para espaciamientos distintos de las hileras, consulte la tabla de conversión de dosis de aplicación lineal en la sección de instrucciones para aplicación en las plantas. En ningún caso debe exceder la restricción máxima por acre.		
Restricciones de uso: Dosis máxima de aplicación única: 6.0 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.033 lb de ingrediente activo/acre) por aplicación. Dosis máxima anual: 6.0 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. NO exceda 0.033 lb de ingrediente activo/acre/año calendario en aplicación en tierra, incluidas las aplicaciones en semillas o tierra. NO aplique a menos de 1 pulgada de profundidad.		

* No registrado para su uso en California.

ALGODÓN*

PLAGAS DE TIERRA	DOSIS DE USO	
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)	onzas fluidas de producto/1000 pies lineales de hilera (onzas de ingrediente activo/1000 pies de hilera) con hileras de 36 pulg.
Nematodos	3.5 - 5.5 (0.019 - 0.03)	0.24 – 0.38 (0.021 - 0.033)
Tiempo de aplicación - Para control de nematodos al inicio de la temporada, aplique durante la plantación. Instrucciones de uso - Aplique en el surco, por lo menos 5 galones por acre de volumen final, en forma de rociado o por goteo dirigido a la semilla durante la plantación. - La dosis de aplicación lineal se basa en hileras de 36 pulg. Para espaciamientos distintos de las hileras, consulte la tabla de conversión de dosis de aplicación lineal en la sección de instrucciones para aplicación en las plantas. En ningún caso debe exceder la restricción máxima por acre.		
PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO	
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)	
Araña roja	Principio de la temporada	

Ácaro tetránquido del Pacífico Araña roja de la fresa Araña de dos puntos	1.0 - 1.25 (0.005 - 0.007) Mitad de temporada/Última labor de cultivo 1.75 - 3.5 (0.010 - 0.019)
Tiempo de aplicación • Aplique apenas aparezcan los primeros ácaros. Si es necesario, repita la aplicación para mantener el control. Instrucciones de uso • Resulta esencial hacer una cobertura completa del follaje del cultivo para lograr resultados óptimos. La cobertura inadecuada puede provocar un control reducido. • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 5 galones/acre de manera terrestre o aérea. • Con la aplicación aérea, la cobertura del rociado y el nivel y la duración del control de ácaros resultante podría ser menor que con la aplicación terrestre. • Oeste de las Montañas Rocallosas: las dosis más bajas de uso solamente pueden usarse en algodón de menos de 10 pulgadas de altura y solo pueden aplicarse con equipo terrestre. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: ○ Aplicaciones al suelo: 5.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.03 lb de ingrediente activo/acre) por aplicación en planta. ○ Aplicaciones foliares: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre) por aplicación foliar. • Intervalo mínimo de aplicación: 21 días. • Dosis máxima anual: 5.5 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario aplicado en el suelo y 7.0 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario en aplicaciones foliares. ○ NO exceda 0.03 lb de ingrediente activo/acre/año calendario de todos los productos que contengan abamectina aplicados a las semillas o el suelo, ni 0.038 lb de ingrediente activo/acre/año calendario de todos los productos que contengan abamectina en aplicaciones foliares. • NO aplique a menos de 1 pulgada de profundidad. • NO alimente al ganado con algodón tratado, ni permita que lo pasten. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 20 días.	

*No registrado para su uso en California.

MASTUERZO, HIERBA DE SANTA BÁRBARA

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Araña roja Mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i> Araña de dos puntos	1.75 - 3.5 (0.010 - 0.019)
Tiempo de aplicación • Aplicar cuando se observen por primera vez las arañas rojas o moscas minadoras de hojas adultas y repetir la aplicación si es necesario para mantener el control. Instrucciones de uso • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 20 galones/acre de manera terrestre, o 5 galones/acre de manera aérea. • Con la aplicación aérea, el nivel y la duración del control resultante podría ser menor que con la aplicación terrestre.	

- En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada. - Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.
Restricciones de uso: Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre). Intervalo mínimo de aplicación: 7 días. Dosis máxima anual: 10.25 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. NO exceda 0.056 libras de ingrediente activo/acre/año calendario de productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). NO haga más de 2 aplicaciones secuenciales de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina. Intervalo previo a la cosecha (PHI): 7 días.

PLANTAS CUCURBITÁCEAS GRUPO DE CULTIVOS 9

Chayote (fruta); calabaza china (melón de conservación china); melón cidra; pepino; pepino para encurtir; calabaza de peregrino comestible (hyotan, cucuzza, hechima, quimbombó chino); Momordica, varias especies, (balsamina, pera balsámica, melón amargo, pepino chino); melón (incluye cantalupo, melón cantalupo, melón casaba, melón crenshaw, melón pershaw dorado, melón honeydew, melón honeyball, melón mango, melón persa, melón de piña, melón piel de sapo y melón serpiente); zapallo; calabazas de verano (calabaza cuello de cisne, calabaza pattypan, calabaza de cuello recto, calabacín, zucchini); calabazas de invierno (zapallo anco, calabaza, zapallo criollo, calabaza bellota, calabaza espagueti); sandía; incluidas todas las variedades de especies cultivadas o híbridos de estos productos

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i> Ácaros tetraníquidos	1.75 - 3.5 (0.010 - 0.019)
Tiempo de aplicación - Aplicar cuando se observen por primera vez las arañas rojas o moscas minadoras de hojas adultas y repetir la aplicación si es necesario para mantener el control. Instrucciones de uso - Resulta esencial hacer una cobertura completa del follaje del cultivo para lograr resultados óptimos. La cobertura inadecuada puede provocar un control reducido. - Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 20 galones/acre de manera terrestre, o 5 galones/acre de manera aérea. - Con la aplicación aérea, el nivel y la duración del control resultante podría ser menor que con la aplicación terrestre. - En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada. - Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre) por aplicación. Intervalo mínimo de aplicación: 7 días. Dosis máxima anual: 10.25 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. - No exceda 0.056 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje).	

- No haga más de 2 aplicaciones secuenciales de Averland FC o de cualquier otro producto de aplicación foliar que contenga abamectina.
- **Intervalo previo a la cosecha (PHI):** 7 días.

HINOJO DE FLORENCIA

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Araña roja Mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i> Araña de dos puntos	1.75 - 3.5 (0.010 - 0.019)
Tiempo de aplicación • Aplicar cuando se observen por primera vez las arañas rojas o moscas minadoras de hojas adultas y repetir la aplicación si es necesario para mantener el control. Instrucciones de uso • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 20 galones/acre de manera terrestre, o 5 galones/acre de manera aérea. • Con la aplicación aérea, el nivel y la duración del control resultante podría ser menor que con la aplicación terrestre. • En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre). • Intervalo mínimo de aplicación: 7 días. • Dosis máxima anual: 10.25 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.056 libras de ingrediente activo/acre/año calendario de productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones secuenciales de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 7 días.	

VEGETALES QUE SE CONSIDERAN FRUTAS GRUPO DE CULTIVO 8-10

Nakatí; tomate australiano; pimiento morrón; cocona; tomate pasa; berenjena; arándano de jardín; bayas de goji; uvilla; uña de gato; naranjilla; quimbombó; hierba sosa; pepino; morrón; flor de Jamaica; berenjena escarlata; umsobo; tomatillo; tomate; tomate de árbol; incluidas las variedades de especies cultivadas o híbridos de estos productos

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i> Ácaros tetránquidos <i>Thrips palmi</i> Psílido del tomate Ácaro del tomate Todos los cultivos, excepto tomates comerciales cultivados en invernadero: Araña blanca Escarabajo de la papa	1.75 - 3.5 (0.010 - 0.019)
Lombriz del tomate	3.5 (0.019)
Tiempo de aplicación - Para control general, del ácaro del tomate y de ácaros tetránquidos, aplique apenas aparezcan los primeros ácaros. - Para control del <i>Thrips palmi</i>, aplique apenas aparezcan los trips. - Para control de la lombriz del tomate, la aplicación puede hacerse desde el momento en que se detecte la actividad de las polillas hasta, a más tardar, el momento en que haya presencia de larvas recién surgidas. - Para trips, si las poblaciones son mayores al umbral, use un producto eficaz para derribo de trips antes de rociar Averland FC. Instrucciones de uso Todos los cultivos, excepto tomates comerciales cultivados en invernadero: - Resulta esencial hacer una cobertura completa del follaje del cultivo para lograr resultados óptimos. La cobertura inadecuada puede provocar un control reducido. - Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 20 galones/acre de manera terrestre, o 5 galones/acre de manera aérea. - Con la aplicación aérea, el nivel y la duración del control resultante podría ser menor que con la aplicación terrestre. - En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada. Solo para tomates comerciales cultivados en invernadero: - Aplique solamente en la tierra. - Resulta esencial hacer una cobertura completa para lograr resultados óptimos. Seleccione un volumen de rociado apropiado para el tamaño de las plantas y la densidad del follaje, pero aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 20 galones/acre. - En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada. - Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: Dosis máxima de aplicación única: No aplique más de 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre) por aplicación. Intervalo mínimo de aplicación: 7 días. Dosis máxima anual: 10.25 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario.	

- **NO** exceda 0.056 libras de abamectina/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje).
- **NO** haga más de 2 aplicaciones foliares secuenciales de productos que contengan abamectina por año.
- No debe usarse en tomates comerciales cultivados en invernadero en el estado de Nueva York.
- **Intervalo previo a la cosecha (PHI):**
 - **Tomates comerciales cultivados en invernadero:** 1 día.
 - **Todos los demás cultivos:** 7 días.

UVAS Y FRUTAS PEQUEÑAS DE TREPADORAS (EXCEPTO KIWIS) SUBGRUPO 13-07F

Vid amur; grosella espinosa; uva; kiwiño; pasionaria; bayas de schisandra; incluidas las variedades de especies cultivadas o híbridos de estos productos

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Ácaro tetraníquido del Pacífico Araña de dos puntos Cicadélido variegado Chicharrita de la vid del oeste Polilla defoliadora de la vid Ácaro tetraníquido de Willamette	1.75 - 3.5 (0.010 - 0.019)
Tiempo de aplicación • Ácaros tetraníquidos Aplique cuando recién aparezcan los ácaros, pero antes de que los organismos móviles excedan de 5 por hoja. • Polilla defoliadora de la vid Aplique cuando recién se observen las larvas. Para un control óptimo, aplique poco después de la eclosión de los huevos. • Cicadélidos: Averland FC solo provee derribo por contacto. Instrucciones de uso • Resulta esencial hacer una cobertura minuciosa para lograr un buen control de ácaros e insectos. Averland FC debe aplicarse a ambos lados de cada hilera para lograr una cobertura máxima. No rocía hileras alternadas. • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 50 galones/acre con equipo convencional de aplicación terrestre. Pueden usarse menos de 50 galones/acre con un rociador electrostático, pero no deben usarse menos de 5 galones/acre. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre). • Intervalo mínimo de aplicación: 21 días. • Dosis máxima anual: 7.0 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.038 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina por año. • NO lo aplique de forma aérea. • NO permita que el ganado paste en viñedos tratados. • NO lo aplique desde el inicio de la floración hasta después de que termine la caída de los pétalos. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 28 días.	

GUAYABA

Acerola; guayabo; guayaba; jabuticaba; pasionaria; carambola; manzana de Java; variedades de especies cultivadas o híbridos de estos productos

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Araña de dos puntos	2.25 – 4.25 (0.012 - 0.023)
Tiempo de aplicación • Aplique cuando los ácaros aparezcan por primera vez durante la primavera, el verano o el otoño. Instrucciones de uso • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 50 galones/acre con equipo convencional de aplicación terrestre. Pueden usarse menos de 50 galones/acre con un rociador electrostático, pero no deben usarse menos de 5 galones/acre. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 4.25 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.023 lb de ingrediente activo/acre). • Intervalo mínimo de aplicación: 14 días. • Dosis máxima anual: 12.75 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.07 libras de ingrediente activo/acre/año calendario de productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 3 aplicaciones de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina por año. • NO lo aplique de forma aérea. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 7 días.	

HIERBAS SUBGRUPO 19A

Angélica; melisa; albahaca; borraja; pimpinela; manzanilla; menta gatuna; perejil francés (seco); cebollín; cebollín chino; salvia sclarea; coriandro (cilantro o perejil chino) (hoja); hierba de Santa María; cilantro (hoja); curry (hoja); eneldo; ballota; hisopo; lavanda; zacate limón; apio de monte (hoja); caléndula; mejorana (mejorana dulce o anual, orégano, mayorana); capuchina; perejil (seco); poleo; romero; ruda; salvia; hierba oliva, verano e invierno; laurel (hojas de laurel); tanacetos; estragón; tomillo; gaulteria; aspérula; ajeno

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i> Ácaros tetraníquidos	1.75 – 3.5 (0.010 – 0.019)
Tiempo de aplicación • Aplicar cuando se observen por primera vez las moscas minadoras de hojas adultas o ácaros tetraníquidos adultos y repetir la aplicación si es necesario para mantener el control. Instrucciones de uso • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 20 galones/acre con equipo convencional de aplicación terrestre. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	

Restricciones de uso:

- **Dosis máxima de aplicación única:** 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre) por aplicación.
- **Intervalo mínimo de aplicación:** 7 días.
- **Dosis máxima anual:** 10.25 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario.
 - **NO** exceda 0.056 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje).
 - **NO** haga más de 2 aplicaciones de Averland FC o de cualquier otro producto de aplicación foliar que contenga abamectina por cada ciclo de cultivo y corte.
- **NO** lo aplique de forma aérea.
- **NO** lo aplique desde el inicio de la floración hasta después de que termine la caída de los pétalos.
- **Intervalo previo a la cosecha (PHI):**
 - **Cebollines:** 7 días.
 - **Todos los demás cultivos:** 14 días.

LÚPULOS

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Araña de dos puntos	1.75 – 3.5 (0.010 – 0.019)
Tiempo de aplicación • Aplique Averland FC cuando las arañas de dos puntos lleguen a umbrales de tratamiento. Instrucciones de uso • Resulta esencial hacer una cobertura completa de las hojas superiores e inferiores para lograr resultados óptimos. La cobertura inadecuada puede provocar un control reducido. • Para aplicaciones con crecimiento hasta la mitad del enrejado (6-8 pies de altura), aplique 1.75-3.5 onzas fluidas/acre diluidas por lo menos en 40 galones/acre. • Para aplicaciones con crecimiento superior a la mitad del enrejado, aplique 3.5 onzas fluidas/galón/acre diluidas por lo menos en 100 galones/acre. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre) por aplicación. • Intervalo mínimo de aplicación: 21 días. • Dosis máxima anual: 7.0 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.038 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina por año. • NO permita que el ganado paste en campos de lúpulo tratado. • NO lo aplique de forma aérea. • NO lo aplique a lúpulos en California. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 28 días.	

HORTALIZAS DE HOJAS VERDES Y VERDURAS CON PECIOLO SUBGRUPO 22B

Cardo; apio; apio chino; fuki; ruibarbo; udo; zuiki; incluidas las variedades de especies cultivadas o híbridos de estos productos.

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Araña roja Mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i> Araña de dos puntos	1.75 - 3.5 (0.010 - 0.019)
Tiempo de aplicación - Aplicar cuando se observen por primera vez las arañas rojas o moscas minadoras de hojas adultas y repetir la aplicación si es necesario para mantener el control. Instrucciones de uso - Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 20 galones/acre de manera terrestre, o 5 galones/acre de manera aérea. - Con la aplicación aérea, el nivel y la duración del control resultante podría ser menor que con la aplicación terrestre. - En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada. - Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre). Intervalo mínimo de aplicación: 7 días. Dosis máxima anual: 10.25 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. NO exceda 0.056 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). NO haga más de 2 aplicaciones foliares secuenciales de Averland FC o de cualquier otro producto de aplicación foliar que contenga abamectina. Intervalo previo a la cosecha (PHI): 7 días.	

VERDURAS DE HOJAS VERDES SUBGRUPO 4-16a

Amaranto chino; amaranto; áster indio; chipaca; té de Java; cham-chwi; cham-na-mul; perejil francés, hojas frescas; chipilín; margarita mediterránea; cilantro, hojas frescas; valeriana locusta; cosmos; hojas de diente de león; hojas de dang-gwi; eneldo; lengua de vaca; dol-nam-mul; ebolo; endibia; escarola; quelite de monte; celosia; espárrago del rey Enrique; huauzontle; hojas de yute; lechuga amarga; lechuga; hojas de lechuga; armuelle; perejil, hojas frescas; llantén menor; primavera inglesa; verdolaga común; verdolaga de Cuba; radicchio; espinaca; espinaca de Malabar; espinaca de Nueva Zelanda; otoo; acelga; hojas de violeta china; incluidas las variedades de especies cultivadas o híbridos de estos productos.

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Araña roja Mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i> Araña de dos puntos	1.75 - 3.5 (0.010 - 0.019)
Tiempo de aplicación Aplicar cuando se observen por primera vez las arañas rojas o moscas minadoras de hojas adultas y repetir la aplicación si es necesario para mantener el control.	

Instrucciones de uso • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 20 galones/acre de manera terrestre, o 5 galones/acre de manera aérea. • Con la aplicación aérea, el nivel y la duración del control resultante podría ser menor que con la aplicación terrestre. • En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre). • Intervalo mínimo de aplicación: 7 días. • Dosis máxima anual: 10.25 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.056 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones foliares secuenciales de Averland FC o de cualquier otro producto de aplicación foliar que contenga abamectina. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 7 días.

BAYAS DE CRECIMIENTO LENTO SUBGRUPO 13-07G

Gayuba; bilberry; arándano silvestre de arbusto bajo; zarzamora de los pantanos; arándano; arándano rojo europeo; arándanos australianos; partridgeberry; fresa; variedades de especies cultivadas o híbridos de estos productos.

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Araña roja Araña roja de la fresa Araña de dos puntos Eliminación: Ácaro del ciclamen	3.5 (0.019)
Tiempo de aplicación • Cuando los ácaros aparezcan, haga 2 aplicaciones con un intervalo de 7-10 días entre ellas. Si es necesario, repita esta secuencia de aplicación para mantener el control.	
Instrucciones de uso • Resulta esencial hacer una cobertura completa de las hojas superiores e inferiores para lograr resultados óptimos. La cobertura inadecuada puede provocar un control reducido. • Ajuste el volumen de rociado y la colocación de las boquillas para garantizar la cobertura máxima de la parte superior e inferior de las hojas. • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 50 galones/acre con equipo convencional de aplicación terrestre. Cuando use un rociador electrostático, no use menos de 10 galones/acre. • Ácaro del ciclamen: Aplique con suficiente agua para conseguir una buena cobertura hasta la corona de la planta. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre).	

- **Intervalo mínimo de aplicación:** 21 días después de la segunda aplicación.
- **Dosis máxima anual:** 14 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario.
 - **NO** exceda 0.076 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje).
- **NO** lo aplique de forma aérea.
- **NO** lo use en viveros de fresas.
- **Intervalo previo a la cosecha (PHI):** 3 días.

MENTA (MENTA PIPERITA, HIERBABUENA)

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Araña de dos puntos	1.75 - 2.5 (0.010 - 0.014)
Tiempo de aplicación • Trate cuando recién aparezcan los ácaros tetránquidos. Instrucciones de uso • Resulta esencial hacer una cobertura completa del follaje del cultivo para lograr resultados óptimos. La cobertura inadecuada puede provocar un control reducido. • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 20 galones/acre de manera terrestre, o 5 galones/acre de manera aérea. • Con la aplicación aérea, el nivel y la duración del control de ácaros tetránquidos resultante podría ser menor que con la aplicación terrestre. • En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 2.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.014 lb de ingrediente activo/acre) por aplicación. • Intervalo mínimo de aplicación: 7 días. • Dosis máxima anual: 7.75 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.042 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones secuenciales de Averland FC o de cualquier otro producto de aplicación foliar que contenga abamectina. ○ NO haga más de 3 aplicaciones de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina por año. • NO permita que el ganado paste o se alimente con hojas tratadas. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 28 días.	

CEBOLLAS Y BULBOS SUBGRUPO 3-07A

Lirio de día, bulbo; ajedrezada, bulbo; ajo, bulbo; ajo elefante, bulbo; ajo de cuello duro, bulbo; lirio, bulbo; cebolla, bulbo; cebolla china, bulbo; cebolla perla; cebolla de huevo, bulbo; chalota, bulbo; variedades de especies cultivadas o híbridos de estos productos.

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i> Trips	1.75 - 3.5 (0.010 - 0.019)

Tiempo de aplicación - Para control de la mosca minadora de hojas, aplicar cuando se observen por primera vez las moscas minadoras de hojas adultas y repetir la aplicación si es necesario. - Para control de los trips, aplique cuando los trips estén en el umbral económico. Si es necesario, repita la aplicación para mantener el control. Instrucciones de uso - Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 20 galones/acre de manera terrestre, o 5 galones/acre de manera aérea. - Con la aplicación aérea y la quimigación, el nivel y la duración del control resultante podría ser menor que con la aplicación terrestre. - En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada. - Averland FC puede aplicarse mediante quimigación con aspersores elevados para supresión de trips. - Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.
Control de resistencia: - Haga 2 aplicaciones consecutivas de Averland FC, y luego cambie a un producto químico con un mecanismo de acción diferente. - Haga al menos 2 aplicaciones de un producto químico con un mecanismo de acción diferente antes de hacer aplicaciones adicionales de Averland FC.
Precaución: El control de insectos puede reducirse si se usa Averland FC en combinación con un producto de tipo adherente o aglutinante, como Bravo® Weather Stik®.
Restricciones de uso: Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre) por aplicación. Intervalo mínimo de aplicación: 7 días. Dosis máxima anual: 10.25 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. NO exceda 0.056 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). NO haga más de 2 aplicaciones secuenciales de Averland FC o de cualquier otro producto de aplicación foliar que contenga abamectina. NO use Averland FC como tratamiento de rescate para control de trips. Intervalo previo a la cosecha (PHI): 30 días.

CEBOLLAS VERDES SUBGRUPO 3-07B

Cebollín, hojas frescas; cebollín chino, hojas frescas; hosta elegans; hojas de ajedrezada; kurrat; ajo-cebolla; puerro; puerro silvestre; cebolla cambray; cebolla fresca; cebolla verde; cebolla china; cebolla de árbol; cebolleta; chalota, hojas frescas; variedades de especies cultivadas o híbridos de estos productos.

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i> Trips	1.75 - 3.5 (0.010 - 0.019)
Tiempo de aplicación - Para control de la mosca minadora de hojas, aplicar cuando se observen por primera vez las moscas minadoras de hojas adultas y repetir la aplicación si es necesario. - Para control de trips, aplique como parte de un programa de gestión de trips. Empiece a hacer aplicaciones cuando las poblaciones sean bajas (1-3 trips por planta). Repita la aplicación si es necesario. Si las poblaciones son elevadas, use un producto eficaz para derribo de trips antes de rociar Averland FC.	

Instrucciones de uso • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 20 galones/acre de manera terrestre, o 5 galones/acre de manera aérea. • Con la aplicación aérea y la quimigación, el nivel y la duración del control resultante podría ser menor que con la aplicación terrestre. • En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada. • Averland FC puede aplicarse mediante quimigación con aspersores elevados para supresión de trips. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Control de resistencia: • Haga 2 aplicaciones consecutivas de Averland FC, y luego cambie a un producto químico con un mecanismo de acción diferente. • Haga al menos 2 aplicaciones de un producto químico con un mecanismo de acción diferente antes de hacer aplicaciones adicionales de Averland FC.	
Precaución: • El control de insectos puede reducirse si se usa Averland FC en combinación con un producto de tipo adherente o aglutinante, como Bravo® Weather Stik®.	
Restricciones de uso específicas: • Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre). • Intervalo mínimo de aplicación: 7 días. • Dosis máxima anual: 14 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.076 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones secuenciales de Averland FC o de cualquier otro producto de aplicación foliar que contenga abamectina. • NO aplique de manera aérea en los estados de Nueva York y California. • NO use Averland FC como tratamiento de rescate para control de trips. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 7 días.	

PAPAYA

Zapote negro; zapote amarillo; zapote mamey; papaya; caimillo; chicosapote; incluidas las variedades de especies cultivadas o híbridos de estos productos.

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Araña de dos puntos	2.25 – 4.25 (0.012 - 0.023)
Tiempo de aplicación • Para el control de ácaros, aplique cuando las arañas aparezcan por primera vez durante la primavera, el verano o el otoño. Instrucciones de uso • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 50 galones/acre con equipo convencional de aplicación terrestre. Si usa un rociador electrostático puede usar menos de 50 galones/acre; sin embargo, no deben usarse menos de 5 galones/acre. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	

Restricciones de uso:

- **Dosis máxima de aplicación única:** 4.25 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.023 lb de ingrediente activo/acre).
- **Intervalo mínimo de aplicación:** 14 días.
- **Dosis máxima anual:** 12.75 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario.
 - **NO** exceda 0.070 libras de ingrediente activo/acre/año calendario de productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje).
 - **NO** haga más de 3 aplicaciones secuenciales de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina.
- **NO** lo aplique a mangos.
- **NO** lo aplique de forma aérea.
- **Intervalo previo a la cosecha (PHI):** 7 días.

PIÑA

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Araña de dos puntos	2.25 – 4.25 (0.012 - 0.023)
Tiempo de aplicación • Aplique cuando se observen por primera vez los ácaros tetraníquidos. Instrucciones de uso • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 50 galones/acre con equipo convencional de aplicación terrestre. Si usa un rociador electrostático puede usar menos de 50 galones/acre; sin embargo, no deben usarse menos de 5 galones/acre. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 4.25 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.023 lb de ingrediente activo/acre). • Intervalo mínimo de aplicación: 7 días. • Dosis máxima anual: 8.5 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.046 libras de ingrediente activo/acre/año calendario de productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones secuenciales de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina. • NO lo aplique de forma aérea. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 16 semanas.	

CULTIVOS FRUTALES DE POMOS GRUPO 11-10

Manzana; acerolo; manzana silvestre; níspero; mayhaw; níspero europeo; pera; pera asiática; membrillo; membrillo chino; membrillo japonés, tejocote; incluidas las variedades de especies cultivadas o híbridos de estos productos.

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Araña roja de los frutales y la vid Araña roja de McDaniel Psílido de la pera Ácaro blanco del peral Minadora de hojas tentiforme	2.25 - 4.25 (0.012 - 0.023)

Araña de dos puntos Cicadélido blanco de la manzana Ácaro amarillo	
Tiempo de aplicación • Aplique cuando se alcancen los umbrales de ácaros tetránquidos o insectos. Si es necesario, haga una segunda aplicación para mantener el control. Instrucciones de uso • La cobertura completa es fundamental para lograr el control. Seleccione un volumen de rociado apropiado para el tamaño de los árboles y la densidad del follaje. • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 40 galones/acre. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Precaución: • Aplicar la combinación de Averland FC y un aceite hortícola rociado menos de 14 días antes de aplicar Captan u otros productos que contengan azufre puede provocar fitotoxicidad y pérdida de cultivos.	
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 4.25 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.023 lb de ingrediente activo/acre). • Intervalo mínimo de aplicación: 21 días. • Dosis máxima anual: 8.5 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.046 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina por año. • NO lo aplique de forma aérea. • NO permita que el ganado pade en huertos tratados. • NO lo aplique desde el inicio de la floración hasta después de que termine la caída de los pétalos. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 28 días.	

PAPA

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Escarabajo de la papa Mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i> Psílido de la papa Ácaros tetránquidos ²	1.75 – 3.5 (0.010 – 0.019)
Eliminación: Trips	3.5 (0.019)
Tiempo de aplicación • Para el control del escarabajo de la papa, haga la primera aplicación después de que haya eclosionado aproximadamente el 50% de las masas de huevos y haya presencia de larvas en estadio temprano. Si es necesario hacer dos aplicaciones, límitelas a una sola generación de escarabajo de la papa por cultivo. • Para el control de la mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i>, haga la primera aplicación cuando se observen las primeras moscas adultas. Repita las aplicaciones cuando sea necesario para mantener el control.	

• Para el control de los ácaros tetraníquidos, haga la primera aplicación cuando aparezcan los primeros ácaros. Repita la aplicación cuando sea necesario para mantener el control. • Para suprimir los trips, aplique en un programa de gestión de trips y cuando los trips estén en un umbral económico. Repita la aplicación cuando sea necesario para mantener el control. Instrucciones de uso • Resulta esencial hacer una cobertura completa del follaje del cultivo para lograr resultados óptimos. Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 20 galones/acre de manera terrestre, o 5 galones/acre de manera aérea. • Con la aplicación aérea y la quimigación, el nivel y la duración del control resultante de insectos y ácaros tetraníquidos podría ser menor que con la aplicación terrestre. • En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada. • Puede aplicarse mediante quimigación con aspersores elevados para supresión de trips. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.
Control de resistencia: • Escarabajo de la papa: Las aplicaciones a la siguiente generación de escarabajo de la papa deben hacerse con un producto eficaz que tenga un mecanismo de acción diferente.
Precaución: • El control de insectos puede reducirse si se usa Averland FC en combinación con un producto de tipo adherente o aglutinante, como Bravo® Weather Stik®.
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre) por aplicación. • Intervalo mínimo de aplicación: 7 días. • Dosis máxima anual: 10.25 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.056 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones secuenciales de Averland FC o de cualquier otro producto de aplicación foliar que contenga abamectina. • NO alimente al ganado con follaje tratado, ni permita que lo pasten. • NO aplique Averland FC más de dos veces a una misma generación de escarabajo de la papa, ni en un período de 30 días. • NO use Averland FC como tratamiento de rescate para control de trips. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 14 días.

SOYA*

PLAGAS DE TIERRA	DOSIS DE USO	
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)	onzas fluidas de producto/1000 pies lineales de hilera (onzas de ingrediente activo por 1000 pies lineales de hilera) con hileras de 15 pulg.
Nematodos incluido el nematodo quístico de la soya	10.0 – 15.0 (0.055 - 0.082)	0.29 - 0.43 (0.025 - 0.038)
Tiempo de aplicación • Para control de nematodos al inicio de la temporada, aplique durante la plantación. Instrucciones de uso		

• Aplique en el surco, por lo menos 5 galones por acre de volumen final, en forma de rociado o por goteo dirigido a la semilla durante la plantación. • La dosis de aplicación lineal se basa en hileras de 30 pulg. Para espaciamentos distintos de las hileras, consulte la tabla de conversión de dosis de aplicación lineal en la sección de instrucciones para aplicación en las plantas. En ningún caso debe exceder la restricción máxima por acre.
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 15.0 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.082 lb de ingrediente activo/acre). • Dosis anual máxima 15.0 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ No exceda 0.082 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina que se apliquen a las semillas o la tierra. • NO aplique a menos de 1 pulgada de profundidad.

* No registrado para su uso en California.

CULTIVOS FRUTALES DE DRUPAS GRUPO 12-12

Albaricoque; albaricoque japonés; capulín; cereza negra; cereza de Nanjing; cereza dulce; cereza amarga; jujube chino; nectarina; durazno; ciruela; ciruela americana; ciruela playera; ciruela canadiense; ciruela de jardín; ciruela chickasaw; ciruelo damasceno; ciruelo chino; ciruela klamath; ciruela pasa; pluot; endrino; incluidas las variedades de especies cultivadas o híbridos de estos productos.

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Araña roja de los frutales y la vid Ácaro tetránquido del Pacífico Araña de dos puntos	2.25 - 4.25 (0.012 - 0.023)
Tiempo de aplicación • Aplique cuando recién aparezcan los ácaros tetránquidos. Si es necesario, haga una segunda aplicación para mantener el control. Instrucciones de uso • Seleccione un volumen de rociado apropiado para la cantidad y el tamaño de los árboles y la densidad del follaje, para garantizar una cobertura completa. • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 40 galones/acre. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 4.25 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.023 lb de ingrediente activo/acre). • Intervalo mínimo de aplicación: 21 días. • Dosis máxima anual: 8.5 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.046 libras de abamectina/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina por año. • NO lo aplique de forma aérea. • NO permita que el ganado paste en huertos tratados. • NO lo aplique desde el inicio de la floración hasta después de que termine la caída de los pétalos. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 21 días.	

FRUTOS SECOS GRUPO 14-12

Nuez de kola; almendra; hayuco; castaña de Para; pino del Paraná; araucaria bidwillii; roble bur; nogal blanco americano; castaña de cajú; avellano; anacardo; castaña; chinquapin; coco; coquito; nuez dika; ginkgo; castaño de Guayana; avellana (filbert); nogal japonés; nuez hickory; falso castaño japonés; nuez de macadamia; nuez mongongo; olleto; araucaria araucana; nuez de Okari; pachira aquatica; pejibaye; pecán; pequi; nuez pili; piñones; pistacho; carguero; almendro malabar; nogal negro americano; nogal común; castañito chino florido; incluidas las variedades de especies cultivadas o híbridos de estos productos.

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Araña roja de los frutales y la vid Ácaro tetránquido del Pacífico Araña roja de la fresa Araña de dos puntos	2.25 - 4.25 (0.012 - 0.023)
Tiempo de aplicación - Para control de ácaros tetránquidos, aplique apenas aparezcan los primeros ácaros. El control residual de ácaros tetránquidos es mayor con los depósitos de rocío en las hojas más nuevas que en las hojas antiguas. Si es necesario, haga una segunda aplicación para mantener el control. Instrucciones de uso - Ajuste los galones de rociado por acre tomando en cuenta el tamaño y la cantidad de árboles por acre y la densidad del follaje. Resulta esencial hacer una cobertura minuciosa para lograr un buen control de ácaros e insectos. - Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 40 galones/acre. - Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: Dosis máxima de aplicación única: 4.25 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.023 lb de ingrediente activo/acre). Intervalo mínimo de aplicación: 21 días. Dosis máxima anual: 8.5 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. NO exceda 0.046 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). NO haga más de 2 aplicaciones de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina por año. NO lo aplique de forma aérea. NO permita que el ganado padezca en huertos tratados. NO lo aplique desde el inicio de la floración hasta después de que termine la caída de los pétalos. Intervalo previo a la cosecha (PHI): 21 días.	

FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES PEQUEÑAS CON CÁSCARA NO COMESTIBLE SUBGRUPO 24A

Aisen; bilva; uva birmana; Cryptantha; inga; limoncillo chino; lichi; guamúchil; manduro; matisia; mezquite; fruta de mongongo; pawpaw; caimitillo; tamarindo africano; mamoncillo; tamarindo de terciopelo; wampi; manzana estrella blanca africana; incluidas las variedades de especies cultivadas o híbridos de estos productos.

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i> Trips Araña de dos puntos	2.25 - 4.25 (0.012 - 0.023)
Tiempo de aplicación • Ácaros: Aplique cuando los ácaros aparezcan por primera vez durante la primavera, el verano o el otoño. • Moscas minadoras de hojas: aplique para proteger el crecimiento nuevo durante la primavera, el verano o el otoño. • Trips: Las aplicaciones dirigidas a trips solamente controlarán a la generación actual y deben hacerse en el momento apropiado. • Aplique cuando se hayan alcanzado los umbrales económicos (después de que inicie la eclosión de los huevos, de preferencia a principios o mediados de la eclosión). Instrucciones de uso • Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 50 galones/acre con equipo convencional de aplicación terrestre. Si usa un rociador electrostático puede usar menos de 50 galones/acre; sin embargo, no deben usarse menos de 5 galones/acre. • En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.	
Restricciones de uso: • Dosis máxima de aplicación única: 4.25 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.023 lb de ingrediente activo/acre). • Intervalo mínimo de aplicación: 30 días. • Dosis máxima anual: 8.5 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.046 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones de Averland FC o de cualquier otro producto foliar que contenga abamectina por año. • NO lo aplique de forma aérea. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 14 días.	

*No registrado para su uso en California.

TUBÉRCULOS Y CORMO, SUBGRUPO 1C

Arracacha, arrurruz, alcachofa china; tupinambo; achira comestible; yuca, dulce y agria; chayote (raíz); chufa; quiscamote (taro); jengibre; lerén; papa; batata; malanga; cúrcuma; jícama; ñame de puna.

PLAGAS FOLIARES	DOSIS DE USO
	onzas fluidas de producto/acre (libras de ingrediente activo/acre)
Escarabajo de la papa Mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i> Psílido de la papa Ácaros tetraníquidos	1.75 - 3.5 (0.010 - 0.019)
Eliminación: Trips	3.5 (0.019)

Tiempo de aplicación • Para el control del escarabajo de la papa, haga la primera aplicación después de que haya eclosionado aproximadamente el 50% de las masas de huevos y haya presencia de larvas en estadio temprano. Si es necesario hacer dos aplicaciones, límitelas a una sola generación de escarabajo de la papa por cultivo. • Para el control de la mosca minadora de hojas <i>Liriomyza</i>, haga la primera aplicación cuando se observen las primeras moscas adultas. Repita las aplicaciones cuando sea necesario para mantener el control. • Para el control de los ácaros tetraníquidos, haga la primera aplicación cuando aparezcan los primeros ácaros. Repita la aplicación cuando sea necesario para mantener el control. • Para suprimir los trips, aplique en un programa de gestión de trips y cuando los trips estén en un umbral económico. Repita la aplicación cuando sea necesario para mantener el control. Instrucciones de uso • Resulta esencial hacer una cobertura completa del follaje del cultivo para lograr resultados óptimos. Aplique este producto diluido en un volumen mínimo de 20 galones/acre de manera terrestre, o 5 galones/acre de manera aérea. • Con la aplicación aérea y la quimigación, el nivel y la duración del control resultante de insectos y ácaros tetraníquidos podría ser menor que con la aplicación terrestre. • En condiciones de poblaciones grandes de plagas, follaje denso o condiciones adversas para la aplicación (como temperaturas altas), use un volumen de agua mayor para garantizar la cobertura adecuada. • Puede aplicarse mediante quimigación con aspersores elevados para supresión de trips. • Al aplicar al follaje, debe mezclarse con un adyuvante de rociado humectante, propagador o penetrador de tipo no iónico para evitar los residuos ilegales. Consulte la sección Instrucciones de aplicación y mezclado para ver más información.
Control de resistencia: • Escarabajo de la papa: Las aplicaciones a la siguiente generación de escarabajo de la papa deben hacerse con un producto eficaz que tenga un mecanismo de acción diferente.
Precaución: • El control de insectos puede reducirse si se usa Averland FC en combinación con un producto de tipo adherente o aglutinante, como Bravo® Weather Stik®.
Restricciones de uso específicas: • Dosis máxima de aplicación única: 3.5 onzas fluidas de Averland FC/acre (0.019 lb de ingrediente activo/acre) por aplicación. • Intervalo mínimo de aplicación: 7 días. • Dosis máxima anual: 10.25 onzas fluidas de Averland FC/acre/año calendario. ○ NO exceda 0.056 libras de ingrediente activo/acre/año calendario considerando todos los productos que contengan abamectina, incluyendo todos los tipos de aplicación (tratamiento de semillas, tierra, follaje). ○ NO haga más de 2 aplicaciones secuenciales de Averland FC o de cualquier otro producto de aplicación foliar que contenga abamectina. • NO alimente al ganado con follaje tratado, ni permita que lo pasten. • NO aplique Averland FC más de dos veces a una misma generación de escarabajo de la papa, ni en un período de 30 días. • NO use Averland FC como tratamiento de rescate para control de trips. • Intervalo previo a la cosecha (PHI): 14 días.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

No contamine agua, comida ni forrajes mediante el almacenamiento y desecho.

Almacenamiento de pesticidas

Almacene solo en contenedores originales. Almacene en un lugar fresco y seco, de un modo tal que se evite la contaminación cruzada. Mantenga el contenedor cerrado cuando no esté en uso. No lo almacene cerca de alimentos o forraje. En caso de derrame en el piso o en áreas pavimentadas, trapee y retírelo en el área de almacenamiento de desechos químicos hasta que pueda desecharlo adecuadamente si el producto no se puede usar de acuerdo con lo indicado en la etiqueta.

Desecho de pesticidas

Los residuos de pesticidas son muy peligrosos. El desecho inadecuado del pesticida sobrante, la mezcla de aerosol o las aguas de enjuague de contenedores constituye una violación de la Ley Federal. Si estos residuos no pueden ser desechados de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta, comuníquese con la agencia para el manejo de pesticidas o control ambiental de su estado, o al representante para el Manejo de Residuos Peligrosos de la Oficina Regional de la EPA más cercana para obtener indicaciones.

Manipulación de contenedores de 5 galones o más, contenedores no rellenables:

No reutilice ni vuelva a llenar este contenedor. Entréguelo para reciclaje, si la opción está disponible. Enjuague tres veces el contenedor (o realice un procedimiento equivalente) de inmediato después de vaciarlo. Enjuague tres veces, de la siguiente manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o en un tanque de mezclado. Llene $\frac{1}{4}$ del contenedor con agua. Coloque y apriete el tapón. Ponga el contenedor de lado y hágalo rodar hacia adelante y atrás, asegurándose de dar al menos una vuelta completa, durante 30 segundos. Ponga el contenedor en posición vertical e inclínelo hacia adelante y atrás varias veces. Ponga el contenedor sobre el otro extremo e inclínelo hacia adelante y atrás varias veces. Vacíe el agua de enjuague en un equipo de aplicación o un tanque de mezcla, o almacene el agua de enjuague para usarla más tarde o desécharla. Repita este procedimiento dos veces más. Una vez limpio, ofrezca el envase para ser reciclado, o perforélo y deséchelo en un relleno sanitario apropiado, o deseché utilizando otros métodos permitidos por las autoridades estatales y locales.

EL CONTENEDOR NO ES SEGURO PARA ALIMENTOS, FORRAJES NI AGUA PARA BEBER.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
LEA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Condiciones de venta y limitación de garantía y responsabilidad:

AVISO: Lea por completo las instrucciones de uso y las condiciones de venta y limitación de garantía y responsabilidad antes de comprar y usar este producto. Si no acepta estos términos, devuelva el producto de inmediato, sin abrir, y se le devolverá el precio de compra.

Las instrucciones de uso de este producto deben seguirse cuidadosamente. Es imposible eliminar todos los riesgos inherentemente asociados con el uso de este producto. Pueden ocurrir daños a los cultivos, falta de eficacia u otras consecuencias no deseadas debido a factores como el método de uso o aplicación, las condiciones meteorológicas o del cultivo que están fuera del control de Vive Crop Protection o del Vendedor. Todos estos riesgos serán asumidos por el Comprador y el Usuario, quienes acuerdan liberar a Vive Crop Protection y al Vendedor de toda responsabilidad por cualquier reclamo relacionado con dichos factores.

El vendedor garantiza que este producto concuerda con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente adecuado para los propósitos establecidos en las Instrucciones de Uso cuando se usa de acuerdo las dichas instrucciones bajo condiciones normales de uso.

EN LA MEDIDA EN QUE SEA COHERENTE CON LAS LEYES VIGENTES, VIVE CROP PROTECTION NO OFRECE GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD NI DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NI NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA CON RESPECTO A LA SELECCIÓN, COMPRA O USO DE ESTE PRODUCTO.

Cualquier garantía, expresa o implícita, será inaplicable si este producto se ha usado en contravención a las instrucciones de la etiqueta o en condiciones que no sean razonablemente previsibles para el vendedor o Vive Crop Protection (o que estén fuera de su control), y el comprador asume el riesgo de dicho uso.

En la medida en que sea compatible con las leyes vigentes, Vive Crop Protection o el vendedor no serán responsables por daños incidentales, consecuenciales o especiales que resulten del uso o la manipulación de este producto. EN LA MEDIDA EN QUE SEA COHERENTE CON LAS LEYES VIGENTES, LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA DEL USUARIO O COMPRADOR, Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE VIVE CROP PROTECTION Y EL VENDEDOR POR TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES, PÉRDIDAS, LESIONES O DAÑOS (INCLUYENDO RECLAMACIONES BASADAS EN INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O CUALQUIER OTRA CAUSA) QUE SURJAN DEL USO O MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO, SERÁ LA DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O, A ELECCIÓN DE VIVE CROP PROTECTION O EL VENDEDOR, EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO.

Estas condiciones de venta y limitación y de garantía y responsabilidad no se pueden modificar con ningún acuerdo escrito u oral, excepto que esté firmado por un representante autorizado de Vive Crop Protection.

Averland Allosperse y Vive Crop Protection son marcas registradas de Vive Crop Protection Inc.
Bravo® y Weather Stik® son marcas registradas de ADAMA Group Company.

© 2025 Vive Crop Protection Inc. Todos los derechos reservados.