




Protocolo de Actuación en caso de empleados contagiados, contactos estrechos y casos sospechosos de COVID19.

Dirección Recursos Humanos

Mayo 2020





**¿QUÉ HACER SI UN EMPLEADO ES
DIAGNOSTICADO DE COVID-19 DURANTE
LA FASE PREVIA O FASE 1 DEL PLAN DE
RETORNO? ¿Y CON SUS COMPAÑEROS DE
TRABAJO?**

Índice



- 01 | Consideraciones Generales
- 02 | Clasificación de los casos compatibles con COVID19
- 03 | ¿Cómo actuar ante un "caso confirmado"?
- 04 | ¿Cómo actuar ante un "caso sospechoso"?

Índice



05 | ¿Cómo actuar ante un “contacto estrecho”?

06 | ¿Cómo actuar ante un “caso casual”?

07 | Interpretación de las pruebas diagnósticas

1

Consideraciones Generales



El Ministerio de Sanidad, en el marco del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, de 28 de abril, publicó la **Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19**, de 6 de mayo de 2020.

Esta Estrategia establece que el **objetivo** en esta etapa es la detección precoz de cualquier caso que pueda tener infección activa y que, por tanto, pueda transmitir la enfermedad.

Las empresas, a través de los servicios de prevención, deben colaborar con las autoridades sanitarias en la **detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 y sus contactos, para controlar la transmisión.**

1 Consideraciones Generales



El **objeto** de este Protocolo es **Analizar y aplicar** en Haya Real Estate, la **Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19**, de 6 de mayo de 2020 y modificaciones posteriores.

2

Clasificación de los casos compatibles con COVID19



De acuerdo con la normativa aplicable las situaciones frente al COVID19 pueden clasificarse de la siguiente forma:



Caso sospechoso: Se considera caso sospechoso de infección de COVID19 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor de garganta al tragar), anosmia (pérdida total del olfato), ageusia (alteración en el sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección según criterio clínico.



Caso confirmado con infección activa: Se trata de casos con o sin clínica y PCR positiva, o bien casos que cumplen criterio clínico, con PCR negativa y resultado positivo a IgM por serología (no por test rápidos). Se trata de casos que deben ser valorados y confirmados por las autoridades sanitarias, sin que sea válido el autodiagnóstico o la realización de pruebas individuales.



Contacto estrecho:

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados con contacto físico a un caso confirmado, sin la adecuada protección.
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros (ej. visitas, reunión) y durante más de 15 minutos.
- Cualquier persona que haya viajado en un avión, tren u otro medio de transporte terrestre de largo recorrido (siempre que sea posible el acceso a la identificación de los viajeros) en un radio de dos asientos alrededor del caso.



Contacto casual: Cualquier otra persona que haya estado compartiendo espacio cerrado con un caso mientras era sintomático, pero que no cumpla con los criterios de ser contacto estrecho ni sospechoso.

3

¿Cómo actuar ante un “caso confirmado”?



Una vez el diagnóstico sea confirmado por el Servicio Público de Salud, la empresa deberá:

1. **Tramitar la baja laboral** del empleado a través de la Seguridad Social. Se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a **accidente de trabajo**, exclusivamente para la **prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social**, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID19.
2. A partir de ese momento, el empleado **no podrá acceder a las instalaciones** de la empresa hasta que se lo autoricen los médicos dándole el alta.
3. Esto es aplicable incluso si el trabajador es asintomático.
4. Asegurarse que el trabajador informa a las autoridades sanitarias de su enfermedad (en el caso que se hubiera diagnosticado de modo privado, fuera del Servicio Público de Salud).
5. **Reforzar inmediatamente** las medidas de prevención generales: **limpieza de todas las superficies y elementos del centro de trabajo, y especialmente aquellas con las que el empleado infectado hubiera estado en proximidad.**
6. **Reforzar inmediatamente las medidas de prevención** para el conjunto de empleados que sigan trabajando.
7. **Incrementar las medidas de FORMACIÓN e INFORMACIÓN** a empleados para evitar el contagio y la propagación del virus.
8. **Elaborar un listado con todos los empleados que hayan tenido contacto con el caso**, recordando que la transmisión del virus ocurriría, en los casos leves en la primera semana de la presentación de los síntomas, desde 1-2 días antes hasta 5-6 días después. En los casos más graves esta transmisión sería más intensa y más duradera.

4 ¿Cómo actuar ante un “caso sospechoso”?



Si la sospecha surge durante la permanencia del empleado en el centro de trabajo, se deberá:

1. **Solicitar al empleado que haga uso de mascarilla** (si es que no lo estaba haciendo).
2. Su responsable directo, RRHH o el Servicio de Prevención de Haya le informará que al tratarse de un “caso sospechoso”, **debe abandonar el centro de trabajo**.
3. **Vigilancia activa** de los síntomas por parte del Servicio de Prevención de Haya.
4. El empleado permanecerá en **autoaislamiento domiciliario** y contactará con el Servicio Público de Salud según se haya establecido en cada Comunidad Autónoma.
5. **El empleado no podrá acceder a las instalaciones** de la empresa hasta que se lo autoricen los médicos dándole el alta.
6. El empleado podrá continuar **TELETRABAJANDO** si su estado de salud lo permite y en tanto no tenga la baja médica de los Servicios Públicos de Salud.
7. **Seguir las indicaciones generales y específicas del Servicio de Prevención y de las Autoridades Sanitarias.**

5

¿Cómo actuar ante un “contacto estrecho”?



Si el Servicio Público de Salud diagnostica como **caso confirmado de COVID19** a una persona (empleado propio o externo a la compañía) que haya permanecido en las instalaciones de Haya Real Estate, el Servicio de Prevención iniciará el **estudio de sus contactos estrechos**. Una vez confirmado un contacto estrecho:

1. Se **comunicará formalmente al empleado** que está en esa categoría de **“CONTACTO ESTRECHO”**. En dicho comunicado se le facilitará información sobre las pruebas diagnósticas a las que deberá someterse:
 - Test Serológico para todos los contactos estrechos.
 - PCR en aquellos casos en los que el resultado del test serológico sea positivo.

En cualquier caso, ambas pruebas correrán a cargo de la compañía.

2. **Se retirará al empleado del centro de trabajo** y realizará **cuarentena domiciliaria durante 14 días** como máximo, en función de los resultados de las pruebas.
3. **Vigilancia activa** de los síntomas por parte del Servicio de Prevención de Haya.
3. Se **comunicará formalmente al empleado** que está en esa categoría de **“CONTACTO ESTRECHO”**.
4. El empleado desempeñará sus funciones **TELETRABAJANDO**, aislado en su domicilio mientras se mantenga asintomático. Si durante los 14 días posteriores a la exposición, el contacto desarrollara síntomas y la situación clínica lo permite, deberá hacer autoaislamiento inmediato domiciliario y contactar con el Servicio Público de Salud según se haya establecido en cada Comunidad Autónoma.
5. **Seguir las indicaciones generales y específicas del Servicio de Prevención y de las Autoridades Sanitarias.**

6

¿Cómo actuar ante un “contacto casual”?



1. Se puede **continuar con la actividad laboral con normalidad.**
2. **Vigilancia pasiva.** No es necesario tomar medidas específicas, pero si estar alerta por si aparecen síntomas: vigilar tos, fiebre (temperatura superior a 37,8º) y dificultad respiratoria.
3. En caso de aparición de estos síntomas, autoaislamiento domiciliario y contactar con el Servicio Público de Salud según se haya establecido en cada Comunidad Autónoma.
4. Valoración individualizada de cada caso en función del entorno personal concreto.
5. **Seguir las indicaciones generales y específicas del Servicio de Prevención y de las Autoridades Sanitarias.**

7

Interpretación de las pruebas diagnósticas




Cuando una persona se contagia de SARS-COV-2, que es el virus responsable del COVID19, inicialmente se produce un periodo silente en el que no es posible detectar la respuesta por parte del sistema inmune.

Aproximadamente alrededor del 6º - 7º día, nuestro organismo comienza a producir anticuerpos. Se producen primero anticuerpos de tipo **inmunoglobulina M (IgM)** que alcanzan su pico máximo a los 7-10 días para, más tarde, casi desaparecer. Esta respuesta primaria es indicativa de una infección aguda.

Posteriormente se producirá la respuesta inmune secundaria, más rápida, intensa y prolongada en tiempo. Con ella se generan anticuerpos de tipo **inmunoglobulina G (IgG)**.

En el siguiente gráfico podemos ver como se generan los anticuerpos según el paso de los días



Test Serológico

Se basa en la detección de **anticuerpos IgG e IgM** frente al virus.

Pruebas diagnósticas

PCR

Se basa en la detección directa del virus mediante la identificación de un fragmento del **material genético del virus (RNA)**.

Interpretación de las pruebas diagnósticas



Resultados Test Serológico

IgM-

IgG-

El resultado es compatible con ausencia de exposición al virus y también con el periodo ventana de la infección. No se ha desarrollado inmunidad.

IgM-

IgG+

El resultado indica que se está en la fase final de la infección o con la infección curada, y ha desarrollado inmunidad.

NO CONTAGIOSO

IgM+

IgG-

El resultado indica que te encuentras en una fase precoz de la infección.

IgM+

IgG+

El resultado es compatible con la fase activa de la infección y con la fase de recuperación:

- Si el valor de IgM > IgG: está en la fase temprana de la infección.
- Si el valor de IgM < IgG: está en la fase tardía de la infección.

CONTAGIOSO

¿Qué pautas debo seguir tras conocer los resultados?

Reincorporación

si no hay sintomatología clínica y tras 14 días de aislamiento domiciliario para IgM- / IgG -

Aunque debes cuidar las medidas e distancia social e higiene de manos recomendadas por el Ministerio de Sanidad, además de las organizativas de la compañía.



Aislamiento



No es posible la reincorporación
Es necesaria una **prueba de PCR**



7

Interpretación de las pruebas diagnósticas



Resultados PCR	¿Qué pautas debo seguir tras conocer los resultados?
<p>PCR NEGATIVO → Caso confirmado con enfermedad resuelta</p>	<p>Reincorporación si no hay sintomatología clínica</p> <p>Aunque debes cuidar las medidas e distancia social e higiene de manos recomendadas por el Ministerio de Sanidad, además de las organizativas de la compañía.</p> 
<p>PCR POSITIVO → Caso confirmado con infección activa</p>	<p>Aislamiento</p> <p>Se seguirán las pautas indicadas en el punto 3.-¿Cómo actuar ante un “caso confirmado”?, entre otras:</p> 



Dirección de Recursos Humanos

Calle Medina de Pomar, nº 27. CP 28042, Madrid
901 11 77 88 | www.haya.es