


Отчет по анализу социальных сетей и ментального здоровья

1. Ночное использование соцсетей по полам


На данном графике представлено среднее значение использования социальных сетей в ночное время. Это позволяет оценить, какая группа пользователей больше подвержена нарушению режима сна.



Отчет по анализу социальных сетей и ментального здоровья

2. Общая популярность платформ


Распределение пользователей по основным социальным сетям в исследуемом датасете.



3. Предпочтения по полам


Детальное сравнение выбора платформ мужчинами и женщинами. Видно, какие соцсети более 'женские' или 'мужские'.

Отчет по анализу социальных сетей и ментального здоровья



4. Индексы тревоги (GAD-7) и депрессии (PHQ-9)


Сравнение среднего уровня психического дискомфорта в зависимости от основной используемой платформы.



Отчет по анализу социальных сетей и ментального здоровья

5. Зависимость сна от времени в сети


Линейный график показывает тенденцию: как правило, с ростом времени в соцсетях сокращается длительность сна.



6. Самый популярный тип контента

Анализ того, какой формат (видео, текст, истории) привлекает больше всего внимания пользователей.


Отчет по анализу социальных сетей и ментального здоровья



7. Сравнение предпочтений в контенте по полам

Различия в потреблении типов контента между мужчинами и женщинами.


Отчет по анализу социальных сетей и ментального здоровья



8. Тепловая карта взаимосвязей

Матрица корреляции показывает, насколько сильно связаны числовые показатели (возраст, время, баллы GAD/PHQ) между собой.

Отчет по анализу социальных сетей и ментального здоровья



Отчет по анализу социальных сетей и ментального здоровья

9. Результаты машинного обучения

Точность модели (R^2): 0.39

Влияние времени в сети: 1.24

Влияние сна: -0.08

10. Примеры прогнозирования состояния пользователя

Используя обученную модель, мы можем смоделировать состояние типичных пользователей:

Сценарий 1 (Активный пользователь): При 10ч. экрана и 5ч. сна -> Прогноз GAD-7: 14.51 (Высокий уровень)

Сценарий 2 (Умеренный пользователь): При 2ч. экрана и 7ч. сна -> Прогноз GAD-7: 4.40 (Легкая тревога)

Вывод: Модель наглядно демонстрирует, что сокращение экранного времени и увеличение продолжительности сна статистически значимо снижают риск развития тревожных состояний.