

*****ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ**

Морфогенетические механизмы
развития дистрофии://

пиноцитоз, цитопемзис//

+инфильтрация, декомпозиция//

дегрануляция, гипоксия//

деструкция, некробиоз//

перфузия, пенетрация

Какое заболевание может
осложниться развитием

амилоидоза://

гипертоническая болезнь//

атеросклероз //

+ревматоидный артрит //

хронический пиелонефрит//

хроническая ишемическая болезнь

сердца

Железосодержащие пигменты из
гемоглобина://

+ферритин, гемосидерин//

порфирин, гематин//

билирубин, ферритин //

билирубин, гематоидин//

гемомеланин, гематоидин

Определение гематомы://

пропитывание тканей кровью с

повреждением тканевых элементов//

+полость, содержащая

свернувшуюся кровь//

мелкие точечные кровоизлияния//

плоскостные кровоизлияния//

пятнистые кровоизлияния в

слизистых оболочках

Наиболее вероятный источник

тромбоэмболии легочной артерии://

тромбоз воротной вены//

тромбоз мезентеральных артерий//

тромбоз внутри легочных вен//

тромбоз вен тонкой кишки//

+тромбоз вен нижних конечностей

Какие процессы относятся к

приспособительным://

+метаплазия, организация//

агенезия, гипотрофия//

дистрофия, некроз//

гипоплазия, стеноз//

петрификация, декомпенсация

Клеточный атипизм —

гистологические признак: //

лейомиомы//

фибромиомы//

фибромы//

рабдомиомы//

+фибросаркомы

Доброкачественная эпителиальная

опухоль://

саркома//

плоскоклеточный рак//

аденокарцинома//

+папиллома//

гемангиома

Однородные полупрозрачные

белковые массы, напоминающие

гиалиновый хрящ образуются в

соединительной ткани при://

амилоидозе//

гиалиново-капельной дистрофии//

мукоидном набухании//

+гиалинозе//

фибриноидном набухании

Пигмент, накапливающийся в
кардиомиоцитах при бурой
атрофии миокарда: //
билирубин//
гемосидерин//
+липофусцин//
гемомеланин//
порфирин

Один из компонентов пульмоно-
коронарного рефлекса при
тромбоэмболии легочной артерии: //
+спазм ветвей легочной артерии//
спазм ветвей аорты//
паралич ветвей легочной артерии//
паралич коронарных артерий//
паралич мелких бронхов и бронхиол

При очаговом гнойном воспалении
в тканях образуется полость
вследствие://
травмы//
дренирования//
+гистолиза//
апоптоза//
ксантоматоза

Определение компенсации: //
восстановление ткани взамен
утраченной//
переход одного вида ткани в
другой//
величение массы органа//
процессы жизнедеятельности,
направленные на сохранение вида//
+реакции, направленные на
восстановление нарушенной
функции

Форма регенерации сосудов://

пролиферация и дифференцировка
эпителия//
образование грануляционной
ткани://
образование глиальных рубцов//
регенерационная гипертрофия//
+почкование, аутогенное
новообразование

К злокачественным
мезенхимальным опухолям
относятся://
аденокарцинома, плоскоклеточный
рак//
аденома, скirrрозный рак//
+липосаркома, фибросаркома//
рак на месте, папилома//
медуллярный и солидный рак

Вид воспаления вокруг инородных
тел://
альтеративное
экссудативное
+продуктивное
полипозное
кондилломатоз

Микроскопический признак
гидропической дистрофии –
наличие в цитоплазме клеток://
вакуолей с жировыми
включениями//
+вакуолей наполненных
жидкостью//
вакуолей с эозинофильной
зернистостью//
скоплений зерен бурого цвета//
«пылевидная» цитоплазма

Гемоглобиногенные пигменты://
меланин, липохром//

+гемосидерин, билирубин//
адренохром, цероид//
липофусцин, гемофусцин//
пигмент энтерохромаффинных
клеток

Легкие при хроническом венозном
полнокровии - в состоянии://
мутного набухания//
цианотической индурации//
мукоидного набухания//
мускатного фиброза//
+бурой индурации

Благоприятный исход тромбоза://
+асептическое расплавление
тромба//
тромбоэмболия//
септическое расплавление тромба//
организация с полным закрытием
просвета сосуда//
инфицирование тромба

Стадии компенсации://
дистрофия , перестройка//
+становление, истощение//
истощение, некробиоз//
нарушение кровообращения//
альтерация, регенерация

Доброкачественные опухоли из
гладкой и поперечно-полосатой
мускулатуры://
фиброма, фибромиома//
лейомиосаркома,
рабдомиосаркома//
+лейомиома, рабдомиома//
папиллома, аденома//
хондрома, хондромиксома

Локализация первых гематогенных
метастазов саркомы бедра://
печень//
почки//

+легкие//

головной мозг//

лимфатические узлы

Характерный признак
плоскоклеточного орगेвающего
рака://
преобладание стромы//
преобладание паренхимы//
продукция слизи//
трабекулярное строение//
+раковые жемчужины

Наиболее частая причина жирового
гепатоза://
гликогеноз//
вирусный гепатит//
+хронический алкоголизм//
холестаз//

гемосидероз

Распространенный гиалиноз
артериол развивается при: //
атеросклерозе//
+артериальной гипертонии//
артериальной гипотонии//
тромбофлебите//
флеболите

К развитию общего гемосидероза
приводит://
венозное полнокровие легких//
геморрагический инфаркт//
+внутрисосудистый гемолиз
эритроцитов//
образование гематомы//
диапедезное кровоизлияние

Направление движения эмбола при парадоксальной эмболии://
против тока крови
под действием силы тяжести
против градиента давления
из системы воротной вены в вены малого круга кровообращения
+из вен большого круга в артериальное русло, минуя легкие

У ребенка, больного дифтерией, развилась асфиксия, от которой наступила смерть. Какие патоморфологические изменения можно обнаружить при патологоанатомическом исследовании://
в зеве и трахее - геморрагическое воспаление//
в зеве - катаральное воспаление//
+в трахее - пленки рыхло связанные с подлежащими тканями//
в трахее - фибриновая пленка плотно спаянная со слизистой оболочкой//
на миндалинах - фибриновая пленка рыхло связанная с подлежащими тканями

Определение воспаления://
+сосудисто-мезенхимальная реакция ткани в ответ на повреждение//
это восстановление утраченных структур//
безудержный рост клеточных элементов//
гиперплазия ультраструктурных элементов//

циркуляция в кровяном русле инородных тел

Определение регенерации://
переход одного вида ткани в другой//
увеличение объема клеток, ткани органа//
увеличение количества структурных компонентов ткани//
+восстановление структурных элементов ткани взамен погибшей//
уменьшение объема клеток

Злокачественная опухоль из пигментобразующей ткани://
невринома//
+меланома//
астроцитомы//
папиллома//
невус

Макроскопическое выражение гемосидероза легких://
большое пестрое легкое//
+бурая индурация легких//
сотовое легкое//
кистозное легкое//
цирротическое легкое

Исход гидropической дистрофии://
ороговение//
ожирение//
фокальный коагуляционный некроз//
+фокальный колликвационный некроз//
обратное развитие

Белый инфаркт с геморрагическим венчиком развивается в://

головном мозге//
легком//
+миокарде//
кишечнике//
селезенке

Слизистая оболочка толстой кишки
отечна, полнокровна, покрыта
пленкой серовато-коричневого
цвета, которая снимается с трудом.

Характер воспалительного
процесса://

фолликулярный колит//
+дифтеритический колит//
эрозивный колит//
геморрагический колит//
катаральный колит

Характерный путь раннего
метастазирования рака://

гематогенный//
+лимфогенный//
перинеуральный//
ликворный//
контактный//

Неблагоприятный исход тромбоза://
асептическое расплавление тромба//
+отрыв тромба от стенки сосуда//

организация//
васкуляризация//
канализация

Опухоль развивающаяся в
брюшине и плевре://
лейомиома//

остеохондрома//
+мезотелиома//
хондросаркома
рабдомиосаркома

Определение гиперплазии://
уменьшение объема клеток тканей//
разрастание стромы на месте
паренхимы//
восстановление ткани взамен
утраченной//

+увеличение числа структурных
элементов ткани, клеток//
уменьшение числа структурных
элементов ткани, клеток

Зрелые дифференцированные
клетки характерны для://
злокачественной опухоли//
недифференцируемой//
злокачественной и
доброкачественной опухоли//
+доброкачественной опухоли//
злокачественной и пограничной
опухоли

Морфологический признак роговой
дистрофии://

апоптоз//
петрификация//
+гиперкератоз//
амилоидоз//
ксантоматоз

Селезенка при амилоидозе://
сморщенная//
мускатная//
+саговая//

полосатая//
глазурная//

Вид гиперемии при затруднении
кровотока по магистральному
артериальному стволу://
ангионевротическая//
+коллатеральная//

гиперемия после анемии//
вакатная//
воспалительная//

Причина жировой эмболии://
+травматическое разможнение
подкожной клетчатки//
травма головного мозга//
ожирение//
липоматоз//
липосклероз

«Волосатое сердце» - следствие
воспаления://
+крупозного//
дифтеритического//
серозного//
гнилостного//
межуточного

Процесс организации://
амилоидоз//
дистрофия//
гистолиз//
+рубцевание//
метаплазия

У женщины в
постклимактерическом периоде
развилось кровотечение. Было
проведено диагностическое
выскабливание полости матки. В
соскобе – атипичные железистые
структуры с выраженным
клеточным атипизмом.
Патогистологическое заключение://
лейомиома//
лейомиосаркома//
фибромиома//
полип матки//
+аденокарцинома

Определение менингиомы://
опухоль нейроэктодермального
происхождения//
+опухоль из оболочек головного и
спинного мозга//
опухоль вегетативной нервной
системы//
опухоль периферической нервной
системы//
опухоль меланинообразующей ткани

Морфогенетический механизм
амилоидоза://
резорбция//
инфильтрация//
декомпозиция//
трансформация//
+ извращенный синтез

Причина подпеченочной желтухи://
гемолитическая анемия//
малярия//
+желчекаменная болезнь//
сепсис//
вирусный гепатит

Синоним фокального
колликвационного некроза://
жировая дистрофия//
апоптоз//
гиалиново-капельная дистрофия//
паранекроз//
+баллонная дистрофия

Благоприятный исход тромбоза://
+асептическое расплавление
тромба//
тромбоэмболия//
септическое расплавление тромба//

организация с полным закрытием
просвета сосуда//
инфицирование тромба

Фаза пролиферации при воспалении
характеризуется://
повреждением ткани//
нарушением кровообращения//
фагоцитозом//
+размножением клеток в зоне
воспаления//
образованием экссудата

Общепатологический процесс, часто
развивающийся на фоне метаплазии
эпителия://
воспаление//
некроз//
+рак//
амилоидоз//
дистрофия

Формы морфологического
атипизма://
антигенный и биохимический//
функциональный и тканевой//
антигенный и клеточный//
+клеточный и тканевой//
тканевой и функциональный

Микроскопический признак
жировой дистрофии миокарда://
+жировые вакуоли в цитоплазме
кардиомиоцитов//
осmioфильная зернистость
цитоплазмы кардиомиоцитов//
бурый пигмент в цитоплазме
кардиомиоцитов//
осифильные зерна в цитоплазме
кардиомиоцитов//

эозинофильные глыбки в
цитоплазме кардиомиоцитов

Вид сосудисто-стромальной
белковой дистрофии://
баллонная//
роговая//
гиалиново-капельная//
смешанная//
+мукоидное набухание//

Причина местного гемосидероза://
интраваскулярный гемолиз//
+экстраваскулярный гемолиз//
гемохроматоз//
холалемия//
гемолитическая желтуха

Одна из причин сосудистого
некроза://
миелоз//
интоксикация//
инфекция//
+тромбоз//
пелиоз

Исход тромбоза с образованием в
тромбе каналов, выстланных
эндотелием://
эпителизация//
петрификация//
эмболизация//
+реваскуляризация//
организация

При межуточном воспалении
преобладает://
альтеративная тканевая реакция//
экссудативная тканевая реакция//
+продуктивная тканевая реакция//

альтеративно-экссудативная
реакция//
иммунопатологическая реакция

Термин «реституция» обозначает://
+полную регенерацию//
возмещение дефекта ткани//
замещение дефекта рубцом//
регенерационную гипертрофию//
разрастание стромы

Признаки клеточного атипизма://
нарушение соотношения стромы и
паренхимы//
+полиморфизм клеток и ядер,
гиперхромия ядер//
изменение формы и размеров
органа//
мономорфизм клеток и ядер,
гипохромия ядер//
постоянство ядерно-
цитоплазматического соотношения

Опухоль из сухожилий и
сухожильных влагалищ://
десмоид//
хондрома//
фиброма//
+синовиома//
карцинома

Вид желтухи при сепсисе://
печеночная//
+надпеченочная//
подпеченочная//
паренхиматозная//
механическая

Определение петехий://
обширные кровоизлияния//
+точечные кровоизлияния//

сливные кровоизлияния в коже//
плоскостные кровоизлияния//
крупнопятнистые кровоизлияния

Макроскопические изменения
печени при жировой дистрофии://
+увеличена, дряблая, желто-
коричного цвета//
уменьшена, плотная, темно-
коричневая//
увеличена, эластичная, темно-
красная//
уменьшена, плотная, желто-
зеленая//
уменьшена, дряблая, темно-красная

Поверхностная обратимая
дезорганизация соединительной
ткани://
+мукоидное набухание//
фибриноидное набухание//
гиалиноз//
баллонная дистрофия//
гиалиново-капельная дистрофия

Пигмент, образующийся в дне
эрозий слизистой оболочки
желудка://
гемосидерин//
билирубин//
+солянокислый гематин//
ферритин//
цериод

Орган, в котором возможно
развитие гангрены://
головной мозг//
печень//
+легкое//
селезенка//
тимус

Тканевая эмболия может развиваться при://

тромбоваскулите//

бактериальной пневмонии//

+атеросклерозе аорты//

септических родах//

переломах трубчатых костей

Определение викарной гипертрофии://

+гипертрофия одного из парных

органов при удалении второго//

гипертрофия органа при усиленной его работе//

гипертрофия органа при рубцовых изменениях//

нейро-гуморальная гипертрофия//

гипертрофические разрастания

Злокачественная опухоль из гладкомышечной ткани://

рабдомиосаркома//

синовиома//

+лейомиосаркома//

фибромиома//

рабдомиома

Для выявления жировой эмболии применяется краситель://

пикрофуксин//

ШИК-реактив//

+судан III//

берлинская лазурь//

конго красный

Образное название печени при жировой дистрофии://

глазурная//

мускатная//

+гусяная//

сальная//

порфировая

Вторичный амилоидоз - возможное осложнение://

+туберкулеза//

гриппа//

скарлатины//

дифтерии//

рахита

Пигмент старения, изнашивания://

порфирин//

билирубин//

+липофусцин//

гематоидин//

меланин

Омертвление поверхностных участков тела, подвергшихся давлению://

секвестр//

+пролежень//

инфаркт//

нома//

некробиоз

Организация тромба начинается:// в хвосте//

+в месте прикрепления головки//

в теле//

в теле и в хвосте//

одновременно во всех частях

тромба

Фибринозное воспаление серозных оболочек://

катаральное//

дифтеритическое//

флегмона//

серозное//

+крупозное

Вид атрофии мышц конечностей
при атеросклерозе бедренной
артерии://

+атрофия от ишемии//

дисфункциональная//

компрессионная//

от снижения нагрузки//

нейротическая

Рост опухоли в просвет полого
органа://

+экзофитный//

эндофитный//

уницентрический//

мультицентрический//

инвазивный

Опухоль из бурого жира://

липома//

липомиксома//

+гибернома//

лейомиома//

фибромиома//

Гистологический признак

шванномы://

гигантские клетки Березовского//

псевдожелезы//

+тельца Верокаи//

солидные структуры//

псаммомные тельца

Признак хронической сердечной
недостаточности://

+мускатная печень//

фибринозный плеврит//

гусиная печень//

лимфаденопатия//

глазурная печень

Определение меланомы://

бородавчатый невус//

разновидность рака//

злокачественная опухоль из

эпителия//

доброкачественная опухоль из

меланинообразующей ткани//

+злокачественная опухоль из

меланинообразующей ткани

Локализация ретроградных

метастазов рака желудка://

в селезенке//

в почках//

в костях черепа//

в головном мозге//

+в яичниках

Исход инфаркта://

+ организация//

реваскуляризация//

деформация//

реканализация//

аутолитическое расплавление

Вид гнойного воспаления://

фиброма//

+флегмона//

гангрена//

цирроз//

псаммома

Фаза воспаления://

инфильтрация//

десквамация//

+экссудация//

организация//

пенетрация

У мужчины, умершего алкогольной интоксикацией, на вскрытии обнаружена резко увеличенная малокровная печень, тестоватой консистенции, желтого вида. В цитоплазме гепатоцитов выявлены различных размеров оптически пустые вакуоли. Вид дистрофии печени://

углеводная паренхиматозная//
гиалиново-капельная//
мезенхимальная жировая//
+паренхиматозная жировая//
гидропическая

Мужчина умер от тяжелой интоксикацией, обусловленной сепсисом. На вскрытии выявлено "тигровое сердце". При гистохимическом исследовании в цитоплазме кардиомиоцитов обнаружены липиды.

Наиболее вероятный механизм развития этой дистрофии://
+ декомпозиция//
инфильтрация//
трансформация//
извращенный синтез//
нарушение секреции и застой секрета

У мужчины в слизистой оболочке полости рта выявлен белесоватый участок (лейкоплакия). При электронной микроскопии в цитоплазме клеток обнаружено резкое увеличение количества ультраструктур, образованных кератином. На отдельных участках многие из них превращаются в кератогиалин.

Вид паренхиматозной дистрофии://
жировая//
углеводная//
гиалиново-капельная//
+роговая//
гидропическая

У женщины внезапно появился озноб, на губах - герпетические высыпания. Микроскопически в клетках эпидермиса обнаружены крупные вакуоли с оттеснением ядра на периферию и сморщиванием его.

Разновидность паренхиматозной дистрофии, обнаруженной в эпидермисе губ://
жировая//
углеводная//
+баллонная//
зернистая//
гиалиново-капельная

Женщина, на протяжении 10 лет страдала анемией. При исследовании нефробиоптата выявлено накопление крупных зерен белка ярко-розового цвета в цитоплазме эпителиальных клеток почечных канальцев.

Вид дистрофии эпителия почечных канальцев://
паренхиматозная жировая //
паренхиматозная углеводная//
баллонная дистрофия//
гидропическая дистрофия//
+гиалиново-капельная

У мужчины после отравления антифризом развилась картина почечной недостаточности. При

электронной микроскопии биоптата почки в клетках эпителия извитого проксимального канальца обнаружено большое количество вакуолей, набухание и гомогенизация митохондрий с деструкцией крист.

При световой микроскопии вакуоли оказались оптически пустыми, окраска суданом III - отрицательная.

Вид дистрофии эпителия почечного канальца://

паренхиматозная жировая дистрофия//

гиалиново-капельная дистрофия//
баллонная дистрофия//

+гидропическая дистрофия//
паренхиматозная углеводная дистрофия

У ребенка 4-х лет - дифтерия зева.

На 7-е сутки болезни наступила смерть от острой сердечной недостаточности. На вскрытии: полости сердца расширены в поперечнике, мышца сердца тусклая, дряблая, на разрезе пестрая, с желтоватыми участками.

В цитоплазме некоторых кардиомиоцитов выявляются мелкие вакуоли.

Суданом III вакуоли окрашиваются в оранжевый цвет. Вид дистрофии кардиомиоцитов://

углеводная//
баллонная//

гиалиново-капельная//
гидропическая//

+ жировая

Мужчина 30 лет умер при явлениях гнойного перитонита. На вскрытии: печень увеличена в объеме, дряблая, глинистого вида. Микроскопически: цитоплазма гепатоцитов содержит крупные и мелкие оптически пустые вакуоли, которые при окраске осмиевой кислотой приобретают черный цвет.

Вид дистрофии гепатоцитов://

гидропическая дистрофия//

гиалиново-капельная дистрофия//

паренхиматозная углеводная дистрофия//

роговая дистрофия//

+паренхиматозная жировая дистрофия

У женщины 35 лет с Rh (-) кровью родился доношенный ребенок с одноклассной Rh (+) кровью с признаками анемии. На третьи сутки у новорожденного появились симптомы поражения головного мозга. На пятые сутки наступила смерть. Микроскопически: в нейронах - тигролиз и кариолизис, в цитоплазме - оптически пустые вакуоли, не красящиеся суданом III.

Вид дистрофии нейронов://

роговая//

+гидропическая//

гиалиново-капельная//

паренхиматозная жировая//

паренхиматозная углеводная

У больного с нефротическим синдромом в эпителиальных клетках извитых проксимальных почечных канальцев при световой микроскопии обнаружены крупные

глубки розовато-красноватого цвета.

Вид дистрофии эпителия почечных канальцев://

роговая//

гидропическая//

+гиалиново-капельная//

углеводная //

жировая

У мужчины с циррозом печени, печень мелкобугристая, уменьшена в размерах, плотная, желтоватого цвета. Микроскопически: в гепатоцитах выявлены крупные оптически пустые вакуоли, в которых содержится вещество, окрашенное в черный цвет при применении осмиевой кислоты и в оранжевый – при применении красителя судан III. Оптически пустые вакуоли гепатоцитов – это:// псевдовакуоли гиалоплазмы// алкогольный гиалин (тельца Мэллори)//

+крупнокапельная жировая дистрофия//

вакуольная или гидропическая дистрофия//

включения гликогена

При электронной микроскопии миокарда мужчины, страдающего пороком сердца, в цитоплазме кардиомиоцитов обнаружено большое количество набухших митохондрий с деструкцией крист, а также крупных вакуолей, содержащих осмиефильную субстанцию. Эти вакуоли, при окраске гистологических

препаратов суданом III, имеют оранжево-красный цвет. О какой дистрофии идет речь://

гиалиново-капельной//

гидропической (вакуольной)//

баллонной//

+жировой паренхиматозной//

жировой стромально-сосудистой

Женщина болела сахарным диабетом с семи лет. Умерла от кровоизлияния в мозг. На вскрытии почки уменьшены в размерах, поверхность почек мелкозернистая, корковый слой истончен. В почечных канальцах эпителий высокий, со светлой пенистой цитоплазмой. При окраске кармином Беста цитоплазма эпителиальных клеток окрашена в ярко-красный цвет.

Изменения в эпителии почечных канальцев обусловлены наличием:// протеинов//

липидов//

гиалина//

+ гликогена//

солей мочевой кислоты

Женщина болела сахарным диабетом с семи лет. Умерла от кровоизлияния в мозг. На вскрытии печень увеличена в объеме, дряблая, бледная, желтого цвета, глинистого вида. Цитоплазма гепатоцитов светлая, пенистая. На замороженных срезах в ней выявляется вещество, красящееся суданом III в оранжево-красный цвет. Макро- и микроскопические

изменения печени обусловлены
наличием в гепатоцитах:

протеинов//

+липидов//

гиалина//

гликогена//

гликопротеидов

При вскрытии трупа женщины 55
лет патологоанатом обнаружил
накопление AL-амилоида в сердце,
желудочно-кишечном тракте, языке,
коже и по ходу нервов. О какой
форме амилоидоза идет речь в
данном случае://

+первичный идиопатический//

локальный амилоидоз//

ограниченный (местный)//

семейный врожденный//

сенильный (старческий)

Женщина 32 лет на протяжении
нескольких месяцев болела
инфекционно-аллергическим
васкулитом. Умерла от
кровоизлияния в мозг. Стенка
сосудов микроциркуляторного
русла значительно утолщена,
гомогенная, эозинофильная, без
клеточных элементов, резко ШИК-
позитивная, просвет сосудов сужен.

Реакция метакромазии –
отрицательная. Вид стромально-
сосудистой дистрофии://

мукоидное набухание//

фибриноидное набухание//

склероз (фиброз)//

+гиалиноз//

амилоидоз

Мужчина длительно страдал
сахарным диабетом. Умер от
кровоизлияния в мозг.

Макроскопически мелкие сосуды
головного мозга напоминают
утолщенные стекловидные
трубочки хрящевидной
консистенции. Микроскопически
стенка артериол выглядит
гомогенной, эозинофильной, резко
ШИК-позитивна. Такая
морфологическая картина
свидетельствует о развитии://

амилоидоза//

+гиалиноза//

гликогеноза//

липоидоза//

гемосидероза

При вскрытии трупа женщины 70
лет, с клиническим диагнозом "рак
желудка", отмечена кахексия
(резкое истощение). Подкожно-
жировая клетчатка истончена;
межмышечная волокнистая
соединительная ткань и строма
органов замещены слизеподобной
массой, содержащей большое
количество гликопротеидов. Эти
морфологические изменения -
признак дистрофии://

жировой//

белковой//

минеральной//

+ углеводной//

пигментной

У больного, страдающего
ревматоидным артритом, при
микроскопическом исследовании
капсулы коленного сустава выявлен

участок, в котором пучки коллагеновых волокон выглядят гомогенными, эозинофильными, резко ШИК-позитивными. Реакция метакромазии – отрицательная. Данная микроскопическая картина свидетельствует о развитии:// мукоидного набухания// фибриноидного набухания// склероза (фиброза)// +гиалиноза// амилоидоза

У мужчины 45 лет со стенозом митрального клапана произведена биопсия ткани ушка левого предсердия. Микроскопически выявлены участки, в которых коллагеновые волокна сохраняют пучковое строение, однако выглядят набухшими, утолщенными, разволокненными, слегка базофильные (при окраске гематоксилином и эозином), что свидетельствует об обострении процесса и наличии мукоидного набухания. Гистохимическая реакция, необходимая для подтверждения диагноза:// окраска суданом III// конго рот// +окраска толудиновым синим// ШИК-реакция// окраска на гликоген

При вскрытии трупа мужчины средних лет, длительно страдавшего бронхоэктатической болезнью, оба надпочечника резко увеличены в объеме за счет коркового слоя. Надпочечники плотной

консистенции, бледные, сального вида. Микроскопически по ходу ретикулярной стромы, в стенках сосудов отложения гомогенных масс розового цвета, окрашиваемых конго-рот в кирпично-красный цвет, что свидетельствуют о наличии:// +гликозаминогликанов// гликогена// липопротеидов// сложного гиалина +амилоида

У больного, страдающего ревматоидным артритом, при микроскопическом исследовании биоптата капсулы коленного сустава выявлен участок, в котором коллагеновые волокна сохраняют пучковое строение, однако, выглядят набухшими, утолщенными, разволокненными, слегка базофильными (при окраске гематоксилином и эозином). При окраске толудиновым синим этот участок окрашен в пурпурный цвет, что свидетельствует об увеличении содержания:// нейтральных мукополисахаридов// +гликозаминогликанов// гликогена// липопротеидов// сложного гиалина

При вскрытии трупа мужчины средних лет, страдавшего на протяжении 15 лет остеомиелитом, обнаружена спленомегалия (резко увеличенная селезенка). Ткань селезенки хрящевидной консистенции, с сальным блеском.

Равномерно по всей пульпе видны полупрозрачные зерна, которые при микроскопическом исследовании представляют собой фолликулы, замещенные гомогенными, эозинофильными массами, окрашиваемыми конго-рот в кирпично-красный цвет. Эти изменения свидетельствуют о наличии://

мукоидного набухания//
+амилоидоза//
паренхиматозной жировой дистрофии//
гиалиноза//
липоидоза

Виды венозного полнокровия://
сердечное, венозное//
сосудистое, паренхиматозное//
+местное, общее//
токсическое, травматическое//
коллатеральное.

Определение стаза://
замедление оттока венозной крови//
замедление притока артериальной крови//
+ остановка кровотока в микрососудах//
свертывание крови в очаге кровоизлияния//
внутрисосудистый гемолиз эритроцитов

Паренхиматозный диспротеиноз://
мукоидное набухание//
+ гиалиново-капельная дистрофия//
гликогеноз//
липоидоз//
гиалиноз

Паренхиматозная дистрофия миокарда при «тигровом сердце»://
зернистая//
гиалиново-капельная//
гидропическая//
+жировая//
углеводная

Непосредственная причина развития дистрофии://
усиленное поступление в клетку кислорода//
усиление функциональной активности клетки//
+дефицит энергии в клетке//
снижение в клетке синтетических процессов//
усиление гликолитических процессов

Виды стромально-сосудистой дистрофии://
мутное набухание, зернистая дистрофия//
цистиноз, гидропическая дистрофия//
+мукоидное набухание, гиалиноз//
амилоидоз, гиалиново-капельная дистрофия//
гликогеноз, жировая дистрофия

Вид дистрофии в зависимости от локализации://
минеральная//
+смешанная//
белковая//
жировая//
углеводная

Факторы, имеющие значение в патогенезе гидропической дистрофии://
извращенный синтез//
+ избыточное поступление жидкости в клетку из внеклеточного пространства//
фрагментация митохондрий//
образование псевдомиелиновых структур//
избыточное поступление в клетку углеводов из внеклеточного пространства

В каких органах чаще развиваются паренхиматозные диспротеинозы://
мочевой пузырь, матка//
+почки, печень, сердце//
селезенка, лимфоузлы//
костный мозг, тимус//
кости скелета, мышцы

Образное название печени при жировой дистрофии (по макроскопической картине)://
+гусиная печень//
мускатная печень//
ложно-мускатная печень//
глазурная печень//
аспидная печень

Процесс, отражающий адаптацию клетки://
гидропическая дистрофия//
гиалиново-капельная дистрофия//
роговая дистрофия//
+зернистая дистрофия//
пигментная дистрофия

Возможные исходы мукоидного набухания://

склероз, атрофия//
слизистая дистрофия, казеозный некроз//
+обратное развитие, фибриноидное набухание//
амилоидоз, липофусциноз//
фибриноидный некроз, гиалиноз

Исходы фибриноидного набухания:
обратное развитие, мукоидное набухание//
амилоидоз, липосклероз//
+фибриноидный некроз, гиалиноз//
влажный некроз, липофусциноз//
обызвествление, мутное набухание

Заболевание, при котором наблюдается гиалиноз артериол:
+гипертоническая болезнь//
атеросклероз//
туберкулёз//
злокачественные опухоли//
доброкачественные опухоли

Возможная локализация амилоида в тканях органов при микроскопии:
отложение амилоида в гепатоцитах//
отложение амилоида в эпителии канальцев почки//
+по ходу ретикулярных и коллагеновых волокон стромы//
отложение амилоида в цитоплазме нейронов//
отложение амилоида в альвеолоцитах

Какие органы поражаются при первичном генерализованном амилоидозе:
желудочно-кишечный тракт//
дыхательные пути//

костная ткань, суставы//
+сердечно-сосудистая система,
мышцы//
нервные волокна, ганглии

Заболевание, при котором в
мочевыводящих путях образуются
камни://
нефроптоз//
пионефроз//
некронефроз//
нефросклероз//
+нефролитиаз

Вокруг очага инфаркта в живых
тканях развивается://
Склероз//
Фиброзная капсула//
Продуктивное воспаление//
+Демаркационное воспаление//
Регенерационная гипертрофия

Панцирное сердце развивается в
исходе перикардита://
гнойного//
геморрагического//
+фибринозного//
катарального//
серозного

Вид тромба при стенозе левого
атриовентрикулярного отверстия://
дилатационный //
марантический//
пристеночный//
+шаровидный//
прогрессирующий

Очаг некроза при инфаркте
миокарда:
белый//

+белый с геморрагическим
венчиком//
красный//
красный с белым венчиком//
серый

Характеристика мукоидного
набухания://
развивается в клетках
соединительной ткани//
+развивается в основном веществе
соединительной ткани//
характеризуется накоплением
липидов//
характеризуется накоплением
гликогена//
необратимый процесс

Макроскопическая характеристика
органов при амилоидозе://
уменьшены, синюшные//
+увеличены, плотной
консистенции//
дряблой консистенции, увеличены//
плотные, уменьшены//
на разрезе имеют пеструю окраску

Краситель, выявляющий очаги
мукоидного набухания://
конго красный//
судан III//
пикрофуксин//
+толуидиновый синий//
ШИК - реактив

Изменение в ткани в ответ на
выпадение солей мочевой
кислоты://
гиалиноз//
малокровие//
+некроз, воспаление//

гипертрофия, гиперплазия//

гиперемия

Органы, в которых развивается
метастатическое обызвествление://

+легкие, почки, сердце//

селезенка, надпочечник, головной
мозг//

печень, пищевод, кишечник//

вены, конечности, кожа//

пищевод, поджелудочная железа

Чем характеризуется фаза

экссудации://

дистрофией//

+миграцией форменных элементов
крови//

размножением клеток//

выделением медиаторов//

некрозом

Вид фибринозного воспаления://

абсцесс//

флегмона//

катаральное//

+дифтеритическое//

гранулематозное

Основной признак катарального

воспаления://

образование гноя с деструкцией
ткани//

образование пленки на воспаленной
поверхности//

скопление эритроцитов в экссудате//

+гиперпродукция слизи и стекание

экссудата с воспаленной

поверхности//

расплавление ткани

Чем характеризуется фаза

пролиферации воспалительной
реакции://

повреждением ткани//

нарушением кровообращения//

гистолизисом//

образованием экссудата//

+размножением клеток в зоне
воспаления

Гранулема специфического

воспаления://

туберкулома//

гранулема Попова//

+гумма//

брюшнотифозная гранулема//

гранулема Ашоффа-Талалаева

Клетки, преобладающие в составе

туберкулезной гранулемы://

гистиоциты//

+эпителиоидные//

лейкоциты//

базофильные макрофаги//

клетки Микулича

Изменение тимуса, при нарушении

иммуногенеза://

воспаление//

возрастная инволюция//

+акцидентальная инволюция//

амилоидоз//

гемохроматоз

Патологический процесс - признак

реакции гиперчувствительности

замедленного типа://

инфаркт//

фибриноидный некроз//

+образование гранулем//

восковидный некроз//

образование полипов

Истинное аутоиммунное

заболевание://

язвенная болезнь желудка//

+тиреоидит Хашимото//

туберкулез//

хроническая аневризма//

цирроз печени

Реакция лимфоидной ткани

лимфатических узлов на

воздействие антигена://

экссудативное воспаление//

+гиперплазия, плазмочитарная

трансформация//

гипоплазия, атрофия//

амилоидоз, ретикулез//

некроз, апоптоз

Виды репаративной регенерации://

физиологическая, патологическая//

+полная, регенерационная

гипертрофия//

метаплазия, гиперплазия//

переход одного вида ткани в

другой//

дисплазия, петрификация

Вид регенерации://

викарная//

+внутриклеточная//

гиперпластическая//

компенсаторная //

компрессионная

Вид гипертрофии в зависимости от

механизма возникновения://

+компенсаторная//

от давления//

нейротическая//

алиментарная//

репаративная

Злокачественные мезенхимальные

опухоли://

фиброма, хондрома//

+лейомиосаркома,

рабдомиосаркома//

фибромиксома, гемангиома//

рабдомиома, лейомиома//

остеома, фибролипома

Определение анаплазии опухоли://

нарушение обмена веществ в

опухоли//

кровоизлияния, некроз опухоли//

метастазирование опухоли//

+«возврат» ткани опухоли к более

примитивному строению и обмену//

инфильтрирующий рост опухоли

Характеристика фиброзного рака://

отсутствие стромы//

равное соотношение стромы и

паренхимы//

преобладает паренхима//

+преобладает строма//

отсутствие сосудов

Органоспецифическая

доброкачественная опухоль

гипофиза://

+хромофобная аденома//

семинома//

альдостерома//

хорионэпителиома//

фиброаденома

Доброкачественная опухоль из

покровного эпителия://

невус//

аденокарцинома//
хорионэпителиома//
+папиллома//
цистаденома

Характеристика доброкачественной
опухоли://
клеточный атипизм, тканевой
атипизм//
+тканевой атипизм, экспансивный
рост//
инфильтрирующий рост, клеточный
атипизм//
инвазивный рост, полиморфизм//
дает метастазы, рецидивировать

Определение рака://
злокачественная опухоль из
мезенхимы//
+злокачественная опухоль из
эпителия//
злокачественная опухоль из
меланинообразующей ткани//
глиальная опухоль//
тератоидная опухоль

Основной принцип
морфологической классификации
опухолей://
патогенетический//
+гистогенетический//
по характеру роста;
по характеру метастазирования//
по локализации

Стадия амилоидоза почек://
шоковая//
олигоанурическая//
+нефротическая//
восстановление диуреза//
резидуальная

Лейкодерма развивается в исходе://
анемии//
меланомы//
скарлатины//
лейкоза//
+сифилиса

Формы нарушения обмена
кальция://
+метастатическая, дистрофическая//
метастатическая, сосудистая//
дистрофическая, воспалительная//
метастатическая, экссудативная//
дистрофическая, пролиферативная

Местный фактор
камнеобразования://
нарушение обмена веществ//
малокровие//
+гиперсекреция, воспаление//
полнокровие//
нарушение кровообращения

Сердце дряблое, полости
расширены, под эндокардом серо-
желтые полосы. Причина://
липофусциноз//
белковая парехиматозная дистрофия
//
+жировая парехиматозная
дистрофия //
белковая мезенхимальная
дистрофия//
жировая мезенхимальная
дистрофия

Малярийный пигмент://
порфирин//
+гемомеланин//
гематоидин//

гемосидерин//

билирубин

По содержанию каких пигментов

определяют давность

кровоизлияния в тканях://

гемомеланин и гематин//

порфирин и меланин//

билирубин и липофусцин//

+гемосидерин и гематоидин//

билевердин и гематин

Непосредственная причина

развития известковых метастазов://

гиперкальциемия//

некроз, дистрофия//

гипокальциемия//

диспротеинемия//

воспаление

Морфологические признаки некроза
клетки://

аутолиз, смерть клетки//

+кариорексис, плазмолизис//

паранекроз, патобиоз//

анабиоз, некробиоз//

дистрофия

Определение гангрены://

сосудистый некроз//

токсический некроз//

+некроз тканей, соприкасающихся с
внешней средой://

сухой некроз//

влажный некроз

Какой из некрозов называется

инфарктом://

+сосудистый//

токсический//

аллергический//

трофоневротический//

травматический

Скопление отечной жидкости в

подкожной клетчатке называется://

асцитом//

эксикозом//

+анасаркой//

гиперемией//

гидротораксом

Состав красного тромба://

+фибрин, тромбоциты, эритроциты//

лейкоциты, фибрин, белки плазмы//

эритроциты, фибрин, лейкоциты//

эритроциты, фибрин, лимфоциты//

эритроциты, лейкоциты, плазма

крови

Определение эмболии://

прижизненное свертывание крови в
сосудах//

циркулирующая в крови форменных
элементов//

+закупорка сосудов

циркулирующими в крови

частицами, не встречающимися в

норме//

прижизненное свертывание крови,

излившейся в ткани//

выход крови из сосуда

Вид эмболии, который лежит в

основе развития метастазов

опухоли://

+тканевая//

жировая//

газовая//

воздушная//

тромбоэмболия

Пример ложной гипертрофии://
гипертрофия мочевого пузыря при
гиперплазии предстательной
железы//

викарная гипертрофия почек//
железисто-кистозная гиперплазия
эндометрия//
+гидронефроз//
компенсаторная гипертрофия
миокарда

Определение венозного
полнокровия://
замедление притока крови//
+затруднение оттока крови//
усиление притока крови//
усиление оттока крови//
остановка кровотока

Определение регенерации://
переход одного вида ткани в
другой//
+восстановление ткани взамен
утраченной//
увеличение объема клеток, ткани,
органа//
уменьшение объема клеток, ткани,
органа//
возмещение утраченной функции

Виды местной атрофии://
дистрофическая, некротическая//
+дисфункциональная,
нейротическая//
церебральная, гипофизарная//
кахектическая, алиментарная//
хроническая, патологическая

Виды общей атрофии://
дистрофическая, некротическая//
+раковая, туберкулезная//

хроническая, патологическая//
от сдавления, ишемическая//
дисфункциональная, гормональная

Условие, способствующее развитию
жировой эмболии://
ранение вен шеи//
слабость родовой деятельности//
кессонные работы//
+переломы трубчатых костей//
операция на органах малого таза

Внутренняя оболочка стенки
хронического абсцесса://
хитиновая оболочка//
+пиогенная мембрана//
герминативная оболочка//
грануляционная ткань//
базальная мембрана

Определение флегмонозного
воспаления://
межуточное продуктивное
воспаление//
очаговое экссудативное
воспаление//
осумкованный гнойник//
+диффузное гнойное воспаление//
апостематоз

Макроскопический признак
тромба://
гладкая блестящая поверхность//
свободно извлекается из сосуда//
эластичный//
+шероховатая тусклая поверхность//
циркулирует с током крови

Морфологический признак роговой
дистрофии://
отложение извести внутри клетки//

+гиперкератоз//
омертвление клеток//
развитие опухоли//
уменьшение клеток в размере

Исход гидропической дистрофии://
роговая дистрофия//
гиалиново-капельная дистрофия//
фокальный коагуляционный
некроз//
+фокальный колликвационный
некроз//
обратное развитие

Разновидность некроза костной
ткани://
пролежень//
гангрена//
инфаркт//
+секвестр//
нома

Частая локализация фибриноидного
некроза://
мышцы//
нервная ткань//
костная ткань//
+стенка сосуда//
жировая ткань

Скопление крови в брюшной
полости:
гемоперикард//
гематома//
+гемоперитонеум//
перитонит//
метроррагия

Механизм кровотечения://
разрыв капсулы органа//
+разъедание стенки сосуда//

расплавление закупоривающего
тромба//
разрыв стенки кишки//
разрыв стенки перикарда

Неблагоприятный исход
гематомы://
киста//
гемосидероз//
атрофия//
склероз//
+нагноение//

Локализация катарального
воспаления://
стромы органа//
серозные оболочки//
паренхима печени//
+слизистые оболочки//
капсулы органов

Наиболее вероятная причина
гемосидероза легких://
+хронический венозный застой//
аутоиммунное поражение легких//
острое венозное полнокровие
легких//
нарушение всасывания железа в
кишечнике//
интоксикация гемолитическими
ядами

Краситель, определяющий липиды в
гистологических срезах://
конго красный//
гематоксилин//
+судан IV//
толуидиновый синий//
пикрофуксин

Наиболее вероятная локализация
лейомиомы://
желудок//

кишечник//
+стенка матки//
кожа//
пищевод

Определение олигодендроглиомы://
доброкачественная мезодермальная
опухоль//

злокачественная менинготелиозная
опухоль//
+доброкачественная глиальная
опухоль//

злокачественная неврогенная
опухоль//
злокачественная
эпендимарная опухоль

Доброкачественная опухоль
периферической нервной системы://
+неврилеммома (шваннома)//
гемангиома//
миома//

лейомиома//
рабдомиома

Процесс нарушения пролиферации
и дифференцировки эпителия://
Метаплазия//

Организация//
+Дисплазия//
Воспаление//

Некроз

При кахексии отмечается://
плоскоклеточная метаплазия
bronхов//
+бурая атрофия миокарда//
гидронефроз//

гемосидероз печени//
атрофия коры головного мозга

Местные предпосылки
тромбообразования//
+нарушение целостности
сосудистой стенки //
нарушение соотношения
свертывающей и
противосвертывающей систем//
изменение качества крови//
изменение количества крови//
функциональное перенапряжение
органа

Наиболее вероятный источник
тромбоэмболии легочной артерии//
тромбоз воротной вены //
тромбоз мезентериальных артерий //
тромбоз внутрилегочных вен //
тромбоз вен тонкой кишки//
+тромбоз вен нижних конечностей

ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

Причина развития инфаркта
миокарда при гипертонической
болезни://
+длительный артериолоспазм//
тромбоз артерий//
тромбоэмболия//
функциональное напряжение в
условиях недостаточного
кровоснабжения//
компрессия артериальных сосудов//

Патогенетический путь развития
хронического неспецифического
заболевания легких://

аспирационный//
+бронхитогенный//
гематогенный//
лимфогенный//
периневральный

Helicobacter pylori - этиологический
агент хронического гастрита://

типа А//
+типа В//
типа С//
эозинофильного//
гранулематозного

Осложнение портальной
гипертензии у больных циррозом
печени: //

острая сердечная недостаточность//
острая почечная недостаточность//
кровоизлияние в головной мозг//
+кровоотечение из варикозных вен
пищевода//

надпочечниковая недостаточность

Образное название сердца при
уремии://

тигровое//
бычье//
гигантское//
капельное//
+волосатое

«Рисовые тельца» образуются при://
ревматизме//

+ревматоидном артрите//
системной красной волчанке//
дерматомиозите//
склеродермии

Частая причина смерти при
гипертонической болезни: //

сепсис//
+кровоизлияние в мозг//
дыхательная недостаточность//
тромбоэмболический синдром//
кахексия//
фиброзные бляшки, гранулематоз

Метаплазия эпителия бронхов
характерна для://

острого бронхита//
+хронического бронхита//
инфаркта легкого//
пневмосклероза//
абсцессов легкого

Признаки обострения язвенной
болезни://

малигнизация//
+фибриноидный некроз,
воспаление//
атрофия слизистой оболочки//
появление полипозных
разрастаний//
рубцовая деформация, стеноз

Формы хронического гепатита://
геморрагический, некротический//
+активный, персистирующий//
коматозный//
абсцедирующий, септический//
холангиоцеллюлярный

Почки атрофированы
несимметрично, с крупнобугристой
поверхностью у больных://
подострым гломерулонефритом//
гипертонической болезнью//
+атеросклерозом//

амилоидным нефрозом//
хроническим пиелонефритом

Макроскопические изменения
сердца при остром инфаркте
миокарда://
крупный серый участок в миокарде
неправильной формы//
+желтый участок миокарда на
разрезе, окруженный красноватой
каемкой//
сероватые мелкие рубчики на
разрезе в толще миокарда//
в миокарде ярко-розовый участок
треугольной формы//
слегка возвышающееся над
поверхностью миокарда пятно
молочного цвета

Морфологический эквивалент
острой почечной недостаточности://
парапротеинурический нефроз//
липидный нефроз//
+некротический нефроз//
первично-сморщенная почка//
синдром Альпорта

Смертельное осложнение инфаркта
миокарда://
кровоизлияние в мозг//
хроническая аневризма //
эндотоксический шок//
тромбоэмболия легочной артерии//
+гемотампонада сердца

Характерное изменение сосудов в
селезенке при системной красной
волчанке://
микроаневризма//
атерокальциноз//
эндотелиоз//

+луковичный склероз//
перителиоз

Характерные признаки
хронического гастрита://
клеточный атипизм//
+метаплазия эпителия, воспаление//
некроз эпителия, эрозии//
фибринозное воспаление,
кровоизлияния//
гиперемия, гранулематоз

Для цирроза печени наиболее
характерны: //
воспаление, гиперемия,
геморрагии//
атрофия, малигнизация, пелиоз//
метаплазия, реституция, некроз//
поликистоз, абсцессы, гранулемы//
+ложные долики, узлы-регенераты,
фиброз

При мочекаменной болезни чаще
развивается://
сосудистый нефросклероз//
+калькулезный пиелонефрит//
острый гломерулонефрит//
амилоидный нефроз//
первичный поликистоз

Хроническая язва желудка может
осложниться пенетрацией в://
сальник//
+поджелудочную железу//
печень//
селезенку//
толстый кишечник

Эмболический гнойный нефрит
является морфологическим
проявлением://

неосложненной пневмонии//
+септикопиемии//
дифтерии//
пиелита//
септицемии

Наиболее частая причина жирового гепатоза://
гликогеноз//
вирусный гепатит//
+хронический алкоголизм//
холестаз//
гемосидероз

Распространенный гиалиноз
артериол развивается при: //
атеросклерозе//
+артериальной гипертонии//
артериальной гипотонии//
тромбофлебите//
флеболите

Фактор, имеющий наибольшее
значение в развитии
атеросклероза://
анемия//
тромбоз//
дефицит фибриногена//
состояние иммунитета//
+гиперлипидемия

Вторая стадия крупозной
пневмонии://
прилива//
разрешения//
+красного опеченения//
серого опеченения//
ремиссии

Возможное осложнение острого
флегмонозного аппендицита: //

амилоидоз внутренних органов//
кровотечение, анемия//
малигнизация//
+абсцедирование печени//
пневмония

Характерный признак алкогольного
гепатита:
метаплазия, регенерация//
мускатной печени//
+жировая инфильтрация печени//
кровоизлияние в ткань печени//
абсцедирование

Возможная причина смерти
больных при ревматизме://
+декомпенсация порока сердца//
тампонада полости перикарда//
кровоизлияние в мозг//
острая почечная недостаточность//
острая печеночная недостаточность

Причина смерти при острой
ишемической болезни сердца: //
компенсированная гипертрофия
сердца//
хроническая сердечная
недостаточность//
кома гиповолемическая//
+острая сердечная
недостаточность//
декомпенсированный порок сердца

Название изменений почки при
гипертонической болезни://
амилоидно-сморщенная почка//
вторично сморщенная почка//
гидронефроз//
+первично-сморщенная почка//
поликистоз почек

Приобретенный порок сердца
формируется в исходе://
+ревматического эндокардита//
инфекционного перикардита//
межуточного миокардита//
острого бактериального
панкардита//
гранулематозного миокардита

Воспаление легких, развивающееся
в связи с бронхитом или
бронхиолитом://
межальвеолярная//
+бронхопневмония
плевропневмония//
межлобулярная//
хроническая

Возможный исход хронического
вирусного гепатита://
мулосклероз печени//
бурая атрофия печени//
гликогеноз//
гемосидероз//
+цирроз печени

Асцит при циррозе печени
обусловлен://
воспалением//
печеночной недостаточностью//
гиперэстрогемией//
желтухой//
+портальной гипертензией

Полулуния в клубочках при
гломерулонефрите образуются в
результате://
инфильтрации лейкоцитами//
плазморрагии//
+пролиферации нефротелия//

пролиферации сосудов в
клубочках//
гиалиноза сосудов

Патологический процесс, лежащий
в основе острого пиелонефрита://
+воспаление//
гиалиноз//
гипертрофия//
амилоидоз//
атрофия

Заболевание, характеризующееся
избыточным содержанием воздуха в
легких://
бронхиальная астма//
+эмфизема легких//
бронхоэктатическая болезнь//
хронический бронхит//
крупозная пневмония

Исход ревматического клапанного
эндокардита://
разрыв сердца//
тампонада полости перикарда//
инфаркт миокарда//
хроническая аневризма//
+порок сердца

Стадия разрешения крупозной
пневмонии наступает от начала
болезни на://
1 день//
2 день//
4-6 день//
+9-11 день//
20 день

Для какой формы острого
вирусного гепатита характерно

вовлечение в процесс мелких
желчных протоков://
+холестатической//
циклической желтушной//
молниеносной//
безжелтушной//
некротической

Морфологический признак
некротического нефроза://
воспаление почечных клубочков//
+некроз эпителия извитых
канальцев главных отделов
нефрона//
фибриноидный некроз капилляров
почечных клубочков//
рубцовое сморщивание почек//
зернистая дистрофия эпителия
канальцев

Характер воспаления в слизистой
оболочке желудка и кишечника при
уремии://
гнилостное//
гнойное//
серозно-геморрагическое//
+фибринозное//
продуктивное

Сроки развития рецидивирующего
инфаркта миокарда://
+в течение 4 недель после
инфаркта//
спустя 8 недель после инфаркта//
спустя 12 недель после инфаркта//
спустя 3 месяца после инфаркта//
спустя 6 месяцев после инфаркта

Ревматоидный фактор при
ревматоидном артрите
продуцируется в://

слизистых оболочках//
+синовиальных оболочках//
печени//
почках//
надпочечниках

Острый деструктивный процесс в
легких://
+абсцесс легкого//
хронический бронхит//
бронхоспазм//
интерстициальное воспаление//
пневмосклероз

Поверхностный дефект в
результате некроза слизистой
оболочки://
острая язва//
хроническая язва//
+эрозия//
инвазия//
дисплазия

Макроскопическая характеристика
почки при остром
гломерулонефрите://
большая сальная почка//
первично-сморщенная почка//
вторично-сморщенная почка//
+большая пёстрая почка//
большая белая почка

Для трансмурального инфаркта
миокарда характерно://
очаг некроза только в сосочковых
мышцах//
+некроз всей толщи миокарда//
гипертрофия миокарда//
только субэндокардиальные участки
некроза//
мелкоочаговый кардиосклероз

Синоним ревматоидного артрита://
болезнь Шегрена//
инфекционный полиартрит//
системная красная волчанка//
дерматомиозит//
+болезнь Сокольского-Буйо

Внелегочное осложнение крупозной
пневмонии при гематогенной
генерализации воспалительного
процесса://
гнойный медиастенит//
+гнойный менингит
абсцесс легкого//
эмпиема плевры//
регионарный лимфаденит

Форма деструктивного
аппендицита://
+флегмонозно-язвенный//
простой//
поверхностный//
атрофический//
гиперпластический

Частая причина смерти больных при
алкогольном циррозе://
сердечная недостаточность//
гепатоцеллюлярная
недостаточность//
почечная недостаточность//
инфекционно-токсический шок//
+кровотечение из варикозно
расширенных вен пищевода

Стадия острой почечной
недостаточности://
латентная//
+олигоанурическая//
протеинурическая//

нефротическая//
склерозирования

Первично-сморщенная почка при
гипертонической болезни://
уменьшена в размерах, поверхность
- крупнобугристая//
+уменьшена в размерах,
поверхность – мелкозернистая//
увеличена в размерах, на разрезе -
дольчатого вида//
увеличена, дряблая, поверхность –
гладкая//
уменьшена в размерах, поверхность
с рубцовыми втяжениями

Грозное осложнение ревматоидного
артрита://
сепсис//
ДВС-синдром//
СДРВ-синдром//
+амилоидоз//
шок

Общий реактивный процесс при
крупозной пневмонии://
эмпиема плевры//
+гиперплазия селезенки//
абсцесс легкого//
карнификация//
гангрена легкого

Морфологическая форма острого
аппендицита://
+простой//
гипертрофический//
атрофический//
глубокий//
гиперпластический

Форма острого гепатита с
массивными некрозами://
безжелтушная//
+молниеносная//
холестатическая//
циклическая желтушная//
реактивная

Клубочки при интракапиллярном
гломерулонефрите имеют вид://
полулуния//
+лапчатый вид//
сетчатый вид//
глыбчатый//
гомогенный

Признаки стадии липоидоза при
атеросклерозе артерий://
повышение проницаемости
эндотелия и мембран интимы//
накопление гликозаминогликанов в
интимае//
разрастание в интимае молодой
соединительной ткани//
+инфильтрация интимы
холестерином, липопротеидами//
изъязвления, кальциноз

Состав экссудата в 3-й стадии
крупозной пневмонии://
фибрин, эритроциты//
+фибрин, лейкоциты//
серозный экссудат//
слизистый экссудат//
геморрагический экссудат

Алкогольный гиалин при
алкогольном гепатите://
+тельце Маллори//
тельце Каунсильмена//
тельце Жиля//

тельце Муно//
тактильное тельце

Образное название печени при
жировой дистрофии (по
макроскопической картине)://
+гусиная печень//
мускатная печень//
ложно-мускатная печень//
глазурная печень//
аспидная печень

Гастрит типа А локализуется в
отделе желудка://
пилорическом//
антральном//
+фундальном//
кардиальном//
во всех отделах

При гастрите типа А в крови
обнаруживаются антитела к
клеткам://
+париетальным//
главным//
добавочным//
G-клеткам//
Т-лимфоцитам

При хроническом гастрите
морфологические изменения
слизистой оболочки обусловлены://
казеозным некрозом//
пролиферацией эпителия//
гиалинозом стенок сосудов//
продуктивным воспалением//
+нарушением регенерации эпителия

Кишечная метаплазия может
развиваться при хроническом
гастрите://

поверхностном//
продуктивном //
гранулематозном//
+атрофическом//
катаральном

На фоне хронического
атрофического гастрита часто
развивается://
хроническая язва//
острая язва//
эрозия//
+рак//
полип желудка

Эрозию слизистой оболочки
желудка от острой язвы отличает://
склероз дна//
+глубина некроза//
воспалительная реакция//
гипертрофия желез в краях//
атрофия слизистой оболочки

Гнойный тромбофлебит
брыжеечных вен аппендикса может
осложниться://
абсцессами легких//
+абсцессами печени//
флегмоной желудка//
флегмоной аппендикса//
самоампутацией отростка

Осложнение хронического
аппендицита://
кровотечение//
муковисцидоз//
миксома//
+миксоглобулез//
мезентериолит

Склероз и атрофия всех слоев стеки
аппендикса с облитерацией
просвета отмечается при://
простом аппендиците//
деструктивном аппендиците//
ложном аппендиците//
апостематозном аппендиците//
+хроническом аппендиците

При вторичном билиарном циррозе
печень://
+ темно-зеленого цвета//
мягкая//
уменьшена в размере//
поверхность гладкая//
капсула резко утолщена

Морфологические признаки цирроза
печени://
гнойное воспаление//
+структурная перестройка//
стаз//
тромбоз//
липоматоз

Желчные стазы характерны для://
+билиарного цирроза//
постнекротического цирроза//
жирового гепатоза//
аутоиммунного гепатита//
хронического активного гепатита

Причина первичного
нефросклероза://
пиелонефрит//
гломерулонефрит//
+атеросклероз//
амилоидоз//
туберкулез

Заболевание, при котором в
мочевыводящих путях образуются
камни://

нефроптоз//
пионефроз//
некронефроз//
нефросклероз//
+нефролитиаз

Осложнение пиелонефрита://
парапроктит//
перитонит//
папилломатоз//
+папиллонекроз//
пилоростеноз

Причина вторичного
нефросклероза://
гипертоническая болезнь//
+диабетический гломерулосклероз//
атеросклеротический
артериосклероз//
нефротическая гипертензия//
тромбоэмболия почечной артерии

Макроскопически, участок некроза
в сердце можно увидеть от начала
ишемии, через://
1-2 часа//
4-6 часов//
+18-24 часов//
72 часа//
8-16 часов

На вскрытии умершего от инфаркта
миокарда в полости перикарда
обнаружена жидкая кровь и
свертки. Это следствие://
асистолии//
+миомаляции//
тромбоэмболии//

кардиогенного шока//
фибрилляции желудочков

На створках деформированных,
склерозированных митральных
клапанов обнаружены плотные
«бородавки». Это признак
эндокардита://
острого бородавчатого//
острого септического//
хронического абактериального//
+возвратно-бородавчатого//
простого вальвулита

Возможное смертельное
осложнение при ревматическом
бородавчатом эндокардите://
фиброэластоз эндокарда//
гемоперикардиум//
+тромбоэмболия//
аневризма сердца//
отек мозга

Инфаркт миокарда,
распространяющийся на всю
толщу сердечной мышцы://
субэпикардальный//
субэндокардиальный//
интрамуральный//
+трансмуральный//
перикардальный

По периферии постинфарктного
рубца - миокард в состоянии://
атрофии//
склероза//
+гипертрофии//
фиброза//
некроза

В старческом возрасте возникает
эмфизема легких://
викарная//
буллезная//
+сенильная//
межуточная//
обструктивная

Морфологический признак,
отличающий хронический абсцесс
от острого://

гистолиз в центре абсцесса//
наличие пиогенной мембраны//
наличие полости заполненной
гноем//

инфильтрация

полиморфноядерными

лейкоцитами//

+ наличие соединительнотканной
капсулы.

Какое изменение лежит в основе
развития легочного сердца при
ХОБЛ://

гипертрофия левого желудочка//
+ гипертрофия правого желудочка//
ожирение сердца//
бурая атрофия миокарда//
дилатационная кардиомиопатия//

«Писчие перья» на поверхности
разреза ткани легкого являются
признаком://

острого бронхита//

бронхоэктазии//

буллезной эмфиземы//

пневмонита//

+ хронического бронхита

Причиной развития
цилиндрического бронхоэктаза
является://

+ катаральный бронхит//

перибронхит//

перибронхиальный склероз//

деструктивный панбронхит//

деструктивный бронхиолит

Форма острого бронхита://

склерозирующий//

фибропластический//

деформирующий//

полипозный//

+катаральный

Артерии каких органов наиболее
часто поражаются при
атеросклерозе://

печени, селезенки//

+сердца, головного мозга//

надпочечников, тимуса//

селезенки, поджелудочной железы//

щитовидной железы, гипофиза

Морфологические признаки
долипидной стадии атеросклероза://

+повышение проницаемости

эндотелия и мембран интимы//

разрастание соединительной ткани

вокруг отложений липидов//

распад жиробелковых комплексов в
интиме//

дистрофическое обызвествление//

деструкция эластических волокон

Характерное осложнение

атеросклероза брюшного отдела
аорты://

+разрыв аневризмы//

тромбоэмболия легочной артерии//

инфаркт миокарда//
инфаркт легкого//
инфаркт головного мозга

Частое осложнение мозговой формы
гипертонической болезни://
+кровоизлияние в мозг//
атрофия вещества мозга//
гидроцефалия//
развитие энцефалита//
развитие менингита

Изменения почек при
гипертонической болезни://
амилоидно-сморщенные почки//
вторично сморщенные почки//
гидронефроз//
+первично сморщенные почки//
поликистоз почек

Характерное изменение сердца при
гипертонической болезни://
гипертрофия правого желудочка//
бурая атрофия сердца//
+гипертрофия левого желудочка//
аортальный порок сердца//
«тигровое» сердце

Морфологические изменения
артериол, при гипертоническом
кризе://
гиалиноз, склероз//
+плазменное пропитывание,
фибриноидный некроз//
атеросклероз, кальциноз//
липосклероз, петрификация//
эластофиброз, гиалиноз

Морфологическое проявление
острой ишемической болезни
сердца://

аневризма сердца//
кардиосклероз//
+инфаркт миокарда//
хроническая аневризма//
жировая дистрофия миокарда

Возможное смертельное
осложнение хронической
ишемической болезни сердца:
разрыв острой аневризмы//
кардиогенный шок//
асистолия//
+разрыв хронической аневризмы//
острый отек легких

Стадии инфаркта миокарда://
+ишемическая, некротическая//
смешанная, склеротическая//
доклиническая, клиническая//
«функциональная»//
компенсаторная

Морфологические проявления
уремии://
гранулематозный миокардит//
гнойный менингит, энцефалит//
геморрагический менингит,
энцефалит//
+фибринозный перикардит,
фибринозный колит//
язвенно-некротический энтероколит

Основные группы заболеваний
почек, согласно структурно-
функционального принципа://
опухоли почек, пороки развития//
поликистоз, гидронефроз//
+тубулопатии, гломерулопатии//
дисплазия, гипоплазия//
амилоидоз, липоидоз

Заболевание почек из группы
гломерулопатий://
острая почечная недостаточность//
+гломерулонефрит//
гидронефроз//
пиелонефрит//
нефросклероз

Заболевание почек, из группы
тубулопатий://
+острая почечная недостаточность//
амилоидоз почек//
гломерулонефрит//
гломерулосклероз//
гломерулит

Характер экссудата при
экстракапиллярном
гломерулонефрите://
гнойный//
+геморрагический//
ихорозный//
слизистый//
гнилостный

Морфологический вариант
интракапиллярного
гломерулонефрита://
геморрагический//
фибринозный//
+мезангиальный//
гнойный//
катаральный

Стадия амилоидоза почек://
шоковая//
олигоанурическая//
+нефротическая//
восстановление диуреза//
резидуальная

Определение пиелонефрита://
двустороннее диффузное негнойное
воспалением клубочкового аппарата
почек//
+заболевание инфекционной
природы с воспалением межуточной
ткани почек, ее чашечки и лоханка//
заболевание наследственной
природы с преимущественным
поражением эпителия канальцев//
заболевание, в основе которого
лежит некроз эпителия канальцев//
наследственное заболевание с
преимущественным поражением
гломерулярного аппарата

Форма острого гастрита://
атрофический//
гипертрофический//
+катаральный//
полипозный//
фибропластический

Изменение, характерное для
хронического атрофического
гастрита://
изъязвление//
кровоизлияние//
обилие слизистого экссудата//
+энтерализация слизистой
оболочки//
фибринозное воспаление

Патологический процесс
характерный для обострения
хронической язвы желудка://
гиалиноз//
организация//
петрификация//
+фибриноидный некроз//
регенерация

Наиболее частая локализация
хронической язвы желудка://
+малая кривизна//
кардиальный отдел//
дно желудка//
большая кривизна//
тело желудка

Изменение мышечного слоя в дне
хронической язвы://
замещение жировой тканью//
аденоматоз//
+ замещение соединительной
тканью//
дисплазия//
обызвествление

Возможное осложнение обострения
хронической язвы://
деформация желудка//
стеноз привратника//
малигнизация//
+кровотечение//
образование полипа

Осложнение острого аппендицита://
+перфорация//
петрификация//
организация//
рубцевание//
облитерация

Заболевание, при котором часто
развивается жировой гепатоз://
гликогеноз печени//
вирусный гепатит//
общий амилоидоз//
гемохроматоз//
+хронический алкоголизм/

Клинико-морфологическая форма
вирусного гепатита://
гепатомегалическая//
+циклическая желтушная,
безжелтушная//
дистрофическая,
спленомегалическая//
диспротеинемическая//
обструктивная, дискинетическая

Гистологические признаки острого
вирусного гепатита://
гликогеноз печени, образование
гранулем//
+ белковая дистрофия и
колликвационный некроз
гепатоцитов//
атрофия гепатоцитов, накопление
липофусцина//
жировая дистрофия, образование
телец Маллори//
инфильтрация стромы
полинуклеарными лейкоцитами.

Гистологические признаки острого
алкогольного гепатита://
гиалиново-капельная дистрофия
гепатоцитов//
баллонная дистрофия гепатоцитов,
холестаз//
тельца Каунсильмена, белковая
дистрофия гепатоцитов//
+тельца Маллори, жировая
дистрофия гепатоцитов//
инфильтрация стромы
лимфоидными клетками

Возможный исход острого
вирусного гепатита://
мускатная печень//
бурая атрофия печени//

гликогеноз печени//

+ цирроз печени//

гемосидероз печени

Клинико-морфологическая форма
хронического гепатита://

безжелтушная, некротическая//

циклическая, желтушная//

+активный, персистирующий//

токсическая, токсико-

аллергическая//

цирротическая, холестатическая

Макроскопическая особенность
постнекротического цирроза
печени://

+крупноузловая поверхность
печени//

мелкоузловая поверхность печени//

мелкозернистая поверхность

печени//

ребристая поверхность печени//

гладкая поверхность печени

Макроскопический признак
портального цирроза печени://

крупноузловая поверхность печени//

+мелкоузловая поверхность
печени//

расширение желчных протоков//

широкие фиброзные поля между
узлами//

гладкая поверхность печени

Синдром – одно из осложнений
цирроза печени://

легочно-сердечная

недостаточность//

хроническая сердечная

недостаточность//

кожно-висцеральный//

+портальная гипертензия//

отечно-гипотонический

Возможный исход ревматического
клапанного эндокардита://

разрыв сердца//

тампонада полости сердца//

инфаркт миокарда//

хроническая аневризма//

+порок сердца

Морфологические особенности
стафилококковой пневмонии://

+очаги некроза и нагноения//

фиброзные изменения//

геморрагический экссудат//

очаги казеозного некроза//

фибриноидные изменения

Синоним крупозной пневмонии://

очаговая//

+долевая//

геморрагическая//

казеозная//

абсцедирующая

Интерстициальная болезнь легких://
пневмопатия//

бронхоэктатическая болезнь//

+фиброзирующий альвеолит//

хронический абсцесс легкого//

бронхиальная астма

Исход острой токсической
дистрофии печени://

мускатная печень//

гемосидероз печени//

гемомеланоз печени//

+постнекротический цирроз//

гликогеноз печени

Наиболее частый путь
проникновения инфекции в почки://
+урогенный//
лимфогенный//
диспластический//
контактный//
имплантационный

Мужчина 60 лет в течение 15 лет
страдает гипертонической
болезнью; в последнее время
появились жалобы на слабость,
быструю утомляемость, полиурию.
При обследовании выявлены:
протеинурия, значительное
повышение содержания креатинина
в крови. Больной умер от
нарастающей почечной
недостаточности. Клинико-
морфологическая форма
гипертонической болезни://
мозговая//
сердечная//
+почечная//
полиорганный//
эндокринная

Больной 39 лет с инфильтративно-
язвенным раком желудка
периодически отмечал рвоту цвета
кофейной гущи, мелену. В крови $2,0 \times 10^{12}$ /л эритроцитов. Умер от
нарастающей сердечно-сосудистой
недостаточности. Какой вид анемии
развился у больного://
гемолитическая//
дисэритропоэтическая//
+постгеморрагическая//
гипопластическая//
пернициозная

Морфогенетическая стадия
развития атеросклероза://
гиалиноз//
+долипидная//
дистрофическая//
метаболическая//
атрофическая

Для гипертонического криза
характерно://
гиалиноз, склероз, кальциноз
артерий//
+фибриноидный некроз артериол,
спазм, плазморрагии//
атеросклеротические изменения//
периваскулярный склероз//
атероматоз

Пневмония, характеризующаяся
развитием воспалительного
процесса в строме легкого://
крупозная//
очаговая//
+интерстициальная//
хроническая//
абсцедирующая

Заболевание, при котором
развивается сотовое легкое://
крупозная пневмония//
бронхопневмония//
+фиброзирующий альвеолит//
гангрена легкого//
эмфизема легкого

Процесс, при котором легкое
превращается в плотную мясистую
безвоздушную ткань://
гангрена//
+карнификация//
абсцесс//

бронхоэктаз//

эмфизема

Патологический процесс,
характеризующийся фиброзом,
деструкцией, перестройкой и
деформацией легких://

бронхопневмония//

+пневмоцирроз//

интерстициальная пневмония//

крупозная пневмония//

гангрена легких

Рубцовое осложнение язвенной
болезни://

+стеноз//

пенетрация//

кровотечение//

гастрит//

дуоденит

Характерный признак острой язвы://

плотные края//

некроз эпителия//

подрытый край//

нависающий край//

+дно, окрашенное в черный цвет

Основные морфологические
признаки острых гепатозов://

стаз и некроз//

некроз и воспаление//

дистрофия и воспаление//

+дистрофия и некроз//

тромбоз и некроз

Желчные стазы характерны для://

+билиарного цирроза//

постнекротического цирроза//

жирового гепатоза//

аутоиммунного гепатита//

хронического активного гепатита

Образное название почки при
хроническом пиелонефрите://

большая пестрая почка//

большая красная почка//

большая сальная почка//

+щитовидная почка//

большая белая почка

Почка при остром

гломерулонефрите://

большая сальная почка//

первично-сморщенная почка//

вторично-сморщенная почка//

+большая пёстрая почка//

большая белая почка

Частое осложнение портальной
гипертензии у больных циррозом
печени//

острая сердечная недостаточность //

острая почечная недостаточность //

кровоизлияние в головной мозг //

+кровотечение из вен пищевода//

надпочечниковая недостаточность

У больного с билиарным циррозом
печени развивается синдром//

постнекротический//

гепатокардиальный//

+гепато-ренальный//

пульмоно-коронарный//

кожно- висцеральный

Образное название сердца при
уремии, развившейся в исходе
хронической почечной
недостаточности//

Тигровое//

Бычьё//

Гигантское//
Капельное//
+Волосатое

Что развивается в сердце при
диффузной эмфиземе легких//
бурая атрофия//
ожирение //
гипертрофия левого желудочка//
инфаркт миокарда//
+гипертрофия правого желудочка

При всех острых очаговых
пневмониях наблюдается//
Эмфизема//
Карнификация//
Острый бронхит//
Пневмосклероз//
+Альвеолит

Очаг серого размягчения мозга
является проявлением://
геморрагической инфильтрации//
+ишемического инфаркта мозга//
гематомы мозга//
геморрагического пропитывания//
геморрагического инфаркта мозга

Клинико-морфологическая форма
атеросклероза://
липосклероз//
+атеросклероз аорты//
атерокальциноз//
атероматоз//
долипидная стадия

Смерть при ревматизме может
поступить от://
+декомпенсации порока сердца//
тампонады полости перикарда//
разрыва сердца//

острой почечной недостаточности//
острой печеночной недостаточности

ЧАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

Осложнение менингита при
менингококковой инфекции: //
порэнцефалия//
+гидроцефалия//
микрогирия//
микроцефалия//
агирия

Причина смерти при гриппе://
хроническая почечная
недостаточность//
механическая асфиксия//
+кровоизлияния в жизненно важные
центры головного мозга//
хроническая сердечно-сосудистая
недостаточность//
перитонит

Изменения кожи при кори
называются://
Энантема//
+Экзантема//
Витилиго//
Дерматит//
Лейкодерма

При каком заболевании возникают
пятна Филатова-Бельского-Коплика:
Полиомиелит//
+Корь//
Скарлатина//
Дифтерия//
Менингококковая инфекция

Перечислите формы течения
гриппа://

Абортивная//

+Легкая//

Рецидивирующая//

Повторная//

Персистирующая

Изменения поперечно-полосатой
мускулатуры при полиомиелите://

нейротрофическая гипертрофия//

+нейротрофическая атрофия//

амилоидоз//

восковидный некроз//

миозит

Изменения на слизистой оболочке
щеки при кори называются//

Экзантема//

Петехии//

+Энантема//

Геморрагии//

Метаплазия

Тропизм вируса полиомиелита к://
лимфоидная ткань//

+нейроны передних рогов спинного
мозга//

эпителий бронхов//

эпителий кишечника//

мягкие мозговые оболочки

Резкое полнокровие в зеве и
миндалинах (пылающий зев),
«малиновый язык» признаки:

+Скарлатины//

Паротита//

Кори//

Гриппа//

Дифтерии

10 При дифтерии в трахее и бронхах
чаще развивается воспаление://

+ Фибринозное//

Катаральное//

Гнойное//

Гнилостное//

Геморрагические

Некротическая ангина наблюдается
при://

Полиомиелите//

+Скарлатине//

Дифтерии//

Туберкулезе//

Сифилисе

Форма менингококковой
инфекции://

первичный аффект//

+менингит//

первичный комплекс//

истинный круп//

ложный круп

Появление сыпи по всему телу на 2-
ой день болезни за исключением
носогубного треугольника
характерно для://

+скарлатины//

брюшного тифа//

кори//

дифтерии//

сифилиса

Осложнение при дифтерии://

Нома//

+Истинный круп//

Перитонит//

Инфекционный эндокардит//

Заглоточный абсцесс

15 Паралич сердца, диафрагмы,
мягкого неба вследствие
паренхиматозного неврита
возникает при://

+Дифтерии//

Полиомиелите//

Бешенстве//

Менингококковой инфекции//

Гриппе//

Вид ангины при скарлатине://

Фолликулярная//

Лакунарная//

Гнойная//

+Некротическая//

Серозная

Форма менингококковой
инфекции//

Менингоцеле//

Менингомиелит//

Менингоэнцефалит//

+Менингококцемия//

Энцефалит

Вид воспаления при дифтерии://

+фибринозное воспаление//

геморрагическое воспаление///

продуктивное воспаление//

гнойное воспаление//

катаральное воспаление

Изменения возникающие в сердце
при дифтерии://

аневризма сердца//

+токсический миокардит//

инфаркт миокарда//

возвратно-бородавчатый

эндокардит//

митральный стеноз

20 При менингите гидроцефалия
возникает вследствие//

петрификации экссудата//

оссификации экссудата//

+организации экссудата//

инкапсуляции экссудата//

карнификации экссудата

Патологический процесс в
периферических нервах при
дифтерии://

Нейринома//

Нейрофиброма//

+Паренхиматозный неврит//

Атрофия//

Демиелинизация

Истинный круп развивается при://

Гриппе//

Парагриппе//

+Дифтерии//

Аденовирусной инфекции

Скарлатине

Причина смерти при
менингококковом менингите//

+отек мозга//

острая почечная недостаточность//

острая сердечно-сосудистая
недостаточность//

развитие порэнцефалии мозга//

отёк лёгких

Пластинчатое шелушение кожи
наблюдается при://

+Скарлатине//

Дизентерии//

Гриппе//

Парагриппе//

Дифтерии

Местное осложнение
ларинготрахеита при дифтерии//
паралич сердца//
паралич диафрагмы//
+истинный круп//
ложный круп//
медиастенит

Нисходящий круп это://
+ крупозное воспаление бронхов
при дифтерии//
крупозное воспаление миндалин
при дифтерии//
крупозное воспаление пищевода
при дифтерии//
крупозное воспаление желудка при
дифтерии//
крупозное воспаление легких при
дифтерии

Поздний паралич сердца возникает
при://
менингококковой инфекции//
дизентерии//
+дифтерии//
кори//
скарлатине

Морфология
менингококкового назофарингита//
фибринозный назофарингит//
+катаральный назофарингит//
язвенно-некротический фарингит//
гнойный назофарингит//
геморрагический назофарингит

Характер сыпи при скарлатине//
крупно-пятнистая, папулезная//
геморрагическая, звездчатая//
пустулезная, с нагноением//
звездчатая, с некрозами//

+мелкоточечная, ярко-красная

30Патологический процесс в
надпочечниках при
менингококковой инфекции://
гиперплазия мозгового слоя//
гиперплазия коркового слоя//
+некроз и кровоизлияния//
инфаркт и отек//
тромбоз сосудов и петрификаты

Осложнение менингококцемии://
+синдром Уотерхауса-
Фридериксена//
синдром Альпорта///
синдром Стивена-Джонсона//
синдром Эллисона-Золлингера//
синдром Маллори-Вейса

Наиболее частое осложнение
брюшного тифа
Хронический активный гепатит //
Гнойный менингит//
+Кишечное кровотечение//
Тромбофлебит печеночных вен//
Рубцовый стеноз прямой кишки

Укажите стадию брюшного тифа://
Стадия катарального колита//
+Стадия мозговидного набухания//
Стадия разрешения//
Стадия фибринозного энтерита//
Стадия геморрагического
илеocoloтифа

Отдел желудочно-кишечного
тракта, поражаемый при
дизентерии://
Желудок//
+Прямая кишка//
Тощая кишка//

12-перстная кишка//

Пищевод

Неблагоприятный исход

дизентерии://

образование дивертикулов//

+рубцовый стеноз кишки//

карциноид кишки//

гранулематоз кишки//

рак кишки

Стадия брюшного тифа://

Стадия фибринозного энтерита//

Стадия катарального колита//

+Стадия образования язв//

Стадия разрешения//

Стадия геморрагического

илеоколоти́фа

Вторая стадия дизентерии://

катаральный колит//

+фибринозный колит//

язвенный колит//

заживление язв//

гнойного колита

Третья стадия дизентерийного

колита://

катаральный колит//

фибринозный колит//

+язвенный колит//

заживление язв//

гнойного колита

Осложнения дизентерии://

Желудочное кровотечение,

крупозная пневмония//

+ Перфорация язвы, перитонит//

Пилефлебетические абсцессы

печени, восковидный некроз

прямых мышц живота//

Гнилостный гастроэнтероколит,

амилоидоз почек//

Перихондрит гортани,

бронхопневмония

40Наиболее характерные

осложнение брюшного тифа//

Желудочное кровотечение, гнойный

остеомиелит//

Геморрагический

менингоэнцефалит, перитонит//

+Прободение язвы, восковидный

некроз прямых мышц живота//

Гнилостный гастроэнтероколит,

амилоидоз почек//

Перихондрит гортани,

бородавчатый эндокардит

Энтерит при брюшном тифе

характеризуется//

+поражением пейеровых бляшек//

поражением солитарных

фолликулов//

поражением нервных ганглиев//

поражением подслизистых слоев//

поражением брыжейки кишки

Язвенный колит при дизентерии

чаще локализуется//

в слепой кишке//

в тощей кишке//

+в прямой кишке//

в 12-перстной кишке//

в ободочной кишке

Проявлением хронического

постдизентерийного колита

является//

+хронические язвы, рубцовый
стеноз//

фолликулярно-язвенный колит//
острый экссудативный
парапроктит//

геморроидальное кровотечение//
острые язвы с перфорацией

Острейший туберкулезный сепсис
характеризуется появлением в
разных
органах://

Множественных абсцессов//
Множественных каверн//
+Бугорков и очагов некроза//
Кровоизлияний//
Инфарктов, оссификаций

Оссифицированный очаг
туберкулеза называется //
Очаг Абрикосова //
+Очаг Гона //
Очаг Ашоффа-Пуля//
Очаг Ассмана-Редекера//
Очаг Симона

Морфологическое выражение
первичного туберкулеза//
казеозная пневмония//
+первичный комплекс//
туберкулезный лимфаденит//
милиарный туберкулез//
фиброзно-кавернозный туберкулёз

Укажите форму прогрессирования
первичного комплекса://
Интраканаликулярная, септическая//
Токсическая, имплантационная//
Плевральная,
интраканаликулярная//
+Лимфожелезистая, гематогенная//

Контактная, деструирующая

Компоненты первичного легочного
туберкулезного комплекса//
очаг бронхопневмонии,
регионарный лимфаденит,
васкулит//
+очаг казеозной пневмонии,
лимфангит, регионарный
лимфаденит//
гнойный флебит, тромбофлебит//
милиарный туберкулез,
лимфаденит, лимфангит //
очаг Гона, тромбофлебит,
лимфангит

Клинико-морфологическая форма
вторичного туберкулеза //
острый крупноочаговый //
диффузный милиарный //
острый деструктивный //
+фиброзно-кавернозный//
острейший туберкулезный сепсис

50Туберкулезные очаги, нежный
склероз, "очковые" каверны в обеих
легких
характерны для://
Вторичного туберкулеза//
Гематогенной прогрессии
первичного комплекса//
Гематогенной генерализации//
+Гематогенного туберкулеза с
преимущественным поражением
легких//
Гематогенного туберкулеза с
преимущественными внелегочными
поражениями

У студента после резкого
повышения температуры тела

появились менингиальные
признаки: резкая головная боль,
возбуждение, двигательное
беспокойство, ригидность
затылочных мышц. Установлен
клинический диагноз:
менингококковый менингит.

Изменения мягкой мозговой
оболочки имеют вид://

Шагреновой кожи//

+Желто-зеленоватого чепчика//

Звездчатого купола//

Волосатого чепчика//

Шапочки кардинала

На вскрытии умершего больного
мужчины обнаружено увеличенное
сердце массой 700 г. с миогенной
дилатацией левого желудочка.

Полулунные створки аортального
клапана деформированы, свободные
края их петрифицированы с серыми
полипозными наложениями и
изъязвлениями на поверхности,
обращённой к просвету аорты.

Диагностируйте клинико-
анатомическую форму сепсиса.//

септикопиемия//

септицемия//

гнойно-резорбтивной лихорадка//

+затяжной септический

эндокардит//

хронический сепсис

Возможная локализация первичного
туберкулезного комплекса//

сердце //

печень //

головной мозг//

позвоночник //

+легкое

Характерные внелегочные
поражения при гематогенном
туберкулезе://

сердце, головной мозг//

+костно-суставная, мочеполовая
система//

система крови, лимфоидная ткань//

селезенка, надпочечники//

костный мозг, печень

Наиболее частая причина смерти
больных фиброзно-кавернозным
туберкулезом//

кардиогенный шок//

сепсис//

+кровотечение//

отек мозга//

острая сердечная недостаточность

Морфологическое проявление
продуктивной тканевой реакции при
туберкулезе//

+казеозный некроз//

серозно-фибринозное воспаление//

гранулема//

склероз лёгочной ткани//

крупозное воспаление

Форма прогрессирования
первичного туберкулеза://

+гематогенная//

интраканаликулярная//

перибронхиальная //

контактная //

перинеуральная

В исходе инфильтративно-
пневмонической формы туберкулеза
может
развиться://

Абсцессы и каверны легких//
Пневмоцирроз, легочное сердце//
Кровоизлияния в легкие и головной мозг//

+Казеозная пневмония,
туберкулома//

Рак легкого, хроническая
пневмония

Форма вторичного туберкулеза
непосредственно предшествующая
цирротическому туберкулезу//
острый очаговый туберкулез//

+фиброзно-кавернозный
туберкулез//

туберкулема//

инфильтративный туберкулез//
пневмония Ассмана-Редекера

60В исходе инфильтративно-
пневмонической формы туберкулеза
может
развиться://

Абсцессы и каверны в легких//
Пневмоцирроз, легочное сердце//
Кровоизлияния в легкие и
надпочечники//

+Казеозная пневмония,
туберкулома//

Рак легкого, хронический бронхит

В легком имеется полость с плотной
стенкой, окруженная некротической
массой, специфической
грануляцией, фиброзной тканью.
Это -//

Хронический абсцесс//

Рак легкого с распадом//

+Фиброзно-кавернозный
туберкулез//

Альвеококкоз легкого//

Поликистоз легкого

Характерные для септического
очага изменения://

гиалиноз//

+гнойное воспаление//

продуктивное воспаление//

фибринозное воспаление//

амилоидоз

Какой вид желтухи развивается при
сепсисе//

Печеночная//

+Надпеченочная//

Подпеченочная//

Паренхиматозная//

Механическая

Назовите клинико-
морфологическую форму сепсиса://

стафилакокковый//

стрептококковый//

хирургический//

терапевтический//

+хронический сепсис

Разновидность тяжелой формы
гриппа//

септическая//

паралитическая //

геморрагическая //

спленомегалическая//

+с легочными осложнениями

Для легкой формы гриппа
характерно//

большое пестрое легкое//

серозно-гемморагическое
воспаление //

эмпиема плевры//

+катаральный
риноларинготрахеобронхит//
деструктивный панбронхит

Характер дистрофии эпителиальных
клеток при гриппе//

Мукоидное набухание//

Мутное набухание //

Жировая //

Роговая//

+Гидропическая

Морфологические проявления

септического эндокардита//

острый бородавчатый //

диффузный вальвулит//

+полипозно-язвенный //

фибропластический //

возвратно-бородавчатый

При затяжном септическом
эндокардите чаще всего поражается
//

митральный клапан//

трикуспидальный клапан //

+ аортальный клапан //

клапан легочного ствола //

венозные клапаны

70Пятна Лукина – Либмана
проявление//

септикопиемии//

септицемии //

гнойно-резорбтивной лихорадки //

+ затяжного септического

эндокардита //

хронического сепсиса

Больной погиб от тяжелой формы
гриппа с легочными осложнениями.
Какой внешний вид имели легкие? //

Сотовое легкое//

Маленькие красные легкие//

+Большое пестрое легкое//

Бурая индурация легких//

Мускатное легкое

При вскрытии трупа больного,
умершего от перитонита в
отделении кишечных инфекций
городской инфекционной больницы,
в подвздошной кишке найдены язвы
округлой формы, с чистым дном,
локализованные в местах пейеровых
бляшек. Диагностируйте кишечную
инфекцию. //

+Брюшной тиф//

Холера//

Сальмонеллез//

Дизентерия//

Амебиаз

Характеристика язв при брюшном
тифе //

округлые, локализуются в толстом
кишечнике, дно образовано
мышечным слоем, края рваные,
уплотнены//

+ локализуются в нижнем отделе
тонкого кишечника, расположены
по длиннику кишки, края ровные,
закругленные, дно образовано
мышечно-серозным слоем //

локализуются в толстом кишечнике,
неправильной формы, разной
глубины, дно образовано
мышечным или серозным слоем//

локализуются в тонком кишечнике,
округлые, расположены по линии
прикрепления брыжейки, дно
чистое, края валикообразные, при
контакте кровоточат//

неправильной формы, локализируются в тонком и толстом кишечнике, расположены по всей поверхности кишки, разной глубины, дно образовано серозным слоем

Ребенок 5-ти лет заболел остро, появилась высокая температура, боли в горле. При осмотре полости рта: слизистая оболочка зева ярко-красная, миндалины увеличены, в устьях крипт миндалин сероватые очаги некроза. Лимфатические узлы шеи увеличены. На 2-ые сутки болезни у ребенка на коже лица, шеи и туловища, кроме носогубного треугольника, появилась мелкая ярко-красная сыпь. Какие осложнения могут возникнуть в этот период болезни?

Дерматит, мастит, легочное кровотечение//

Остеомиелит, хронический панкреатит, гломерулонефрит//
+Заглоточный абсцесс, гнойно-некротический отит, мастоидит//
Стеноз митрального клапана, миокардит, перикардит//
Тромбофлебит яремной вены, ревматизм, аппендицит

Ребенок 5-ти лет заболел остро, появилась высокая температура, боли в горле. При осмотре полости рта: слизистая оболочка зева ярко-красная, миндалины увеличены, в устьях крипт миндалин сероватые очаги некроза. Лимфатические узлы шеи увеличены. На 2-ые сутки болезни у ребенка на коже лица, шеи и туловища, кроме носогубного

треугольника, появилась мелкая ярко-красная сыпь. Какие осложнения могут возникнуть в этот период болезни?

Дерматит, мастит, легочное кровотечение//

Остеомиелит, хронический панкреатит, гломерулонефрит//
+Гнойный менингит, тромбофлебит яремной вены, синусов твердой мозговой оболочки //

Стеноз митрального клапана, миокардит, перикардит//

Гнойно-некротический отит, ревматизм, аппендицит

Женщина 30 лет умерла от уремии. На вскрытии обнаружены в правом легком комплекс Гона, почки увеличены в размерах с полостями, содержащими творожистые массы, паренхима атрофирована.

Диагностируйте форму туберкулеза.//

Гематогенный туберкулез с преимущественным внелегочным поражением//

+Гематогенный туберкулез с преимущественными легочными поражениями//

Вторичный туберкулез//

Первичный туберкулез//

Милиарный туберкулез

У умершего больного обнаружена деформация верхних сегментов обоих легких. Плевральные полости заполнены спайками. В верхушечных сегментах легких округлые полости диаметром от 3-х до 4-х см., с плотными стенками. В

полостях грязно-серые влажные массы. Вокруг полостей в паренхиме легких тяжи плотной волокнистой соединительной ткани. Стенки бронхов утолщены, просветы их зияют. Диагностируйте форму туберкулеза.//

Гематогенный туберкулез с преимущественным внелегочным поражением//

Гематогенный туберкулез с преимущественными легочными поражениями//

+Вторичный туберкулез//

Первичный туберкулез//

Милиарный туберкулез

Больной много лет страдал фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, который осложнился эмпиемой плевры. Через 5 лет стала нарастать почечная недостаточность. Умер от уремии. Назовите предшествующую образованию каверны форму туберкулеза.

Острый очаговый туберкулез//

Хронический очаговый туберкулез//

Туберкулома//

+Острый кавернозный туберкулез//

Цирротический туберкулез

У ребенка 5 лет появились боли при глотании, температура тела повысилась до 38,5 С, на теле обнаружена мелкоточечная ярко-красная сыпь. Язык малиновый, "пылающий зев", шейные лимфоузлы увеличены. Через 3 недели в моче обнаружены белок, эритроциты, единичные гиалиновые

цилиндры. Патологический процесс в почках://

эмболический гнойный нефрит//

пиелонефрит//

+острый гломерулонефрит//

вторичный амилоидоз//

поликистоз почек

80Мужчина 60 лет длительно болел

фиброзно-кавернозным

туберкулезом легких,

осложнившимся эмпиемой плевры.

В течение последнего года

появилась и нарастала почечная

недостаточность. Умер от

массивного легочного

кровотечения. Причиной развития

хронической почечной

недостаточности://

хронический пиелонефрит//

+вторичный амилоидоз//

туберкулез мочеполовой системы//

нефросклероз//

гломерулонефрит//

Макроскопическая картина

селезенки при септикопиемии//

+Увеличена, дряблая, дает

обильный соскоб //

Уменьшена, плотная//

Цианотическая индурация//

Уменьшена, дряблая, бурого цвета

на разрезе //

Характерны ишемические инфаркты

и рубцы

Локализация первых гнойных

метастазов при септикопиемии//

Лимфатические узлы//

Селезенка //

+Легкие //

Миокард //

Почки

В кроветворной и лимфатической
ткани при септицемии можно
обнаружить//

Атрофию //

Метаплазию//

Гипоплазию //

+Гиперплазию //

Дисплазию

Характерная локализация
первичного туберкулезного
комплекса//

Печень и почки //

Кости и мышцы//

Сердце и суставы //

+Кишечник и легкие //

Головной мозг и спинной мозг

При невозможности установить
входные ворота сепсис называют//

Идиопатическим //

Первичным//

+Криптогенным//

Неясной этиологии //

Ациклическим

Частая причина смерти при
дифтерии на 2-3 неделе
заболевания//

Амилоидоз почек//

+Ранний паралич сердца//

Поздний паралич сердца//

Кровоизлияние в головной мозг //

Острая легочная недостаточность

Частая причина смерти при
дифтерии на 2 месяце заболевания//

Амилоидоз почек//

Ранний паралич сердца//

+Поздний паралич сердца//

Кровоизлияние в головной мозг //

Острая легочная недостаточность

Исход изменений слизистой
оболочки верхних дыхательных
путей при легкой форме гриппа//

Образование глубоких язв//

Образование рубцов//

+Полная регенерация слизистой
оболочки//

Хронический бронхит //

Хроническая пневмония

Поражение слизистой оболочки
верхних дыхательных путей при
легкой форме гриппа//

Гнойный трахеит //

Серозно-геморрагический трахеит//

+Катаральный ларинго-
трахеобронхит//

Слизисто-гнойный бронхит//

Геморрагический бронхит

90 Характерными изменениями в
легких при гриппе являются://
фибринозно-геморрагическая
пневмония//

поражение мелких бронхов и
бронхиол//

+бронхопневмония с склонностью
к абсцедированию и
кровоизлияниям//

поражение паренхимы легких в
виде крупозной пневмонии//

панбронхиты, приобретенные
бронхоэктазы

На вскрытии выявлена картина перитонита. В подвздошной кишке, в центре некротизированных групповых фолликул, обнаружены язвы с неровными краями. В дне одной из них - сквозное отверстие.

Микроскопически в краях не полностью некротизированных групповых фолликул обнаружена пролиферация ретикулярных клеток. Наиболее вероятный диагноз://

неспецифический язвенный колит//
туберкулез кишки//

+брюшной тиф//

холера//

рак кишечника

В биопсийную лабораторию доставлена удаленная почка больного 26 лет. В верхнем полюсе найдено опухолевидное образование. При микроскопическом исследовании обнаружены участки казеозного некроза, окруженные эпителиоидными, лимфоидными клетками, гигантскими клетками Пирогова-Лангханса. О каком заболевании идет речь://

Сифилис//

Гипернефрома//

+Туберкулез//

Эхинококкоз//

Лепра

93 Характерными клинико-морфологическими особенностями септикопиемии являются:

+бактериальная эмболия с образованием метастатических гнойников в различных органах//
казеозный лимфаденит и лимфангит//
гнойный тромбофлебит, гипоплазия селезенки//

гиперплазия лимфатических узлов, вилочковой железы, милиарные бугорки в легких//

гепатоспленомегалия, полипозно-язвенный эндокардит

Путь передачи возбудителя кори://
парентеральный //

+воздушно-капельный//

половой//

нейрогенный//

лимфогенный

Тропизм вируса полиомиелита к://
лимфоидная ткань//

+нейроны передних рогов спинного мозга//

эпителий бронхов//

эпителий кишечника//

мягкие мозговые оболочки

Путь заражения при полиомиелите://

+фекально-оральный//

воздушно-капельный//

половой//

контактный//

парентеральный

Синдром Уотерхауса-Фридериксена является частым осложнением:

цитомегаловирусной
инфекции//

грибковой инфекции//

+менингококковой инфекции//
коревой пневмонии//
токсического гриппа

Форма скарлатины в зависимости
от клинико-морфологических
проявлений://

осложненная//
нефротическая//
геморрагическая//
церебральная//
+токсическая

Скоротечная легочная чахотка
является осложнением://
+ прогрессирующего первичного
туберкулеза//
генерализованного гематогенного
туберкулеза//
хронического крупноочагового
туберкулеза легких//
острого очагового туберкулеза
легких//
острого кавернозного туберкулеза
легких

Источником обострения острого
очагового туберкулеза с развитием
фиброзно-очагового туберкулеза
легких является://
очаг Абрикосова//
+очаг Ашофф-Пуля//
очаг Симона//
очаг Гона//
очаг Ассмана-Редекера