

Thm 1.1-1 \forall 紧集 $K \subset \Omega$, 必可找到 $- (C_c^\infty(\Omega))$ 函数 φ_K 在 K 上 $\equiv 1$.

(截断函数)

定义 1.1.3: 若 $\{\varphi_v\}$ 是一个 $C_c^\infty(\Omega)$ 函数列满足以下条件:

(1) $\text{supp } \varphi_v$ 含于一个共同紧集 $K \subset \Omega$ 中.

(2) 对任意重指标 α , 在上述紧集内: $\sup_K |\partial^\alpha \varphi_v| \rightarrow 0$

则称 $\varphi_v \rightarrow 0 (C_c^\infty(\Omega))$

$$\varphi_\varepsilon = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x-y) \alpha_\varepsilon(y) dy$$

定理 1.1.2: 若 $u(x)$ 是 (\mathbb{R}^n) 中局部可积函数, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$, 若 $u(x) \in C^0(\mathbb{R}^n)$, 则对于任一紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$, u_ε 在 K 上一致收敛于 $u(x)$; 若 $u(x) \in C_c^\infty$, 则 $u_\varepsilon \rightarrow u (C_c^\infty(\mathbb{R}^n))$; 若 $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则 $u_\varepsilon \rightarrow u (L^p(\mathbb{R}^n))$.

证明: (1) 若 $u(x) \in C^0(\mathbb{R}^n)$, 由于 $\int_{\mathbb{R}^n} \alpha_\varepsilon(y) dy = 1$ 可得:

$u_\varepsilon(x) - u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} (u(x-y) - u(x)) \alpha_\varepsilon(y) dy$. K 中, $x \in K, |y| < \varepsilon, |x-y|$ 就是当 x 属于某紧集 K 时, 由于 $\alpha_\varepsilon(y)$ 的支集在球 $|y| \leq \varepsilon$ 中, 故 x 与 $x-y$ 落在紧集 K_1 中, 这里的 K_1 是把以 K 中任一点为圆心 ε 为半径的球都包含在里面的紧集.

利用 $u(x)$ 在紧集 K_1 上的一致连续性可知:

对任意 $\delta > 0$, 在 ε 充分小时有

$$\max_{x \in K} |u_\varepsilon(x) - u(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |u(x-y) - u(x)| \alpha_\varepsilon(y) dy \leq \max_{x, x-y \in K_1} |u(x-y) - u(x)| \int_{\mathbb{R}^n} \alpha_\varepsilon(y) dy \leq \delta \int_{\mathbb{R}^n} \alpha_\varepsilon(y) dy = \delta.$$

所以当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 在 K 上 $u_\varepsilon(x)$ 一致收敛于 $u(x)$.

(2) 若 $u(x) \in C_c^\infty$, 记 $\text{supp } u = K$, 则当 $\varepsilon \leq 1$ 时: $\text{supp } u_\varepsilon \subset K_1$ 又由 (1), 在 K 上 $u_\varepsilon(x)$ 一致收敛于 $u(x)$, 又对任意重指标 α ($|\alpha| \leq |\alpha|$)

$$(\partial^\alpha u_\varepsilon)(x) = \partial^\alpha \int_{\mathbb{R}^n} u(x-y) \alpha_\varepsilon(y) dy$$

由控制收敛定理才能交换求导顺序.

$$= \int_{\mathbb{R}^n} (\partial^\alpha u)(x-y) \alpha_\varepsilon(y) dy$$

可知在 K 上, $\partial^\alpha u_\varepsilon$ 一致收敛于 $\partial^\alpha u$,

于是 $u_\varepsilon \rightarrow u (C_c^\infty(\mathbb{R}^n))$

(3) 若 $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 我们先找一个紧支集的连续函数 v (由实变函数中结论), 使它满足 $\|u - v\|_{L^p} < \frac{\delta}{3}$ 由三角不等式有:

$$\|u_\varepsilon - u\|_{L^p} \leq \|u_\varepsilon - v_\varepsilon\|_{L^p} + \|v_\varepsilon - v\|_{L^p} + \|u - v\|_{L^p} \quad (1.9)$$

由于对任意 L^p 函数 $f(x)$ 成立:

$$\|f_\varepsilon\|_{L^p} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f_\varepsilon|^p dx \right)^{1/p} = \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) \alpha_\varepsilon(y) dy \right|^p dx \right\}^{1/p}$$

将 $\alpha_\varepsilon(y)$ 拆成 $\alpha_\varepsilon^{1/p+1/q}(y)$. 由 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\leq \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^p \alpha_\varepsilon(y) dy \right)^{p/p} \times \left(\int_{\mathbb{R}^n} \alpha_\varepsilon(y) dy \right)^{p/q} dx \right\}^{1/p}$$

$$= \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^p \alpha_\varepsilon(y) dy dx \right\}^{1/p}$$

$$= \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} \alpha_\varepsilon(y) \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^p dx dy \right\}^{1/p}$$

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) \alpha_\varepsilon(y) dy \right| \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^p \alpha_\varepsilon(y) dy \right)^{1/p} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \alpha_\varepsilon(y) dy \right)^{1/q}$$

$$\|f_\varepsilon\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|u_\varepsilon - v_\varepsilon\|_{L^p} \leq \|u - v\|_{L^p}$$


(截断)

$$\begin{aligned} & | \partial^\beta u_\varepsilon - \partial^\beta u | \\ & \leq \int_{\mathbb{R}^n} | \partial^\beta u(x-y) - \partial^\beta u(x) | \alpha_\varepsilon(y) dy \end{aligned}$$

$$\|u_\varepsilon - v_\varepsilon\|$$

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

$$\int_{\mathbb{R}^n} \alpha_\varepsilon(x-y) |u(y)| dy$$



$$= \|f\|_{L^p} \quad (\text{其中 } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1).$$

$$\text{因此有 } \|u_\varepsilon - v_\varepsilon\|_{L^p} \leq \|u - v\|_{L^p} < \frac{\delta}{3}.$$

又由于 v 是具有紧支集连续函数, 所以 v_ε 一致收敛于 v , 因此当 ε 充分小时:

$$\|v_\varepsilon - v\|_{L^p} < \frac{\delta}{3}$$

于是由 (1.9) $\|u_\varepsilon - u\|_{L^p} < \delta$ 这就得到了

$$u_\varepsilon \rightarrow u \quad (L^p(R^n))$$

注: 若定理区域改成一般区域 Ω , 相应定理依然成立. 若 $u(x)$ 是 Ω 中局部可积函数, 当

$\varepsilon \rightarrow 0$, 若 $u(x) \in C^0(\Omega)$, 则对于任一紧集

$K \subset \Omega$, u_ε 在 K 上一致收敛于 $u(x)$;

若 $u(x) \in C_c^\infty$, 则 $u_\varepsilon \rightarrow u \quad (C_c^\infty(\Omega))$;

若 $u \in L^p(\Omega)$, 则 $u_\varepsilon \rightarrow u \quad (L^p(\Omega))$.

证明: 先讨论 $u \in C^0(\Omega)$ 情形, 由于此时闭集于紧集等价, 故 Ω 内任一闭区域 K 到 Ω 边界必有一最小距离 d ,

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 仍然可以找到一个 K_1 是把以 K 中任一点为圆心 ε 为半径的球都包含在里面的紧集.

这时考虑式子:

$$u_\varepsilon(x) - u(x) = \int_{\Omega} (u(x-y) - u(x)) \alpha_\varepsilon(y) dy \quad K \subset \Omega$$

之后证明过程与 R^n 相同. 至于后两者情形, 只需将 $u(x)$ 在 Ω 外做零延拓, 再像上述定理中一样证明即可.

再介绍两个基本空间, 一类是 $C^\infty(\Omega)$, 一类是 $\mathcal{S}(R^n)$. $C^\infty(\Omega)$ 是 Ω 上所有无限次可微函数的集合, 其中极限关系为:

若 $\{\varphi_\nu\}$ 是 $C^\infty(\Omega)$ 中函数列, 且对任一紧集 $K \subset \Omega$, 任一重指标 α 成立:

$$\sup_K |\partial^\alpha \varphi_\nu| \rightarrow 0,$$

则称 $\varphi_\nu \rightarrow 0 \quad (C^\infty(\Omega))$. 定义 1.1.4: 若函数 $\varphi \in C^\infty(R^n)$, 且对所有正整数 k 以及任意重指标 α 成立:

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} (1 + |x|^2)^k |\partial^\alpha \varphi(x)| = 0 \quad (1.11)$$

则称 φ 是 R^n 上的速降函数, 记为 $\varphi \in \mathcal{S}(R^n)$. 条件 (1.11) 等价于对所有正整数 k 以及任意重指标 α 成立:

$$\sup_{x \in R^n} (1 + |x|^2)^k |\partial^\alpha \varphi(x)| < \infty$$

速降函数空间中的极限关系定义如下:



若对所有正整数 k 以及任意重指标 α 成立:

$$\sup_{x \in R^n} (1 + |x|^2)^k |\partial^\alpha \varphi_\nu(x)| \rightarrow 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} |x| > M, \quad |\psi(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \\ |x| \leq M, \quad |\psi(x)| < \varepsilon \end{array} \right.$$

$$\psi \in C_c^\infty(R^n), \quad |\partial^\alpha \psi| \rightarrow 0$$

u_ε 可用 v_ε 逼近.



$$C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$$

$$\mathcal{D}'(\Omega) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$$

就称 $\varphi_v \rightarrow 0$ ($\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$)

则显然我们有如下包含关系: $C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \subset C^\infty(\mathbb{R}^n)$

定义1.1.5: 称 $C_c^\infty(\Omega)$ 上的线性连续泛函为 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 广义函数,

称 $C^\infty(\Omega)$ 上的线性连续泛函为 $\mathcal{E}'(\Omega)$ 广义函数,

称 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 上的线性连续泛函为 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

对于广义函数来说,一般不说它在某点的取值,以 $\delta(x)$ 为例,它在零点的取值是没有意义的,但是在任一开集上的值(或称它在任一子集上的限制) 确是有确切意义的.

若 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $\Omega_1 \subset \Omega$, 则对一切 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega_1)$,

$\langle T, \varphi \rangle$ 是 $C_c^\infty(\Omega_1)$ 上的线性连续泛函, 这样从 T 又诱导出一个 $\mathcal{D}'(\Omega_1)$ 广义函数, 它可以记为 $T|_{\Omega_1}$, 在不产生混淆时也可简单定义为 T .

定义1.2.1: 若有一广义函数 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 对任一函数 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega_1)$ ($\Omega_1 \subset \Omega$) 成立: $\langle T, \varphi \rangle = 0$ (2.1) 则称 T 在 Ω_1 中为0. 若广义函数 T_1, T_2 在 Ω_1 中使 $T_1 - T_2$ 为0, 则称 T_1 与 T_2 在 Ω_1 中相等.

定理1.2.2: (单位分解定理) 若在 \mathbb{R}^n 中有开集组 $\{O_i\}$ ($i = 1, 2, \dots, k$) 覆盖紧集 K , 则可找到如下函数族

$\{\varphi_i\}$ 其中 $\varphi_i \geq 0$, $\varphi_i \in C_c^\infty(O_i)$, 且在 K 上 $\sum_{i=1}^k \varphi_i \equiv 1$.

证明: 因为开集 O_1 覆盖了 $K \setminus \bigcup_{i=2}^k O_i$, 故 $\delta_1 = d(\partial O_1, K \setminus \bigcup_{i=2}^k O_i) > 0$,

于是我们可以将 O_1 缩小为: $O'_1 = \{x \in O_1, \text{dist}(x, \partial O_1) > \frac{\delta_1}{2}\}$,

则 O'_1 与 O_2, \dots, O_k 一起构成对 K 的覆盖. 类似的, 可以逐个缩小 O_2, \dots, O_k , 使 O'_1, O'_2, \dots, O'_k 构成 K 的覆盖.

由定理1.1.1, 在每个 O_i 中都存在函数 $\psi_i(x)$, 使 $\psi_i \in C_c^\infty(O_i)$,

且在 O'_i 上 $\psi_i = 1$. 由于 $K \subset \bigcup_{i=1}^k O'_i$,

故 $\sum_{i=1}^k \psi_i$ 在 K 上恒大于0. 令 $\varphi_i(x) = \psi_i(x) / \sum_{i=1}^k \psi_i(x)$ 即得所需的分解


$1 = \sum_{i=1}^k \varphi_i(x)$.

定义1.2.2: 使广义函数 T 取零值的最大开集的余集, 称为广义函数的支集, 记为 $\text{supp} T$.

例1: δ 函数的支集是原点0.

例2: 将在 Ω 上几乎处处为0的函数视为广义函数, 其支集是空集.

定义1.2.3: 若 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中广义函数列 $\{T_k\}$ 对任一 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 均成立 $\langle T_k, \varphi \rangle \rightarrow 0$ $k \rightarrow \infty$ 则称 T_k 弱收敛于0. 若 $T_k - T$ 弱收敛于0, 则称 T_k 弱收敛于 T , 记为 $T_k \rightarrow T$



T.

定义1.2.5: 设T是 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 广义函数, 定义T关于 x_k 的偏导数 $\frac{\partial T}{\partial x_k}$ 为下式决定的广义函数:

$$\left\langle \frac{\partial T}{\partial x_k}, \varphi \right\rangle = - \left\langle T, \frac{\partial \varphi}{\partial x_k} \right\rangle, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega) \quad (2.6)$$

由于从 $\varphi_v \rightarrow 0 (C_c^\infty(\Omega))$ 可推出 $\frac{\partial \varphi_v}{\partial x_k} \rightarrow 0 (C_c^\infty(\Omega))$

所以(2.6)确实定义了一个 $C_c^\infty(\Omega)$ 上的广义函数. 即 $\frac{\partial T}{\partial x_k}$ 是 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 广义函数, 称为T关于 x_k 的广义导数或导数. 类似可以定义高阶导数: 对于重指标 α , 定义

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

关于广义导数的两个性质: (1): 广义函数任意阶导数成立. (2): 广义函数的导数与求导次序无关: 对任意

$\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ $\left\langle \frac{\partial^2 T}{\partial x_i \partial x_k}, \varphi \right\rangle$ 为什么等于 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的fourier变换?

$$= \left\langle T, \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_k \partial x_i} \right\rangle$$

$$= \left\langle T, \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_k} \right\rangle$$

$$= \left\langle \frac{\partial^2 T}{\partial x_k \partial x_i}, \varphi \right\rangle$$

$$\left(x^\alpha \partial^\beta f \right)^\wedge = (-1)^{|\alpha|} (i)^{|\beta|-|\alpha|} \partial^\alpha \left(\xi^\beta \hat{f} \right), \text{ 即 } x^\alpha \partial^\beta f \in L^1(\mathbb{R}^n), \text{ 故 } \partial^\alpha (\xi^\beta \hat{f}) \text{ 有界} \Leftrightarrow \hat{f} \in \mathcal{S}$$

广义函数的Fourier变换若 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 则定义f的Fourier变换:

$$(Ff)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot \xi} f(x) dx \text{ 其中: } x \cdot \xi = x_1 \xi_1 + \cdots + x_n \xi_n. (Ff)(\xi) \text{ 也常记为 } \hat{f}(\xi).$$

若 $g \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 还可定义g的Fourier逆变换为: $(F^{-1}g)(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot \xi} g(x) dx$.

我们有如下事实:

$$(1) \text{ 若 } f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n), \text{ 则 } \widehat{x_i f(\xi)} = -D_i \hat{f}(\xi), \widehat{D_i f(\xi)} = \xi_i \hat{f}(\xi),$$

$$\text{这里 } D_i = \frac{1}{i} \partial_i.$$

$$(2) \text{ 若 } f, g \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n), \text{ 则: } \langle \hat{f}, g \rangle = \langle f, \hat{g} \rangle \text{ 由此又可得出关于 } L^2(\mathbb{R}^n) \text{ 内积成立:}$$

$$(f, g) = (2\pi)^{-n} (\hat{f}, \hat{g})$$

原因是经过两次傅里叶变换后:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt e^{-j\theta \omega} d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j(\theta+t)\omega} d\omega dt = 2\pi x(-\theta)$$

Sobolev space: 定义1.3.1: 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一给定区域, 对 $m \geq 0, 1 \leq p \leq \infty$ 定义Sobolev空间 $H^{m,p}(\Omega)$ 为满足条件 $D^\alpha u \in L^p(\Omega)$ ($|\alpha| \leq m$) 的广义函数u全体构成的集合, 并装备以范数: $\|u\|_{H^{m,p}(\Omega)} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}$

$$\|u\|_{H^{m,\infty}(\Omega)} = \max_{|\alpha| \leq m} \|D^\alpha u\|_{L^\infty(\Omega)} \text{ 特别当 } p=2 \text{ 时, 记 } H^{m,2}(\Omega) \text{ 为 } H^m(\Omega)$$

这时可引进内积 $(u, v)_m = \sum_{|\alpha| \leq m} (D^\alpha u, D^\alpha v)_{L^2(\Omega)}$ 他们分别满足内积

和范数的几个要求的. 在以后的讨论中, 我们一般只要求所讨论的区域 Ω 有

界, 且边界 $\partial\Omega$ 为 C^∞ 光滑. 这里 C^∞ 光滑的定义是对任意 $x \in \partial\Omega$, 存在x的邻域U, 使 $U \cap$

$\partial\Omega$ 可用 $x_i = \varphi(x_1, \cdots, x_{j-1}, x_{j+1}, \cdots, x_n)$ 表示, 其中 $1 \leq i \leq n$, 且 φ 是 C^∞ 函

$$\int_{\mathbb{R}^n} x_i f(\xi) e^{-x \cdot \xi} dx = -D_i \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) e^{-x \cdot \xi} dx$$

数.显然,当区域 Ω 有界时边界 $\partial\Omega$ 是紧集,我们的假定即等价于在每个 $U_i(1 \leq i \leq N)$ 中, $\partial\Omega \cap U_i$ 可以用 C^∞ 显函数表示.

根据 $H^{m,p}(\Omega)$ 的定义我们有如下性质:

$$(1) H^{0,p}(\Omega) = L^p(\Omega)$$

$$(2) \text{若 } m_1 \geq m_2 \geq 0, \text{ 则 } H^{m_1,p}(\Omega) \subset H^{m_2,p}(\Omega);$$

$$\text{又若 } p_1 \geq p_2 \geq 1, \text{ 则 } H^{m,p_1}(\Omega) \subset H^{m,p_2}(\Omega) (\Omega \text{ 为有限区域.})$$

$$(3) \text{若 } u \in H^{m,p}(\Omega), |\beta| \leq m, \text{ 则}$$

$$D^\beta u \in H^{m-|\beta|,p}(\Omega)$$

$$(4) \text{若 } \tau: \Omega_x \rightarrow \omega_y \text{ 是一个 } C^\infty \text{ 变换, 其逆变换 } \tau^{-1} \text{ 也属于 } C^\infty, \text{ 且两个变换的Jacobi行列式在 } \bar{\Omega}_x \text{ 与 } \bar{\omega}_y \text{ 上都有界, } u \in H^{m,p}(\Omega_x). \text{ 则 } u(x) \text{ 经变换 } \tau \text{ 所导出的函数 } v(y) = u(\tau^{-1}(y)) \text{ 属于 } H^{m,p}(\omega_y).$$

$$\text{证明: } v(y) = u(\tau^{-1}(y))$$

$$= u(y_1(x_1 \cdots x_n), \cdots, y_n(x_1 \cdots x_n))$$

$$\int \cdots \int_{\omega_y} v(y_1 \cdots y_n) dy_1 \cdots dy_n$$

$$= \int \cdots \int_{\Omega_x} v(y_1(x_1 \cdots x_2), \cdots, y_n(x_1 \cdots x_n)) J dx_1 \cdots dx_n$$

$$\text{由于雅可比行列式 } J \text{ 有界, 所以若 } u \in H^{m,p}(\Omega_x), \text{ 则 } v \in H^{m,p}(\omega_y).$$