ЛП-№(008534)-(РГ-RU) от 21.01.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Листок-вкладыш – информация для пациента

АЦЦ®, 100 мг, 200 мг, порошок для приготовления раствора для приема внутрь (с ароматом апельсина)

Действующее вещество: ацетилцистеин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 4–5 дней, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат АЦЦ®, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата АЦЦ®.
3. Прием препарата АЦЦ®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата АЦЦ®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат АЦЦ®, и для чего его применяют

Препарат АЦЦ® содержит действующее вещество ацетилцистеин и относится к группе препаратов, называемых препаратами, применяемыми при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающими средствами, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; муколитическими средствами.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

АЦЦ® используется для **разжижения мокроты и облегчения откашливания** при респираторных заболеваниях, при которых образуется вязкая мокрота.

Показания к применению

Препарат АЦЦ® применяется для лечения взрослых и детей старше 2 лет при следующих заболеваниях и состояниях:

- острые и хронические заболевания органов дыхания, связанные с образованием вязкого трудноотделяемого бронхиального секрета: бронхит, трахеит, ларинготрахеит, бронхиолит, пневмония, абсцесс легкого, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), муковисцидоз, интерстициальные заболевания легких, ателектаз легкого (вследствие закупорки бронхов слизистой пробкой);
- катаральный и гнойный отит, гайморит, синусит (облегчение отхождения секрета);
- удаление вязкого секрета из дыхательных путей при посттравматических и послеоперационных состояниях.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 4–5 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата АЦЦ®

Противопоказания

Не принимайте препарат АЦЦ®, если:

- у Вас аллергия на ацетилцистеин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- у Вас язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
- у Вас дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- если Вы кормите грудью;
- Ваш ребенок младше 2-х лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата АЦЦ® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Данный препарат применяют с осторожностью, если у Вас наблюдаются следующие

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

заболевания и состояния:

- бронхиальная астма, обструктивный бронхит;
- наличие в прошлом (в анамнезе) язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
- печеночная и/или почечная недостаточность;
- непереносимость гистамина;
- варикозное расширение вен пищевода;
- кровохарканье, легочное кровотечение;
- заболевания надпочечников;
- артериальная гипертензия;
- беременность.

Если у Вас бронхиальная астма и обструктивный бронхит, то ацетилцистеин следует принимать под контролем бронхиальной проходимости.

Если Вы не способны эффективно откашливать мокроту, необходимо проводить удаление избыточного количества секрета.

Следует соблюдать осторожность при применении ацетилцистеина, если у Вас отмечалась язвенная болезнь в прошлом, особенно при сопутствующем применении других лекарственных средств, способных оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта.

Следует избегать применения препарата, если у Вас почечная и/или печеночная недостаточность, во избежание дополнительного образования азотистых соединений.

Следует соблюдать осторожность при применении ацетилцистеина, если у Вас непереносимость гистамина. Если Вы относитесь к данной группе пациентов, Вам следует избегать длительного лечения с применением ацетилцистеина, поскольку ацетилцистеин влияет на метаболизм гистамина и может приводить к развитию симптомов непереносимости (таких как головная боль, вазомоторный ринит, зуд).

При применении ацетилцистеина очень редко сообщалось о случаях развития тяжелых аллергических реакций, таких как синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла. При возникновении изменений кожи и слизистых оболочек Вам следует немедленно обратиться к врачу, прием препарата необходимо прекратить.

Присутствие легкого серного запаха является характерным запахом действующего

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

вещества.

Не следует принимать препарат непосредственно перед сном (рекомендуется принимать препарат до 18:00).

1 пакетик АЦЦ® (дозировка 100 мг) соответствует 0,24 ХЕ.

1 пакетик АЦЦ® (дозировка 200 мг) соответствует 0,23 ХЕ.

Дети и подростки

Препарат АЦЦ® противопоказан детям в возрасте до 2-х лет (см. раздел 2. «Противопоказания»).

Другие препараты и препарат АЦЦ®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Данная рекомендация особенно актуальна для следующих групп препаратов:

- **Средства для подавления кашля (противокашлевые средства).** При одновременном применении препарата АЦЦ® в сочетании с противокашлевыми лекарственными препаратами из-за подавления кашлевого рефлекса может возникнуть застой мокроты в бронхах. Перед назначением такого лечения необходима тщательная оценка Вашего состояния. Перед использованием этой комбинации необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
- **Антибиотики.** При одновременном применении с некоторыми группами антибактериальных препаратов, как тетрациклины (за исключением доксициклина), аминогликозиды, пенициллины (ампициллин), а также противогрибковых препаратов, таких как амфотерицин В, возможно их взаимодействие с тиоловой группой ацетилцистеина, что ведет к снижению активности обоих препаратов. Поэтому интервал между приемом этих препаратов и АЦЦ® должен составлять не менее 2 ч (кроме цефиксима и лоракарбефа).
- **Нитроглицерин.** Одновременное применение с ацетилцистеином может привести к расширению сосудов и усилению эффекта нитроглицерина. Если требуется совместное применение нитроглицерина и ацетилцистеина, то следует контролировать Ваше состояние на предмет потенциального снижения артериального давления (может быть серьезным и проявляться головной болью).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

- **Карбамазепин.** Одновременное применение ацетилцистеина и карбамазепина может выражаться в снижении концентрации карбамазепина до недостаточного для эффективного лечения.
- **Активированный уголь.** Одновременное применение ацетилцистеина и активированного угля может снизить эффект ацетилцистеина.
- **Парацетамол.** Ацетилцистеин устраняет токсические эффекты парацетамола.

Влияние препарата АЦЦ® на лабораторные исследования

Если Вам предстоит сдать какой-либо из следующих анализов, сообщите лечащему врачу, что Вы принимаете АЦЦ®, так как данный лекарственный препарат может повлиять на уровень:

- салицилатов в плазме крови;
- кетоновых тел в анализах мочи.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Поскольку нет достаточного опыта применения ацетилцистеина у беременных женщин, следует избегать приема препарата АЦЦ®, прием возможен только если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода.

Грудное вскармливание

Поскольку нет данных о выделении ацетилцистеина с грудным молоком, препарат АЦЦ® не следует применять в период грудного вскармливания. В случае необходимости применения препарата АЦЦ® в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Ацетилцистеин не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

АЦЦ® содержит сахарозу

Данный препарат содержит 2829,5 мг сахарозы на 1 пакетик для дозировки 100 мг и 2717 мг сахарозы на 1 пакетик для дозировки 200 мг.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Если врач когда-либо сообщал Вам о том, что у Вас есть непереносимость некоторых видов углеводов (сахаров), проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать прием АЦЦ®.

3. Прием препарата АЦЦ®

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые:

АЦЦ® (дозировка 100 мг): по 2 пакетика 2–3 раза в день (400–600 мг);

АЦЦ® (дозировка 200 мг): по 1 пакетику 2–3 раза в день (400–600 мг).

Применение у детей и подростков

Подростки старше 14 лет:

АЦЦ® (дозировка 100 мг): по 2 пакетика 2–3 раза в день (400–600 мг);

АЦЦ® (дозировка 200 мг): по 1 пакетику 2–3 раза в день (400–600 мг).

Дети от 6 до 14 лет:

АЦЦ® (дозировка 100 мг): по 1 пакетику 3 раза в день или по 2 пакетика 2 раза в день (300–400 мг);

АЦЦ® (дозировка 200 мг): по 1 пакетику 2 раза в день (400 мг).

Дети от 2 до 6 лет:

АЦЦ® (дозировка 100 мг): по 1 пакетику 2–3 раза в день (200–300 мг).

Муковисцидоз:

Пациенты с массой тела ≥ 30 кг: в случае необходимости возможно увеличение дозы до 800 мг.

Дети старше 6 лет:

АЦЦ® (дозировка 100 мг): по 2 пакетика 3 раза в день (600 мг);

АЦЦ® (дозировка 200 мг): по 1 пакетику 3 раза в день (600 мг).

Дети от 2 до 6 лет:

АЦЦ® (дозировка 100 мг): по 1 пакетику 4 раза в день (400 мг);

АЦЦ® (дозировка 200 мг): по 1 пакетику 2 раза в день (400 мг).

Детский возраст до 2 лет: АЦЦ® противопоказан у детей в возрасте до 2 лет.

Путь и способ применения

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Препарат применяется внутрь, после еды.

Порошок следует растворять в одном стакане воды комнатной температуры.

При разведении препарата используйте стеклянную посуду, избегайте контакта с металлами, резиной, кислородом, легко окисляющимися веществами.

Не следует принимать препарат непосредственно перед сном (рекомендуется принимать препарат до 18:00).

Дополнительный прием жидкости усиливает эффект разжижения мокроты.

Продолжительность терапии

Продолжительность курса лечения следует оценивать индивидуально. При кратковременных простудных заболеваниях длительность курса составляет 5–7 дней, при лечении хронических заболеваний – до нескольких месяцев (по рекомендации врача).

Если Вы приняли препарата АЦЦ® больше, чем следовало

В случае передозировки может возникнуть раздражение желудка и кишечника, которое может проявляться в виде боли в животе, тошноты, рвоты, диареи.

На сегодняшний день никаких серьезных побочных эффектов или симптомов отравления не наблюдалось, даже в случае употребления чрезвычайно высокой дозы (до 500 мг/кг/сутки). Однако, если Вы подозреваете передозировку препаратом АЦЦ®, сообщите об этом своему врачу.

Если Вы забыли принять препарат АЦЦ®

Примите следующую дозу препарата в обычное время согласно графику. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата АЦЦ® и немедленно обратитесь за медицинской помощью при появлении нижеперечисленных нежелательных реакций:

- **аллергических реакций**, которые могут возникать нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): кожный зуд; образование сыпи в виде волдырей (крапивница); остро возникающий отек кожи или слизистых оболочек

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

(ангионевротический отек); кожная сыпь (экзантема); реакции гиперчувствительности.

- **нежелательных реакций**, которые наблюдались очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): анафилактический шок, анафилактические/анафилактоидные реакции; серьезные кожные реакции, такие как синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата АЦЦ®

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): учащенное сердцебиение (тахикардия); низкое артериальное давление (артериальная гипотензия); головная боль; шум в ушах; воспаление слизистой рта (стоматит); боль в области живота, тошнота, рвота, диарея; лихорадка.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): затрудненное дыхание с неприятным ощущением напряжения дыхательных мышц (одышка), бронхоспазм (преимущественно у пациентов с гиперреактивностью бронхов при бронхиальной астме); расстройства пищеварения (диспепсия).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): кровотечения*.

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): отек лица; изжога; коллапс.

* Единичные сообщения о развитии кровотечений на фоне применения ацетилцистеина, иногда вместе с реакциями гиперчувствительности. Снижение агрегации тромбоцитов на фоне применения ацетилцистеина было подтверждено в некоторых исследованиях, клиническая значимость этого явления пока не выяснена.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, сообщите об этом врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленных на территории государства – члена Евразийского экономического

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефон: +7 (800) 550 99 03

E-mail: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Казахстан

010000, г. Астана, ул. Иманова, 13, БЦ «Нурсаулет»

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК

Телефон: +7 (7172) 235 135

E-mail: farm@dari.kz

www.ndda.kz

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон/факс: +375 (17) 242 00 29

E-mail: rcpl@rceth.by

www.rceth.by

Кыргызская Республика

720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, д. 25

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

Телефон: +996 312 21 92 88, +996 312 21 92 86

Факс: +996 312 21 05 08

E-mail: dlsmi@pharm.kg

Республика Армения

0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5

ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Телефон: +374 10 20 05 05, +374 96 22 05 05
E-mail: info@ampra.am
www.pharm.am

5. Хранение препарата АЦЦ®

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не принимайте данный лекарственный препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после надписи: «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат АЦЦ® содержит:

Действующим веществом является ацетилцистеин.

Каждый пакетик содержит 100 мг или 200 мг ацетилцистеина.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: сахароза, аскорбиновая кислота, сахарин, ароматизатор апельсиновый.

Внешний вид препарата АЦЦ® и содержимое упаковки

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (с ароматом апельсина).

Порошок белого или желтоватого цвета, частично агломерированный, с запахом апельсина.

Внешний вид раствора: от прозрачного до слегка опалесцирующего, бесцветный раствор.

По 3 г порошка в пакетик из комбинированного материала (алюминиевая фольга/бумага/полиэтилен).

По 20 и 50 пакетиков в картонную пачку вместе с листком-вкладышем.

Примечание: с целью контроля первого вскрытия с двух сторон картонной пачки допускается наличие прозрачных наклеек.

Не все виды упаковок могут быть представлены в продаже.

Держатель регистрационного удостоверения

Словения

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Сандоз д.д., Веровшкова 57, 1000 Любляна

Телефон: +386 1 580 3332

Факс: +386 1 568 3517

E-mail: info.sandoz@sandoz.com

Производитель

Выпускающий контроль качества:

Салютас Фарма ГмбХ, Отто-фон-Гюрике-Аллее 1, 39179 Барлебен, Германия.

За любой информацией о препарате, а также в случае возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

АО «Сандоз», 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 70;

Телефон: +7 (495) 660 75 09;

Факс: +7 (495) 660 75 10.

Республика Казахстан

ТОО «Сандоз Казахстан», 050022, г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 95;

Телефон: +7 (727) 258 10 48.

Республика Беларусь

Представительство АО «Сандоз Фармасьютикалз д.д.» (Словения) в Республике Беларусь

220084, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 3, помещение 49;

Телефон: +375 (17) 370 16 20;

Факс: +375 (17) 370 16 21.

Кыргызская Республика

ОсОО Неман Фарм

720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, Бульвар Эркиндик, 58а;

Телефон: +996 550 337501.

Республика Армения

ООО «Фарм Эталон Плюс»

2210, Республика Армения, Котайкская область, 19-ая ул. Аринджа, 11;

Телефон: +374 11 550051.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

В случае возникновения вопросов обращаться на адрес электронной почты adverse.event.russia@sandoz.com для Российской Федерации и на адрес электронной почты patient.safety.cis@sandoz.com для других стран.

Для претензий по качеству обращаться на адрес электронной почты complaint.eaeu@sandoz.com.

Различные торговые наименования

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации, Республике Беларусь, Кыргызской Республике под торговым наименованием АЦЦ®.

Препарат зарегистрирован в Республике Армения под торговыми наименованиями АЦЦ® 100 (дозировка 100 мг) и АЦЦ® 200 (дозировка 200 мг).

Препарат зарегистрирован в Республике Казахстан под торговыми наименованиями АЦЦ® (дозировка 100 мг) и АЦЦ® 200 (дозировка 200 мг).

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза https://eec.eaeunion.org/

ЛП-№(008534)-(РГ-RU) от 21.01.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Листок-вкладыш – информация для пациента

АЦЦ®, 200 мг, порошок для приготовления раствора для приема внутрь (с ароматом меда и лимона)

Действующее вещество: ацетилцистеин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 4–5 дней, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат АЦЦ®, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата АЦЦ®.
3. Прием препарата АЦЦ®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата АЦЦ®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат АЦЦ®, и для чего его применяют

Препарат АЦЦ® содержит действующее вещество ацетилцистеин и относится к группе препаратов, называемых препаратами, применяемыми при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающими средствами, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; муколитическими средствами.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

АЦЦ® используется для **разжижения мокроты и облегчения откашливания** при респираторных заболеваниях, при которых образуется вязкая мокрота.

Показания к применению

Препарат АЦЦ® применяется для лечения взрослых и детей старше 6 лет при следующих заболеваниях и состояниях:

- острые и хронические заболевания органов дыхания, связанные с образованием вязкого трудноотделяемого бронхиального секрета: бронхит, трахеит, ларинготрахеит, бронхиолит, пневмония, абсцесс легкого, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), муковисцидоз, интерстициальные заболевания легких, ателектаз легкого (вследствие закупорки бронхов слизистой пробкой);
- катаральный и гнойный отит, гайморит, синусит (облегчение отхождения секрета);
- удаление вязкого секрета из дыхательных путей при посттравматических и послеоперационных состояниях.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 4–5 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата АЦЦ®

Противопоказания

Не принимайте препарат АЦЦ®, если:

- у Вас аллергия на ацетилцистеин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- у Вас язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
- у Вас дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- если Вы кормите грудью;
- Ваш ребенок младше 6-ти лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата АЦЦ® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Данный препарат применяют с осторожностью, если у Вас наблюдаются следующие

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

заболевания и состояния:

- бронхиальная астма, обструктивный бронхит;
- наличие в прошлом (в анамнезе) язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
- печеночная и/или почечная недостаточность;
- непереносимость гистамина;
- варикозное расширение вен пищевода;
- кровохарканье, легочное кровотечение;
- заболевания надпочечников;
- артериальная гипертензия;
- беременность.

Если у Вас бронхиальная астма и обструктивный бронхит, то ацетилцистеин следует принимать под контролем бронхиальной проходимости.

Если Вы не способны эффективно откашливать мокроту, необходимо проводить удаление избыточного количества секрета.

Следует соблюдать осторожность при применении ацетилцистеина, если у Вас отмечалась язвенная болезнь в прошлом, особенно при сопутствующем применении других лекарственных средств, способных оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта.

Следует избегать применения препарата, если у Вас почечная и/или печеночная недостаточность, во избежание дополнительного образования азотистых соединений.

Следует соблюдать осторожность при применении ацетилцистеина, если у Вас непереносимость гистамина. Если Вы относитесь к данной группе пациентов, Вам следует избегать длительного лечения с применением ацетилцистеина, поскольку ацетилцистеин влияет на метаболизм гистамина и может приводить к развитию симптомов непереносимости (таких как головная боль, вазомоторный ринит, зуд).

При применении ацетилцистеина очень редко сообщалось о случаях развития тяжелых аллергических реакций, таких как синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла. При возникновении изменений кожи и слизистых оболочек Вам следует немедленно обратиться к врачу, прием препарата необходимо прекратить.

Присутствие легкого серного запаха является характерным запахом действующего

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

вещества.

Не следует принимать препарат непосредственно перед сном (рекомендуется принимать препарат до 18:00).

1 пакетик АЦЦ® соответствует 0,21 ХЕ.

Дети и подростки

Препарат АЦЦ® в данной лекарственной форме противопоказан детям в возрасте до 6-ти лет (см. раздел 2. «Противопоказания»).

Другие препараты и препарат АЦЦ®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Данная рекомендация особенно актуальна для следующих групп препаратов:

- **Средства для подавления кашля (противокашлевые средства).** При одновременном применении препарата АЦЦ® в сочетании с противокашлевыми лекарственными препаратами из-за подавления кашлевого рефлекса может возникнуть застой мокроты в бронхах. Перед назначением такого лечения необходима тщательная оценка Вашего состояния. Перед использованием этой комбинации необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
- **Антибиотики.** При одновременном применении с некоторыми группами антибактериальных препаратов, как тетрациклины (за исключением доксициклина), аминогликозиды, пенициллины (ампициллин), а также противогрибковых препаратов, таких как амфотерицин В, возможно их взаимодействие с тиоловой группой ацетилцистеина, что ведет к снижению активности обоих препаратов. Поэтому интервал между приемом этих препаратов и АЦЦ® должен составлять не менее 2 ч (кроме цефиксима и лоракарбефа).
- **Нитроглицерин.** Одновременное применение с ацетилцистеином может привести к расширению сосудов и усилению эффекта нитроглицерина. Если требуется совместное применение нитроглицерина и ацетилцистеина, то следует контролировать Ваше состояние на предмет потенциального снижения артериального давления (может быть серьезным и проявляться головной болью).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

- **Карбамазепин.** Одновременное применение ацетилцистеина и карбамазепина может выражаться в снижении концентрации карбамазепина до недостаточного для эффективного лечения.
- **Активированный уголь.** Одновременное применение ацетилцистеина и активированного угля может снизить эффект ацетилцистеина.
- **Парацетамол.** Ацетилцистеин устраняет токсические эффекты парацетамола.

Влияние препарата АЦЦ® на лабораторные исследования

Если Вам предстоит сдать какой-либо из следующих анализов, сообщите лечащему врачу, что Вы принимаете АЦЦ®, так как данный лекарственный препарат может повлиять на уровень:

- салицилатов в плазме крови;
- кетоновых тел в анализах мочи.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Поскольку нет достаточного опыта применения ацетилцистеина у беременных женщин, следует избегать приема препарата АЦЦ®, прием возможен только если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода.

Грудное вскармливание

Поскольку нет данных о выделении ацетилцистеина с грудным молоком, препарат АЦЦ® не следует применять в период грудного вскармливания. В случае необходимости применения препарата АЦЦ® в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Ацетилцистеин не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

АЦЦ® содержит сахарозу

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Данный препарат содержит 2507 мг сахарозы на 1 пакетик. Если врач когда-либо сообщал Вам о том, что у Вас есть непереносимость некоторых видов углеводов (сахаров), проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать прием АЦЦ®.

АЦЦ® содержит натрий

Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одном пакетике, то есть, по сути, не содержит натрия.

3. Прием препарата АЦЦ®

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые: по 1 пакетику 2–3 раза в день (400–600 мг).

Применение у детей и подростков

Подростки старше 14 лет: по 1 пакетику 2–3 раза в день (400–600 мг).

Дети от 6 до 14 лет: по 1 пакетику 2 раза в день (400 мг).

Муковисцидоз:

Пациенты с массой тела ≥ 30 кг: в случае необходимости суточная доза может быть увеличена до 800 мг в день.

Дети старше 6 лет: по 1 пакетику 3 раза в день (600 мг).

Детский возраст до 6 лет: АЦЦ® противопоказан у детей в возрасте до 6 лет.

Путь и способ применения

Препарат применяется внутрь, после еды.

Порошок следует растворять в одном стакане горячей, но не кипящей, воды. Полученный раствор перемешивают и выпивают горячим. Температура должна быть приемлема для питья. Приготовленный раствор необходимо употребить сразу после приготовления.

При разведении препарата используйте стеклянную посуду, избегайте контакта с металлами, резиной, кислородом, легко окисляющимися веществами.

Не следует принимать препарат непосредственно перед сном (рекомендуется принимать препарат до 18:00).

Дополнительный прием жидкости усиливает эффект разжижения мокроты.

Продолжительность терапии

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Продолжительность курса лечения следует оценивать индивидуально. При кратковременных простудных заболеваниях длительность курса составляет 5–7 дней, при лечении хронических заболеваний – до нескольких месяцев (по рекомендации врача).

Если Вы приняли препарата АЦЦ® больше, чем следовало

В случае передозировки может возникнуть раздражение желудка и кишечника, которое может проявляться в виде боли в животе, тошноты, рвоты, диареи.

На сегодняшний день никаких серьезных побочных эффектов или симптомов отравления не наблюдалось, даже в случае употребления чрезвычайно высокой дозы (до 500 мг/кг/сутки). Однако, если Вы подозреваете передозировку препаратом АЦЦ®, сообщите об этом своему врачу.

Если Вы забыли принять препарат АЦЦ®

Примите следующую дозу препарата в обычное время согласно графику. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата АЦЦ® и немедленно обратитесь за медицинской помощью при появлении нижеперечисленных нежелательных реакций:

- **аллергических реакций**, которые могут возникать нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): кожный зуд; образование сыпи в виде волдырей (крапивница); остро возникающий отек кожи или слизистых оболочек (ангионевротический отек); кожная сыпь (экзантема); реакции гиперчувствительности.
- **нежелательных реакций**, которые наблюдались очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): анафилактический шок, анафилактические/анафилактоидные реакции; серьезные кожные реакции, такие как синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата АЦЦ®

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): учащенное сердцебиение (тахикардия); низкое артериальное давление (артериальная гипотензия); головная боль; шум в ушах; воспаление слизистой рта (стоматит); боль в области живота, тошнота, рвота, диарея; лихорадка.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): затрудненное дыхание с неприятным ощущением напряжения дыхательных мышц (одышка), бронхоспазм (преимущественно у пациентов с гиперреактивностью бронхов при бронхиальной астме); расстройства пищеварения (диспепсия).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): кровотечения*.

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): отек лица; изжога; коллапс.

* Единичные сообщения о развитии кровотечений на фоне применения ацетилцистеина, иногда вместе с реакциями гиперчувствительности. Снижение агрегации тромбоцитов на фоне применения ацетилцистеина было подтверждено в некоторых исследованиях, клиническая значимость этого явления пока не выяснена.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, сообщите об этом врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленных на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефон: +7 (800) 550 99 03

E-mail: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

www.roszdravnadzor.gov.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Республика Казахстан

010000, г. Астана, ул. Иманова, 13, БЦ «Нурсаулет»

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК

Телефон: +7 (7172) 235 135

E-mail: farm@dari.kz

www.ndda.kz

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон/факс: +375 (17) 242 00 29

E-mail: rcpl@rceth.by

www.rceth.by

Кыргызская Республика

720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, д. 25

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

Телефон: +996 312 21 92 88, +996 312 21 92 86

Факс: +996 312 21 05 08

E-mail: dlsmi@pharm.kg

Республика Армения

0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5

ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»

Телефон: +374 10 20 05 05, +374 96 22 05 05

E-mail: info@ampra.am

www.pharm.am

5. Хранение препарата АЦЦ®

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не принимайте данный лекарственный препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после надписи: «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат АЦЦ® содержит:

Действующим веществом является ацетилцистеин.

Каждый пакетик содержит 200 мг ацетилцистеина.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: сахароза, аскорбиновая кислота, натрия сахаринат, ароматизатор лимонный, ароматизатор медовый.

Внешний вид препарата АЦЦ® и содержимое упаковки

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (с ароматом меда и лимона).

Порошок белого или желтоватого цвета, частично агломерированный, с запахом меда и лимона.

Внешний вид раствора: опалесцирующий, бесцветный раствор.

По 3 г порошка в пакетик из комбинированного материала (алюминиевая фольга/бумага/полиэтилен).

По 6, 10 или 20 пакетиков в картонную пачку вместе с листком-вкладышем.

Примечание: с целью контроля первого вскрытия с двух сторон картонной пачки допускается наличие прозрачных наклеек.

Не все виды упаковок могут быть представлены в продаже.

Держатель регистрационного удостоверения

Словения

Сандоз д.д., Веровшкова 57, 1000 Любляна

Телефон: +386 1 580 3332

Факс: +386 1 568 3517

E-mail: info.sandoz@sandoz.com

Производитель

Выпускающий контроль качества:

Салютас Фарма ГмбХ, Отто-фон-Гюрике-Аллее 1, 39179 Барлебен, Германия.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

За любой информацией о препарате, а также в случае возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

АО «Сандоз», 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 70;

Телефон: +7 (495) 660 75 09;

Факс: +7 (495) 660 75 10.

Республика Казахстан

ТОО «Сандоз Казахстан», 050022, г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 95;

Телефон: +7 (727) 258 10 48.

Республика Беларусь

Представительство АО «Сандоз Фармасьютикалз д.д.» (Словения) в Республике Беларусь

220084, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 3, помещение 49;

Телефон: +375 (17) 370 16 20;

Факс: +375 (17) 370 16 21.

Кыргызская Республика

ОсОО Неман Фарм

720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, Бульвар Эркиндик, 58а;

Телефон: +996 550 337501.

Республика Армения

ООО «Фарм Эталон Плюс»

2210, Республика Армения, Котайкская область, 19-ая ул. Аринджа, 11;

Телефон: +374 11 550051.

В случае возникновения вопросов обращаться на адрес электронной почты adverse.event.russia@sandoz.com для Российской Федерации и на адрес электронной почты patient.safety.cis@sandoz.com для других стран.

Для претензий по качеству обращаться на адрес электронной почты complaint.eaeu@sandoz.com.

Различные торговые наименования

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации и Кыргызской Республике под торговым наименованием АЦЦ®.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Препарат зарегистрирован в Республике Беларусь под торговым наименованием АЦЦ® Лимон и Мед.

Препарат зарегистрирован в Республике Армения под торговым наименованием АЦЦ® 200 Горячий напиток.

Препарат зарегистрирован в Республике Казахстан под торговым наименованием АЦЦ® 200.

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза https://eec.eaeunion.org/

ЛП-№(008534)-(РГ-RU) от 21.01.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Листок-вкладыш – информация для пациента

АЦЦ®, 600 мг, порошок для приготовления раствора для приема внутрь (с ароматом меда и лимона)

Действующее вещество: ацетилцистеин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 4–5 дней, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат АЦЦ®, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата АЦЦ®.
3. Прием препарата АЦЦ®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата АЦЦ®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат АЦЦ®, и для чего его применяют

Препарат АЦЦ® содержит действующее вещество ацетилцистеин и относится к группе препаратов, называемых препаратами, применяемыми при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающими средствами, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; муколитическими средствами.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

АЦЦ® используется **для разжижения мокроты и облегчения откашливания** при респираторных заболеваниях, при которых образуется вязкая мокрота.

Показания к применению

Препарат АЦЦ® применяют у взрослых и подростков старше 14 лет при следующих заболеваниях и состояниях:

- острые и хронические заболевания органов дыхания, связанные с образованием вязкого трудноотделяемого бронхиального секрета: бронхит, трахеит, ларинготрахеит, бронхиолит, пневмония, абсцесс легкого, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), муковисцидоз, интерстициальные заболевания легких, ателектаз легкого (вследствие закупорки бронхов слизистой пробкой);
- катаральный и гнойный отит, гайморит, синусит (облегчение отхождения секрета);
- удаление вязкого секрета из дыхательных путей при посттравматических и послеоперационных состояниях.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 4–5 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата АЦЦ®

Противопоказания

Не принимайте препарат АЦЦ®, если:

- у Вас аллергия на ацетилцистеин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- у Вас язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
- Вы или Ваш ребенок младше 14 лет;
- у Вас дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- если Вы кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата АЦЦ® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Данный препарат применяют с осторожностью, если у Вас наблюдаются следующие заболевания и состояния:

- бронхиальная астма, обструктивный бронхит;
- наличие в прошлом (в анамнезе) язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
- печеночная и/или почечная недостаточность;
- непереносимость гистамина;
- варикозное расширение вен пищевода;
- кровохарканье, легочное кровотечение;
- заболевания надпочечников;
- артериальная гипертензия;
- беременность.

Если у Вас бронхиальная астма и обструктивный бронхит, то ацетилцистеин следует принимать с осторожностью под контролем бронхиальной проходимости.

Если Вы не способны эффективно откашливать мокроту, необходимо проводить удаление избыточного количества секрета.

Следует соблюдать осторожность при применении ацетилцистеина, если у Вас отмечалась язвенная болезнь в прошлом, особенно при сопутствующем применении других лекарственных средств, способных оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта.

Следует избегать применения препарата, если у Вас почечная и/или печеночная недостаточность, во избежание дополнительного образования азотистых соединений.

Следует соблюдать осторожность при применении ацетилцистеина, если у Вас непереносимость гистамина. Если Вы относитесь к данной группе пациентов, Вам следует избегать длительного лечения с применением ацетилцистеина, поскольку ацетилцистеин влияет на метаболизм гистамина и может приводить к развитию симптомов непереносимости (таких как головная боль, вазомоторный ринит, зуд).

При применении ацетилцистеина очень редко сообщалось о случаях развития тяжелых аллергических реакций, таких как синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла. При возникновении изменений кожи и слизистых оболочек Вам следует немедленно обратиться к врачу, прием препарата необходимо прекратить.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Присутствие легкого серного запаха является характерным запахом действующего вещества.

Не следует принимать препарат непосредственно перед сном (рекомендуется принимать препарат до 18.00).

1 пакетик АЦЦ соответствует 0,17 ХЕ.

Дети и подростки

Препарат АЦЦ® противопоказан детям в возрасте до 14-ти лет (см. раздел 2. «Противопоказания»).

Другие препараты и препарат АЦЦ®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Данная рекомендация особенно актуальна для следующих групп препаратов:

- **Средства для подавления кашля (противокашлевые средства).** При одновременном применении препарата АЦЦ® в сочетании с противокашлевыми лекарственными препаратами из-за подавления кашлевого рефлекса может возникнуть застой мокроты в бронхах. Перед назначением такого лечения необходима тщательная оценка Вашего состояния. Перед использованием этой комбинации необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
- **Антибиотики.** При одновременном применении с некоторыми группами антибактериальных препаратов, как тетрациклины (за исключением доксициклина), аминогликозиды, пенициллины (ампициллин), а также противогрибковых препаратов, таких как амфотерицин В, возможно их взаимодействие с тиоловой группой ацетилцистеина, что ведет к снижению активности обоих препаратов. Поэтому интервал между приемом этих препаратов и АЦЦ® должен составлять не менее 2 ч (кроме цефиксима и лоракарбефа).
- **Нитроглицерин.** Одновременное применение с ацетилцистеином может привести к расширению сосудов и усилению эффекта нитроглицерина. Если требуется совместное применение нитроглицерина и ацетилцистеина, то следует контролировать Ваше состояние на предмет потенциального снижения артериального давления (может быть серьезным и проявляться головной болью).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

- **Карбамазепин.** Одновременное применение ацетилцистеина и карбамазепина может выражаться в снижении концентрации карбамазепина до недостаточного для эффективного лечения.
- **Активированный уголь.** Одновременное применение ацетилцистеина и активированного угля может снизить эффект ацетилцистеина.
- **Парацетамол.** Ацетилцистеин устраняет токсические эффекты парацетамола.

Влияние препарата АЦЦ® на лабораторные исследования

Если Вам предстоит сдать какой-либо из следующих анализов, сообщите лечащему врачу, что Вы принимаете АЦЦ®, так как данный лекарственный препарат может повлиять на уровень:

- салицилатов в плазме крови;
- кетоновых тел в анализах мочи.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Поскольку нет достаточного опыта применения ацетилцистеина у беременных женщин, следует избегать приема препарата АЦЦ®, прием возможен только если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода.

Грудное вскармливание

Поскольку нет данных о выделении ацетилцистеина с грудным молоком, препарат АЦЦ® не следует применять в период грудного вскармливания. В случае необходимости применения препарата АЦЦ® в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Ацетилцистеин не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

АЦЦ® содержит сахарозу

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Данный препарат содержит 2045 мг сахарозы на 1 пакетик АЦЦ®. Если врач когда-либо сообщал Вам о том, что у Вас есть непереносимость некоторых видов углеводов (сахаров), проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать прием АЦЦ®.

АЦЦ® содержит натрий

Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одном пакетике, то есть, по сути, не содержит натрия.

3. Прием препарата АЦЦ®

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Взрослые: по 1 пакетику один раз в день (эквивалентно 600 мг ацетилцистеина).

Применение у детей и подростков

Подростки старше 14 лет: по 1 пакетику один раз в день (эквивалентно 600 мг ацетилцистеина).

Детский возраст до 14 лет: АЦЦ® противопоказан у детей в возрасте до 14 лет.

Путь и способ применения

Препарат применяется внутрь, после еды.

Порошок следует растворять, помешивая, в одном стакане горячей воды. Полученный раствор выпивают горячим. Температура должна быть приемлема для питья. В случае необходимости приготовленный раствор можно оставить на 3 часа.

При разведении препарата используйте стеклянную посуду, избегайте контакта с металлами, резиной, кислородом, легко окисляющимися веществами.

Не следует принимать препарат непосредственно перед сном (рекомендуется принимать препарат до 18.00).

Дополнительный прием жидкости усиливает эффект разжижения мокроты.

Продолжительность терапии

Продолжительность курса лечения следует оценивать индивидуально. При кратковременных простудных заболеваниях длительность курса составляет 5–7 дней, при лечении хронических заболеваний – до нескольких месяцев (по рекомендации врача).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Если Вы приняли препарата АЦЦ® больше, чем следовало

В случае передозировки может возникнуть раздражение желудка и кишечника, которое может проявляться в виде боли в животе, тошноты, рвоты, диареи.

На сегодняшний день никаких серьезных побочных эффектов или симптомов отравления не наблюдалось, даже в случае употребления чрезвычайно высокой дозы (до 500 мг/кг/сутки). Однако, если Вы подозреваете передозировку препаратом АЦЦ®, сообщите об этом своему врачу.

Если Вы забыли принять препарат АЦЦ®

Примите следующую дозу препарата в обычное время согласно графику. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата АЦЦ® и немедленно обратитесь за медицинской помощью при появлении нижеперечисленных нежелательных реакций:

- **аллергических реакций**, которые могут возникать нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): кожный зуд; образование сыпи в виде волдырей (крапивница); остро возникающий отек кожи или слизистых оболочек (ангионевротический отек); кожная сыпь (экзантема); реакции гиперчувствительности.
- **нежелательных реакций**, которые наблюдались очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): анафилактический шок, анафилактические/анафилактоидные реакции; серьезные кожные реакции, такие как синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата АЦЦ®

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): учащенное сердцебиение (тахикардия); низкое артериальное давление (артериальная гипотензия); головная боль; шум в ушах; воспаление слизистой рта (стоматит); боль в области живота, тошнота, рвота, диарея; лихорадка.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): затрудненное дыхание с неприятным ощущением напряжения дыхательных мышц (одышка), бронхоспазм (преимущественно у пациентов с гиперреактивностью бронхов при бронхиальной астме); расстройства пищеварения (диспепсия).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): кровотечения*.

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): отек лица; изжога; коллапс.

* Единичные сообщения о развитии кровотечений на фоне применения ацетилцистеина, иногда вместе с реакциями гиперчувствительности. Снижение агрегации тромбоцитов на фоне применения ацетилцистеина было подтверждено в некоторых исследованиях, клиническая значимость этого явления пока не выяснена.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, сообщите об этом врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленных на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефон: +7 (800) 550 99 03

E-mail: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Казахстан

010000, г. Астана, ул. Иманова, 13, БЦ «Нурсаулет»

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК

Телефон: +7 (7172) 235 135

E-mail: farm@dari.kz

www.ndda.kz

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон/факс: +375 (17) 242 00 29

E-mail: rcpl@rceth.by

www.rceth.by

Кыргызская Республика

720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, д. 25

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

Телефон: +996 312 21 92 88, +996 312 21 92 86

Факс: +996 312 21 05 08

E-mail: dlsmi@pharm.kg

Республика Армения

0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5

ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»

Телефон: +374 10 20 05 05, +374 96 22 05 05

E-mail: info@ampra.am

www.pharm.am

5. Хранение препарата АЦЦ®

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не принимайте данный лекарственный препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после надписи: «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат АЦЦ® содержит:

Действующим веществом является ацетилцистеин.

Каждый пакетик содержит 600 мг ацетилцистеина.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: сахароза, аскорбиновая кислота, натрия сахаринат, ароматизатор лимонный, ароматизатор медовый.

Внешний вид препарата АЦЦ® и содержимое упаковки

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (с ароматом меда и лимона).

Порошок белого или желтоватого цвета, частично агломерированный, с запахом лимона и меда.

Внешний вид раствора: опалесцирующий, бесцветный раствор.

По 3 г порошка в пакетик из комбинированного материала (алюминиевая фольга/бумага/полиэтилен).

По 6, 10 или 20 пакетиков в картонную пачку вместе с листком-вкладышем.

Примечание: с целью контроля первого вскрытия с двух сторон картонной пачки допускается наличие прозрачных наклеек.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Держатель регистрационного удостоверения

Словения

Сандоз д.д., Веровшкова 57, 1000 Любляна

Телефон: +386 1 580 3332

Факс: +386 1 568 3517

E-mail: info.sandoz@sandoz.com

Производитель

Выпускающий контроль качества:

Салютас Фарма ГмбХ, Отто-фон-Гюрике-Аллее 1, 39179 Барлебен, Германия.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

За любой информацией о препарате, а также в случае возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

АО «Сандоз», 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 70;

Телефон: +7 (495) 660 75 09;

Факс: +7 (495) 660 75 10.

Республика Казахстан

ТОО «Сандоз Казахстан», 050022, г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 95;

Телефон: +7 (727) 258 10 48.

Республика Беларусь

Представительство АО «Сандоз Фармасьютикалз д.д.» (Словения) в Республике Беларусь

220084, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 3, помещение 49;

Телефон: +375 (17) 370 16 20;

Факс: +375 (17) 370 16 21.

Кыргызская Республика

ОсОО Неман Фарм

720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, Бульвар Эркиндик, 58а;

Телефон: +996 550 337501.

Республика Армения

ООО «Фарм Эталон Плюс»

2210, Республика Армения, Котайкская область, 19-ая ул. Аринджа, 11;

Телефон: +374 11 550051.

В случае возникновения вопросов обращаться на адрес электронной почты adverse.event.russia@sandoz.com для Российской Федерации и на адрес электронной почты patient.safety.cis@sandoz.com для других стран.

Для претензий по качеству обращаться на адрес электронной почты complaint.eaeu@sandoz.com.

Различные торговые наименования

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации и Кыргызской Республике под торговым наименованием АЦЦ®.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.10.2025 № 25116
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Препарат зарегистрирован в Республике Беларусь под торговым наименованием АЦЦ® Лимон и Мед.

Препарат зарегистрирован в Республике Армения под торговым наименованием АЦЦ® 600 Горячий напиток.

Препарат зарегистрирован в Республике Казахстан под торговым наименованием АЦЦ® Хот Дринк.

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о лекарственном препарате содержатся на веб-сайте Союза: https://eec.eaeunion.org/