ЛП-№(004051)-(РГ-RU) от 17.04.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.12.2023 № 25811
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Фенистил, 1 мг/мл, капли для приема внутрь

Действующее вещество: диметинден

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 7 дней, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Фенистил, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Фенистил.
3. Прием препарата Фенистил.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Фенистил.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Фенистил, и для чего его применяют

Препарат Фенистил содержит действующее вещество диметинден, относится к группе антигистаминных средств системного действия и применяется для лечения и профилактики аллергических заболеваний и кожного зуда различного происхождения.

Показания к применению

Препарат Фенистил применяется у взрослых и детей в возрасте от 1 месяца:

– при аллергических заболеваниях: заболевании, проявляющемся появлением зудящих, красных волдырей на поверхности кожи (крапивница); насморке, вызванном аллергией на цветочную пыльцу (сенная лихорадка); насморке, возникающем из-за аллергии (круглогодичный аллергический ринит); остро

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.12.2023 № 25811
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

возникающем отеке кожи и слизистых оболочек (ангионевротический отек); пищевой или лекарственной аллергии;

– при кожном зуде различного происхождения: кожном заболевании, сопровождающимся зудом, покраснением и высыпаниями (экзема); заболеваниях кожи, проявляющихся сыпью, покраснением кожи, жжением (зудящие дерматозы); в том числе при хроническом воспалительном заболевании кожи (атопический дерматит); кори; краснухе; ветряной оспе; укусах насекомых;
– для профилактики аллергических реакций во время проведения терапии, направленной на снижение чувствительности к аллергенам (гипосенсибилизирующей терапии).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Способ действия препарата Фенистил

Препарат Фенистил – это антигистаминное, противоаллергическое и противозудное средство. Действующее вещество диметинден приводит к деактивации вещества, участвующего в регуляции процесса воспаления в организме (гистамина), путем конкурентного подавления его в Н1-рецепторах.

Первичный ответ после приема препарата Фенистил ожидается в течение 30 мин, максимальный отклик ожидается в течение 5 часов. Эффект препарата при кожных реакциях после приема 4 мг диметиндена в качестве отдельной дозы ожидается до 24 часов после приема.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 7 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Фенистил

Противопоказания

Не принимайте препарат Фенистил

- если у Вас аллергия на диметинден или любые другие компоненты препарата Фенистил (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша),
- у детей младше 1-го месяца, особенно у недоношенных,
- если Вы кормите грудью,
- если у Вас заболевание глаз, сопровождающееся повышением внутриглазного давления (закрытоугольная глаукома),
- если у Вас бронхиальная астма,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.12.2023 № 25811
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- если у Вас доброкачественная опухоль предстательной железы (гиперплазия предстательной железы),
- у пожилых пациентов, страдающих спутанностью сознания.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Фенистил проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Это особенно важно, если:

- у Вас заболевание легких, при котором есть воспаление дыхательных путей и отек бронхов (хроническое обструктивное заболевание легких),
- у Вас эпилепсия,
- Вы беременны,
- возраст ребенка от 1 месяца до 1 года,
- Вы старше 65 лет.

Препарат неэффективен при зуде, связанном с повышением в крови содержания выводящихся с желчью веществ вследствие нарушения синтеза, секреции и оттока желчи (с холестазом).

Капли препарата Фенистил не следует подвергать воздействию высоких температур.

Препарат следует применять с осторожностью у пожилых пациентов в связи с повышенной вероятностью возникновения таких нежелательных реакций, как возбудимость и утомляемость. Противопоказано применение препарата у пожилых пациентов, страдающих спутанностью сознания.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте до 1 месяца (см. раздел 2 «Противопоказания»).

Фенистил следует применять с осторожностью у детей от 1 месяца до 1 года в связи с тем, что седативный эффект может сопровождаться эпизодами нарушения дыхания (ночное апноэ). В данной возрастной группе применение препарата рекомендовано после консультации с врачом и только по медицинским показаниям, требующим лечения с применением антигистаминных препаратов.

У детей младшего возраста, в частности в возрасте до 6 лет, антигистаминные препараты могут вызывать повышенную возбудимость.

Другие препараты и препарат Фенистил

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Не принимайте препарат Фенистил, если Вы принимаете опиоидные анальгетики, противосудорожные препараты, трициклические антидепрессанты, ингибиторы

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.12.2023 № 25811
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

моноаминоксидазы (МАО), антигистаминные средства, противорвотные средства, нейролептики, анксиолитики, снотворные средства, скополамин, этанол, т.к. совместное применение двух и более препаратов, угнетающих функцию центральной нервной системы (ЦНС), усиливает ее угнетение, что может приводить к нежелательным и даже угрожающим жизни последствиям.

Трициклические антидепрессанты и м-холинблокаторы (бронходилататоры, желудочно-кишечные спазмолитики, капли для расширения зрачков и т.п.) увеличивают антимускариновый эффект, повышают риск обострения глаукомы или задержки мочи.

Не принимайте препарат Фенистил совместно с прокарбазином, чтобы уменьшить подавление функций ЦНС.

Препарат Фенистил с алкоголем

Препарат Фенистил, как и многие антигистаминные препараты, может усиливать действие алкоголя. Алкоголь может усиливать седативный (снотворный) эффект препарата Фенистил.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Не рекомендуется принимать препарат во время беременности, за исключением случаев, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода и только под наблюдением врача.

Грудное вскармливание

Не принимайте препарат в период грудного вскармливания, т.к. диметиндена малеат может выделяться с грудным молоком.

Фертильность

Следует соблюдать осторожность при приеме препарата, если Вы планируете беременность.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Подобно другим антигистаминным средствам препарат Фенистил может ослаблять внимание, поэтому его следует принимать с осторожностью при управлении автомобилем, работе с механизмами или при других видах работ, где требуется повышенное внимание.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.12.2023 № 25811
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

3. Прием препарата Фенистил

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые

20 капель препарата соответствуют 1 мл препарата или 1 мг диметиндена.

Рекомендованная суточная доза составляет 3–6 мг диметиндена (60–120 капель), разделенная на 3 приема, то есть по 20–40 капель 3 раза в день.

Пациентам, склонным к сонливости, рекомендуется применять 40 капель перед сном и 20 капель утром.

Не превышайте рекомендованную дозу!

Пациенты пожилого возраста

Для пожилых пациентов (старше 65 лет) коррекция дозы не требуется.

Применение у детей и подростков

Фенистил противопоказан у детей в возрасте до 1 месяца.

Дети в возрасте от 1 месяца до 12 лет: рекомендована суточная доза из расчета 0,1 мг/кг массы тела, что эквивалентно 2 каплям на кг массы тела. Суточную дозу необходимо разделить на 3 приема.

Детям в возрасте от 1 месяца до 1 года следует принимать препарат только по назначению врача.

Режим дозирования для детей старше 12 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Путь и (или) способ введения

Для приема внутрь.

Флакон может иметь как обычную крышку, так и крышку, снабженную системой защиты от несанкционированного вскрытия детьми.

Для снятия крышки, снабженной системой защиты от несанкционированного вскрытия детьми, следует нажать на нее и одновременно повернуть согласно рисунку на крышке.

При назначении грудным детям Фенистил следует добавлять в бутылочку с теплым детским питанием непосредственно перед кормлением. Если ребенка уже кормят с ложки, капли можно давать неразведенными. Капли имеют приятный вкус.

Продолжительность терапии

Максимальная длительность применения препарата без консультации с врачом – 7 дней.

Если Вы приняли препарата Фенистил больше, чем следовало

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.12.2023 № 25811
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Симптомы

Если Вы приняли большее количество препарата, чем следовало, обратитесь к врачу.

Если Вы приняли препарата Фенистил больше, чем следовало, у Вас могут наблюдаться следующие симптомы: угнетение центральной нервной системы (ЦНС) и сонливость (в основном у взрослых), стимуляция ЦНС и м-холинблокирующие эффекты (особенно у детей и пожилых пациентов), в т.ч. возбуждение, нарушение координации движений (атаксия), учащенное сердцебиение (тахикардия), галлюцинации, сильное мышечное напряжение вместе с ритмичными подергиваниями мышц (тонико-клонические судороги), расширение зрачка (мидриаз), сухость во рту, «приливы» крови к лицу, задержка мочи, лихорадка, снижение артериального давления, резкое падение артериального давления (коллапс) и кома.

Лечение

При передозировке следует принять активированный уголь, солевые слабительные, лекарственные средства для поддержания деятельности сердечной и дыхательной систем (аналептические средства не должны применяться).

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Если Вы забыли принять препарат Фенистил

При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата Фенистил принимать специальные меры не требуется, примите обычную дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу! В дальнейшем продолжайте принимать препарат в соответствии с установленным режимом. В случае возникновения дополнительных вопросов по приему препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Фенистил может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Немедленно прекратите прием препарата и обратитесь к лечащему врачу, если у Вас появятся какие-либо из следующих симптомов, которые могут быть признаками аллергической реакции (анафилактоидной реакции), возникающей очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- отек лица,
- отек глотки,
- сыпь,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.12.2023 № 25811
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- мышечные спазмы,
- одышка.

Ниже перечислены другие нежелательные реакции, которые наблюдались при применении препарата Фенистил:

Очень часто (могут возникать у более чем у 1 человека из 10):

- утомляемость.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- сонливость,
- нервозность.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- беспокойство,
- головная боль,
- головокружение,
- желудочно-кишечные расстройства,
- тошнота,
- сухость во рту и горле.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Тел.: +7 (800) 550-99-03

Эл. почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: https://www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Армения

«Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э. Габриеляна» АОЗТ

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/4

Тел.: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Эл. почта: admin@pharm.am

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.12.2023 № 25811
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Сайт: www.pharm.am

Республика Беларусь

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Тел.: +375-17-242-00-29

Эл. почта: rcpl@rceth.by

Сайт: www.rceth.by

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Адрес: 010000, г. Астана, район Байконыр, ул. А. Иманова, 13

Тел.: +7 (7172) 235 135

Эл. почта: farm@dari.kz

Сайт: www.ndda.kz

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25

Тел.: + 996 (312) 21-92-88

Эл. почта: vigilance@pharm.kg

Сайт: www.pharm.kg

5. Хранение препарата Фенистил

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и флаконе.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.12.2023 № 25811
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Фенистил содержит

Действующим веществом является диметинден.

Каждый мл препарата содержит 1 мг диметиндена малеата.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются натрия гидрофосфата додекагидрат, лимонной кислоты моногидрат, бензойная кислота, динатрия эдетат, натрия сахаринат, пропиленгликоль, вода очищенная.

Внешний вид препарата Фенистил и содержимое упаковки

Препарат представляет собой капли для приема внутрь.

Прозрачная жидкость, от бесцветного до желтовато-коричневого цвета.

По 20 мл во флакон из темного стекла, снабженный капельницей-дозатором из полиэтилена и полипропиленовой крышкой белого цвета с системой контроля первого вскрытия или полипропиленовой крышкой белого цвета с системой контроля первого вскрытия и системой защиты от несанкционированного вскрытия детьми.

Флакон вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку.

На вторичной упаковке допустимо наличие контроля первого вскрытия.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

АО «Хелеон Рус»

123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, помещ. III, комната 9, эт 6

Тел.: +7 (495) 777-98-50

Телефон бесплатной «Горячей» линии: 8 (800) 333-46-94

Эл. почта: rus.info@haleon.com

Производитель

Швейцария

Хелеон КХ САРЛ

Haleon CH SARL, Route de l’Etraz, 1260 Nyon, Switzerland.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

АО «Хелеон Рус»

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.12.2023 № 25811
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, помещ. III, комната 9, эт 6

Тел.: +7 (495) 777-98-50

Телефон бесплатной «Горячей линии»: 8 (800) 333-46-94

Эл. почта: rus.info@haleon.com

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза http://eec.eaeunion.org/.

Листок-вкладыш доступен на всех языках Союза на веб-сайте Союза.