

## Klasifikasi PDP

Bentuk umum dari PDP linier order 2 dengan dua variabel adalah

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G$$

dengan  $A, B, C, \dots, G$  dan  $u$  adalah fungsi  $(x, y)$  dan dapat diturunkan 2 kali pada domain  $\Omega$ .

Klasifikasi PDP linier order 2 dengan dua variabel:

1. PDP Hiperbolik  $B^2 - 4AC > 0$
2. PDP Parabolik  $B^2 - 4AC = 0$
3. PDP Eliptik  $B^2 - 4AC < 0$

$$A^* = A\xi_x^2 + B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2$$

$$B^* = 2A\xi_x\eta_x + B(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + 2C\xi_y\eta_y$$

$$C^* = A\eta_x^2 + B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2$$

$$D^* = A\xi_{xx} + B\xi_{xy} + C\xi_{yy} + D\xi_x + E\xi_y$$

$$E^* = A\eta_{xx} + B\eta_{xy} + C\eta_{yy} + D\eta_x + E\eta_y$$

$$F^* = F$$

$$G^* = G$$

Persamaan (3.15) adalah bentuk kanonik dari PDP linier order 2 dengan dua variabel.

$$A^*w_{\xi\xi} + B^*w_{\xi\eta} + C^*w_{\eta\eta} + D^*w_{\xi} + E^*w_{\eta} + F^*w = G^*$$

## Hiperbolik

Bentuk kanonik PDP hiperbolik adalah

$$w_{\xi\eta} = H_1^*(\xi, \eta, w, w_{\xi}, w_{\eta}).$$

Langkah-langkah mengubah PDP hiperbolik ke bentuk kanoniknya:

1. Tentukan tipe PDP dengan mengecek

$$B^2 - 4AC > 0 \rightarrow \text{PDP hiperbolik}$$

2. Dapatkan persamaan karakteristiknya

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

$$\rightarrow \text{solusinya } \phi_1(x, y) = c_1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

$$\rightarrow \text{solusinya } \phi_2(x, y) = c_2$$

sehingga  $\xi(x, y) = \phi_1(x, y)$  dan  $\eta(x, y) = \phi_2(x, y)$

3. Dapatkan turunan  $\xi, \eta$  terhadap  $x, y$  sehingga didapat

$$\xi_x, \xi_y, \xi_{xx}, \xi_{xy}, \xi_{yy}, \eta_x, \eta_y, \eta_{xx}, \eta_{xy}, \eta_{yy}$$

4. Substitusi hasil no (3) ke persamaan (3.15) untuk mendapatkan

$$A^*, B^*, C^*, D^*, E^*, F^*, \text{ dan } G^*$$

5. Selesaikan hasil no (4) sehingga didapat hasil  $w(\xi, \eta)$

6. Transformasi hasil no (5) ke bentuk  $u(x, y)$

## Parabolik

Bentuk kanonik PDP parabolik adalah

$$w_{\eta\eta} = H_2^*(\xi, \eta, w, w_{\xi}, w_{\eta})$$

atau

$$w_{\xi\xi} = H_3^*(\xi, \eta, w, w_{\xi}, w_{\eta}).$$

Langkah-langkah mengubah PDP parabolik ke bentuk kanoniknya:

1. Tentukan tipe PDP dengan mengecek

$$B^2 - 4AC = 0 \rightarrow \text{PDP parabolik}$$

2. Dapatkan persamaan karakteristiknya

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B}{2A} \rightarrow \text{solusinya } \phi_1(x, y) = c_1$$

sehingga  $\xi(x, y) = \phi_1(x, y)$  dan  $\eta(x, y)$  adalah sebarang fungsi  $(x, y)$  dengan catatan

$$J = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} \neq 0$$

3. Dapatkan turunan  $\xi, \eta$  terhadap  $x, y$  sehingga didapat

$$\xi_x, \xi_y, \xi_{xx}, \xi_{xy}, \xi_{yy}, \eta_x, \eta_y, \eta_{xx}, \eta_{xy}, \eta_{yy}$$

4. Substitusi hasil no (3) ke persamaan (3.15) untuk mendapatkan

$$A^*, B^*, C^*, D^*, E^*, F^*, \text{ dan } G^*$$

5. Selesaikan hasil no (4) sehingga didapat hasil  $w(\xi, \eta)$

6. Transformasi hasil no (5) ke bentuk  $u(x, y)$

## Eliptik

Langkah-langkah mengubah PDP eliptik ke bentuk kanoniknya:

1. Tentukan tipe PDP dengan mengecek

$$B^2 - 4AC < 0 \rightarrow \text{PDP eliptik}$$

2. Dapatkan persamaan karakteristiknya

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B - i\sqrt{4AC - B^2}}{2A}$$

$$\rightarrow \text{solusinya } \alpha(x, y) = c_1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B + i\sqrt{4AC - B^2}}{2A}$$

$$\rightarrow \text{solusinya } \beta(x, y) = c_2$$

sehingga diperoleh

$$\xi(x, y) = \frac{\alpha + \beta}{2} \quad \text{dan} \quad \eta(x, y) = \frac{\alpha - \beta}{2i}$$

3. Dapatkan turunan  $\xi, \eta$  terhadap  $x, y$  sehingga didapat

$$\xi_x, \xi_y, \xi_{xx}, \xi_{xy}, \xi_{yy}, \eta_x, \eta_y, \eta_{xx}, \eta_{xy}, \eta_{yy}$$

4. Substitusi hasil no (3) ke persamaan (3.15) untuk mendapatkan

$$A^*, B^*, C^*, D^*, E^*, F^*, \text{ dan } G^*$$

5. Selesaikan hasil no (4) sehingga didapat hasil

$$w(\xi, \eta)$$

6. Transformasi hasil no (5) ke bentuk

$$u(x, y)$$

## Metode Pemisahan Variabel

Bentuk umum PDP order 2 dengan 2 variabel homogen adalah

$$A^*u_{xx} + B^*u_{xy} + C^*u_{yy} + D^*u_x + E^*u_y + F^*u = 0$$

dan bentuk kanoniknya adalah

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = 0$$

diasumsikan solusi dengan pemisah variabel yaitu

$$u(x, y) = X(x)Y(y) \neq 0$$

maka akan diperoleh

$$u_x = X'Y$$

$$u_y = XY'$$

$$u_{xx} = X''Y$$

$$u_{xy} = X'Y'$$

$$u_{yy} = XY''$$

## Getaran Dawai

Solusi permasalahan getaran dawai

$$u_{tt} - c^2u_{xx} = 0, \quad 0 < x < \ell, \quad t > 0$$

dengan kondisi awal

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq \ell$$

$$u_t(x, 0) = g(x), \quad 0 \leq x \leq \ell$$

dan batas

$$u(0, t) = 0, \quad t \geq 0$$

$$u(\ell, t) = 0, \quad t \geq 0$$

adalah

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) \left[ a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right) + b_n \sin\left(\frac{cn\pi}{\ell}t\right) \right]$$

dengan

$$a_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) dx,$$

$$b_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^{\ell} g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) dx.$$

## Konduksi Panas

Solusi permasalahan konduksi panas  $u_t = ku_{xx}$ ,  $0 < x < \ell$ ,  $t > 0$  dengan kondisi awal dan batas

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq \ell$$

$$u(0, t) = 0, \quad t \geq 0$$

$$u(\ell, t) = 0, \quad t \geq 0$$

adalah

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) e^{-\left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 kt}$$

dengan

$$a_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) dx.$$

## Metode Ekspansi Fungsi Eigen

Metode ini dapat digunakan jika permasalahan nonhomogen berupa **PDP nonhomogen dengan kondisi batas homogen**. Langkah-langkah metode eigen function expansion.

1. Dapatkan eigen function dari masalah homogen, misal  $\phi_n(x)$  = eigen function, maka solusinya adalah

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n(t) \phi_n(x). \quad (1)$$

2. Bagian nonhomogen dari PDP ( $G(x, t)$ ) diekspansi dari eigen function

$$G(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} h_n(t) \phi_n(x). \quad (2)$$

3. Substitusi ke PDP nonhomogen diperoleh PDB  $C_n(t)$ .
4. Cari solusi PDB  $C_n(t)$ .
5. Masukkan kondisi awal dan diperoleh  $C_n(0)$  dan  $C_n'(0)$ .

## PD Non-hom Kondisi & Batas Non-hom

Misalkan persamaan diferensial parsial nonhomogen:

$$u_{tt} = c^2u_{xx} + h(x, t)$$

dengan kondisi awal:

$$u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x)$$

dan kondisi batas nonhomogen:

$$u(0, t) = p(t), \quad u(\ell, t) = q(t)$$

Langkah-langkah penyelesaian:

1. Pemisahan solusi:

$$u(x, t) = v(x, t) + U(x, t)$$

dengan  $v(x, t)$  memenuhi kondisi batas homogen dan  $U(x, t)$  mengatasi kondisi batas nonhomogen.

2. Tentukan fungsi  $U(x, t)$  agar:

$$U(0, t) = p(t), \quad U(\ell, t) = q(t)$$

Ambil:

$$U(x, t) = p(t) + \frac{x}{\ell} (q(t) - p(t))$$

sehingga kondisi batas homogen diperoleh untuk  $v(x, t)$ :

$$v(0, t) = 0, \quad v(\ell, t) = 0$$

3. Substitusi ke persamaan utama:

$$v_{tt} - c^2v_{xx} = h(x, t) - U_{tt}(x, t)$$

atau:

$$v_{tt} - c^2v_{xx} = H(x, t)$$

4. Tentukan kondisi awal untuk  $v$ :

$$v(x, 0) = f(x) - U(x, 0)$$

$$v_t(x, 0) = g(x) - U_t(x, 0)$$

5. Selesaikan PDP untuk  $v(x, t)$  dengan kondisi batas homogen dan sumber baru  $H(x, t)$  menggunakan metode *eigen function expansion*.

6. Gabungkan solusi:

$$u(x, t) = v(x, t) + U(x, t)$$

## Solusi PDP Linier Tingkat Dua dengan Koefisien Konstan

Bentuk umum PDP linier tingkat dua adalah:

$$a u_{xx} + b u_{xy} + c u_{yy} + d u_x + e u_y + f u = g$$

dengan  $a, b, c, d, e, f, g$  fungsi-fungsi dari  $x$  dan  $y$ , atau konstan.

Untuk kasus koefisien konstan, bentuknya menjadi:

$$a u_{xx} + b u_{xy} + c u_{yy} = g(x, y)$$

dengan  $a, b, c$  konstan.

Definisikan operator:

$$D = \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\mathcal{D} = \frac{\partial}{\partial y}$$

$$D^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

$$D\mathcal{D} = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}$$

$$\mathcal{D}^2 = \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

Sehingga operator diferensial:

$$F(D, \mathcal{D}) = aD^2 + bD\mathcal{D} + c\mathcal{D}^2$$

dan bentuk PDP menjadi:

$$F(D, \mathcal{D})u = g(x, y)$$

**Penyelesaian umum** dari PDP ini adalah:

$$u = u_c + u_p$$

dengan:

- $u_c$ : *penyelesaian komplementer*, yaitu solusi dari persamaan homogen  $F(D, \mathcal{D})u = 0$

- $u_p$ : *penyelesaian partikular*, yaitu solusi dari persamaan nonhomogen  $F(D, \mathcal{D})u = g(x, y)$

Untuk menyelesaikan bagian homogen:

$$a u_{xx} + b u_{xy} + c u_{yy} = 0$$

gunakan substitusi  $u = e^{y+mx}$ , maka:

$$u_x = m e^{y+mx},$$

$$u_y = e^{y+mx},$$

$$u_{xx} = m^2 e^{y+mx},$$

$$u_{xy} = m e^{y+mx},$$

$$u_{yy} = e^{y+mx}$$

Substitusi ke PDE menghasilkan persamaan karakteristik:

$$am^2 + bm + c = 0$$

Dengan solusi  $m_1, m_2$ , bentuk umum solusi  $u_c$  bergantung pada sifat akarnya:

- Jika  $m_1 \neq m_2$  (real dan berbeda):

$$u_c = f(y + m_1 x) + g(y + m_2 x)$$

- Jika  $m_1 = m_2 = k$  (real dan kembar):

$$u_c = f(y + kx) + x g(y + kx)$$

atau

$$u_c = f(y + kx) + y g(y + kx)$$

- Jika  $m_1, m_2 = p \pm qi$  (kompleks konjugat):

$$u_c = f(y + (p + qi)x) + g(y + (p - qi)x)$$

Untuk penyelesaian partikularnya:

- Jika  $F(D, \mathcal{D})u = e^{ax+by}$ , maka:

$$\begin{aligned} u_p &= \frac{1}{F(D, \mathcal{D})} e^{ax+by} \\ &= \frac{e^{ax+by}}{F(a, b)} \quad \text{dengan } F(a, b) \neq 0 \end{aligned}$$

- Jika  $F(D^2, D\mathcal{D}, \mathcal{D}^2)u = \sin(ax+by)$ , maka:

$$\begin{aligned} u_p &= \frac{1}{F(D^2, D\mathcal{D}, \mathcal{D}^2)} \sin(ax + by) \\ &= \frac{\sin(ax + by)}{F(-a^2, -ab, -b^2)} \\ &\text{dengan } F(-a^2, -ab, -b^2) \neq 0 \end{aligned}$$

- Jika  $F(D^2, D\mathcal{D}, \mathcal{D}^2)u = \cos(ax + by)$ , maka:

$$\begin{aligned} u_p &= \frac{1}{F(D^2, D\mathcal{D}, \mathcal{D}^2)} \cos(ax + by) \\ &= \frac{\cos(ax + by)}{F(-a^2, -ab, -b^2)} \\ &\text{dengan } F(-a^2, -ab, -b^2) \neq 0 \end{aligned}$$

- Jika  $F(D, \mathcal{D})u = x^p y^q$  dengan  $p, q$  bilangan bulat positif, maka:

$$u_p = \frac{1}{F(D, \mathcal{D})} x^p y^q$$

- jika  $q < p$ , deretkan dalam  $\frac{p}{D}$  sampai  $\left(\frac{p}{D}\right)^q$

- jika  $p < q$ , deretkan dalam  $\frac{p}{\mathcal{D}}$  sampai  $\left(\frac{p}{\mathcal{D}}\right)^p$

- $\frac{1}{D - a\mathcal{D}} f(x, y) = \int f(x, c - ax) dx$  dengan  $c$  diganti  $y + ax$  setelah integrasi